ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2009
XVIII



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
504
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XVIII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2009 № 504

СОДЕРЖАНИЕ

1395-1418 Наблюдения за птицами в окрестностях Струпово (низовья реки Луги).
К.Ю.ДОМБРОВСКИЙ

1419-1421 Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major* похищает птенцов снегиря *Pyrrhula pyrrhula*.
А.В.БАРДИН

1421-1422 Новая находка мохноногого сыча *Aegolius finereus pallens* в Памиро-Алае.
И.А.АБДУСАЛЯМОВ, Р.Л.БЁМЕ

1422-1423 О распространении серой вороны *Corvus cornix* в тундровой зоне Ямала.
М.Г.ГОЛОВАТИН, В.А.СОКОЛОВ

1423 Зимние находки голубых сорок *Cyanopica cyanus* в Нижнем Приамурье.
В.Г.БАБЕНКО

Редактор и издатель А.В.Бардин

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2009
Дата опубликования: 23 сентября 2009

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XVIII
Express-issue

2009 № 504

CONTENTS

1395-1418 Observations on birds near Strupovo, Lower Luga. K.Yu.DOMBROVSKY

1419-1421 A great spotted woodpecker *Dendrocopos major* carries off nestlings of the bullfinch *Pyrrhula pyrrhula*. A.V.BARDIN

1421-1422 New record of the Tengmalm's owl *Aegolius funereus pallens* in Pamirs-Alai. I.A.ABDUSALAMOV, R.L.BEME

1422-1423 On distribution of the hooded crow *Corvus cornix* in tundra of Yamal. M.G.GOLOVATIN, V.A.SOKOLOV

1423 Winter records of the azure-winged magpie *Cyanopica cyanus* on Lower Amur. V.G.BABENKO

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
S.-Petersburg University
S-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2009

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2009, Том 18, Экспресс-выпуск **504**: 1395-1418*

Наблюдения за птицами в окрестностях Струпово (низовья реки Луги)

К.Ю.Домбровский

Государственный Научно-исследовательский институт озёрного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ), Набережная Макарова, д. 26, Санкт-Петербург, 199053, Россия

Поступила в редакцию 26 августа 2009


Весной 2001 года лаборатория мониторинга популяций лососевых рыб Государственного Научно-исследовательского института озёрного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ) получила возможность установить рыбоучётное заграждение (РУЗ) на реке Луге. Целью установки РУЗа является учёт «скатывающейся» весной в море молоди лосося и кумжи. Заграждение поставлено в приустьевом участке реки в деревне Струпово (59°36′44′′ с.ш., 28°08′59′′ в.д.) Кингисеппского района Ленинградской области, в 12 км от устья Луги. Струпово находится в южной части Кургальского полуострова, в его основании. Сам полуостров находится на южной трассе Беломоро-Балтийского пролётного пути и крайне интересен с орнитологической точки зрения. Кроме того, по линии шоссе, соединяющем Струпово с Усть-Лугой, проходит восточная граница Государственного комплексного заказника «Кургальский», созданного на полуострове в 2000 году.

РУЗ на реке Луга в деревне Струпово с 2001 теперь ежегодно устанавливается во второй-третьей декаде апреля (в зависимости от сроков схода льда и паводка) и работает до начала июня, после чего демонтируется. Круглосуточное дежурство всё это время ведётся посменно сотрудниками ГосНИОРХ.

Работая на РУЗе в сезоны 2001-2009 годов и выполняя свои профессиональные обязанности, я имел ещё возможность проводить некоторые орнитологические наблюдения. Так как отлучаться на длительное время от РУЗа я не мог, то ограничил свои наблюдения систематическими обходами маленького полуострова, находящегося между основным руслом Луги и старицей (см. рисунок).

Длина ежегодно обследуемого мною полуострова составляет 1200, ширина – 200 м. По полуострову вдоль берега Луги идёт слабо накатанная автомобильная колея. По ней изредка проезжают на легковых автомобилях рыбаки-любители. Вообще почти весь полуостров представляет собой заброшенный несколько лет назад покос. Растут здесь в основном луговые травы. Участок южнее старицы, как наиболее пониженный и сырой, прорезан узкой дренажной канавой, поросшей высоким тростником. Оба берега полуострова (как со стороны Луги, так и

со стороны старицы) покрыты довольно густой кустарниковой и древесной порослью с преобладанием ольхи, ивы, черёмухи. На мелководье у берегов местами можно видеть плотные заросли высокого тростника, между которыми есть протоки практически стоячей воды.



Участок орнитологических наблюдений (2001-2009) в Струпово, Ленинградская область.

Ширина Луги в районе деревни Струпово составляет около 200 м. Глубина на середине реки достигает 4 м. У берегов глубины значительно меньше. Левый берег (где проводились наблюдения) низкий, местами топкий и заиленный. Правый берег приподнятый, в основном песчаный. На правом берегу много молодых и спелых сосен.

Работая на РУЗе в режиме «неделя через неделю», я обычно проводил орнитологические наблюдения ежедневно по 2-3 раза в светлое время суток. Редко проводились наблюдения в тёмное время. Наблюдения заключались в обходе по периметру всего полуострова и фиксировании замеченных птиц. При этом в бинокль осматривалась постоянно часть акватории реки и противоположный берег. Птицы, замеченные там, тоже, конечно, отмечались в полевом дневнике. Но если принять во внимание, что почти всё светлое время суток я находился на берегу реки около базы (вне стен жилого вагона-бытовки), то наблюдения, можно сказать, были постоянными. Общая продолжительность весенних наблюдений с 2001 по 2009 годы составила 258 дней.

В этой статье я привожу результаты довольно поверхностных наблюдений за птицами, проведённых в определённое время года в окрестностях маленькой деревни, расположенной в основании Кургальского полуострова и находящейся на границе Кургальского заказника. Всего здесь мною отмечено 135 видов птиц (по состоянию на 10 июня 2009). Понятно, что данная работа даёт лишь рекогносцировочное

представление о птицах, встречающихся в данном районе, причём лишь в весенний период.

Результаты

Phalacrocorax carbo. В настоящее время в Ленинградской области на южном берегу восточной части Финского залива известно лишь одно место размножения большого баклана – Кургальский полуостров (Бубличенко 2000; Коузов 2007).

Весной 2001-2003 годов, несмотря на ежедневные экскурсии вдоль берега реки Луга в окрестностях Струпово, больших бакланов я не видел. Впервые здесь этих птиц я наблюдал 15 апреля 2004. Стая из 11 бакланов прилетела со стороны устья Луги и села на воду. Птицы быстро сплавлялись вниз по течению один за другим, цепочкой. Периодически 1-2 птицы ныряли, полностью скрываясь под водой. В стае заметны как старые особи с белёсым оперением головы (6 птиц), так и молодые с чёрными головами (5 птиц). 18 апреля наблюдал стаю из 8 больших бакланов: цепочкой летели мимо нашей базы в сторону устья Луги. 21 апреля, выстроившись клином, пролетело 33 больших баклана. Летели низко над рекой вверх по течению.

В 2005 году первого баклана я увидел 19 апреля. Взрослая особь (судя по «седой» голове) кормилась близ базы. После чего стала сушить расправленные крылья, выбравшись на маленький островок (площадью не более 1 м^2). Во время «сушки» крыльев дул очень сильный северный ветер, летел колючий мелкий снег, и температура воздуха не превышала +1°С. 20 апреля одиночный баклан пролетел кругом над рекой около базы. 21 апреля пролетели 2 баклана над рекой вверх по течению. Судя по окраске голов – это молодой и старый.

В 2006 году бакланов я не видел. В 2007 году, 19 апреля, в 9 ч 30 мин стая больших бакланов численностью более 50 особей пролетела, выстроившись клином, в сторону устья Луги.

Ardea cinerea. Серая цапля – обычная, но малочисленная птица. (Осенью я видел здесь серую цаплю 24 сентября 2000). В 2001 году 13 мая отмечена всего лишь раз одиночная птица, стоявшая на отмели. В 2002 году серые цапли встречались значительно чаще. Первая птица, пролетевшая над рекой, отмечена 14 апреля (наиболее ранняя дата за весь период наблюдений). В течение всего мая цапли здесь встречались практически ежедневно. Обычно одиночная птица охотится, стоя на берегу реки. Редко можно наблюдать пролетающих одновременно 2 особей. И лишь раз, 12 мая, пролетели вместе 3 серые цапли. Один из местных рыбаков сказал, что на острове, который расположен на Луге чуть ниже Струпово (рисунок), в зарослях сухого тростника серая цапля построила гнездо прямо на земле. К сожалению, проверить это сообщение не представилось возможным. В 2003-2007 годах оди-

ночная серая цапля (очень редко две), стоящая на урезе воды или пролетающая низко над рекой, встречалась с самого начала и до окончания наших работ на Луге. В 2004 году 20 апреля впервые здесь наблюдал сразу 6 цапель, пролетевших вверх по реке.

Ciconia ciconia. В окрестностях деревни Струпово белый аист встречается лишь эпизодически. Ближайшее гнездо белого аиста находится в 4 км юго-восточнее Струпово, в окрестностях деревни Ропша. Гнездо построено на кровле водонапорной башни около МТФ и известно с 1990 года (Пчелинцев, Ильинский 2004). В 2001-2008 годах я, часто проезжая в гнездовый период по шоссе мимо Ропши, постоянно наблюдал на гнезде 1-2 белых аистов. В 2001 году белых аистов в окрестностях Струпово не видел. В 2002, кроме разовых пролётов одиночных птиц над деревней (всего дважды за сезон наблюдений: 14 апреля и 29 мая), наблюдал парящих кругами высоко над рекой 3 птиц 14 мая. 2003 году 25 мая парившие кругами над деревней 3 аиста опустились на луг. Бродили по траве, что-то склёвывая. 4 июня один аист прилетел днём на луг и ходил по нему не менее 4 ч.

Весной 2004 года в деревне около одного из частных домов установили искусственное гнездовье: плоский настил из досок, укреплённый на длинном шесте. В период с 19 по 26 апреля трижды отмечен одиночный аист, парящий над Лугой и деревней Струпово (пара белых аистов на гнезде в Ропше отмечена с 16 апреля). 5 мая я наблюдал в посёлке Большое Кузёмкино (приблизительно в километре от гнезда) ходящего по огороду одиночного аиста. При этом пара белых аистов в это же время находилась на своём гнезде в Ропше. 8 мая вечером над Струпово восходящими кругами парили 2 птицы. Поднялись очень высоко, затеяв брачные игры. Одна из птиц как бы постоянно «нападала» в воздухе на другую, пикируя сверху. Вторая уворачивалась от нападений, иногда даже переворачиваясь в воздухе кверху лапами. Но ногами не отбивалась. Птицы не разлетались в стороны, а так и держались совсем рядом, продолжая свои игры. 10 мая над деревней летал 1 аист. 23 мая пролетели 2 по направлению к Ропше.

Весной 2005 года в деревне около одного из домов установили второе искусственное гнездовье: такое же, как в 2004. С 5 мая по 2 июня одну птицу можно было видеть около базы (всего 6 наблюдений). Возможно, белый аист появлялся бы здесь и чаще, но пара серых ворон, построившая своё гнездо на ольхе у старицы, агрессивно нападала на аиста, вынуждая его улетать в сторону. Белый аист, подвергаясь воздушному нападению ворóны (нападает всегда одна из них), громко стучит клювом, как деревянной трещоткой. Никаких попыток самообороны аист не предпринимает.

В 2006 году одиночный белый аист, летающий кругами высоко в небе, отмечен лишь 25 апреля. Описанные выше искусственные гнез-

довья в деревне аисты не заселили. В 2007 году белые аисты появлялись в окрестностях Струпово лишь в июне. Две птицы парили кругами над Лугой 1 июня, а 4 и 6 июня отметил лишь по одному аисту, пролетевшему через реку к лугу.

Cygnus cygnus. Обычен на весеннем пролёте. Самых первых кликунов здесь я наблюдал 8 апреля 2004: низко над Лугой на северовосток пролетели 4 лебедя. Причём было это не в Струпово, а на 20 км выше по течению реки, в деревне Кейкино. На момент наблюдения Луга уже вскрылась ото льда, но по реке постоянно плыли льдины и ледяное крошево, у берегов местами лежал плотный слой почерневшего зимнего льда. Непосредственно в Струпово пролетающих кликунов я наблюдал в разные годы с 12 апреля по 8-10 мая. Обычно птицы летят стаями (цепью) от 6 до 40 особей с рассвета до 15-16 ч, преимущественно в северо-восточном направлении. Скорее всего, птицы перемещаются со стороны Нарвского залива через Кургальский полуостров к южному побережью Финского залива. Известно, что весной лебеди в большом количестве останавливаются на отдых и кормёжку в районе посёлков Керново и Лебяжье (Мальчевский, Пукинский 1983). Обычно стаи кликунов летят на средней высоте. Птицы почти всегда громко перекликаются трубными, зычными голосами. Порой именно на звук я обращал внимание вначале, и уж потом замечал летящую стаю. В день открытия весеннего сезона охоты, в апреле, здесь с 6 ч начинается настоящая «канонада». С этого момента в окрестностях Струпово все пластинчатоклювые птицы перемещаются разрозненными стаями в совершенно непредсказуемых направлениях. Не являются исключением и кликуны. Хотя эти птицы, будучи спугнутыми выстрелами охотников, летят поодиночке: вдоль Луги вниз по течению, к устью реки.

Cygnus bewickii. Малого лебедя можно изредка наблюдать на весеннем пролёте. Возможно, они летят в смешанных стаях с кликунами (Мальчевский, Пукинский 1983). Мною малые лебеди отмечены лишь несколько раз. 23 мая 2003 утром стая из 8 птиц молча летела в сторону Лужской губы. 18 мая 2004 утром на Луге перед базой (примерно в 150 м от берега) плавали 4 птицы. Они улетели лишь тогда, когда по берегу и причальным мосткам начали часто ходить люди. 1 июня 2005 летели молча цепочкой 6 птиц в сторону Лужской губы. 7 мая 2006 встречена стая из более чем 100 птиц. Постоянно перекликаясь на высоких нотах, птицы летели к южному побережью Финского залива (в сторону посёлка Лебяжье).

22 мая 2007 в 8 ч 15 мин стая малых лебедей из 16 птиц попыталась сесть на Лугу около РУЗа, приняв, видимо, большие поплавки за сидящих на воде лебедей. Дело в том, что конструктивные особенности ловушки требуют применения поплавков, способных удерживать на

плаву довольно тяжёлые предметы. Нами при установке РУЗа в последние годы используются полиэтиленовые белые мешки из-под сахарного песка (на 50 кг), заполненные плотно закрытыми пустыми пластиковыми бутылями. Четыре таких ярко-белых мешка полуметровой длины, постоянно плавающих в 20 м от понтона РУЗа, очевидно, напоминают лебедям их сородичей (как чучела-приманки). Вышеупомянутая стая заходила на посадку, выставив вперёд лапы и тормозя в воздухе крыльями, но что-то спугнуло птиц. Взлетев выше деревьев и перестроившись в линию, малые лебеди полетели в сторону Лебяжьего. Через 1.5 ч был отмечен одиночный малый лебедь, плавающий на реке в 50 м от поплавков.

3 июня 2007 отмечена стая из 9 малых лебедей, в 6 ч 25 мин молча и невысоко пролетающая линией над рекой в юго-западном направлении к Нарвскому заливу.

Во время весенней миграции над деревней Струпово летят 4 вида гусей: серый ***Anser anser***, белолобый ***A. albifrons***, гуменник ***A. fabalis*** и пискулька ***A. erythropus***. В дни массового пролёта здесь можно наблюдать тысячные смешанные стаи летящих гусей. В основном, это гуменники и белолобые гуси. Серые гуси (их немного меньше) тоже летят вместе с вышеупомянутыми видами. В бинокль не всегда можно разглядеть птиц, и гуси определяются по голосам. Пискульки встречаются значительно реже и в гораздо меньших количествах. Самая крупная стая пискулек, которую я наблюдал 4 мая 2001, состояла из 30 гусей.

Branta leucopsis. Известно, что белощёких казарок в большом количестве можно наблюдать у побережья Кургальского полуострова и на близлежащих к нему островах. Чаще эти птицы встречаются здесь на осеннем пролёте (Бубличенко 2000). Что касается моих наблюдений, то 6 мая 2007 в 7 ч 10 мин отмечена стая численностью до 70 птиц. Белощёкие казарки, перекликаясь, летели низко, широким фронтом, «полосой» в западном направлении (возможно, в сторону Нарвского залива, к островам западного побережья Кургальского полуострова). Через 15 мин отмечена ещё одна стая – до 50 птиц. Характер и направление полёта такие же, как у предыдущей стаи.

Branta bernicla. Многочисленных чёрных казарок можно наблюдать у побережья Кургальского полуострова и на близлежащих к нему островах (Бубличенко 2000). 28 мая 2003 в 7 ч 50 мин я наблюдал стаю из 17 птиц, неровным клином летящих на средней высоте. Казарки изредка перекликались. Направление полёта – северо-восток. 19 мая 2004 в 10 ч 00 мин стая из 40-45 птиц неровным клином летела низко над лугом, редко перекликаясь, в северном направлении. В 19 ч 50 мин пролетели на восток 12 чёрных казарок, на большой высоте, редко перекликаясь. 16 мая 2005 в 11 ч 15 мин пролетели 3 птицы: ко-

сой линией, крыло к крылу, на средней высоте к северо-востоку, редко перекликаясь.

Branta canadensis. Впервые я увидел канадскую казарку, неторопливо расхаживающую по лугу между рекой и старицей, рано утром 9 мая 2002. Ещё 8 мая местные жители говорили, что по лугу ходит «раненый гусь», которого они безуспешно пытались поймать. Дескать, гусь этот слетает на воду, а там уж его не взять. 9 мая птица была мною обнаружена в 50 м от воды: она спокойно ходила по лугу и щипала короткую свежую траву. Подпустив меня на совершенно открытом месте на 20 м, казарка заволновалась. Вытянув шею, она стала тревожно оглядываться по сторонам, после чего взлетела. Сделав круг низко над Лугой, казарка набрала высоту и улетела в сторону полей за деревню. Второй раз здесь я видел этих казарок 21 мая 2006. В 10 ч 30 мин невысоко над лугом к северо-западу молча пролетела стая из 7 гусей. При помощи бинокля удалось рассмотреть, что стая состояла из 4 белолобых гусей и 3 канадских казарок.

Anas platyrhynchos. Обычна. Во время схода ледяного покрова на реке можно наблюдать стаи до 20-30 крякв (максимальное количество, которое я видел,– 60). Утки держатся около берегов, или «сплавляются» на льдинах группами по 5-10. В более позднее время (после полного схода льда и спада воды) на реке держатся лишь единичные пары или группки по 2-4 самца. Очень редко, и не каждый год, даже в середине мая можно увидеть стаи до 15 самцов (например, 18 мая 2006). В конце второй декады мая на реке появляются выводки: до 10 пуховичков в сопровождении самки. На обследуемом мною участке реки неоднократно наблюдал лишь по одному выводку.

Anas crecca. Обычен. Сразу после схода льда (обычно в середине апреля) свистунки на реке держатся стаями до 20 птиц (лишь 22 апреля 2006 наблюдал около 40 чирков). К концу апреля численность этих уток резко падает, и на реке остаются 1-2 пары.

Anas penelope. Обычна, но малочисленна. Редко и не каждый год можно увидеть плавающую стайку из 6-8 свиязей. Обычно на реке держатся 1-2 пары или 2 самца и 1 самка.

Anas querquedula. Обычен, но малочислен. После окончания ледохода можно наблюдать маленькие группы, состоящие из 2-4 самцов и 1-2 самок. В мае на обследуемом мною участке реки обычно остаётся 1 или, реже, 2 пары чирков-трескунков. А в конце месяца можно видеть лишь одиночного самца (самка, вероятно, сидит на гнезде).

Anas clypeata. Обычна, но малочисленна. В самом конце апреля, а чаще в мае, можно наблюдать от 1 до 3 пар широконосок.

Aythya ferina. В период моих наблюдений на Луге красноголовый нырок встречался редко. 13 апреля 2002 наблюдал стаю из 20 птиц. В 2005 одиночных самцов видел лишь 21 апреля и 5 мая.

Aythya fuligula. Обычна. В разные сезоны с середины апреля хохлатые чернети могут встречаться стаями до 20-35 птиц или небольшими табунками до 10. В стайках самцов всегда немного больше, чем самок: самцы составляют 60-70% от общего числа птиц. В мае Хохлатые чернети держатся обычно парами (после 15 мая этих уток здесь я не наблюдал).

Melanitta nigra. Единственный раз, 5 июня 2003, мною были отмечены самец и самка синьги, плавающие около берега реки Луги.

Bucephala clangula. Обычен, но встречается нечасто. В середине апреля можно наблюдать стаи до 20 птиц. Причём самцов в это время значительно больше, чем самок (более 80%). Позже птиц становится меньше, и на реке в окрестностях Струпово остаются 1-2 пары и одиночные самцы. В первой декаде июня можно уже наблюдать самцов в стадии линьки.

Mergus albellus. Встречается редко. В 2003 году наблюдал пару лутков лишь 22 апреля и 8 мая, в 2004 – пару увидел 15 апреля.

Mergus merganser. Большой крохаль на данном участке Луги встречается в основном в апреле (Домбровский 2007б). В начале – середине месяца здесь иногда можно наблюдать стаи из 10 или немногим более птиц. В конце апреля на участке обычно держится всего 1-2 пары. Да и те исчезают в начале мая. Лишь один раз одиночная самка была отмечена 19 мая 2005. В 2007 и 2008 годах большие крохали в районе Струпово вообще не встречались.

Pandion haliaetus. Скопа встречается редко: отмечаются 1-2 наблюдения, и то не каждый сезон (в 2002 и 2003 не отмечена). Обычно скопа охотится над рекой. Интересное поведение отмечено 4 мая 2001: птица довольно долго и низко парила над жилым вагоном базы, присматриваясь к свежей рыбе, лежащей в ящике на улице (плотва и корюшка длиной 15-20 см). Схватить рыбу птица не решилась, видимо, лишь потому, что видела меня, сидящего на крыльце вагона-бытовки.

Haliaeetus albicilla. Судя по литературным данным, одним из резерватов размножения орлана-белохвоста на Северо-Западе России является Кургальский полуостров (Бубличенко 2000; Пчелинцев 2003; Фёдоров 2009). Я впервые увидел эту птицу в окрестностях деревни Струпово утром 16 апреля 2004. Взрослый орлан пролетел низко над водой со стороны устья Луги и уселся на дерево на противоположном берегу реки. В течение получаса, пока я ходил по полуострову, орлан неподвижно сидел на ветке. Днём 22 апреля 2006 взрослая особь белохвоста парила высоко в небе над Струпово. Ещё раз орлан в этом году наблюдался 21 мая в такой же ситуации. 29 апреля 2007 отмечен орлан, слетевший с небольшого острова на середине реки Луги.

Accipiter nisus. Обычная, хотя и редко встречающаяся птица. В основном можно увидеть одну птицу от 1 до3 раз за сезон наблюдений.

Только однажды, 7 мая 2006, удалось наблюдать воздушные игры пары ястребов. Возможно, перепелятник гнездится в смешанном сосново-еловом лесу на противоположном от Струпово берегу Луги. В пользу этой версии говорит то, что перепелятник агрессивен по отношению к другим птицам именно тогда, когда он находится около леса на правом берегу. Например, именно оттуда ястреб отгонял серую ворону, оттуда нападал на канюка. Один раз наблюдал, как перепелятник пытался охотиться на стайку мелких воробьиных птиц, кормящихся на кустах ольхи и черёмухи около реки. Хищник осторожно и тихо перелетал низом зарослей, постепенно приближаясь к стайке. Лишь моё случайное появление спугнуло его.

Buteo lagopus. Непосредственно в деревне Струпово наблюдал летающего над лугом зимняка лишь 25 апреля 2006. Но в ближайших от Кургальского полуострова окрестностях эти птицы, по моим наблюдениям, встречаются довольно регулярно на весеннем пролёте.

Buteo buteo. Встречается нечасто, но ежегодно. Обычно можно видеть одиночного парящего канюка. Реже удавалось наблюдать брачные полёты пары птиц. Всего лишь один раз отмечена весенняя миграция: 20 мая 2006 сразу 7 канюков на большой высоте парящим полётом перемещались в северо-восточном направлении. Неоднократно приходилось видеть, как канюка над лугом «прогоняет» пара серых ворон или несколько пар дроздов-рябинников.

Aquila clanga. Видел большого подорлика лишь один раз. 16 апреля 2004 орёл пролетал низко над зарослями ольхи около реки. Заметив людей, сделал резкий разворот в воздухе и быстро полетел вдоль реки в сторону устья.

Circus cyaneus. Встречается нечасто и не каждый год. Впервые полевого луня я отметил 5 мая 2001: наблюдал брачные игры пары птиц. В 2003 году луни встречались с 28 апреля. В более ранний период – самец, позже – и самка. Обычно полевых луней удавалось увидеть поодиночке: либо самца, либо самку. Лишь один раз увидел пару. В 2004 году видел только одного самца (21 апреля). В 2005 году самца наблюдал с 20 апреля. А самку увидел только 5 мая. Встречал полевых луней ещё и в 2006 и 2008 годах – разовые наблюдения.

Circus pygargus. Луговой лунь встречается значительно реже полевого. 10 мая 2001 видел самца. 13 мая 2002 наблюдал, как несколько рябинников гоняют над лугом около реки самца. 28 мая 2003 видел самца. 19 мая 2006 удалось наблюдать, как на самца луня самоотверженно нападают две белые трясогузки. (Возможно, здесь я наблюдал и самок лугового луня, но не смог отличить их от самок полевого луня). В литературе есть сведения, что в 2008 году пара луговых луней регулярно наблюдалась над сельскохозяйственными угодьями между деревнями Струпово и Большое Кузёмкино (Фёдоров 2009).

Falco tinnunculus. Пустельги отмечены лишь в 2002 году. 15 апреля наблюдал, как самец и самка гонят над рекой серую ворону: со стороны высокоствольных сосняков к нашему пониженному берегу. Оба сокола «прижимали» ворону почти к самой воде, нападая на неё попеременно в воздухе практически постоянно. Отогнав серую ворону за реку, обе пустельги вернулись обратно. 26 апреля видел пустельгу, пролетевшую со стороны луга к реке.

Falco subbuteo. Впервые в окрестностях Струпово чеглок отмечен мною 30 апреля 2001. Сокол пролетел над дорогой между молодым сосняком и лугом. В 2002 году чеглока я видел дважды: 27 и 29 мая. Сокол пролетал над лугом, где в то время можно было наблюдать многочисленных стрекоз разных видов и размеров. В 2003 году, 6 августа (дата не входит в описываемый мною период времени), чеглок пролетел над шоссе почти в том же месте, где я его видел 30 апреля 2001.

Perdix perdix. Самец, стоящий на кочке заброшенного выпаса и изредка подающий голосовой сигнал, отмечен 27 мая 2003. Повторно серые куропатки отмечены 21 мая 2004: две птицы пролетели низко над этим же выпасом.

Coturnix coturnix. «Бой» перепела за все годы наблюдений я слышал здесь лишь один раз: 3 июня 2007 (Домбровский 2007в). С 6 до 7 ч в густой траве около речной старицы постоянно кричал самец. Ни раньше, ни позже в 2007 году (почти постоянно находясь у реки с 17 апреля по 7 июня) голоса перепела здесь я больше не слышал. Имеются сведения, что именно в 2007 году произошла очередная инвазия перепела в Ленинградскую область (Фокин, Потапов 2007).

Lyrurus tetrix. В весенний период в окрестностях Струпово можно практически постоянно слышать голоса токующих тетеревов. Начало токового периода мне застать не удалось ни разу: в то время, когда я оказывался здесь, т.е. 11-15 апреля, тетерева уже активно «бормотали» по утрам. Дважды мне удалось отметить осеннее токование: 21-24 сентября 2000 и 25 августа 2004. Токовища, по словам местных жителей, находятся северо-западнее деревни, в лесах Кургальского полуострова. Если учесть, что голос поющего тетерева в безветренную погоду можно услышать за 3 км (Иванов, Потапов 2008), то в данном случае сложно сказать, где именно токуют эти птицы. И ещё нужно отметить следующий факт. После сильных лесных пожаров летом 2006 года и последовавших за ними сильных рубок леса (как пострадавшего от огня, так и нет) тетерева явно сменили место тока: в 2007 году (во всяком случае, с 17 апреля по 24 мая) токующих птиц я вообще не слышал. Весной 2008 года голоса тетеревов доносились со значительно большего расстояния, чем прежде, и заметно реже.

Grus grus. Обычная птица. Самая ранняя встреча серого журавля – 8 апреля 2004 (слышал голос). Последнее наблюдение было за-

фиксировано 4 июня 2003: 5 птиц, выстроившись в линию, летели из-за Луги в сторону леса за деревню (на юго-запад). В 2007 году, тоже 4 июня, слышал голос. Наиболее часто здесь можно именно слышать журавлей. Наблюдать в основном приходится летящих птиц. Пролетают они либо группами по 2-3-4 птицы, либо стаями до 14 (максимум, что мне удалось наблюдать). Основное направление полёта – на северо-восток. Неоднократно наблюдал серых журавлей, кружащих над рекой «каруселью»: птицы замкнутым строем, представляющим собой круг, медленно парят в восходящих потоках воздуха, не взмахивая крыльями. Журавли то поднимаются ввысь, то снижаются. Численность птиц в таких «каруселях» колеблется от 3 до 14. Всего лишь раз я здесь наблюдал брачный танец 22 апреля 2003. Самец исполнял его перед самкой на открытом лугу на противоположной, относительно нашей базы, стороне реки.

Crex crex. Обычная птица. Появляется к середине мая (самое раннее наблюдение 5 мая 2001). В период тока одновременно можно слушать голоса 4-5 коростелей. Поздние ночные заморозки и заиндевелая трава (например, 11-12 мая 2002) нисколько не мешают птицам токовать практически всю ночь. В 2009 году коростель появился очень поздно – лишь 21 мая. Молодая трава, несмотря на запоздалую весну, выросла к этому времени уже до 20 см. Но в тот промежуток времени, когда я находился здесь (до 28 мая), можно было слышать голос лишь одной птицы.

Fulica atra. Лысуху я увидел в Струпово лишь в 2009 году. Когда наша бригада 22 апреля приехала для установки РУЗа, лысуха плавала около берега близ подтопленных тростников. До этого дня здесь людей вообще не было. И птица, несмотря на неожиданно для неё появившийся фактор беспокойства, продолжала держаться в 50 м от базы, плавая практически на одном месте. Продержалась лысуха здесь ещё и 23 апреля, отплывая немного в сторону, когда бригада забивала кувалдой металлические сваи причала в дно. В последующие дни лысухи здесь уже не было.

Charadrius dubius. Встречается очень редко. Видел лишь одного малого зуйка, бегающего по илу около воды, 23 апреля 2005.

Vanellus vanellus. Обычная, но малочисленная птица. Прилетает рано. Даже если мы в Струпово начинаем работать в первой декаде апреля, то чибисы в это время здесь уже присутствуют. Обычно чибисы летают над заброшенным выпасом около реки: но не более двух пар. 29 мая 2005 нашёл 3 пуховых птенцов в возрасте 2-3 дня. В последующие два дня чибисы (2 пары) здесь были очень агрессивны, постоянно отгоняли от выпаса пролетающую серую ворону, тоже гнездившуюся поблизости. В 2006-2008 годах чибисы здесь стали появляться заметно реже. Пролетали лишь изредка по 1-2 над рекой или выпасом.

Гнёздиться на старом выпасе птицы перестали. Биотоп, по сравнению с предыдущими сезонами, не изменился, но здесь появились лисицы *Vulpes vulpes*, которых раньше на маленьком обследуемом полуострове не было видно. Скорее всего, животные переплывают мелкую и узкую старицу, отделяющую полуостров от шоссе и от лесов Кургальского полуострова. Возможно, лисицы разоряют здесь гнёзда птиц, в том числе и чибисов.

Haematopus ostralegus. Встречается здесь очень редко. Известно, что с начала 1990-х немногочисленные кулики-сороки уже встречались на островах восточной части Финского залива (Леоке 1999). Местные рыбаки в 2001 году рассказывали мне, что в небольших количествах эти кулики постоянно встречаются в конце весны и в начале лета на восточном побережье Кургальского полуострова (например, в районе населённого пункта Липово). Я на Луге, в деревне Струпово, впервые отметил этих птиц 6 мая 2005. Пара куликов утром (в 7-8 ч), перекликаясь, пролетела в метре над водой вверх по течению реки. Через пять минут те же птицы пролетели в обратном направлении, но уже на высоте крон деревьев.

Tringa ochropus. Черныш обычен, но малочислен. Встречается ежегодно, но лишь по 1-2 (редко 3 вместе) птицы. Самое раннее токовое поведение отмечено 18 апреля 2007. Если учесть, что токование у чернышей начинается с момента занятия гнездового участка (Мальчевский, Пукинский 1983), то, наверное, их прилёт в этом районе можно отнести к началу второй декады апреля. Но эта дата, конечно, варьирует в разные годы. Последние токовые полёты наблюдались здесь мною 13 мая 2005.

Tringa glareola. Очень редок. Видел лишь дважды одного фифи 17 и 19 апреля 2004.

Tringa nebularia. Редок. Наиболее ранняя встреча отмечена 20 апреля 2004: большой улит токовал. Можно изредка наблюдать по 1 (редко 2) птицы до начала июня. И то не ежегодно.

Tringa totanus. Обычная, но малочисленная птица. Одиночных травников здесь можно наблюдать с начала третьей декады апреля. Токующие птицы в разные годы отмечались с 23 апреля по 18 мая. Стайки птиц (численностью не более 7) в зависимости от погодных условий наблюдались с 26 апреля (2004) до 5 мая (2007).

Actitis hypoleucos. Обычная, но малочисленная птица. Одиночных перевозчиков можно наблюдать уже с самого прибытия нашей экспедиционной группы на место: с начала второй декады апреля. Токующие кулики тоже отмечались в это время. Скорее всего, они начинают токовать здесь ещё раньше: так, например, на реке Луге около Лужского рыбоводного завода в 2005 году мною был отмечен токующий перевозчик 6 апреля. Но нужно отметить, что завод находится

южнее Струпово примерно на 40 км. Токовое поведение мною отмечено до 28 мая (2008, затяжная весна). Стаю куликов численностью в 20 особей я видел лишь один раз: 6 мая 2006.

Philomachus pugnax. Очень редко встречающаяся здесь птица. Видел турухтанов лишь дважды в 2003 году. 7 мая пролетела стая из 25 птиц, среди них хорошо были заметны самцы в брачном наряде. И 11 мая пролетели 4 птицы – скорее всего, две пары.

Gallinago gallinago. Редкая в период наблюдений птица. Иногда одиночного бекаса можно спугнуть с луга около реки (1-2 раза за сезон). Голос токующего бекаса за период наблюдений был отмечен с 16 апреля (2004) до 6 июня (2007), не более 2 наблюдений в сезон.

Scolopax rusticola. Редкая в период наблюдений птица. Наблюдать можно только во время брачных полётов перед наступлением вечерних сумерек: на тяге. Обычно одиночный вальдшнеп, издавая характерные звуки, пролетает вдоль реки над выпасом. Реже токующий кулик перелетает через реку от одного лесного массива к другому. В разные годы тяга отмечалась с 19 апреля до 29 мая.

Numenius arquata. Обычная, но малочисленная в период наблюдений птица (если не принимать во внимание пролетающие стаи). Приезжая работать в Струпово, часто застаёшь уже токующих кроншнепов. Наиболее ранние токовые полёты отмечены с 11-12 апреля (2002, 2005). Токующих одиночных куликов около реки в разные годы можно наблюдать до начала июня. Но это не ежедневно и изредка. Активный ток заканчивается, обычно, к началу, а иногда и к середине второй декады мая. Особо нужно отметить пролетающие над Лугой стаи (порой большие). Даты и время их пролёта, направление, численность сильно варьируют, поэтому я решил привести в этой заметке все имеющиеся у меня данные. В 2001-2003 годах летящих стаями кроншнепов я не наблюдал (хотя регулярность и интенсивность наблюдений была не ниже, чем в последующие годы). В 2004 году 19 апреля около 7 ч 30 мин стая численностью до 30 птиц, постоянно перекликаясь, пролетела в северо-восточном направлении. 21 апреля в 20 ч 15 мин такая же стая, постоянно перекликаясь, пролетела на восток. 26 апреля в 7 ч 30 мин стая из 35 кроншнепов пролетела тоже на восток; перекликались редко. В 2005 году 20 апреля в 7 ч 30 мин стая из 11 птиц пролетела в северном направлении, а 23 апреля в 10 ч стая численностью до 50 кроншнепов летела на юго-восток. В 2006 году удалось наблюдать самую крупную стаю: 23 апреля в 16 ч на значительной высоте, постоянно перекликаясь, в северо-восточном направлении пролетело около 160 птиц. В 2007 году 24 апреля в 13 ч 30 мин, часто перекликаясь, стая из 100 куликов широким фронтом летела на юго-восток. В 2008 году наблюдения в Струпово пришлись на более поздний период, поэтому лишь 13 мая была отмечена стайка кронш-

непов из 12 птиц, пролетавших над Лугой в сторону устья (на север) в 19 ч. И ещё 28 мая можно было наблюдать 8 птиц, с громкими трелями облетевших акваторию реки в районе деревни в 16 ч.

Limosa limosa. Очень редко встречающаяся здесь птица. Лишь дважды слышал голос большого веретенника: 19 апреля 2005 и 17 апреля 2007.

Larus canus. Обычная, малочисленная в период наблюдений птица. Одну или нескольких сизых чаек можно видеть почти ежедневно. Птицы иногда пролетают над рекой вместе с малочисленными серебристыми и озёрными чайками. Лишь 2 мая 2007 стая численностью около 100 птиц (ещё вместе с 20 озёрными чайками) на короткое время расселась на реке напротив базы.

Larus argentatus. Обычная, немногочисленная в период наблюдений птица. Реку в окрестностях базы постоянно «патрулируют» несколько серебристых чаек. Рано утром, после рассвета, небольшие группы птиц постоянно летят со стороны Лужской губы в сторону полей. Изредка пара серебристых чаек может сесть на воду близ базы и токовать. После дождя на заброшенном выпасе может собраться стая до 50 и более птиц, где они кормятся выползающими червями.

Larus fuscus. Редка. Можно наблюдать лишь одиночных клуш в течение всего периода наблюдений: обычно вместе с несколькими серебристыми чайками.

Larus ridibundus. Обычная, малочисленная в период наблюдений птица. Одну или нескольких охотящихся озёрных чаек можно видеть ежедневно.

Larus minutus. Малочисленна в период наблюдений. Пролетают над рекой только в мае. Обычно можно наблюдать не более двух раз за сезон от одной до нескольких птиц. Лишь 5 мая 2006 видел стаю из 40 птиц: некоторое время чайки с криками покружились довольно высоко над рекой, после чего улетели в сторону полей за деревню.

Chlidonias nigra. Очень редко встречающаяся птица. Видел чёрных крачек здесь лишь дважды. 20 мая 2004 над рекой пролетели 4 птицы. 20 мая 2006 вместе с 3 речными крачками охотилась 1 чёрная.

Sterna hirundo. Обычная, малочисленная в период наблюдений птица. Первую речную крачку можно наблюдать 23-25 апреля (наиболее ранние встречи). Постоянно здесь держится 1 (редко 2) пары. Охотятся над водой, отдыхать любят на деревянном понтоне РУЗа, установленном на середине реки.

Sterna albifrons. Очень редко встречающаяся птица. В 2005 году видел одну пролетевшую малую крачку 29 мая, а 1 июня наблюдал трёх, охотящихся над рекой. В 2006 году 23 мая отмечена одиночная охотящаяся птица. 29 мая 2008 над водой летала 1 малая крачка.

Columba palumbus. Обычная птица. Когда мы приезжаем рабо-

тать в Струпово (обычно во второй декаде апреля), то вяхири уже здесь. Можно предположить, что прилетают они сюда в первой декаде апреля (Мальчевский, Пукинский 1983). Постоянно повторяющиеся голоса голубей (не обязательно ток) отмечены, в разные годы, с 14 апреля по 6 июня. (Скорее всего, голоса вяхирей можно услышать здесь и позже, но мы в это время уже покидаем Струпово). Обычно токовое поведение можно наблюдать с конца апреля до конца мая. Демонстративные полёты вяхири совершают, как правило, над рекой и лугом, перелетая от одного лесного массива к другому. В 2005 году в период с 20 по 30 апреля на старом выпасе, на выгоревшей после пала траве, кормились стаей от 20 до 40 голубей. До 14 мая птицы продолжали регулярно собираться на выпасе, но уже по 7-9 особей. 15 мая было отмечено всего 4 вяхиря, а 18 мая по выросшей уже новой траве ходил лишь один голубь. Ни в предыдущие, ни в последующие годы стаи вяхирей на выпасе не наблюдались.

Cuculus canorus. Обычная птица. Кукование самцов можно услышать в первых числах мая. Наиболее раннее наблюдение – 1 мая 2002. С этого момента голоса птиц раздаются постоянно, из нескольких мест одновременно. Обычны в мае летающие друг за другом кукушки в ольшанике у реки. В это время часто можно слышать «хохот» самок. 9-10 июня, когда мы снимаем РУЗ и уезжаем из Струпово, кукушки продолжают ещё токовать. Например, находясь здесь14 июля 2003, я слышал голос этой птицы.

Asio otus. Видел здесь ушастую сову только в 2006 году дважды. 24 апреля, около 22 ч 30 мин, в наступающих сумерках от ольшаника у старицы к таким же зарослям на берегу Луги через открытый луг пролетела ушастая сова. На лету обычно «бесшумная» птица звучно хлопала крыльями при каждом взмахе: явно токовый полёт. Через полчаса, в уже почти совсем сгустившейся темноте, долго и часто слышен однообразный голос ушастой совы. 2 мая после заката, в 23 ч, ушастая сова тихо пролетела над лугом и села в заросли ольхи около старицы.

Aegolius funereus. Мохноногого сыча я наблюдал в Струпово вне того периода, к какому относятся все приводимые здесь наблюдения. Но считаю нужным сообщить об этом, так как в весенний период я мохноногого сыча не видел и не слышал. Голос сыча (отрывистые вскрики *«квау, квау»*) я отметил утром 23 сентября 2000. Доносился он из ольшаника, растущего около старицы. Здесь же летали с громким карканьем несколько серых ворон. Увидеть сыча в этот раз мне не удалось. Зато вечером, в 21 ч (закат в это время уже угасал, надвигались сумерки) я увидел сидящего на нижних ветках ольхи, у той же старицы, мохноногого сыча. Подпустил меня к себе птица шагов на десять, после чего бесшумно скрылся в густеющих сумерках. 24 сентября

около 8 ч я вновь услышал голос мохноногого сыча, доносящийся из того же ольшаника. И тут же опять нервно закричали несколько серых ворон. Подходить близко я не стал, чтобы не заставлять сыча вылетать из укрытия перед воронами.

Caprimulgus europaeus. Удалось увидеть козодоя здесь лишь в 2004 году, но зато дважды. Утром 22 апреля, около 7 ч 30 мин, я спугнул козодоя с ольхового дерева у реки. Птица характерным для неё быстрым и бесшумным, немного «мечущимся» в стороны, полётом скользнула над лугом и скрылась. Казалось бы, для такой типично насекомоядной птицы, как козодой, срок встречи очень ранний. Но известно, что козодой в Ленинградской области появляется сравнительно рано, в последнюю неделю апреля (Мальчевский, Пукинский 1983). В 2004 году апрель был достаточно тёплым (с 15 по 22 апреля средняя дневная температура воздуха в окрестностях Струпово составила +15°С, причём 20 апреля дневная температура достигла +20°С). 21 мая около 11 ч козодой, пролетев низко над грунтовой дорогой, сел на ольху у старицы. При моём приближении птица слетела и быстро скрылась из вида. Надо отметить, что вокруг деревни Струпово (как со стороны Кургальского полуострова, так и со стороны противоположного берега Луги) тянутся соснового леса, к которым обычно и тяготеет козодой в гнездовый период.

Apus apus. Обычная, но немногочисленная здесь птица. Возможно, стрижи прилетают сюда кормиться из посёлка «Ленрыба» или из Усть-Луги, где их довольно много и где они, скорее всего, гнездятся под крышами многоквартирных кирпичных и блочных домов. В Струпово одиночные чёрные стрижи появляются в период от 17 до 20 мая. Они летают над рекой и лугом вместе с ласточками, но только держатся в воздухе выше, чем эти птицы. Обычно можно наблюдать от 1-3 до 6 птиц. Только лишь 20-23 мая 2007 здесь охотилась стая численностью до 15 стрижей.

Alcedo atthis. Редко встречающаяся птица. В конце сентября 2000 в деревне Струпово мне довелось провести лишь одну неделю. Хотя эта неделя не входит в описываемый мною период наблюдений, считаю необходимым упомянуть о встрече зимородка: с 21 по 24 сентября одиночная птица постоянно охотилась за мелкой рыбой у берега. Дальнейшие наблюдения относятся к весеннему периоду (Домбровский 2007а). 30 апреля и 1 мая 2001 близ берега изредка можно было увидеть пролетающую низко над водой птицу. Зимородок летает то вверх, то вниз по течению. 14 мая 2002 я увидел пролетевшего зимородка лишь один раз. 6 мая 2007 удалось наблюдать тоже одного пролетевшего зимородка.

Jynx torquilla. Обычная птица. Прилетает довольно рано: первая встреча отмечена 19 апреля (2004). После прилёта вертишейка часто

подаёт голос, перелетая по кустам ольхи около реки или около старицы. Голос этой птицы можно услышать в течение всего мая и в первой декаде июня: в это время мы покидаем Струпово, и насколько долго здесь ещё пребывает вертишейка, я не знаю. Если прислушаться к голосам, то можно сказать, что птиц весной здесь достаточно много. Так, например, 13 мая 2008 я слышал одновременно голоса трёх птиц, доносящиеся с разных сторон.

Dryocopus martius. Обычен. Приезжая на установку РУЗа, уже в первый же день можно услышать как голос, так и барабанную трель желны, доносящиеся, обычно, с правого берега Луги, со стороны высокоствольных сосняков. Голос птицы, а иногда и пролетающую через реку одиночную желну я отмечал до самого окончания нашей работы на реке. То есть, с 16 апреля по 7 июня этот дятел здесь обычен. Нужно добавить, что оказавшись в Струпово 25 августа 2004 года, я также услышал голос желны.

Dendrocopos leucotos. Обычная птица. В течение всего срока наблюдений (середина апреля – первая декада июня) периодически можно слышать весеннюю барабанную трель. В этот же период на деревья ольхи, растущие вдоль берега Луги, периодически прилетают и сами птицы. Наблюдал как самца, так и самку (но порознь).

Dendrocopos major. За все годы наблюдений здесь я увидел этого дятла лишь 22 апреля 2009. Самец обстукивал ствол усыхающей ольхи. Весеннюю барабанную трель большого пёстрого дятла в этом году я слышал 23-24 апреля и 6 мая.

Dendrocopos minor. Редко встречающаяся птица. Наблюдал одиночного самца в прибрежном ольшанике лишь дважды: 12 мая 2003 и 22 апреля 2005.

Lullula arborea. Юлу, или лесного жаворонка видел лишь один раз: 21 апреля 2005 одиночный самец токовал, сидя на небольшой ольхе около реки. Судя по литературным данным (Фёдоров 2009), эта птица не является здесь редким видом.

Alauda arvensis. Обычен. В период наших работ можно постоянно слышать песни полевых жаворонков над заброшенным выпасом.

Riparia riparia. Малочисленна. Обычно несколько птиц (максимум до 15) охотятся среди других ласточек над водой. Первая встреча отмечена 17 мая.

Hirundo rustica. Обычна. Деревенские ласточки прилетают в район наблюдений в конце апреля – начале мая. Наиболее ранние встречи зафиксированы 23 и 24 апреля 2004: одиночная птица летала вместе с 4-5 городскими ласточками. С конца первой декады мая и до конца месяца деревенские ласточки собирают сырой ил с берега реки. Охотятся над водой и лугом стаями по 30-40 птиц (изредка можно наблюдать до сотни).

Delichon urbica. Обычна. Прилетают в район наблюдений в конце апреля – начале мая. Наиболее ранние встречи зафиксированы 23 и 24 апреля 2004: в деревне летали 4-5 городских ласточек. С конца первой декады мая и до конца месяца можно наблюдать, как после дождя птицы собирают сырую глину с грунтовой дороги на лугу. Охотятся над водой и лугом стаями до 20-30 птиц.

Motacilla flava. Редко встречающаяся на пролёте птица. Самую крупную стаю наблюдал 14 мая 2003: на выгоревшем после весеннего пала лугу кормилось более 100 жёлтых трясогузок. Изредка и не каждый год удаётся увидеть группы по 3-10 птиц в период с 18 по 21 мая. Наиболее поздняя встреча – 24 мая (одиночный самец).

Motacilla alba. Обычная птица. Встречается в течение всего периода наблюдений по 1-3. Очень редко можно увидеть кормящихся на лугу 10-13 трясогузок.

Anthus campestris. Я наблюдал полевых коньков лишь дважды в 2005 году. 29 мая спугнул с луга 5 птиц (коньки сели на дерево и начали перекликаться). 31 мая спугнул с того же места 4 птицы: поведение такое же.

Anthus pratensis. Обычен. В начале третьей декады апреля на лугу собираются стаи до 30-40 особей. Позже коньки встречаются по 1-2. Часто слышны песни, можно наблюдать токовые полёты.

Lanius collurio. Обычен. Периодически можно наблюдать либо пару, либо самца или самку по отдельности. Наиболее ранняя встреча отмечена 19 мая. Обычно птицы сидят на столбиках разрушенной ограды старого выгона или на сухом дереве у реки. Один раз (31 мая 2005) наблюдал пару жуланов и ещё, в сотне метров от них, второго самца, постоянно издающего жужжащие звуки.

Lanius excubitor. Видел лишь один раз 22 апреля 2005: одиночный серый сорокопут сидел на вершине ольхи, растущей около реки.

Bombycilla garrulus. Редкая в период весенних наблюдений птица. Зафиксировано всего несколько встреч в 2001, 2005 и 2006 годах с 18 апреля до 5 мая. Свиристели обычно пролетают, перекликаясь, плотной стайкой численностью от 3-5 до 20-25 птиц.

Erithacus rubecula. Обычна, но малочисленна. Встречается, в основном, поодиночке и не ежедневно, в сырых кустарниках около реки с середины апреля и до начала мая: позже не видел. В этот же период можно слышать и пение зарянки.

Luscinia luscinia. Соловей здесь – обычная птица. Петь начинает, по усреднённым данным, с 6 мая. Самая ранняя песня была отмечена 1 мая 2001. В период активного токования одновременно можно услышать песни 4-5 самцов.

Cyanosylvia svecica. Очень редкая здесь птица. Из встречающихся в Ленинградской области двух форм варакушки – «белозвёздной» *(C. s.*

cyanecula) и «рыжезвёздной» *(C. s. svecica)*, 22 мая 2004 в Струпово я наблюдал самца, пластрон которого имел рыжую окраску (Домбровский 2006). Птица перелетала по кустам около заболоченной старицы в 50 м от реки Луги.

Saxicola rubetra. Обычен. Самцы появляются 6-7 мая (самая ранняя встреча 3 мая 2008), через день-два попадаются на глаза и самки. Только что прилетевшие самцы держатся на лугу небольшими стайками до 5-7 птиц. Петь начинают сразу же после прилёта. Песенная активность продолжается до июня.

Oenanthe oenanthe. Обычная, но малочисленная птица. Изредка встречается в течение всего периода наблюдений. За все годы чаще всего каменка попадалась мне на глаза на краю деревни, около заброшенного огорода и разваливающейся бани. В подавляющем большинстве случаев это был самец. В ольшанике около реки эти птицы встретились мне лишь один раз: 17 апреля 2004 здесь держались два самца и две самки.

Turdus merula. Обычен. Встречается изредка в кустах у реки в течение всего периода наблюдений. В подавляющем большинстве случаев отмечены самцы, и лишь очень редко можно увидеть самку. Часто со стороны леса доносится пение, особенно в апреле.

Turdus pilaris. Обычная многочисленная птица. В период наблюдений рябинники встречаются постоянно: с характерным трещанием летают над лугом, садятся на деревья, на луг. Иногда (во второй декаде апреля – начале мая) на лугу кормятся стаи от 50 до 100 особей. Позже, начиная примерно со второй декады мая, часто можно видеть летящих над лугом птиц, несущих корм от огородов в лес за реку.

Turdus iliacus. Обычен. Встречаются по 1-2, реже по несколько птиц, с середины апреля. Довольно часто слышна песня. Нередко белобровиков можно видеть вместе с рябинниками.

Turdus philomelos. Обычен, но увидеть удаётся редко. Чаще можно слышать песни, доносящиеся с противоположного (правого) берега Луги, поросшего сосновым лесом. Первая песня отмечена 24 апреля. В последующем пение продолжается до самого окончания наших работ на РУЗе (начало июня).

Turdus viscivorus. Деряба встречается редко. Наблюдал лишь в течение трёх сезонов. В 2005 году с 24 апреля до 5 мая: около реки держались от 2 до 5 дроздов, один раз слышал песню. В 2006 увидел двух деряб 25 апреля. В 2007 с 25 апреля до 22 мая изредка можно было наблюдать 1-2 птиц.

Locustella fluviatilis. Обычная птица. Петь начинает в середине мая. Наиболее раннее пение отмечено 13 мая 2002. На обследуемой территории за один маршрут можно услышать 2-3 сверчков.

Locustella naevia. Редкая птица, отмеченная лишь в 2004-2006

годах. Петь начинает в середине мая. Наиболее раннее пение отмечено 11 мая 2004. На обследуемой территории за один маршрут можно услышать лишь одного сверчка.

Acrocephalus schoenobaenus. Обычная птица. Прилетает обычно в конце второй – начале третьей декады мая. Самая ранняя встреча отмечена 8 мая 2007. Прилетевшие самцы сразу начинают петь в зарослях сухого прошлогоднего тростника.

Acrocephalus palustris. Болотная камышевка малочисленна. Песню можно услышать в третьей декаде мая и в июне.

Acrocephalus arundinaceus. Малочисленна. Обычно песню можно услышать в третьей декаде мая и в июне. Самая ранняя встреча отмечена 7 мая 2007: прилетевший самец начал петь в зарослях сухого прошлогоднего тростника.

Hippolais icterina. Малочисленна. Изредка можно слышать песню во второй-третьей декаде мая и в июне.

Sylvia borin. Редко встречающаяся птица. В 2005 году песню можно было услышать с 30 мая по 1 июня. В 2006 году садовая славка запела значительно раньше: 5 мая. Нужно отметить, что в этом году уже с начала третьей декады апреля установилась высокая дневная температура воздуха (17-19°C).

Sylvia atricapilla. Поющего самца видел лишь 2 июня 2005.

Sylvia communis. Обычная птица. Первую песню можно услышать в среднем 11-12 мая. В 2001 и 2006 годах славка начала петь с 7 мая. Обойдя описываемый участок, можно наблюдать 4-5 поющих самцов.

Sylvia curruca. Редка. Поющую славку-мельничка видел лишь один раз: 2 июня 2006.

Phylloscopus trochilus. Обычная птица. Держится постоянно в кустарниках и на деревьях. Песню можно слышать с 3-5 мая.

Phylloscopus collybita. Обычна. Держится постоянно в кустарниках и на деревьях. Песню можно услышать с 17 апреля (2004) и до июня. Наблюдал теньковку во время снегопада: 21 апреля 2005 выпало до 3 см снега, температура воздуха днём держалась около 0°. Пеночка перелетала по веткам кустарников вместе с двумя большими синицами около мусорной ямы.

Phylloscopus sibilatrix. Пение отмечено лишь утром 6 мая 2004 года. Птица находилась в кустарниках около старицы.

Muscicapa striata. Редка. Серые мухоловки были отмечены (не ежегодно) в период с 14 до 31 мая: охотящаяся на ольхе около луга пара или одиночная птица, иногда поющий самец.

Ficedula hypoleuca. Редка. В 2004 году 11 мая увидел самку, а 22 мая видел поющего самца. С 19 по 21 мая 2006 отмечена охотящаяся на ольхе около луга пара. 13 мая 2008 наблюдал самца.

Aegithalos caudatus. Обычная, но нечасто встречающаяся в описываемый период птица. Видел нескольких ополовников только 25 марта 2003, когда Луга была ещё покрыта льдом. Кроме того, постоянно наблюдал здесь стаю из 20 птиц с 21 по 24 сентября 2000. Отметил также 2 ополовника в стайке других синиц 6 декабря 2006.

Parus major. Обычная птица. Пение можно слышать в течение всего периода наблюдений. Большие синицы встречаются по 1-2 на деревьях и кустарниках.

Parus caeruleus. Обычна, но очень малочисленна. Встречается в течение всего периода наблюдений, но не более одной пары.

Emberiza citrinella. Обычная, довольно редко попадающаяся на глаза птица. Овсянки встречаются как поодиночке, так и парами. Поющих самцов (не ежедневно) можно слышать в течение всего периода наблюдений.

Emberiza schoeniclus. Обычная птица. Камышовые овсянки встречаются как поодиночке, так и парами. Поющих самцов можно слышать в течение всего периода наблюдений.

Fringilla coelebs. Многочисленная птица. Встречаются в течение всего периода наблюдений. Нередко можно видеть крупные стаи пролётных зябликов. Так, например, 15 и 17 апреля 2002 по зарослям ольшаника у реки перемещались, постоянно запевая, от 30 до 100 самцов. 28 апреля 2003 стаи до 50 самцов в течение всего дня отмечались как у реки, так и около обочин лесных дорог Кургальского полуострова. В 2004 году, 15 апреля, на выжженном весенним палом лугу сидели более 30 самцов. 1 мая 2005 в стае кормящихся на лугу зябликов численностью до 50 птиц были отмечены как самцы, так и самки. В этот же день мною было отмечено массовое перемещение зябликов по кустарникам около шоссе между посёлками Вруда и Летошицы Волосовского района (южнее Струпово на 25 км): на участке дороги протяжённостью до 2 км из машины было замечено более 1000 птиц. В 2006-2008 годах крупные стаи зябликов мною не отмечались.

Fringilla montifringilla. Очень редкая птица. 15 мая 2002 увидел самца и самку в стае зябликов-самцов (всего до 30 птиц). Все птицы кормились на лугу, почерневшем от гари сожжённой прошлогодней травы.

Chloris chloris. Обычная немногочисленная птица. Встречается на кустарниках около реки по несколько птиц или по 1-2 пары в течение всего периода наблюдений. Очень редко можно увидеть стайки до 10 птиц, обычно вместе с зябликами, кормящимися в траве на лугу.

Spinus spinus. Чиж редко встречается в описываемый период. Лишь дважды наблюдал стайки численностью до 10 птиц: 29 апреля 2003 и 19 мая 2005.

Carduelis carduelis. Обычная, но малочисленная в описываемый

период птица. Встречаются по 1-2, редко по несколько. Иногда можно увидеть поющего самца.

Acanthis flammea. Чечётка редко встречается в описываемый период. Видел одиночного самца 5 мая 2005. В более ранние сроки здесь, возможно, кочующие чечётки встречаются чаще. Так, 25 марта 2003 наблюдал рассевшихся на ольховых деревьях у старицы порядка 500 чечёток.

Carpodacus erythrinus. Обычна. Прилетевшие самцы начинают петь с 16-17 мая. Наиболее ранний прилёт отмечен в 2005 году: чечевица запела 13 мая. Держатся птицы поодиночке или парами. Лишь 18 мая 2005 на одном кусте сидели сразу 5 самцов и 2 самки.

Pyrrhula pyrrhula. Обычная, но малочисленная в описываемый период птица. Изредка можно наблюдать одиночного самца или пару снегирей в апреле-мае. В 2005 году пара держалась на обследуемом участке с 5 по 27 мая.

Coccothraustes coccothraustes. 22 апреля 2003 наблюдал трёх самцов дубоноса.

Passer domesticus. Обычен. В деревне около домов домовых воробьёв можно видеть постоянно, но к реке (к нашей базе) они подлетают крайне редко.

Passer montanus. Очень редок здесь. За все годы наблюдений лишь несколько раз видел одиночных полевых воробьёв.

Sturnus vulgaris. Обычная птица. Когда мы приезжаем устанавливать РУЗ, скворцы уже постоянно поют в деревне. Во второй декаде апреля на лугу (ещё не заросшем травой) можно наблюдать стаи кормящихся скворцов численностью до 30. Позднее встречаются одиночные птицы или небольшие группы. Песенная активность обычно заканчивается во второй декаде мая. В начале третьей декады мая скворцы постоянно носят с огородов корм к скворечникам: выкармливают птенцов. А в начале июня уже встречаются летающие группами выводки.

Oriolus oriolus. Обычная птица. Увидеть иволгу удаётся редко, намного чаще можно услышать песню, доносящуюся из леса с противоположного берега. Наиболее раннее пение отмечено 13 мая. На обследуемом участке иволги встретились мне один раз: 19 мая 2006 на ольхе, близко друг к другу, сидели два самца и одна самка.

Garrulus glandarius. На участке наблюдений сойку удаётся встречать очень редко. За всё время наблюдений видел её менее 10 раз (и не каждый год) по одной птице, пролетающей над лугом.

Pica pica. Малочисленная на участке наблюдений птица. Часто можно видеть пролетающих по 1-2 у реки или старицы. По утрам сороки охотно посещают мусорную яму. На обследуемом участке обнаружены 2 гнезда, но оба старые.

Corvus monedula. Очень редкая здесь птица. Хотя в ближайших населённых пунктах, где есть кирпичные дома (например, Большое Кузёмкино или Усть-Луга) галка обычна и даже многочисленна. Много галок также кормится на ближайших полях. В Струпово же этих птиц можно увидеть лишь небольшими группами (менее 10 птиц), когда они изредка пролетают высоко над лугом, перемещаясь, наверное, к местам кормёжки.

Corvus frugilegus. Очень редко встречающаяся здесь птица. За всё время наблюдений видел не более 10 раз (и не каждый год) по одному грачу, пролетающему высоко над лугом. Но в нескольких километрах от Струпово, в окрестностях Большого Кузёмкино, грачи часто кормятся на полях. Есть ли где-то поблизости грачевник – не знаю.

Corvus cornix. Обычна, но немногочисленна. Две пары серых ворон гнездятся в непосредственной близости от базы на вершинах Ольховых деревьев, растущих около воды. В гнездовой период вороны агрессивны и прогоняют со своей территории практически любую пролетающую крупную птицу. Чаще всего серые вороны конфликтуют с во́роном, иногда пролетающим над лугом около реки. Видел, как одиночная воро́на отогнала от гнезда стаю из 5 пролетающих галок. Один раз наблюдал, как две серые вороны пикировали на летящего белого аиста, вынудив его улететь в сторону. Нападают эти птицы и на довольно крупных хищных птиц. Так, на моих глазах одиночная ворона «испортила охоту» скопе, которая, летая над рекой, оказалась слишком близко от гнездовой территории серых ворон. Видел, как пара серых ворон атаковала сразу двух канюков, паривших над лугом, и отогнала их за реку. В следующем году пара серых ворон отгоняла одновременно уже трёх канюков, пролетавших над рекой.

В период вылета из гнёзд молодых птиц взрослые серые вороны пытаются нападать и на человека, идущего по траве луга, пикируя ему буквально на голову. Такое поведение было отмечено в середине первой декады июня (в начале месяца птенцы, машущие крыльями, находились ещё в гнезде).

Corvus corax. Обычная, но немногочисленная, птица. Во́роны периодически пролетают по 1-3 над рекой или лугом в апреле-мае. Лишь 24 апреля 2003 наблюдал одновременно 12 воронов в редколесье, находящемся в полукилометре от постоянного района наблюдений. Нередко можно видеть брачные игры в воздухе, в которых участвуют как 2, так и 3 птицы. Часто на пролетающего во́рона нападают парой (а то и двумя парами) серые воро́ны, когда он пересекает «воздушную границу» их гнездовых участков. Обычно серые вороны гонят во́рона до середины реки, после чего возвращаются к своим гнёздам. Часто в полёте ворон отбивается от преследователей лапами, ловко переворачиваясь в воздухе. Один раз удалось увидеть, как ворон на-

пал в воздухе на серую ворону, летевшую к гнезду с кормом в клюве. Когда птица выпустила из клюва кусок, ворон ловко поймал его на лету и улетел за реку к лесу. Кстати, его тут же начала преследовать другая ворона, а «ограбленная» птица полетела на гнездо. Один раз наблюдал нападающих на пролетающего во́рона двух чибисов, гнездившихся на выпасе.

Литература

Бубличенко Ю.Н. 2000. К орнитофауне южного побережья Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **9** (107): 6-20.

Домбровский К.Ю. 2006. О встречах варакушки *Cyanosylvia svecica* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **15** (338): 1122-1123.

Домбровский К.Ю. 2007а. Встречи зимородка *Alcedo atthis* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **16** (363): 798-806.

Домбровский К.Ю. 2007б. Большой крохаль *Mergus merganser* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **16** (369): 980-984.

Домбровский К.Ю. 2007в. Наблюдение перепела *Coturnix coturnix* около деревни Струпово (устьевая часть реки Луги) в 2007 году // *Рус. орнитол. журн.* **16** (384): 1435-1436.

Иванов В.С., Потапов Р.Л. 2008. Экология тетерева *Lyrurus tetrix* и изменения его численности в Гатчинском районе Ленинградской области за последние полвека // *Рус. орнитол. журн.* **17** (448): 1632-1638.

Коузов С.А. 2007. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на Кургальском полуострове: история вселения и особенности биологии // *Рус. орнитол. журн.* **16** (349): 339-365.

Леоке Д.Ю. 1999. Орнитологические наблюдения на острове Малый (восточная часть Финского залива) // *Рус. орнитол. журн.* **8** (84): 17-20.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана.* Л.: **1**: 1-480, **2**: 1-504.

Пчелинцев В.Г. 2003. Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla* на Северо-Западе России (Ленинградская, Новгородская, Псковская области) // *Рус. орнитол. журн.* **12** (230): 821-824.

Пчелинцев В.Г., Ильинский И.В. 2004. Кадастр гнёзд белого аиста (*Ciconia ciconia* L.) в Ленинградской области // *Птицы и млекопитающие Северо-Запада России*. СПб.: 127-139.

Фёдоров В.А. 2009. Орнитологические находки в Кургальском заказнике (Ленинградская область) // *Рус. орнитол. журн.* **18** (480): 708-716.

Фокин С.И., Потапов Р.Л. 2007. О гнездовании перепела *Coturnix coturnix* в Бокситогорском районе Ленинградской области в 2007 году // *Рус. орнитол. журн.* **16** (376): 1209-1211.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2009, Том 18, Экспресс-выпуск **504**: 1419-1421*

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major* похищает птенцов снегиря *Pyrrhula pyrrhula*

А.В.Бардин

Кафедра зоологии позвоночных, биолого-почвенный факультет, Санкт-Петербургский университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия

Поступила в редакцию 16 сентября 2009

О хищничестве большого пёстрого дятла *Dendrocopos major* написано достаточно много. В большой обзорной статье, посвящённой этому вопросу, В.П.Иванчев (2000) составил список видов птиц, для которых были описаны случаи разорения гнёзд большим пёстрым дятлом. Этот список включает 42 вида, в том числе 4 вида вьюрковых: зяблика *Fringilla coelebs*, зеленушку *Chloris chloris*, щегла *Carduelis carduelis* и чижа *Spinus spinus*. Мои наблюдения в окрестностях города Печоры Псковской области позволяют добавить в этот список ещё один вид – снегиря *Pyrrhula pyrrhula*.

Гнездо снегиря с 6 сильно насиженными яйцами я нашёл 26 мая 2004 на правом берегу Пачковки, круто спускающемся в долину речки. Наверху раскинулся зеленомошный бор, а склон порос густым смешанным лесом из ели, сосны, берёзы, осины. В этом месте, в старых осинах, каждый год гнездятся различные дятлы, поэтому старых дупел очень много и их занимают в основном скворцы *Sturnus vulgaris*. В эти дни они интенсивно кормили подросших птенцов, летая за кормом на расположенные недалеко поля. Помимо скворцов, в этом месте на площади в четверть гектара гнездились и другие птицы *(Fringilla coelebs*, *Turdus philomelos*, *T. iliacus*, *T. merula*, *Prunella modularis*, *Phylloscopus collybita*, *Ph. trochilus*, *Ph. sibilatrix*, *Sylvia atricapilla*, *Parus major*, *P. montanus*, *P. caeruleus*, *Certhia familiaris*, *Regulus regulus*, *Ficedula hypoleuca*, *Muscicapa striata*, *Siphia parva, Anthus trivialis)*, образуя своего рода смешанное поселение, тогда как вокруг в лесу птиц было гораздо меньше. В последние годы, когда общая плотность населения воробьиных сократилось примерно на порядок, такая неравномерность распределения гнездящихся птиц в лесу стала особенно бросаться в глаза.

В 2004 году здесь гнездились две пары дятлов: чёрные *Dryocopus martius* и большие пёстрые (раньше здесь регулярно гнездились зелёные дятлы *Picus viridis*, а желны начали гнездится только два года назад). Большие пёстрые дятлы выдолбили дупло в той же осине, где в прошлом году гнездились чёрные дятлы. Дупло желны располагалось на высоте 4 м и было ориентировано на юг, дупло большого пёстрого –

на высоте 5 м и ориентировано на северо-северо-восток. Прошлогоднее дупло больших пёстрых дятлов в соседней осине заняли поползни *Sitta europaea*, основательно обмазав входное отверстие белой глиной. 26-30 мая я несколько раз наблюдал за поползнями, кормящими больших птенцов, и имел возможность попутно следить за их соседями-дятлами. У больших пёстрых дятлов тоже были птенцы, но ещё маленькие, поскольку «тикали» они совсем тихо.

Дятлы кормили птенцов, порой их грели, кормились сами. Самец иногда долбил на расположенной рядом «кузнице» полураскрытые шишки сосны. При этом у него оставалось время и для другой деятельности, очень меня заинтересовавшей (самка вела себя скрытно и попадалась на глаза редко). Дело в том, что самец проявлял большое любопытство в отношении гнёзд соседей, которые он, казалось, специально разыскивал, ориентируясь на поведение птиц. Он регулярно заглядывал в дупла поползня, большой синицы и скворцов, не делая, однако, попыток разбоя. Подлетевшие вдруг хозяева привычно отгоняли его, с налёта ударяя в спину или голову. Дятел столь же привычно отступал, и никаких скандалов не возникало. Кроме гнёзд в дуплах, дятел выслеживал и навещал открыто расположенные гнёзда, в частности, лесной завирушки, зяблика, пеночек. Сторонился он только скандальных дроздов, но и их гнёзда он, очевидно, разведал. Таким образом, время своего «активного безделья», по терминологии В.Р.Дольника (2004), самец дятла заполнял как бы игровым «исследовательским поведением». Однако собранную при этом информацию он мог затем использовать и для добывания пищи. Вскоре я смог в этом убедиться.

26 мая около 15 ч 30 мин на участок залетела сойка *Garrulus glandarius*. Её появление вызвало переполох, зяблики и дрозды стали её окрикивать и преследовать. Этим переполохом и воспользовался дятел, «под шумок» незаметно подлетел к какому-то из знакомых гнёзд и вскоре принёс голого птенчика. Он уселся на сук, где в кузнице торчала сосновая шишка, прижал ещё шевелившегося птенца грудью, выбил шишку и вставил на её место птенца. Затем несколькими ударами отчленил ему голову, съел её, а измельчённое ещё несколькими ударами тельце отнёс своим птенцам. В этот же день дятел на моих глазах принёс на эту кузницу ещё одного птенчика. Судя по пятнам засохшей крови, кузница уже не раз использовалась для разделки жертв наряду с раздалбливанием шишек. Последнее также было своего рода пустым времяпрепровождением, поскольку семян в шишках к концу мая осталось очень мало.

Уже упомянутое гнездо снегиря было устроено на ёлочке со срубленной вершиной, в результате чего она имела несколько стволиков. Гнездо располагалось на боковой ветви на высоте 1.8 м от земли и было

совершенно скрыто в гуще веточек. Наружный слой построен из сухих веточек ели и жимолости, достигая в диаметре 25 см из-за торчащих в стороны прутиков. Чаша сплетена из тонких сухих веточек ели, Березы, вереска и большого количества корешков трав. Лоток выстлан тонкими корешками трав. Высота постройки 9.5 см, диаметр лотка 6.5 см, глубина лотка 3.2 см.

Дятел, видимо, давно высмотрел это гнездо (ёлочка находится в пределах видимости от гнездового дерева дятла) и неоднократно подлетал посмотреть, как бы просто из любопытства, повисая на тонких веточках и просовывая голову в гущу прутьев. При этом никаких попыток сгонять наседку или трогать яйца в её отсутствие он не делал. Однако 29 мая, когда вылупились птенцы, дятел их утащил. Самка оказала сопротивление, потеряв в схватке часть перьев, в том числе маховое (дятел схватил её за крыло). Однако снегирям (в отличие, например, от зябликов), не удаётся организовать «птичьего переполоха», привлекая более сильных союзников, в частности дроздов. И дятлу удалось, не привлекая внимания остального птичьего населения, перетаскать всех птенчиков снегиря.

Литература

Дольник В.Р. 2004. Изучение поведения животных с помощью анализа их бюджетов времени и энергии // *Рус. орнитол. журн.* **13** (249): 22-32.

Иванчев В.П. 2000. Хищничество большого пёстрого дятла *Dendrocopos major* // *Тр. Окского заповедника* **20**: 107-127.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2009, Том 18, Экспресс-выпуск **504**: 1421-1422*

Новая находка мохноногого сыча *Aegolius funereus pallens* в Памиро-Алае

И.А.Абдусалямов, Р.Л.Бёме

Второе издание. Первая публикация в 1984[*]

4 октября 1982 на северном склоне Туркестанского хребта в арчовниках ущелья Офтанги-Сай, был пойман паутинной сетью взрослый мохноногий сыч подвида *Aegolius funereus pallens* (Schalow, 1908). Предыдущая встреча, также на Туркестанском хребте, была отмечена С.К.Далем (1936). Учитывая оседлость этого сыча, можно предпола-

[*] Абдусалямов И.А., Бёме Р.Л. 1984. Новая находка мохноногого сыча (*Aegolius funereus pallens* Schalow) в Памиро-Алае // *Орнитология* **19**: 171.

гать гнездование его в арчовых лесах Туркестанского хребта, что значительно расширяет к югу и западу ареал данного подвида. Птица была окольцована и выпущена.

Литература

Даль С.К. 1936. Новые данные по географическому распространению лесных сычей // *Тр. Узбек. ун-та* **7**: 163-164.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2009, Том 18, Экспресс-выпуск **504**: 1422-1423*

О распространении серой вороны *Corvus cornix* в тундровой зоне Ямала

М.Г.Головатин, В.А.Соколов

*Второе издание. Первая публикация в 2008**

Ещё в 1980-е годы было отмечено, что серая ворона *Corvus cornix* на Ямале осваивает новые местообитания и продвигается к северу. Область регулярного гнездования совпадала с границей распространения лиственничников и древовидных ив. В то же время сообщалось, что вороны изредка гнездятся в открытой тундре там, где есть подходящие места в виде одиночных деревьев или триангуляционных вышек. В июне 1974 года было найдено гнездо за пределами распространения древесной растительности – в пойме реки Нурмаяха в окрестностях посёлка Мыс Каменный (68°40′ с.ш.) на вершине ивы в 2 м от земли (Данилов и др. 1984). На этой же широте на реке Левый Юрибей (68°22′ с.ш.) несколько раз слышали крик и наблюдали одиночную ворону в начале июля 2005 года (Головатин, Пасхальный 2005).

Залёты одиночек и небольших стаек неоднократно фиксировали далеко за пределами гнездовой области. Наиболее дальние – у мыса Марре-Сале 10 июня 1976 и у посёлка Тамбей – в 1974 году (Данилов и др. 1984). По словам местных жителей, появление ворон в весеннее время вблизи северных тундровых посёлков – явление нередкое.

Во время нашей работы в арктической тундре летом 2008 года в окрестностях посёлка Харасавей 24 июля мы встретили беспокоящуюся пару, а затем обнаружили слётка вороны (птенца удалось сфотографировать). Маховые и рулевые перья его почти полностью отросли, он

* Головатин М.Г., Соколов В.А. 2008. О распространении серой вороны в тундровой зоне Ямала // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 31.

мог перелетать, но делал это неуверенно и по прямой. Птицы держались на территории базы ГСМ (71°11′ с.ш., 66°54′ в.д.). Место было удалено от посёлка на расстояние около 1 км и представляло собой типичную площадку для хранения горюче-смазочных материалов, заставленную крупными ёмкостями и различного рода металлическими сооружениями, на которых, очевидно, серые вороны и гнездились.

Литература

Головатин М.Г., Пасхальный С.П. 2006. Интересные встречи птиц на севере Уральского региона: 2005-2006 // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 46-51.

Данилов Н.Н., Рыжановский В.Н., Рябицев В.К. 1984. *Птицы Ямала*. М.: 1-332.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2009, Том 18, Экспресс-выпуск **504**: 1423*

Зимние находки голубых сорок *Cyanopica cyanus* в Нижнем Приамурье

В.Г.Бабенко

*Второе издание. Первая публикация в 1984**

В июне 1979 года в районе среднего течения реки Тугур (урочище Бурукан) были обнаружены остатки голубой сороки *Cyanopica cyanus*, сохранившиеся, вероятно, с зимнего периода. 2 и 6 ноября 1982 сотрудник метеостанции В.И.Доблер у посёлка Кульчи (озеро Орель) добыл двух голубых сорок из стаи, державшейся здесь до января 1983. Тушки птиц хранятся в Зоологическом музее Московского университета. Таким образом, часть голубых сорок в Нижнем Приамурье осенью и зимой откочёвывает севернее известной области гнездования, граница которой в долине Амура проходит в районе Комсомольска-на-Амуре. Опросные данные также свидетельствуют о регулярных осенне-зимних залётах голубых сорок к северу (посёлок им. Полины Осипенко, Николаевск-на-Амуре).

* Бабенко В.Г. 1984. Зимние находки голубых сорок в Нижнем Приамурье // *Орнитология* **19**: 172.