ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2012
XXI



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
740
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXI
Экспресс-выпуск • Express-issue

2012 № 740

СОДЕРЖАНИЕ

631-640 Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2011 году. К.Ю.ДОМБРОВСКИЙ

641-643 Первая достоверная зимняя регистрация белого аиста *Ciconia ciconia* в Краснодарском крае. М.А.ДИНКЕВИЧ, В.В.ЕРМОЛАЕВ

644-645 Новые гнездящиеся птицы города Усть-Каменогорска. Б.В.ЩЕРБАКОВ

645-647 Птицы жилых и хозяйственных построек сельских населённых пунктов Калининградской области. В.В.БЕЛЯКОВ, А.М.РОМАНОВА

647-648 Кваква *Nycticorax nycticorax* и майна *Acridotheres tristis* – новые виды птиц Восточно-Казахстанской области. В.А.ЕГОРОВ

648-649 О гнездовании илийской саксаульной сойки *Podoces panderi ilensis* в песках близ Баканаса. А.Ф.КОВШАРЬ

649-650 О гнездовании белого аиста *Ciconia ciconia* в Дагестане. А.Н.ХОХЛОВ, В.Ф.МАМАТАЕВА, Г.С.ДЖАМИРЗОЕВ, М.П.ИЛЬЮХ

650-651 Следование чаек за поездами. А.С.КОРЯКИН

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2012
Дата опубликования: 24 марта 2012

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXI
Express-issue

2012 № 740

CONTENTS

631-640 Data on the white stork *Ciconia ciconia* nests in the Leningrad Oblast for 2011. K.Yu.DOMBROVSKI

641-643 First winter record of the white stork *Ciconia ciconia* in the Krasnodar Territory. M.A.DINKEVICH, V.V.ERMOLAEV

644-645 New breeding birds of the city of Ust-Kamenogorsk. B.V.SHCHERBAKOV

645-647 Birds of residential and farm buildings in rural settlements of the Kaliningrad region. V.V.BELYAKOV, A.M.ROMANOVA

647-648 The night heron *Nycticorax nycticorax* and Indian Myna *Acridotheres tristis* – new birds for the North-Kazakhstan Oblast. V.A.EGOROV

648-649 On breeding of the grey ground jay *Podoces panderi ilensis* in sand desert near Bakanas. A.F.KOVSHAR

649-650 On breeding of the white stork *Ciconia ciconia* in Dagestan. A.N.KHOKHLOV, V.F.MAMATAEVA, G.S.DZHAMIRZOEV, M.P.ILYUKH

650-651 Gulls following a train. A.S.KORYAKIN

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2012

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **740**: 631-640*

Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2011 году

К.Ю.Домбровский

Константин Юзефович Домбровский. Государственный научно-исследовательский институт озёрного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ), Набережная Макарова, д. 26, Санкт-Петербург, 199053, Россия

Поступила в редакцию 23 февраля 2012

В 2011 году нами были продолжены наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* на территории Ленинградской области. В дополнение к прежним сведениям (Домбровский 2007, 2008а,б, 2009, 2010) появились новые, свидетельствующие как о стабильном гнездовании, так и о появлении гнёзд, построенных в этом сезоне. Некоторые из известных ранее гнёзд не были найдены, но возможно, они не были замечены из-за густой листвы.

В приведённом ниже списке населённые пункты перечислены в алфавитном порядке с указанием их положения в системе административного деления области (район и волость).




Рис. 1. Места расположения гнёзд белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области, не упоминавшихся до 2011 года (обозначения в тексте).

Аннолово (59°38' с.ш., 30°32' в.д.). Тосненский р-н, Федоровская вол. В гнезде, расположенном на водонапорной башне и обнаруженном в 2000 году (база данных БИНИИ СПбГУ), 21 июля стояли одна взрослая птица и 3 молодых.

Большое Заречье (59°23' с.ш., 29°47' в.д.). Волосовский р-н, Калитинская вол. Гнездо построено на бетонном столбе около мемориала «Малая Хатынь», созданном в 1971 году на месте сожжённой в годы Великой Отечественной войны деревни. Фотографию мемориала, на которой хорошо видно гнездо, обнаружил в Интернете в 2011 году (точка 8 на рис. 1).

Большое Кузёмкино (59°35' с.ш., 28°12' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская вол. 23 мая отмечено, что две птицы активно строят гнездо на опиленной вершине большого лиственного дерева у дороги. 28 мая гнездо уже было полностью достроено (точка 2 на рис. 1). В нём сидела одна птица (рис. 2).



Рис. 2. Гнездо белого аиста в деревне Большое Кузёмкино. 28 мая 2011. Фото автора.

Большое Руддилово (59°34' с.ш., 28°47' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская вол. В гнезде, построенном на краю плоской крыши силосной башни, последний раз одиночный аист был отмечен 29 апреля 2008 года (Домбровский 2008б). С 2009 года до осени 2011 гнездо находилось на прежнем месте, но птиц здесь не видно. Возможно, гнездившаяся здесь пара переместилась в построенное рядом в 2009 году

на бетонном столбе ЛЭП гнездо (Домбровский 2009). В мае 2011 на этом гнезде нами неоднократно отмечены птицы.

Бутково (58°51' с.ш., 30°25' в.д.). Лужский р-н, Ям-Тесовская вол. Гнездо построено на помосте, укреплённом на вершине столба. 16 июля в нём видны 4 птенца (устн. сообщ. В.Андреева, точка 10 на рис. 1).

Велькота (59°36' с.ш., 28°53' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская вол. Гнездо, построенное в 2009 году на бетонном столбе ЛЭП, по-прежнему является жилым.

Виркино (59°29' с.ш., 30°17' в.д.). Гатчинский р-н, Сусанинская вол. Гнездо, построенное на опиленной верхушке старой лиственницы, по-прежнему является жилым. (устн. сообщ. А.В.Бардина) (рис 3).



Рис. 3. Гнездо белого аиста на лиственнице в деревне Виркино. 28 июня 2010. Фото А.В.Бардина

Волпи (59°18' с.ш., 29°03' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнездо на большой сосне с обломанной (или опиленной) вершиной в 2001 году, в 2009 находилось на месте. В 2010 году наблюдения здесь не проводились, а в 2011 гнезда уже нет. Но поблизости от места его расположения, на обломанной верхушке большой живой ели, 8 сентября обнаружено новое гнездо (точка 5 на рис. 1).

Заполье (59°22' с.ш., 29°29' в.д.). Волосовский р-н, Изварская вол. Гнездо построенное на разрушенной кирпичной церкви, расположенной на кладбище, по-прежнему на месте (рис. 4).

Извоз (59°12' с.ш., 29°10' в.д.). Волосовский р-н, Сабская вол. Гнездо, построенное на столбе ЛЭП в 2009 году, сейчас выглядит намного крупнее и массивнее.

Извоз (59°26' с.ш., 28°18' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская вол. В гнезде, расположенном на столбе ЛЭП, в мае-июне можно было видеть взрослых птиц.

Калливере (59°30' с.ш., 28°09' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская вол. Гнездо, построенное на опиленном старом дубе, находится на месте. 30 мая птиц не видно.

Кейкино (59°28' с.ш., 28°16 'в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская вол. Построено на опиленной вершине лиственного дерева, вероятнее всего, в 2010 году. В мае 2011 на гнезде отмечены 2 взрослые птицы (точка 4 на рис. 1).

Коммунар (59°28' с.ш., 28°47' в.д.). Кингисеппский р-н, Опольевская вол. Гнездо, расположенное на столбе ЛЭП и впервые отмеченное в 2001 году, существует по-прежнему.



Рис. 4. Гнездо белого аиста на разрушенном храме Петра и Павла. Заполье. 16 августа 2006. Фото А.В.Бардина.

Копорье (59°44' с.ш., 29°01' в.д.). Ломоносовский р-н, Копорская вол. Гнездо, расположенное на столбе ЛЭП близ реки Копорка и впервые нами отмеченное в 2008 году, находится на месте.

Коряча (59°07' с.ш., 29°18' в.д.). Волосовский р-н, Хотнежская вол. Гнездо, построенное на большом лиственном дереве и впервые отмеченное в 2003 году, существует по-прежнему.

Котлы. (59°36' с.ш, 28°45' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская вол. Гнездо, расположенное возле железнодорожной станции на водонапорной башне, известно с 1995 года (Пчелинцев, Ильинский 2002). В сентябре 2011 гнездо находилось на прежнем месте.

Красницы (59°27' с.ш., 30°21' в.д.). Гатчинский р-н, Сусанинская вол. В многолетнем гнезде, расположенном на дереве, в середине июня 2011 отмечены 3 птенца (устн. сообщ. А.В.Бардина) (рис. 5).



Рис. 5. Гнездо белого аиста на сосне в деревне Красницы.
1 августа 2008. Фото А.В.Бардина.

Красницы (Новые Красницы) (59°20' с.ш, 29°10' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнезда, расположенного на сухом опиленном лиственном дереве и отмеченного в 2003-2007 годах (Домбровский 2008а), с шоссе сейчас не видно. Но в этой же деревне появилось новое гнездо, построенное на помосте, который укреплён на высоком шесте над крышей частного дома. 2 июня на гнезде стоит 1 птица (точка 6 на рис. 1).

Красный Луч (59°17' с.ш,, 29°08' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнездо, расположенное на старой липе с опиленной вершиной, впервые отмечено в 1994 году (Пчелинцев, Ильинский 2002). В сентябре 2009 гнездо находилось на прежнем месте, а в сентябре 2011 его уже не было.

Кряково (59°20' с.ш., 29°01' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнездо на специально устроенном из досок помосте на опиленной вершине большой берёзы, находится на прежнем месте (рис. 6).

Курск (59°19' с.ш, 29°01' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. На столбеЛЭП появилось новое гнездо (точка 7 на рис. 1).

Курск – Яблоницы (59°19' с.ш, 29°08' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. В 2008 году название «Яблоницы» упразднено, и населённый пункт входит в административные границы Курска. Гнездо, расположенное на столбе ЛЭП между упомянутыми населёнными пунктами и известное с 2000 года, находится на прежнем месте.

Летошицы (59°22' с.ш., 29°15' в.д.). Волосовский р-н, Врудская вол. На гнезде, построенном на водонапорной башне и известном с 1993 года, в 2011 успешно гнездились птицы.



Рис. 6. Гнездо белого аиста на помосте, устроенном на опиленной берёзе в деревне Кряково. 6 апреля 2010. Фото автора.

Ломаха (59°40' с.ш., 29°02' в.д.). Ломоносовский р-н, Копорская вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне весной 2005 года, находится на месте.

Лужицы (59°39' с.ш., 28°21' в.д.). Кингисеппский р-н, Усть-Лужская вол. 23 мая на помосте, установленном на опиленных «коронообразно» вершинах двух сухих лиственных деревьев, строится новое гнездо (точка 1 на рис. 1).

Лялицы. (59°27' с.ш., 28°51'в.д.). Кингисеппский р-н, Опольевская вол. Гнездо, впервые отмеченное на водонапорной башне в 2006 году, по-прежнему находится на месте и является жилым.

Малый Луцк (59°24' с.ш., 28°35' в.д.). Кингисеппский р-н, Большелуцкая вол. Гнездо на водонапорной башне, известное с 1998 года (Пчелинцев, Ильинский 2002), по-прежнему на месте.

Мануйлово (59°21' с.ш., 28°51' в.д.). Кингисеппский р-н, Пустомержская вол. Очень крупное гнездо на водонапорной башне у фермы

на месте бывшей деревни Хорошево, известное с 1988 года (Пчелинцев, Ильинский 2002), по-прежнему на месте. Но летом 2009-2011 годов птиц здесь не видно (последний раз аисты были отмечены в 2008 году). Сейчас стенки гнезда сильно заросли кустарником.

Маттия (59°37' с.ш., 28°39' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская вол. Гнездо, построенное в 2010 году на столбе ЛЭП (было жилым), 23 мая 2011 находится на месте, хотя птиц не видно. 7 сентября гнезда уже не было. Здесь же на печной трубе сгоревшего деревянного дома в 2011 году построено новое гнездо аиста (точка 3 на рис. 1).



Рис. 7. Гнездо белого аиста на столбе ЛЭП. Деревня Торма.
9 июня 2010. Фото автора.

Моровино (58°53' с.ш., 30°31' в.д.). Лужский р-н, Ям-Тесовская вол. Гнездо на помосте, устроенном на опиленном дереве. 16 июля птиц издали не видно (устн. сообщ. В.Андреева, точка 11 на рис. 1).

Нарядово (59°37' с.ш., 28°57' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне и известное с 2000 года, по-прежнему на месте.

Пулково (59°25' с.ш., 28°20' в.д.). Кингисеппский р-н, Кошкинская вол. Гнездо, построенное в 2009 году на столбе ЛЭП, в этом сезоне тоже было жилым.

Пустомержа (59°23' с.ш., 28°52' в.д.). Кингисеппский р-н, Пустомержская вол. Гнездо, расположенное на столбе ЛЭП и известное с 2001 года, в 2011 было жилым.

Редкино (59°10' с.ш., 29°01' в.д.). Волосовский р-н, Сабская вол. Гнездо, построенное в 2001 году на разрушенной церкви, находится на прежнем месте.

Сокольники (58°48' с.ш., 30°17' в.д.). Лужский р-н, Оредежская вол. Гнездо устроено на помосте, укреплённом на вершине столба. 16 июля птиц издали не видно (сообщ. В.Андреева, точка 9 на рис. 1).



Рис. 8. Пара белых аистов недалеко от своего гнезда на водонапорной башне. Село Чёрное. 17 июня 2007. Фото А.В.Бардина.

Сумск (59°17' с.ш., 29°05' в.д.). Волосовский район, Остроговицкая волость. Гнездо, построенное на опиленной вершине живой ели и впервые отмеченное нами в 2007 году, по-прежнему на месте.

Сырковицы (59°20' с.ш., 29°09' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне и отмеченное в 1997 году, по-прежнему является жилым.

Торма (59°23' с.ш., 28°54' в.д.). Кингисеппский район, Пустомержская волость. Гнездо, построенное на столбе линии электропередачи в 2009 году, по-прежнему является жилым (рис. 7).

Трубников Бор (58°16' с.ш., 31°24' в.д.). Тосненский р-н, Трубниковборская вол. Гнездо построено в 2011 году на кровле водонапорной башни. 18 июля 2010 на башне стояли 2 птицы, но гнезда здесь ещё не

было. 19 июля 2011 в построенном в этом году гнезде отмечены 2 взрослые птицы (точка 12 на рис. 1).

Турово (58°44' с.ш., 29°56' в.д.). Лужский р-н, Лужская вол. В гнезде, расположенном на водонапорной башне, 16 июля стояла одна птица (устн. сообщ. В.Андреева).

Фёдоровка (59°29' с.ш., 28°14' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская вол. Гнездо, построенное на верхушке бетонного столба ЛЭП весной 2008 года, по-прежнему жилое. Второе гнездо, построенное в 2009 году на противоположном конце Фёдоровки (также на верхушке бетонного столба ЛЭП), было замечено только в конце октября этого года. Гнездились ли в нём аисты, нам не известно.

Чёрное (59°19' с.ш., 29°36' в.д.). Волосовский р-н, Изварская вол. Гнездо на водонапорной башне, отмеченное в 1999 году, по-прежнему на месте. В сентябре птиц уже нет (рис. 8).



Рис. 9. Гнездо белого аиста в деревне Ямсковицы. 17 апреля 2007. Фото автора.

Шуговицы (59°22' с.ш., 28°58' в.д.). Волосовский р-н, Беседская вол. Гнездо, расположенное на опиленной вершине старого лиственного дерева и известное с 2001 года, по-прежнему является жилым.

Ям-Тесово (58°54' с.ш., 30°35' в.д.). Лужский р-н, Ям-Тесовская вол. В гнезде, построенном на столбе ЛЭП в 2009 году, 16 июля 2011 находились подрастающие птенцы (устн. сообщ. В.Андреева).

Ямки (59°24' с.ш., 29°16' в.д.). Волосовский р-н, Врудская вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне и известное с 1999 года, по-прежнему является жилым.

Ямсковицы (59°25' с.ш., 28°49' в.д.). Кингисеппский р-н, Опольевская вол. На специально спиленных «короной» ветках большой берёзы поставлен помост. На нём в 2010 году, в очередной раз, успешно загнездились белые аисты (рис. 9). 5 апреля 2011 нами было отмечено, что гнездо сильно покосилось и почти упало с дерева (висит под углом более 50°). Но уже 28 апреля основание гнезда (большой плоский деревянный круг) было вновь установлено местными жителями. Аисты начали постройку нового гнезда. В течение мая-июня 2011 года на гнезде можно было постоянно наблюдать взрослых птиц.

Ястребино (59°22' с.ш., 28°57' в.д.). Волосовский р-н, Беседская вол. Гнездо аистов, построенное в 2007 году на развалинах церкви, попрежнему остаётся жилым.

По итогам наблюдений 2011 года на обследованной территории отмечено 12 гнёзд белого аиста, не упоминавшихся ранее в литературе. Из них как минимум 5 гнёзд построены в 2011 году. Новые гнёзда устроены на разных типах опор: на дереве, на специально устроенных помостах, на водонапорной башне и даже на печной трубе сгоревшего дома. Гнёзда, построенные в 2009 и 2010 годах, располагались только на столбах линий электропередачи (Домбровский 2009, 2010). Достоверно выяснено, что исчезло 2 гнезда белых аистов из ранее отмеченных (в действительности, скорее всего, больше).

Литература

Домбровский К.Ю. 2007. Места гнездования белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **16** (341): 78-83.

Домбровский К.Ю. 2008. Гнёзда белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (428): 1027-1045.

Домбровский К.Ю. 2008. Новые сведения о гнёздах белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (448): 1622-1626.

Домбровский К.Ю. 2009. Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2009 году // *Рус. орнитол. журн.* **18** (523): 1929-1933.

Домбровский К.Ю. 2010. Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2010 году // *Рус. орнитол. журн.* **19** (604): 1850-1854.

Пчелинцев В.Г., Ильинский И.В. 2002. Кадастр гнёзд белого аиста (*Ciconia ciconia* L.) в Ленинградской области // *Птицы и млекопитающие Северо-Запада России (эколого-фаунистические исследования).* СПб.: 127-139.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **740**: 641-643*

Первая достоверная зимняя регистрация белого аиста *Ciconia ciconia* в Краснодарском крае

М.А.Динкевич, В.В.Ермолаев

Михаил Александрович Динкевич. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аридных зон Южного научного центра Российской академии наук (ИАЗ ЮНЦ РАН), Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344006, Россия. E-mail: mdin@mail.ru
Валерий Валерьевич Ермолаев. Краснодар, Краснодарский край, Россия

Поступила в редакцию 18 марта 2012

Известно, что в Европе часть белых аистов *Ciconia ciconia* зимует в южной части области гнездования: в Испании, Португалии, Болгарии, а также на Кавказе, в Армении, причём число зимующих в этих регионах птиц в последние годы возрастает. Отдельные случаи зимовки белого аиста зарегистрированы и в более северных широтах – на Украине, в Чехии, Германии, Дании, Эстонии, Калининградской области; на Юге России зимовки белого аиста отмечены только в Дагестане (Роотсмяэ 1991; Лыков, Самсонкин 2006; Грищенко, Галчёнков 2011).

В Краснодарском крае белый аист является гнездящимся и пролётным видом. Достоверно гнездится с середины 1990-х; уже в 2000-е годы произошло заметное увеличение его численности и распространения. Гнездовья белого аиста расположены в основном в западной части края (Мнацеканов 2000, 2007; Казаков и др. 2004).

В зимний период в Краснодарском крае была известна только одна находка белого аиста: птица, окольцованная 29 июня 1945 в Аскании-Нова, была найдена мертвой 22 декабря 1952 в Советском районе (Лебедева 1960). Однако, когда именно погиб этот аист, не было точно установлено. Вероятно, именно поэтому эта регистрация либо не вошла в обзоры по Северному Кавказу (Свиридова 2000; Букреев и др. 2009), либо не была расценена как случай зимовки (Казаков и др. 2004).

О встрече белого аиста в конце января 2011 года на ирригационной системе у посёлка Знаменский (восточная окраина Краснодара) нам сообщил С.И.Вершинин. Однако подтвердить или опровергнуть это не удалось. На следующий год (29 и 30 января 2012) один взрослый белый аист был встречен на рисовых чеках у станицы Новомышастовской Красноармейского района в 35 км на северо-запад от Краснодара (45°12′ с.ш., 38°34′ в.д.). 29 января птица кормилась на сельскохозяйственном поле в 20-30 м от обочины трассы Краснодар – Темрюк вместе с несколькими большими белыми цаплями *Egretta alba*. 30 января аиста удалось отметить не сразу: с трассы его не было видно. Он взлетел только при подходе к ирригационному каналу, расположенному в

50-70 м от дороги, рядом с местом первой встречи. Вместе с аистом с неширокого и частично замёрзшего канала в воздух поднялись 10 больших белых и 3 серых *Ardea cinerea* цапли, около 10 крякв *Anas platyrhynchos* и одиночный бекас *Gallinago gallinago*. Аист перелетел на 150-200 м и сел на соседний рисовый чек. Птица не была травмированной, выглядела здоровой и хорошо летала.

В дни наблюдений было бесснежно, температура воздуха доходила до -10…-13°С. Проследить судьбу встреченного в окрестности станицы Новомышастовской белого аиста нам, к сожалению, не удалось.

Интересно, что в обоих случаях белые аисты отмечены в конце января, в бесснежные или малоснежные периоды, но во время усиления холодов. Сравнивая метеорологические условия двух последних зим, можно отметить, что зима 2010/11 года была более тёплой и менее многоснежной, чем 2011/12 (см. таблицу).

Таблица. Среднемесячные температуры воздуха (°С) в ноябре – феврале в 2010/11 и 2011/12 годах в Краснодаре

Среднемесячная температура воздуха	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль
2010/11	+13.12	+7.77	+0.08	-0.63
2011/12	+1.83	+5.69	-0.61	-4.61
Многолетняя	+6.0	+1.9	+0.3	+1.1

Примечания: среднемесячные температуры воздуха 2010/11 и 2011/12 годов взяты из архива погоды с сайта http://www.gismeteo.ru/, многолетние среднемесячные температуры – http://www.pogoda.ru.net/.

В 2010 году ноябрь и декабрь были очень тёплыми и заметно опережали среднемесячные показатели. Тёплым до второй половины оставался и январь, но начавшиеся после 17 января холода привели к снижению среднемесячной температуры ниже нормы. В феврале затяжные холода сменялись оттепелями, но в целом февраль также оказался холоднее нормы. Первый снег пошёл только 6 января, а устойчивый снежный покров держался с середины третьей декады января до конца первой декады февраля. Зиме 2011/12 года предшествовал холодный ноябрь. 10 ноября уже выпал первый снег, который пролежал, правда, недолго. Декабрь и январь (до начала третьей декады) были тёплыми и бесснежными; обильный снег выпал с 31 января, началось усиление морозов, продержавшихся до середины февраля. Зима 2011/12 года была аномально холодной.

Итак, данная регистрация является первой достоверной зимней встречей белого аиста на Северо-Западном Кавказе. Вероятно, в отдельные годы одиночные аисты могут переживать в регионе всю зиму или её часть. При сохранении существующих трендов популяции бело-

го аиста в Краснодарском крае и климата нельзя исключать формирования нерегулярных зимовок вида на Юге России. Успешное переживание зимних условий белым аистом, может быть связано с его синантропностью и обитанием в культурном ландшафте: в селениях, на сельскохозяйственных землях, в условиях Краснодарского края – на рисовых полях, богатых кормом. Гнёзда белого аиста на Кубани отмечены исключительно в районах рисосеяния (Мнацеканов 2000, 2007; Казаков и др. 2004); там же мы наблюдали аиста и зимой. Косвенным подтверждением этого предположения являются периодические случаи зимовки на рисовых чеках Краснодарского края другого теплолюбивого перелётного вида из отряда Ciconiiformes – каравайки *Plegadis falcinellus* (Хохлов, Заболотный 1988).

Литература

Грищенко В.Н., Галчёнков Ю.Д. 2011. Белый аист *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) // *Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные*. М.: 384-416.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П., Хохлов А.Н., Тильба П.А., Пишванов Ю.В., Прилуцкая Л.И., Комаров Ю.Е., Поливанов В.М., Емтыль М.Х., Бичерев А.П., Олейников Н.С., Заболотный Н.Л., Кукиш А.И., Мягкова Ю.Я., Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И., Витович О.А., Динкевич М.А. 2004. *Птицы Северного Кавказа. Т. 1: Гагарообразные, Поганкообразные, Трубконосые, Веслоногие, Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные*. Ростов-на-Дону: 1-398.

Лыков Е.Л., Самсонкин А.В. 2006. Случаи зимовки белого аиста *Ciconia ciconia* в Калининградской области // *Рус. орнитол. журн.* **15** (306): 31-34.

Свиридова Т.В. (сост.). 2000. *Ключевые орнитологические территории России. Т. 1: Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России*. М.: 1-702.

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С., Любимова К.А., Краснова Е.Д., Свиридова Т.В. (сост.). 2009. *Ключевые орнитологические территории России. Т. 3: Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе*. М.: 1-302.

Лебедева М.И. 1960. Некоторые материалы по численности и миграции белого аиста // *Миграции животных*. М., **2**: 130-139.

Мнацеканов Р.А. 2000. К гнездованию белого аиста в Краснодарском крае // *Кавказ. орнитол. вестн.* **12**: 146-147.

Мнацеканов Р.А. 2007. Белый аист *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) // *Красная книга Краснодарского края (животные)*. Изд. 2-е. Краснодар: 364-365.

Роотсмяэ Л.Т. (1991) 2010. Зимовка перелётных птиц в Эстонии в 1981-1990 годах // *Рус. орнитол. журн.* **19** (605): 1893-1894.

Хохлов А.Н., Заболотный Н.Л. 1988. Каравайка остаётся зимовать // *Природа* 6: 59.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **740**: 644-645*

Новые гнездящиеся птицы города Усть-Каменогорска

Б.В.Щербаков

Второе издание. Первая публикация в 2007[*]

Наблюдения за птицами в Усть-Каменогорске, расположенном при слиянии Иртыша и Ульбы, в широкой пойме Иртыша с островами и протоками, с зарослями тополя чёрного и лавролистного, ивы, черёмухи, ведутся мной с 1956 по 2007 год (Самусев и др. 1965; Щербаков 1996). За последнее время в связи с ростом зелёных искусственных и естественных насаждений по берегам рек, а также с расширением площадей дачных посёлков постепенно растёт численность птиц, экологически связанных с пойменными зарослями. Приводим 5 видов птиц, ранее не отмеченных в гнездовый период в черте города.

Milvus migrans. С 2005 года пары гнездящихся чёрных коршунов наблюдаются каждое лето. Взрослые птицы и лётный молодой, требующий корма, держались в 2005 году в тополях иртышского острова в центре города до 2 августа. В 2007 году два коршуна всё лето утром и под вечер охотились за многочисленными в центре города молодыми голубями.

Sitta europaea. С 22 июля по 27 июля 2007 в тополевой пойме Иртыша в черте города наблюдалась семья поползней с 4 лётными, докармливаемыми птенцами. С 2 октября в течение недели один из молодых поползней держался недалеко от места встречи семьи, отыскивая корм на автобусной остановке прямо у ног людей, ждущих автобус. Примерно через неделю он погиб под колёсами автомашины.

Remiz pendulinus. Гнездо обыкновенного ремеза, которое достраивали птицы на тополе чёрном над иртышской старицей на высоте 5 м, обнаружено 15 июня 2007 на территории дачного посёлка, у западной окраины Усть-Каменогорска. Птицы благополучно вывели 4 птенцов. Здесь же 12 августа выводок ремезов из 3 молодых в сопровождении самца в течение получаса кормился на корзинках осота, извлекая из них личинок. Несмотря на то, что молодые сами успешно добывали корм, родитель поочередно кормил каждого.

Cettia cetti. Расселяющий вид. Впервые в черте города всё лето 2007 года широкохвостки держались на дачном участке, в том же районе, где и ремезы. Судя по поведению, они гнездились в запущенных бере-

[*] Щербаков Б.В. 2007. Новые гнездящиеся птицы города Усть-Каменогорска // *Каз. орнитол. бюл. 2007:* 171.

говых зарослях тальника, растущих вперемежку с чёрным и лавролистным тополями.

Chloris chloris. Расселяющийся вид в казахстанской части Алтая (Щербаков 1978; Стариков 2007). Летом территориальная пара зеленушек постоянно до конца июля держалась в дачном посёлке на западной окраине города в береговой роще, состоящей из чёрного и лавролистного тополей и старых ив.

Литература

Самусев И.Ф., Хроков В.В., Щербаков Б.В. 1965. Влияние антропогенных факторов на численность птиц Усть-Каменогорска // *Новости орнитологии*. Алма-Ата: 339-341.

Щербаков Б.В. 1978. О залётах и расселении некоторых птиц в Казахстанском Алтае // *Миграции птиц в Азии*. Ташкент: 144-147.

Щербаков Б.В. 1996. *Птицы за окном (Пособие по птицам населённых пунктов Восточного Казахстана)*. Усть-Каменогорск: 1-144.

Стариков С.В. 2006. Аннотированный список птиц Катон-Карагайского национального парка и прилегающих территорий Алтая // *Тр. Катон-Карагайского национального парка*. Усть-Каменогорск: 147-241.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **740**: 645-647*

Птицы жилых и хозяйственных построек сельских населённых пунктов Калининградской области

В.В.Беляков, А.М.Романова

*Второе издание. Первая публикация в 1981**

Решение актуальных проблем охраны природы в наше время во многом зависит от результатов познания нами закономерностей сложения и развития биогеоценозов или их отдельных компонентов в урбанизированной среде. В этом плане в нашей стране и за рубежом собрано много материалов о птицах городов, тогда как орнитоценозам сельских населённых пунктов внимания уделяется гораздо меньше. Нами в 1974-1977 годах с целью обнаружения и описания гнёзд обследовано 147 жилых и 163 хозяйственных построек разных типов в 6 сельских населённых пунктах Калининградской области.

* Беляков В.В., Романова А.М. 1981. Птицы жилых и хозяйственных построек сельских населённых пунктов Калининградской области // *10-я Прибалт. орнитол. конф.: Тез. докл.* Рига, **1**: 14-15.

Исследование показало, что в летний период в сельских населённых пунктах самой западной области страны постоянно встречается 34 вида птиц, относящихся к 7 отрядам (воробьиные, голубеобразные, стрижеобразные, голенастые, дятлообразные, хищные, журавлеобразные – коростель *Crex crex).* Преобладают вороьиные – 27 видов. В жилых и хозяйственных постройках разного типа постоянно гнездятся 12 видов: домовый воробей *Passer domesticus* (число его гнёзд составило 31.4% от общего количества найденных – 934), деревенская ласточка *Hirundo rustica* (26.0%), городская ласточка *Delichon urbica* (23.9%), чёрный стриж *Apus apus* (11.6%), сизый голубь *Columba livia* (5.0%), белая трясогузка *Motacilla alba* (0.9%), полевой воробей *Passer montanus* (0.6%), горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* (0.3%), скворец *Sturnus vulgaris* (0.1%), большая синица *Parus major* (0.1%), галка *Corvus monedula* (0.1%) и белый аист *Ciconia ciconia* (0.1%).

Большинство видов, за исключением домового воробья, стрижа и скворца, предпочитает гнездиться в хозяйственных постройках (постройки для скота, склады, гаражи и др.). Здесь обнаружено 60.1% от общего числа найденных гнёзд. Преобладающие типы построек, используемые для гнездования доминирующими видами птиц,– это кирпичные неоштукатуренные жилые дома под черепичной крышей и деревянные сараи с черепичным покрытием. В целом постройки под черепичной крышей предпочитаются всем другим. Особый интерес представляет картина распределения отдельных видов по местам гнездования внутри или снаружи самих построек.

Наибольшее количество гнёзд (без разделения по видам) зарегистрировано в различных углублениях и укрытиях нижней части ската крыши вдоль желоба (34.3% гнёзд). Второе место в этом плане занимает карниз постройки (32.3%). Несколько реже птицы гнездятся внутри чердачного помещения на балках, перекрытиях и стропилах (29.1%). Меньше всего гнёзд устраивается на фронтоне (3.3%) и на коньке крыши (1.0%).

Отдельные виды птиц проявляют избирательность к местам для устройства гнёзд. Так, горихвостка-чернушка, сизый голубь и деревенская ласточка предпочитают гнездиться внутри чердачных помещений на балках перекрытий и стропилах, в местах пересечения последних с настилом для кроли. В этих местах располагалось, соответственно, 100%, 95.7% и 78.6% гнёзд названных видов. Городская ласточка устраивает гнёзда преимущественно на карнизах построек (около 70% гнёзд); скворец, стриж, домовый воробей и белая трясогузка – в укрытиях нижней части ската крыши (соответственно, 100%, 99.1%, 57.3%, 50.0%). Белый аист гнездится обычно на коньке крыши.

Учитывая вышеизложенное, в качестве природоохранительных мероприятий в отношении орнитофауны сельских населённых пунктов

следует рекомендовать устройство и сохранение черепичной кровли (к тому же наиболее устойчивой в отношении осадков и других влияний) на жилых и хозяйственных постройках, а также установление на фронтонах крыш зарешеченных окон, доступных для проникновения насекомоядных воробьиных птиц и ограничивающих доступ голубей в чердачные помещения.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **740**: 647-648*

Кваква *Nycticorax nycticorax* и майна *Acridotheres tristis* – новые виды птиц Восточно-Казахстанской области

В.А.Егоров

Второе издание. Первая публикация в 1999[*]

Кваква *Nycticorax nycticorax*. Наиболее северные места гнездования кваквы на востоке Казахстана известны для Алакольской котловины, где в дельте реки Тентек 16 июня 1926 была найдена колония примерно из 10 гнёзд со свежими кладками (Селевин 1928). На озере Зайсан, несмотря на длительные и довольно тщательные исследования, встреч с кваквой не регистрировалось (Хахлов 1928; Самусев 1958; Долгушин 1960; Сурвилло 1971).

Впервые колонию квакв из 10 гнёзд удалось обнаружить 10 июня 1985 ихтиологу Алтайского отделения Казахского института рыбного хозяйства (Усть-Каменогорск) А.Л.Козляткину в южной части озера Зайсан, в 5-6 км восточнее посёлка Приозёрный. Гнёзда располагались на сухих ивах, затопленных водой, на берегу озера Косколь, отделённого от акватории Зайсана неширокой песчано-глинистой косой. Это озеро представляет собой продолговатый мелководный водоём, наполовину заросший тростником. Кое-где по его берегам растут группы ив. Во время наблюдений 10-15 июня 1985 в гнёздах квакв были пуховые птенцы и насиженные кладки. Взятое в коллекцию неоплодотворённое яйцо голубоватой окраски имело размеры 61.5×43.8 мм. Указанная находка колонии отодвигает северную границу ареала кваквы на 300 км к северо-востоку.

---

[*] Егоров В.А. 1999. Кваква и майна – новые виды птиц Восточно-Казахстанской области // *Проблемы охраны и устойчивого использования биоразнообразия животного мира Казахстана (Материалы международной научной конференции).* Алматы: 63-64.

Майна *Acridotheres tristis*. Согласно «Книге генетического фонда Казахской ССР» (1989), северо-восточная граница ареала майны в Казахстане до последнего времени определялась нахождениями у города Талды-Кургана, Балхаша и Джезказгана.

На полупустынном полынно-типчаковой участке закреплённых песков на левом берегу Бухтарминского водохранилища у бывшей пристани Баты 16 и 17 июня 1994 нами наблюдались две майны. Птицы были очень осторожны, подпускали на 25-30 м, кормились на участках песков рядом с домиками базы отдыха. Это первый залёт майны на территорию Восточно-Казахстанской области более чем на 500 км к северо-востоку от ранее известных нахождений.

Литература

Долгушин И.А. 1960. *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **1**: 1-470.

Самусев И.Ф. 1958. Материалы по промысловым птицам оз. Зайсан // *Учён. зап. Усть-Каменогорск. пед. ин-та* **1**: 98-144.

Книга генетического фонда Казахской ССР. Часть 1. Позвоночные животные. 1989. Алма-Ата: 1-215.

Селевин В.А. 1928. К распространению цапли-кваквы (*Nycticorax nycticorax* L.) в Семиречье // *Uragus* **2** (7): 39-40.

Сурвилло А.В. 1971. *Птицы Зайсанской котловины и их связь с арбовирусами*. Автореф. дис. … канд. биол. наук. Алма-Ата: 1-23.

Хахлов В.А. 1928. Зайсанская котловина и Тарбагатай. Зоогеографический очерк. Птицы. Ч 1. Общая // *Изв. Томск. ун-та* **81**: 1-157.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **740**: 648-649*

О гнездовании илийской саксаульной сойки *Podoces panderi ilensis* в песках близ Баканаса

А.Ф.Ковшарь

Второе издание. Первая публикация в 2002[*]

От зоологов Баканасского отряда Талдыкурганской противочумной станции мне не раз приходилось слышать, что саксаульная сойка *Podoces panderi ilensis* Menzbier et Schnitnikov 1915 гнездится в песках недалеко от посёлка Баканас, что значительно южнее известных нам гнёзд этого вида в районе Кароя. Зоолог А.Г.Мельчаков сообщил мне,

[*] Ковшарь А.Ф.. 2002. О гнездовании саксаульной сойки в песках близ Баканаса // *Каз. орнитол. бюл. 2002:* 89.

что 28 апреля 1998 в 70 км к востоку от Баканаса, в черносаксаульниках, нашёл гнездо с двумя зеленоватыми пятнистыми яйцами; самка сидела в гнезде, а вспугнутая убежала.

В июне того же года А.Г.Мельчаков проводил нас с группой английских орнитологических туристов Дэвида Холмана в эти места. Примерно в 55 км к северо-востоку от Баканаса, миновав рисовые чеки и глинистую Акдалинскую равнину, мы вышли к колодцу Кокуйрюм (на карте – Кокирюм), на стыке Акдалинской равнины и Баканасской саксауловой рощи. Здесь, в редком саксаульнике на невысоких барханах, 12 июня 1998 мы осмотрели пустое гнездо саксаульной сойки, в котором в апреле было 2 яйца. Гнездо помещалось в верхней части саксаула, на высоте около 2.5 м от почвы. В выстилке гнезда не оказалось так называемой «перхоти» (остатков роговых чехликов от маховых перьев), которая обычно бывает после вылета птенцов. Скорее всего, гнездование не было успешным. В 100 м в межбарханном понижении на саксауле мы обнаружили второе гнездо саксаульной сойки – целое, но тоже пустое. Постройка была новая, явно этого года. Самих птиц в течение двухчасовой экскурсии, пришедшейся на самое жаркое время дня, мы так и не видели, но факт гнездования их здесь не вызывает сомнений.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **740**: 649-650*

О гнездовании белого аиста *Ciconia ciconia* в Дагестане

А.Н.Хохлов, В.Ф.Маматаева,
Г.С.Джамирзоев, М.П.Ильюх

*Второе издание. Первая публикация в 2001**

Известно, что белый аист *Ciconia ciconia* в XIX веке гнездился по реке Терек (Богданов 1879). В первой половине XX столетия этот вид на гнездовании стал здесь очень редок. Так, Е.П.Спангенберг (1951) в 1929 году обнаружил всего лишь одну пару в ауле Зрых (Дагестан).

По нашим данным (1999-2000 годы), белый аист не представляет редкости в Дагестане по всему междуречью Терека и Сулака. Здесь

* Хохлов А.Н., Маматаева В.Ф., Джамирзоев Г.С., Ильюх М.П. 2001. О гнездовании белого аиста в Дагестане // *Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии*. Казань: 620.

пары аистов гнездятся в населённых пунктах, на опорах ЛЭП по железной дороге, на отдельно стоящих деревьях вне населённых пунктов, в лесах и лесополосах, на скирдах и искусственных гнездовьях, устроенных сельскими жителями. Жилые гнёзда зарегистрированы в следующих точках: Бабаюрт (2 гнезда), Айтхан, Качалай, Хамаматюрт, Герменчик, Львовские Номера, Новая Коса, Герменкутан. По опросным данным, две пары белых аистов гнездятся по левобережью Терека в районе села Новый Берюзяк и три пары – в около села Умар-Отар Хасавюртовского района.

Прилёт первых птиц приходится на первые числа марта. Основная масса белых аистов появляется во второй декаде марта. Птенцы слетают с гнёзд в третьей декаде июня – начале июля. Эффективность гнездования довольно высока (около 4 птенцов на гнездо). В послегнездовое время аисты держатся на рисовых чеках, орошаемых полях и прочих мелководьях. В определённое время семьи возвращаются на гнездо. Молодые отлетают в середине октября, взрослые – в конце октября. По опросным данным, отдельные пары гнездятся по 14-15 лет подряд (село Умар-Отар). В 10 гнёздах, находившихся под наблюдением в 1999 и 2000 годах, погибли две взрослые птицы, разбившись о провода ЛЭП. В обоих случаях птицы сломали ноги. Сельские жители пытались спасти их, но аисты через некоторое время погибали. В целом местное население очень бережно относится к белым аистам.

Таким образом, в Дагестане в 1980-1990-е годы сформировалась устойчивая гнездовая популяция белого аиста, насчитывающая около 20-25 пар. Можно ожидать, что этот вид в ближайшие горы появится на гнездовании в других районах Северного Кавказа.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **740**: 650-651*

Следование чаек за поездами

А.С.Корякин

*Второе издание. Первая публикация в 2001**

Следование морских птиц за судами в море – общеизвестное явление, но сходный феномен – следование птиц за поездами – не привлёк внимания, возможно, потому, что с очевидностью его можно наблюдать только из торцового окна тамбура последнего вагона.

* Корякин А.С. 2001. Следование чаек за поездами // *Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии*. Казань: 322-323.

В нашем случае наблюдения проведены в солнечную погоду 9 июля 2000 со скорого поезда «Мурманск–Москва».

Следование чаек за поездом отмечено в Карелии, на участке Октябрьской железной дороги между станциями Сегежа, Медвежья Гора и Кондопога. Этот участок магистрали не электрифицирован (птицам не угрожает опасность разбиться о провода), а полотно дороги большей частью проходит через плотный лесной коридор.

За поездом летели сизые *Larus canus*, серебристые *L. argentatus* чайки и клуши *L. fuscus*. Все наблюдавшиеся птицы были взрослыми. Обычно за поездом следовала группа из 5-10 особей; максимальная по величине группа включала 10 сизых, 3 серебристых чаек и 3 клуш. Некоторые особи непрерывно следовали за поездом на протяжении 10-20 км. Иногда к чайкам, летящим за поездом, присоединялись и во́роны *Corvus corax*, но они прекращали преследование через 1-2 км.

Чайки явно учитывали аэродинамические эффекты, возникающие при прохождении поезда. Они предпочитали держаться в зоне от нескольких метров до нескольких десятков метров от последнего вагона и в пределах этой зоны использовали в основном парящий, а не машущий полёт. У отдельных чаек изредка отмечались попытки схватить какие-то объекты, оказавшиеся в воздухе после прохождения поезда, но в целом поведение птиц более напоминало игровое. Во многом сходное поведение отмечалось в устье реки Нивы в Кандалакше, когда при внезапном усилении ветра ранее отдыхавшие сизые, серебристые и морские *Larus marinus* чайки поднимались в воздух и до 10 мин и более играли в воздушном потоке, используя преимущественно парение.