ISSN 0869-4362

# Русский орнитологический журнал

2012
XXI



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

771

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

*Издается с 1992 года*

Том XXI

Экспресс-выпуск • Express-issue

# 2012 № 771

## СОДЕРЖАНИЕ

1523-1532 Орнитологические наблюдения в долине реки Девятки и в окрестностях некоторых посёлков восточного участка Байкало-Амурской магистрали. I.V.KUZIKOV

1532-1535 Гнёзда ремеза *Remiz pendulinus* на Нарских прудах в Московской области. Н.С.МОРОЗОВ

1535-1537 Тенденции изменения численности гусеобразных Нижнего Приамурья за последние 20 лет XX века. Н.Д.ПОЯРКОВ

1537-1544 Наблюдения за птицами с группами иностранных туристов в мае-июне 2012 года в центральных и юго-восточных районах Казахстана. В.В.ХРОКОВ

1544-1545 Залёты фламинго *Phoenicopterus roseus* в Алакольскую котловину. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ, Е.А.АНИСИМОВ

1545-1547 О некоторых редких видах птиц Владимирской области. В.В.РОМАНОВ, Ю.А.БЫКОВ, В.А.СЕРБИН

*Редактор и издатель А.В.Бардин*

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2012
Дата опубликования: 22 июля 2012

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
*Published from 1992*
Volume XXI
Express-issue
2012 № 771

# CONTENTS

1523-1532 Ornithological observations in the valley of Devyatka River and in the vicinity of some settlements in the eastern sector of the Baikal-Amur Railway.
I.V.KUZIKOV

1532-1535 Finding nests of the penduline tit *Remiz pendulinus* on Nara ponds in the Moscow Oblast.
N.S.MOROZOV

1535-1537 Trends in the number of waterfowl in the Lower Amur region in the last 20 years of the XX century.
N.D.POYARKOV

1537-1544 Birding with groups of foreign birdwatchers in May-June 2012 in central and south-eastern Kazakhstan.
V.V.KHROKOV

1544-1545 Invasions of the greater flamingo *Phoenicopterus roseus* in Alakol depression.
N.N.BEREZOVIKOV, E.A.ANISIMOV

1545-1547 On some rare birds of the Vladimir Oblast.
V.V.ROMANOV, Yu.A.BYKOV, V.A.SERBIN

*A.V.Bardin, Editor and Publisher*
Department of Vertebrate Zoology
St.-Petersburg University
St.-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2012

*ISSN 0869-4362*
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **771**: 1523-1532*

# Орнитологические наблюдения в долине реки Девятки и в окрестностях некоторых посёлков восточного участка Байкало-Амурской магистрали

И.В.Кузиков

*Игорь Викторович Кузиков*. Ул. Живописная, д. 19, кв. 67, Москва, 123103, Россия.
E-mail: kuzikov-y@mail.ru

*Поступила в редакцию 9 июля 2012*

Несмотря на то, что исследования авифауны Нижнего Приамурья имеют более чем полутора вековую историю, в орнитологическом отношении этот район изучен недостаточно полно (Бабенко, Фадеева 2010). В районе, где мы вели наблюдения, наиболее изучен исток реки Девятки с прилегающим к нему побережьем озера Эворон и левобережье реки в 5 км ниже села Кондон, где проводились стационарные исследования (Бабенко 2000; Федотов, Брунов 1977). Во время наших непродолжительных наблюдений 24-31 мая 2012 обследованы южное побережье озера Эворон, долина реки Девятки в районе истока и окрестностей населённых пунктов Сельхоз, Харпичан, Кондон, а также правобережье реки ниже села Кондон на протяжении 5 км. Кроме того, наблюдения вели в окрестностях посёлка Харпичан на удалении до 5 км к западу и северу, а также в долине реки Амгунь вблизи посёлка Берёзовый. Посещение перечисленных выше мест через 35-37 лет позволило заметить некоторые изменения в составе орнитофауны района, отмеченные в повидовых очерках.

***Phalacrocorax carbo***. В долине реки Девятки большой баклан, согласно монографии В.Г.Бабенко (2000), не отмечен. Не был он встречен и В.В.Бруновым с соавторами (1988), а также нами во время стоянки в полевом лагере на левом берегу Девятки в 5 км ниже села Кондон в июне и первой половине июля 1975-1977 годов (стационар «Кондон») и в истоках Девятки в июле 1978-1979 годов. В описываемом районе баклан отмечен Г.Е.Росляковым (1987) на озере Эворон и В.А.Колбиным с соавторами (1994) – в низовьях реки Горин.

Нами 26-30 мая 2012 неоднократно наблюдались отдельные особи и группы до 4 птиц, летевшие вверх и вниз над рекой Девяткой или в небольшом отдалении от неё. В окрестностях бывшего стационара «Кондон» 27 мая 2012 встречены 2 кормящихся больших баклана. Около 10 особей, в том числе с ветками в клювах, 24 мая кружились на правом берегу реки Горин вблизи моста у одноимённого посёлка, что

даёт основание предположить наличие здесь или поблизости гнездовой колонии больших бакланов.

***Ardea cinerea***. В числе одного-двух десятков особей за экскурсию серая цапля постоянно отмечалась нами в долине реки Девятки между её истоком и устьем реки Харпичан. Единичные встречи зарегистрированы нами в окрестностях села Кондон и посёлка Харпичан. Колония серых цапель на южном берегу озера Эворон, которая существовала по крайней мере с 1970 года (данные В.Т.Тагировой – см.: Бабенко 2000) и была известна многим исследователям (Росляков 1975; Бабенко 2000; наши наблюдения в июле 1978), в настоящее время исчезла. По словам сотрудника охотничьей базы «Эворон», цапли «переселились на реку Горин в 2011 году».

***Histrionicus histrionicus***. Отсутствие встреч каменушки в конце 1990-х годов и снижение её численности в Нижнем Приамурье отмечал Н.Д.Поярков (2001). Нами каменушка встречена 24 мая 2012 на реке Харпичан в окрестностях одноимённого посёлка.

***Bucephala clangula***. Гоголь встречен 25 мая на реке Харпичан.

***Pandion haliaetus***. Ранее скопа отмечалась на озере Эворон (Тагирова 1983). Нами она обнаружена 26 мая в момент «зависания» над рекой Девяткой между деревней Сельхоз и устьем реки Харпичан.

***Buteo buteo***. Канюк наблюдался нами 29 мая в смешанном лиственнично-берёзовом лесу в 3 км к западу от посёлка Харпичан.

***Falco subbuteo***. Чеглока, сидящего на антенне во дворе дома, видели 25 мая в посёлке Харпичан.

***Lagopus lagopus***. На южном пределе распространения на Нижнем Амуре граница ареала белой куропатки не спускается южнее реки Горин (Иванов 1976). Отмечена как гнездящаяся птица в окрестностях озера Эворон (Штильмарк 1973). Нами среди мари на левом берегу реки Харпичан (51º17′52″ с.ш., 136º33′09″ в.д.) 25 мая был поднят самец с тёмной головой, шеей и грудью.

***Tringa ochropus***. Черныш отмечен 26 мая 2012 на берегу реки Девятки в 1 км к юго-западу от деревни Сельхоз.

***Gallinago megala***. Лесной дупель зарегистрирован в окрестностях озера Эворон и в долине реки Девятки (Федотов, Брунов 1977; Брунов и др. 1988). Самец, токовавший над марью, встречен нами 29 мая в 2 км западнее посёлка Харпичан. В других местах мы почти ежедневно поднимали бекасов с земли по 1-2 особи за экскурсию среди марей в окрестностях деревни Сельхоз, села Кондон и посёлка Харпичан, а также у уреза воды на левом берегу Девятки. В связи с тем, что надёжное определение бекасов возможно только по контактным признакам (Рябицев 2008), не исключена возможность принадлежности их к виду *Gallinago gallinago*, который обычен и широко распространён в данном районе (Бабенко 2000).

***Numenius madagascariensis***. Дальневосточный кроншнеп в Нижнем Приамурье рассматривается как редкий вид, который наблюдался в бассейне озера Эворон (Нечаев 1974; Бабенко, Поярков 1984; Росляков 1990; Бабенко 2000) и долине реки Горин (Koblik *et al*. 2001). Нами одна особь поднята 28 мая 2012 среди мари на левом берегу Девятки в 1 км к северо-востоку от деревни Сельхоз. Ещё три дальневосточных кроншнепа встречены 30 мая на южном берегу озера Эворон в 1 км западнее охотничьей базы. Поднявшись с тревожными криками, птицы вновь вернулись и сели на то же место, что может свидетельствовать о возможном гнездовании.

***Limosa limosa***. Большой веретенник обычен на озере Эворон (Бабенко 2000). Нами по 4 особи встречены 26 мая на пролёте в окрестностях деревни Сельхоз на заброшенном лугу и 30 мая на озере Эворон.

***Streptopelia orientalis***. Пара больших горлиц держалась на заброшенном поле вблизи деревни Сельхоз рядом с недостроенным гнездом, найденном на берёзе на высоте 4 м. Одна птица отмечена 27 мая у станции Харпичан.

***Cuculus micropterus***. На северо-восточном пределе распространения индийская кукушка отмечена в долине Амура в окрестностях посёлка Хурба, Комсомольска-на-Амуре, в Комсомольском заповеднике и на озере Удыль (Кистяковский, Смогоржевский 1973; Назаров 1993; Бабенко 2000; Нечаев, Гамова 2009). Детали границы ареала к северо-западу от Комсомольска-на-Амуре не описаны. В окрестностях стационара «Кондон» в середине 1970-х годов не была отмечена (Брунов и др. 1988). Нами на маршруте общей протяжённостью 8.5 км от села Кондон по правому берегу реки на восток и обратно на юго-юго-запад к железной дороге 27 мая отмечены по голосу и визуально 2 особи в точках с координатами 51º15′11″ с.ш., 136º36′04″ в.д. и 51º14′30″с.ш., 136º 36′19″ в.д. Обе встречи зарегистрированы в долинном смешанном лесу с преобладанием берёзы и лиственницы с хорошо развитым подлеском, без видимых признаков пожара.

***Cuculus canorus***. В разных районах Нижнего Приамурья первое кукование отмечали во второй-третьей декадах мая (Бабенко 2000). Кукование 1-2 самцов обыкновенной кукушки мы слышали 25 мая в окрестностях посёлка Харпичан, 27-30 мая – в окрестностях посёлка Кондон, деревни Сельхоз и озера Эворон.

***Cuculus (saturatus) optatus***. Глухая кукушка отмечена по голосу 30 мая в дубняке на склоне сопки в окрестностях посёлка Харпичан и по дороге на озеро Эворон в 3 км юго-юго-западнее охотбазы.

***Dryocopus martius***. Желна встречена 28 мая 2012 в окрестностях деревни Сельхоз.

***Hirundo rustica***. Гнездование (начало строительства гнёзд) у деревенской ласточки нами отмечено с 26 мая в деревне Сельхоз и по-

сёлке Харпичан. По словам местных жителей, численность деревенской ласточки в Харпичане, из-за участившихся случаев закрытия доступа их в помещения, в последние годы заметно снизилась и стала уступать *Delichon urbica*.

***Delichon urbica***. Крупная колония воронков, состоящая из 70-75 гнёзд, из которых приблизительно половина обновлялась 28 мая, обнаружена под крышей ангара на территории Эворонского леспромхоза в посёлке Харпичан. Единичные особи встречены нами 26 мая в окрестностях деревни Сельхоз в смешанной стае с *Hirundo rustica* и *Riparia riparia* над рекой Девяткой.

***Motacilla tschutschensis***. Несколько стаек берингийской жёлтой трясогузки численностью от 10 до 20 особей были встречены нами на пролёте возле водоёмов у посёлка Харпичан (25 мая) и вблизи деревни Сельхоз (28 мая), а также на берегах реки Девятки (26-27 мая).

***Motacilla (tschutschensis) taivana***. Юго-западная граница гнездового ареала зелёноголовой трясогузки в Хабаровском крае совпадает с очертаниями Тугур-Эворонской впадины (Редькин, Бабенко 1999; Бабенко, Фадеева 2010) и в характеризуемом нами районе полностью включает долину реки Девятки, а также среднюю и нижнюю часть долины Горина. Несколько птиц встречены нами 26 мая на правом берегу Девятки чуть ниже деревни Сельхоз. Одна особь замечена со строительным материалом у воды и, вероятно, держалась поблизости от гнезда (рис. 1). Птиц, строящих гнёзда в такое же время, встречали на Нижнем Амуре и другие авторы (Редькин, Бабенко 1999).



Рис. 1. Зелёноголовая трясогузка *Motacilla taivana* с материалом для выстилки гнезда. Окрестности деревни Сельхоз, 26 мая 2012. Фото автора.

***Motacilla alba***. Белая трясогузка отмечена в посёлках Харпичан и Берёзовый.

***Lanius cristatus***. Сибирский жулан встречался нам 25-30 мая в посёлке Харпичан и селе Кондон, а также во время экскурсий в окрестностях этих посёлков и деревни Сельхоз среди или вблизи марей.

***Sturnus cineraceus***. В деревне Сельхоз серый скворец встречен 28 мая 2012 с кормом для птенцов.

***Pica pica***. Из ближайших к району наших наблюдений мест гнездование сороки зарегистрировано в посёлках Горин и Берёзовый (Бабенко 2000). Нами жилое гнездо на вершине лиственницы найдено 26 мая 2012 на окраине посёлка Харпичан.

***Corvus macrorhynchos***. Большеклювая ворона отмечена нами в посёлке Харпичан (25-30 мая), посёлке Берёзовый (31 мая) и окрестностях села Кондон (27 мая).

***Phragmaticola aedon***. Толстоклювая камышевка добывалась на реке Горин у села Кондон (Яхонтов 1963). Поющий самец встречен нами 28 мая в кустарниковых зарослях на берегу искусственного «залива» реки Девятки ниже деревни Сельхоз.

***Saxicola torquata***. Самцы черноголового чекана встречены на мари в низовьях реки Харпичан (25 мая), в окрестностях деревни Сельхоз, а также в посёлке Берёзовый (31 мая).

***Phoenicurus auroreus***. Встречи сибирской горихвостки (25 мая) и конфликты конспецифичных самцов (28 мая) отмечены в посёлке Харпичан.

***Turdus pallidus***. Северная граница гнездовой части ареала бледного дрозда в Нижнем Приамурье к западу от Комсомольска-на-Амуре выяснена недостаточно подробно (Бабенко 2000). Нами в смешанном лиственнично-берёзовом лесу 29 мая найдено гнездо с насиживающей птицей в 2 км западнее посёлка Харпичан. Гнездо было расположено близи лесной дороги в развилке ольхи на высоте 2.5 м и содержало полную кладку из 5 ненасиженных яиц (рис. 2). Размеры гнезда, мм: диаметр гнезда 140×170; диаметр лотка 100×105; высота гнезда 125; глубина лотка 50. Размеры яиц, мм: 26.7×19.21; 25.63×19.36; 26.28×19.09; 26.35×19.43; 27.04×19.53.

***Turdus eunomus***. Бурый дрозд в Нижнем Приамурье, вероятно, встречается на пролёте (Бабенко 2000). Нами вблизи деревни Сельхоз на заброшенном поле 26 мая встречена одиночная птица, кормившаяся на дороге.

***Passer domesticus***. В районе восточного БАМа домовый воробей найден в Комсомольске-на-Амуре и посёлке Берёзовый (Бабенко 1983, 2000). Нами встречен в посёлке Харпичан, где отмечены особи с гнездовым материалом, предположительно гнездившиеся под крышей ангара на территории Эворонского леспромхоза.



Рис. 2. Кладка бледного дрозда *Turdus pallidus*.
Окрестности посёлка Харпичан, 29 мая 2012. Фото автора.



Рис. 3. Кладка уссурийского снегиря *Pyrrhula griseiventris*. Окрестности посёлка Берёзовый, долина реки Амгунь, 31 мая 2012. Фото автора.

***Pyrrhula griseiventris***. Особенности гнездования уссурийского снегиря в Нижнем Приамурье малоизвестны. Гнёзда из Нижнего Приамурья в литературе не описаны. По косвенным признакам (гнез-

довое поведение, обнаружение самок с наседными пятнами и слётков) гнездование предполагается в окрестностях Комсомольска-на Амуре, Николаевска-на-Амуре, в долине реки Тугур (Воробьёв 1954; Бабенко 2000). Нами у посёлка Берёзовый в пойме Амгуни 31 мая 2012 найдено гнездо с насиживающей птицей. Оно располагалось на молодой пихте у ствола на высоте 1.7 м и представляло рыхлую постройку из тонких веточек с оформленным лоточком из травинок и корешков в центре (рис. 3). Размеры, мм: диаметр гнезда 160×240; диаметр лотка 65×68; высота гнезда 90; глубина лотка 40. Гнездо содержало полную кладку из 5 ненасиженных яиц; их размеры, мм: 20.2-20.8×14.7-15.0 (измерено 3 яйца). По окраске фона скорлупы и части пятен найденная нами кладка очень похожа на хранящуюся в Зоологическом музее МГУ кладку уссурийского снегиря, найденную А.П.Кузякиным 15 мая 1962 в окрестностях Южно-Сахалинска, но отличается от неё большей плотностью пятен на тупом конце яйца и их более светлой окраской (см. сайт В.Вишневского: http//www.fotoparus.com).

***Emberiza leucocephala***. Белошапочная овсянка распространена на всей территории Нижнего Приамурья. Имеются экземпляры, добытые в конце марта 1959 года у села Кондон (Бабенко 2000). Нами 25 мая встречен самец с признаками территориального поведения на склоне сопки, поросшей дубом, в окрестностях посёлка Харпичан.



Рис. 4. Кладка седоголовой овсянки *Ocyris spodocephalus*.
Окрестности деревни Сельхоз, 28 мая 2012. Фото автора.



Рис. 5. Неполная кладка седоголовой овсянки *Ocyris spodocephalus*. Окрестности посёлка Берёзовый, 31 мая 2012. Фото автора.

***Ocyris spodocephalus***. Седоголовая овсянка – одна из самых многочисленных и широко распространённых овсянок Нижнего Приамурья (Бабенко 2000). Находки полных ненасиженных кладок в этом регионе зарегистрированы, главным образом, в первой половине июня, реже – в третьей декаде мая и в конце июня (Рашкевич 1965; Росляков 1965; Бабенко 2000). В Нижнем Приамурье седоголовая овсянка устраивает гнёзда на земле и в кустах на высоте до 0.5 м (Бабенко 2000). В Амурской области и Приморье известны гнёзда, расположенные на небольших деревьях на высоте до 2.25 м (Поливанов, Поливанова 1977; Кисленко и др. 1990; Балацкий 1997). Нами обнаружены 2 гнезда этого вида: в окрестностях деревни Сельхоз (28 мая) на земле под прикрытием сухих стеблей таволги с полной свежей кладкой из 5 яиц (рис. 4) и в долине реки Амгунь (31 мая) – на молодой пихте у ствола на высоте 1.2 м с неполной кладкой из 2 яиц (рис. 5).

***Ocyris aureolus***. Территориальные пары дубровников с гнездовым поведением встречены 28 мая 2012 в зарослях кустарников среди мари на левом берегу реки Девятки вблизи деревни Сельхоз и 30 мая на южном берегу озера Эворон.

Кроме перечисленных выше, в районе нашего исследования в соответствующих стациях встречены широко распространённые виды: кряква *Anas platyrhynchos*, чирок-трескунок *Anas querquedula*, чёрный коршун *Milvus migrans*, перевозчик *Actitis hypoleucos*, озёрная чайка *Larus ridibundus*, белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus*, речная

крачка *Sterna hirundo*, белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos*, береговушка *Riparia riparia*, зелёный конёк *Anthus hodgsoni*, восточная чёрная ворона *Corvus (corone) orientalis*, пеночка *Phylloscopus* sp., полевой воробей *Passer montanus*.

*Автор глубоко признателен В.С.Фридману и Я.А.Редькину за помощь в определении некоторых видов птиц.*

Литература

Бабенко В.Г. 1983. Фауна птиц населённых пунктов Нижнего Приамурья // *2-я Сиб. орнитол. конф. Птицы Сибири*. Горно-Алтайск: 229-230.

Бабенко В.Г. 2000. *Птицы Приамурья*. М.: 1-725.

Бабенко В.Г., Поярков Н.Д. 1984. Орнитогеографические особенности открытых ландшафтов Нижнего Приамурья // *Биол. науки* 12: 35-39.

Бабенко В.Г., Фадеева Е.О. 2010. *Структура, динамика и филогеографический анализ фауны и населения птиц Нижнего Приамурья*. М.: 1-440.

Брунов В.В., Бабенко В.Г., Азаров Н.И. 1988. Население и фауна птиц Нижнего Приамурья // *Сб. тр. Зоол. муз. Моск. ун-та* **26**: 78-110.

Воробьёв К.А. 1954. *Птицы Уссурийского края*. М.: 1-360.

Иванов А.И. 1976. *Каталог птиц СССР*. Л.: 1-275.

Кистяковский А.Б., Смогоржевский Л.А. 1973. Материалы по фауне птиц Нижнего Амура // *Вопр. геогр. Дальнего Востока*. Хабаровск, **11**: 182-224.

Колбин В.А., Бабенко В.Г., Бачурин Г.Н. 1994. Позвоночные животные Комсомольского заповедника // *Флора и фауна заповедников*. М., **57**: 13-41.

Назаров Ю.Н. 1993. Индийская кукушка // *Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Совообразные*. М.: 188-192.

Нечаев В.А. 1974. К распространению и биологии некоторых видов Нижнего Амура // *Фауна и экология наземных позвоночных юга Дальнего Востока*. Владивосток: 145-154.

Нечаев В.А., Гамова Т.В. 2009. *Птицы Дальнего Востока России (аннотированный каталог)*. Владивосток: 1-564.

Поливанова Н.Н., Поливанов В.М. 1977. К экологии седоголовой овсянки // *Орнитология* **13**: 82-90.

Поярков Н.Д. (2001) 2012. Тенденции изменения численности гусеобразных Нижнего Приамурья за последние 20 лет XX века // *Рус. орнитол. журн.* **21** (771): 1535-1537.

Рашкевич Н.А. 1965. Материалы по экологии птиц Нижнего Амура // *Вопр. геогр. Дальнего Востока. Преобраз. прир. Биогеогр*. Хабаровск, **7**: 283-291.

Редькин Я.А., Бабенко В.Г. 1999. Материалы по распространению и систематике форм группы жёлтых трясогузок (подрод *Budytes*) на Дальнем Востоке России (по авифауне Приамурья) // *Рус. орнитол. журн.* **8** (85): 3-28.

Росляков Г.Е. 1965. Гнездование некоторых нижнеамурских птиц // *Вопр. геогр. Дальнего Востока. Преобраз. прир. Биогеогр*. Хабаровск, **7**: 292-296.

Росляков Г.Е. 1975. Цапельники в Нижнем Приамурье // *Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана*. М.: 49-50.

Росляков Г.Е. 1987. *Охота по перу в Приамурье*. Хабаровск: 1-128.

Росляков Г.Е. 1990. Дальневосточный кроншнеп в Хабаровском крае // *Итоги изучения редких животных (Материалы к Красной книге)*. М.: 104-105.
Рябицев В.К. 2008. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Справочник-определитель*. 3-е изд. Екатеринбург: 1-634.
Тагирова В.Т. 1983. Редкие птицы Приамурья и их охрана // *2-я Сиб. орнитол. конф. Птицы Сибири*. Горно-Алтайск: 254-256.
Федотов М.П., Брунов В.В. 1977. Население птиц двух ключевых участков восточной части трассы БАМа // *7-я орнитол. конф.: тез. докл.* Киев, **1**: 107-108.
Штильмарк Ф.Р. 1973. Наземные позвоночные Комсомольского-на-Амуре заповедника и прилежащих территорий // *Вопр. геогр. Дальнего Востока*. Хабаровск, **11**: 30-124.
Яхонтов В.Д. 1963. Новые данные к орнитофауне Нижнего Амура // *Вопр. геогр. Дальнего Востока*. Хабаровск, **6**: 215-220.
Koblik E.A., Rohwer S., Drovetski S.V., Wood Ch.S., Andreev A.V., Banin D.A., Masterov V.B. 2001. Faunistic records from the Eastern regions of Russia // *Орнитология* **29**: 47-58.

*ISSN 0869-4362*
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **771**: 1532-1535*

# Гнёзда ремеза *Remiz pendulinus* на Нарских прудах в Московской области

Н.С.Морозов

*Второе издание. Первая публикация в 2008*[*]

В последние годы гнездование обыкновенного ремеза *Remiz pendulinus* было установлено в целом ряде мест Москвы и Подмосковья (Калякин, Волцит 2006; Гроот Куркамп 2005, 2007а.б; Ковалёв 2007). На Нарских прудах (Одинцовский район) И.С.Сметанин (устн. сообщ.) нашёл жилое гнездо в 2007 году.

В феврале и марте 2008 года ещё в 5 точках мы обнаружили 8 старых гнёзд: в трёх точках по 2 гнезда, в двух – по 1. Подчеркнём, что нам удалось посетить не более четверти потенциально пригодных для гнездования ремеза участков по берегам и на дамбах Нарских прудов, главным образом – к западу от шоссе между деревнями Чупряково и Дютьково, но и здесь не далее 2.6 км к юго-западу от деревни Асаково. Гнёзда были найдены пóходя, а не в результате целенаправленных поисков. Расстояния между двумя наименее и наиболее удалёнными друг от друга точками составляют 0.4 и около 3 км, соответственно. Все

[*] Морозов Н.С. 2008. Гнёзда ремеза на Нарских прудах // *Московка* **7**: 26-27.

гнёзда помещались на живых берёзах *Betula pendula*, стоящих вблизи других берёз и кустиков ивы, недалеко от зарослей тростника.



Рис. 1. Гнездо ремеза *Remiz pendulinus*.
Нарские пруды, зима 2008 года. Фото автора.



Рис. 2. Местоположение гнезда ремеза *Remiz pendulinus*.
Нарские пруды, зима 2008 года. Фото автора.

В южной части деревни Чупряково 2 гнезда находились на одном дереве (высота около 15 м, диаметр ствола на уровне груди 42 см) с

разных сторон кроны на высоте 3.0 и 4.0-4.3 м. Берёза растёт на маленьком бугре в поросшей тростником низине, в 10-15 м от шоссе на Асаково и 40-45 м от ближайшего дома. Другие 2 гнезда располагались в 400 м от первой пары и в 15 м друг от друга, между деревнями Чупряково и Асаково у подножия дамбы, разделяющей пруды, по которой проходит это же шоссе, примерно в 60-65 и 80 м от стоящего на берегу склада из листового металла. Гнёзда висели примерно в 10 и 7 м от шоссе на высоте 4.6 и 3.4 м, высота берёз 13-15 м, диаметры их стволов на уровне груди 18 и 31 см, соответственно. На фотографии (рис. 1) запечатлено одно из этих двух гнёзд, причём на «пейзажном» снимке (рис. 2) оно находится в центре кадра. Третья пара гнёзд была найдена в 1.8-2.2 км от двух первых, примерно в 1.6 км к юго-юго-западу от посёлка рыбхоза «Нара» и 1.6 км к западу от деревни Асаково, на краю дамбы, отделяющей небольшую, сплошь заросшую тростником секцию от основной части пруда, в 100 и 150 м от опушки высокоствольного елово-берёзового леса. Здесь гнездовые деревья отстояли на 95 м друг от друга, их высота – примерно 10 и 12 м, диаметры стволов на уровне груди – 20 и 21 см, высота расположения гнёзд примерно 7 и 7-7.5 м, соответственно.

Одиночные гнёзда были обнаружены приблизительно в 1 км к юго-западу и 2.5 км к западу-юго-западу от южного конца деревни Асаково, на краях дамб, тянущихся вдоль противоположных берегов пруда. Высота берёз с гнёздами – соответственно 11-12 и 12-13 м, диаметры стволов на уровне груди 18 и 25 см, высота расположения гнёзд 5.0 и 8-9 м. В первом из этих двух мест гнездо помещалось на краю лесополосы (шириной около 7 м) из берёз и осин, растущих на дамбе. С противоположной от пруда стороны эта дамба граничит с подтопленной полосой ивовых кустов шириной 10-15 м (высота кустов 3.5-5 м, гнездо ремеза висело над ними), за которой начинается поле. Во втором месте прибрежная дамба граничит со старым, заполненным водой каналом. Сразу за ним начинается молодой березняк, далее переходящий в высокоствольный елово-берёзовый лес. Эта точка находится в 650-750 м от третьей «пары» гнёзд.

Литература

Гроот Куркамп Х. (сост.) 2005. Интересные встречи: апрель-август 2005 г. // *Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья* **2**: 46-50.

Гроот Куркамп Х. (сост.) 2007а. Интересные встречи: сентябрь 2006 г. – март 2007 г. // *Московка* **5**: 57-62.

Гроот Куркамп Х. (сост.) 2007б. Интересные встречи: апрель-сентябрь 2007 г. // *Московка* **6**: 50-55.

Калякин М.В., Волцит О.В. 2006. *Атлас: Птицы Москвы и Подмосковья*. София; Москва: 1-372.

Ковалёв К. 2007. О гнездовании ремеза в Марьино // *Московка* **6**: 40-41.

Мищенко А.Л., Суханова О.В. 2004. Гнездовая группировка обыкновенного ремеза в Виноградовской пойме (Московская область) // *Мир птиц* 3-1 (27-28): 20.

*ISSN 0869-4362*
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **771**: 1535-1537*

# Тенденции изменения численности гусеобразных Нижнего Приамурья за последние 20 лет XX века

Н.Д.Поярков

*Второе издание. Первая публикация в 2001**

Материал по численности, распространению и биологии гусеобразных Anseriformes собирался автором с 1978 по 2000 год в разных районах Нижнего Приамурья от бассейна озера Болонь (49°36′ с.ш., 136° 08′ в.д.) на юге, до озера Чукчагир (52°07′ с.ш., 136°29′ в.д.), залива Счастья (Амурский лиман) и озера Мухтель (54°09′ с.ш., 139°08′ в.д.) на севере. Были обследованы все основные районы размножения водоплавающих птиц в рассматриваемом регионе.

Наряду с краткосрочными колебаниями численности учёты 1996-2000 годов показали стойкие тенденции изменения в населении птиц за 15-20-летний период. В сообщении приведены данные только по видам, встречавшимся нам на гнездовании.

Резко сократилась численность *Cygnus cygnus*, *Anas crecca*, *Anas querquedula*, *Anas clypeata*, *Aythya fuligula*. Причём если кликун, свистунок и широконоска изредка встречаются на гнездовании, то за 1997-2000 годы не было встречено ни одного выводка трескунка, а хохлатая чернеть почти исчезла даже на пролёте.

Отдельно необходимо сказать о резком сокращении численности касатки *Anas falcata* – одном из наиболее уязвимых видов речных уток Палеарктики. До 1980-х годов касатка составляла от 50 до 85% от населения гусеобразных практически во всех основных районах размножения. В последние годы её доля стала не более 30%, местами – много меньше. Резко изменилась структура населения утиных в послегнездовой период: 15-20 лет назад от 50 до 85% выводков касаток входило в межвыводковые объединения, которые нередко состояли из нескольких

* Поярков Н.Д. 2001. Тенденции изменения численности гусеобразных Нижнего Приамурья за последние 20 лет // *Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии*. Казань: 504-506.

видов утиных. В 1997-2000 годах такие агрегации встречались единично. Исключение составляет южная (дальняя) часть озера Удыль, где плотность и структура населения касатки осталась на уровне конца 1970-х. Возможно, это объясняется отсутствием пожаров в этом районе и уменьшением пресса охоты из-за тяжёлого экономического положения, что подтверждает гипотезу об антропогенной причине сокращения численности. Известно, что падение численности касатки происходит и в других частях ареала.

Незначительно сократили численность *Anser fabalis middendorffi*, *Bucephala clangula*, *Mergus merganser*.

Сухонос *Cygnopsis cygnoides* остаётся в крайне опасном положении. По учётам в 1988, 1996 и 1999 годах его численность на озере Удыль составляла от 20 до нескольких пар; от несколько десятков пар держалось на Удыль-Кизинской низменности. В 2000 году было учтено: 15 взрослых и 15 молодых сухоносов на озере Чёртово (53°09′ с.ш., 139° 26′ в.д.; В.Б.Мастеров, устн. сообщ.), 75 молодых и 55 взрослых на озере Удыль и до 20-30 птиц на протоке Холан (51°40′ с.ш., 139°41′ в.д.). Сходные показатели последний раз отмечены в 1986 году. Провал численности в предыдущие годы заставляет думать о возможном перераспределении вида в пространстве, вызванного, возможно, сильнейшими пожарами 1999 года: гуси могли стать более заметными из-за деструкции неизвестных, недоступных угодий. Вследствие потери таких резерватов, нижнеамурская популяция сухоноса может стать ещё более уязвимой.

Остались примерно на прежнем абсолютном уровне численности: *Anas platyrhynchos*, *Anas acuta*, *Anas penelope*. При этом доля кряквы в населении стабильна и стала намного выше, тогда как шилохвость и свиязь остались как лишь незначительные составляющие от общего числа гнездящихся утиных.

Увеличили численность два вида. В 1999 году впервые с середины 1960-х годов на пролёте наблюдались тысячные стаи клоктуна *Anas formosa*, а на озере Удыль предположительно загнездилось несколько пар. Увеличение численности происходит на фоне смены мест основных зимовок: до 1960-х они располагались в Японии и Китае, а сейчас – в Южной Корее, где зимует около 200000 клоктунов. Мандаринка *Aix galericulata*, по сравнению с 1980-ми годами, не только на порядок увеличила численность в ряде районов, но и расширила ареал, вплотную подойдя к Амурскому Лиману.

Не встречены в 1997-2000 годах *Anas poecilorhyncha*, *Anas strepera*, *Aythya baeri*, *Melanitta deglandi*, *Histrionicus histrionicus*, *Mergus albellus*, *Mergus serrator*, *Mergus squamatus*, нерегулярно и единично встречавшиеся на гнездовании в 1970-1980-х годах. Их отсутствие в конце 1990-х может быть случайным, хотя на фоне потепления климата и

быстрого продвижения на север многих южных форм можно было бы ожидать в Нижнем Приамурье роста численности чёрной кряквы, серой утки и нырка Бэра.

Большинство негативных изменений мы склонны объяснять антропогенными факторами, особенно трансформацией местообитаний и прессом охоты, в том числе на зимовках в Китае.

*ISSN 0869-4362*
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **771**: 1537-1544*

# Наблюдения за птицами с группами иностранных туристов в мае-июне 2012 года в центральных и юго-восточных районах Казахстана

В.В.Хроков

*Валерий Васильевич Хроков*. Общество любителей птиц «Ремез», Алматы, Казахстан.
E-meil: vkh.remez@mail.ru

*Поступила в редакцию 10 июля 2012*

В мае-июне 2012 года я участвовал в качестве гида в трёх орнитологических турах с иностранными бёдвочерами – бельгийцами и немцами (турлидер бельгийской группы Джонни Стаеленс, турлидеры немецких групп от фирмы «Альбатрос» Герт Дахмс и Михаэль Шмольц). Поездки проходили по традиционным для Bird-watching маршрутам в Акмолинской и Алматинской областях (Хроков 2009, 2010, 2011). Всего было встречено 262 вида птиц, в том числе на Кургальджине (16-19 мая) 132 вида и в Алматинской области – 221 вид. В Алматинской области маршруты проходили к востоку от Алматы (3-5 мая, 20-24 мая, 2-6 июня), где было отмечено 143 вида, и к западу от этого города (6-8 мая, 25-27 мая, 7-9 июня), где встречено 138 видов. Отдельно следует выделить посещение Большого Алматинского озера в Заилийском Алатау (9-11 мая, 27-30 мая, 9-12 июня); там зарегистрировано 65 видов птиц.

Ниже приводятся сведения о редких птицах, занесённых в Красную книгу Казахстана и Красный список МСОП (помечены звёздочкой), а также фенологические наблюдения за некоторыми обычными видами птиц. Полагая, что бёдвочерам, которые в будущем собираются посетить Казахстан, будет интересно ознакомиться со списком встреченных нами птиц, привожу его в конце своего сообщения.

*Podiceps cristatus*. На озере Сорбулак (Алматинская обл.) 9 июня встречены взрослые чомги с пуховичками и одна токующая пара.

*Pelecanus crispus**. В заливе Сорбулака 6 мая плавали 2 пары кудрявых пеликанов (там же наблюдались 27 мая и 9 июня). На Кургальджине 10 пеликанов встречены 17 мая на озере Шолак, 18 мая 3 птицы

на озере Есей. В национальном природном парке «Алтын-Эмель» над рекой Или 6 июня кружилась стая из 15 пеликанов.

*Pelecanus onocrotalus**. Стая из 10 розовых пеликанов отмечена 7 мая на Топарских озерах в Алматинской области. Близ села Жантеке (Акмолинская обл.) 16 мая степью пролетали 7 птиц.

*Ciconia nigra**. Одиночные чёрные аисты наблюдались в Алматинской области: 6 мая у озера Сорбулак, 8 мая у дороги в районе села Копа и 4 июня в каньоне реки Тимерлик. Группа из 9 особей кружила над рекой Или в «Алтын-Эмеле».

*Phoenicopterus roseus**. В заливе озера Есей (Кургальджинский заповедник) 18 мая тремя разрозненными группами кормились более 100 фламинго.

*Cygnus cygnus**. Пара лебедей-кликунов встречена 4 мая на реке Каркара в Алматинской области. Пара и одиночка отмечены 16 и 17 мая в Акмолинской области – на степных разливах у села Оразак и в пойме Нуры у села Кургальджино.

*Aythya nyroca**. Белоглазые нырки наблюдались 6 и 7 мая на озёрах Сорбулак и Топарских.

*Oxyura leucocephala**. Две пары савок встречены на озере Есей 18 мая, одиночный самец – 19 мая на озере Каттыбай (Акмолинская обл.).

*Pernis ptilorhynchus*. Утром 11 мая в районе Большого Алматинского озера высоко пролетали 3 хохлатых осоеда.

*Milvus migrans*. Скопление из сотни коршунов обнаружено 7 июня на свалке у города Капчагай.

*Circus macrourus**. Одиночные степные луни встречены 16 и 19 мая в степи у сёл Оразак и Арыкты (Акмолинская обл.).

*Buteo rufinus*. Гнездо курганника с 4 оперяющимися птенцами обнаружено 21 мая в ущелье Кокпек. При проверке этого гнезда 3 июня в нём сидели 2 слётка, один из них слетел при нашем приближении. В «Алтын-Эмеле» 24 мая найдено гнездо с птенцами. Одна из взрослых птиц была почти белая.

*Circaetus gallicus**. Два змееяда встречены 6 мая в Таукумах. Гнездо с насиживающей птицей обнаружено 24 мая на туранге близ Поющего бархана («Алтын-Эмель»); 6 июня в нём также сидела насиживающая птица.

*Hieraaetus pennatus**. Одиночные орлы-карлики наблюдались 3, 5, 9 мая и 4 июня в пойме Чарына у Ясеневой рощи, в Большом Алматинском ущелье и в каньоне реки Тимерлик.

*Aquila nipalensis**. Одиночные степные орлы отмечены 4 и 22 мая в каньоне реки Чарын и Сюгатинской долине.

*Aquila heliaca**. Один могильник 6 мая сидел у обочины дороги в районе озера Сорбулак.

*Aquila chrysaetos**. Одиночные беркуты наблюдались в Алматинской

области: 3, 4, 21, 22, 24 мая и 3, 8, 11 июня в ущелье Кокпек, Сюгатинской долине, Чарынском каньоне, Таукумах, на Кегенском перевале и в «Алтын-Эмеле». Три пары беркутов встречены 11 мая, 2, 4 и 12 июня в верховьях реки Чилик, в ущельях Кокпек и Большое Алматинское. У Большого Алматинского озера одного орла преследовали чёрные вороны *Corvus corone*.

*Aquila clanga**. Одиночный большой подорлик отмечен 19 мая в районе села Сабунды (Акмолинская обл.).

*Haliaeetus albicilla**. Одиночные белохвосты встречены 7 и 27 мая, 6 и 9 июня у озёр Сорбулак и Топарских и в пойме реки Или («Алтын-Эмель»). Один из орланов подвёргся атаке грачей *Corvus frugilegus*.

*Gypaetus barbatus**. Одиночные бородачи наблюдались 10, 22, 28 мая и 4, 10 июня в Большом Алматинском ущелье, ущелье Кокпек и в Сюгатинской долине. Один из них 10 июня долго кружил над зелёными южными склонами в районе Космостанции, а затем мы увидели его улетающим вверх с сурком в лапах.

*Neophron percnopterus**. Одиночные стервятники встречены 4, 21 мая и 4 июня в Чарынском каньоне, ущелье Кокпек и близ Чунджи.

*Aegypius monachus**. Одиночные чёрные грифы отмечены 4 и 23 мая на перевале Кетмень и у села Каныролен, 2 птицы – 7 июня в районе села Шенгельды. Группы из 3 и 5 грифов наблюдались 21 и 24 мая в верховьях Чарына и в национальном парке «Алтын-Эмель». Последние собрались у какой-то падали.

*Gyps himalayensis**. Одиночные кумаи встречены 4 и 21 мая на перевале Кегень и в верховьях Чарына, 2 птицы парили на большой высоте над Большим Алматинским озером 29 мая.

*Gyps fulvus*. Один белоголовый сип парил над перевалом Алтын-Эмель 7 июня.

*Falco cherrug**. Одиночные балобаны наблюдались 4 и 22 мая, 4 и 6 июня в Чарынском и Тимерликском каньонах и в «Алтын-Эмеле».

*Falco vespertinus**. Несколько гнездовых пар кобчиков встречено 16 мая в лесополосе вдоль трассы у села Жантеке.

*Falco naumanni**. Две небольшие гнездовые колонии степных пустельг обнаружены 4 мая в скалах на перевале Кегень и мусульманском кладбище у села Аксай в Алматинской области.

*Falco tinnunculus*. Гнездо обыкновенной пустельги с птенцами, помещавшееся на плоской вершине ели, найдено 10 мая у Большого Алматинского озера.

*Grus grus**. Группа из 4 серых журавлей пролетала в районе города Чунджа 4 мая. На берегу озера Шолак 17 мая в стае красавок сидели 9 серых журавлей.

*Anthropoides virgo**. Встречи красавок в Алматинской области: 3 мая группа из 3 птиц у села Чилик, 4 мая пара в районе перевала

Кетмень и труп под проводами в пойме Каркары, 6 мая пара у озера Сорбулак и там же пролетающая стая из более чем 100 особей, в этот же день у села Каншенгель (Таукумы) стая из 30 особей, 3 июня «танцующая» пара в верховьях Чарына, 7 июня одиночный журавль жадно пил воду из пруда у трассы между сёлами Курты и Каншенгель. Встречи в Акмолинской области: 16 мая 2 одиночных красавки у сёл Оразак и Жантеке, 17 мая стая из 30 особей на озере Шолак.

*Crex crex**. Около города Талгара вечером 11 мая слышали крики коростеля.

*Chlamydotis undulata**. Джек был встречен в Таукумах (пара и одиночка 7 мая и 7 июня) и в «Алтын-Эмеле» (одиночный 24 мая).

*Charadrius asiaticus*. Пара каспийских зуйков встречена 7 мая в Таукумах в районе села Каншенгель. В последующие посещения этой местности их здесь не было.

*Charadrius leschenaultii*. В этом году большеклювый зуёк был обычен в Таукумах: 7 мая в районе села Каншенгель встречено 5 пар, 26 мая там наблюдались 2 пары с пуховыми птенцами, на другой день отмечена пара с 1 пуховичком (7 июня этот птенец был наполовину оперён), 8 июня в данном районе встречена пара с 3 птенцами и стая из 30 зуйков. В Сюгатинской долине 22 мая видели группу из 5 птиц.

*Vanellus gregarius**. Три кречётки отмечены 16 мая в пойме Нуры у села Абай (Кургальджинский р-н).

*Ibidorhyncha struthersii**. Пара серпоклювов держалась на галечнике Большого Алматинского озера 9 мая; 29 мая там наблюдались 2 пары – все 4 птицы стояли рядом и быстро кланялись, затем разбрелись и стали кормиться; 11 июня в этом месте встречен выводок из 2 взрослых птиц и 3 оперяющихся птенцов.

*Numenius arquata**. Два одиночных больших кроншнепа отмечены 17 и 18 мая у озёр Шолак и Султан-Кельды.

*Limosa limosa**. Два больших веретенника встречены 6 мая на озере Сорбулак. Гнездовые пары наблюдались 16 и 18 мая на озёрах Садырбай и Шолак.

*Glareola nordmanni**. На озере Жумай (Кургальджинсий р-н) 17 мая держалась одна пара степных тиркушек.

*Tringa stagnatilis*. На берегу озера Каттыбай 19 мая найдено гнездо поручейника с 4 насиженными яйцами.

*Tringa totanus*. Травник – частичный альбинос с белыми крыльями встречен 16 мая на озере Садырбай.

*Himantopus himantopus*. Разрозненное скопление кормящихся ходулочников из более чем 150 особей наблюдалось 6 мая в заливе озера Сорбулак; через месяц там держалось около 10 гнездовых пар.

*Larus ichthyaetus**. В гнездовой колонии черноголовых хохотунов на острове озера Майшукур (Хроков 2009, 2010), 17 мая шло насижи-

вание. Несколько пролетающих чаек видели над озёрами Садырбай и Шолак и рекой Нура.

*Pterocles orientalis**. Чернобрюхий рябок был обычен в мае и июне у артезианских скважин в Таукумах и «Алтын-Эмеле», собираясь на водопое группами до 20 особей. Утром 8 июня первые птицы прилетели на водопой в 7 ч 10 мин.

*Pterocles alchata**. Белобрюхий рябок был более редким, чем чернобрюхий; отмечен на водопое группами по 2-3 особи в Таукумах 8 мая и 8 июня.

*Syrrhaptes paradoxus**. Саджа встречается в Таукумах и «Алтын-Эмеле» в меньшем числе, чем чернобрюхий рябок. У артезианских скважин обычно наблюдались по 2-4 особи. В Сюгатинской долине 5 мая у дороги сидели 2 птицы.

*Columba eversmanni**. Бурый голубь отмечен в туранговых рощах по реке Или: пара у села Жельтуранга 7 мая, 2 пары у села Айдарлы 23 мая (токовали) и 5 июня.

*Delichon urbica*. Небольшая колония воронков 27 мая найдена под мостом через реку Курты, из некоторых гнёзд выглядывали воробьи *Passer domesticus*. На Большом Алматинском озере 11 июня городские ласточки ещё строили гнёзда – собирали грязь у лужи на дороге.

*Hirundo rustica*. В селе Басчи («Алтын-Эмель») 25 мая деревенские ласточки носили корм птенцам.

*Lanius minor*. У города Иссык на придорожном карагаче 2 июня найдено гнездо чернолобого сорокопута, в котором сидела самка.

*Sturnus vulgaris*. Скворцы, выкармливающие птенцов, наблюдались 23 мая в туранговой роще у села Айдарлы.

*Sturnus roseus*. В небольшой колонии розовых скворцов на ферме у села Бирлик (Кургальджинский р-н) 17 мая взрослые носили корм птенцам. На Сорбулаке 27 мая в каменистом теле плотины образовалась многотысячная колония (6 мая там не было ни одной птицы); 9 июня на камнях сидели преимущественно самцы, самки, видимо, насиживали кладки. В научном посёлке у Большого Алматинского озера 11 июня впервые встречены 3 розовых скворца (высота 2500 м н.у.м.).

*Acridotheres tristis*. Выкармливающие птенцов майны отмечены 25 мая в селе Басчи.

*Pica pica*. Слётки встречены 2 июня в лесополосе у города Иссык.

*Cinclus pallasii*. В Большом Алматинском ущелье 11 мая бурые оляпки носили птенцам корм; 27 мая там встречены лётные молодые.

*Sylvia nana*. Пустынная славка с кормом в клюве отмечена 24 мая в «Алтын-Эмеле».

*Leptopoecile sophiae*. Одна пара расписных синичек встречена 11 и 29 мая в арчевнике Большого Алматинского ущелья; 11 июня там наблюдался выводок из 2 взрослых птиц и 3 слётков.

*Oenanthe pleschanka*. В каньоне реки Чарын 3 июня обнаружено гнездо плешанки с птенцами.

*Oenanthe isabellina*. Слёток плясуньи встречен 4 июня в Сюгатинской долине.

*Phoenicurus erythrogaster*. Пара, носящая корм птенцам под крышу здания, наблюдалась 10 июня на Космической станции в Большом Алматинском ущелье. В этот день там шёл снег.

*Turdus viscivorus*. В верховьях Чилика (ущелье Малыбай) 2 июня среди голых скальников на старой иве у реки обнаружено гнездо дерябы с 2 крупными птенцами, почти слётками. Дрозд с кормом в клюве отмечен 11 июня у Большого Алматинского озера.

*Myophonus caeruleus**. В Большом Алматинском ущелье в мае-июне наблюдали две пары синих птиц, одна из них 12 июня ещё выкармливала птенцов.

*Remiz coronatus*. Достраивающееся гнездо черноголового ремеза (без входного рукава) найдено 3 мая в лесополосе из лоха близ города Чилик. Неподалёку от этого места над речкой 20 мая обнаружено гнездо с насиживающей птицей, рядом в 15-20 см от него висели 2 старых гнезда, построенные ещё в 2009 и 2011 годах (Хроков 2009, 2011). Посетив это место 2 июня, мы застали гнездо разоренным (порвано дно), а ремезы начали строить новое гнездо в 5 м от старых.

*Sitta tephronota*. Гнездо скального поползня найдено 8 мая в урочище Тамгалы-тас (Алматинская обл.) на отвесной скале. Взрослые птицы носили птенцам корм.

*Passer domesticus*. Выкармливающие птенцов домовые воробьи наблюдались 18 мая в селе Кургальджино.

*Passer ammodendri*. Саксаульные воробьи, носившие строительный материал в бетонные столбы ЛЭП у села Айдарлы, отмечены 5 июня. В 2009 году в конце мая они здесь кормили птенцов (Хроков 2009).

*Carpodacus erythrinus*. На перевале Алтын-Эмель 7 июня слёток чечевицы выпрашивал корм у самки. Взрослые птицы клевали глину из кучи у дороги вместе с коноплянками *Acanthis cannabina*.

*Emberiza bruniceps*. Самка жёлчной овсянки с кормом в клюве отмечена 8 июня в саксаульнике пустыни Таукумы.

*Emberiza cioides*. Поющий самец встречен 4 мая на перевале Кетмень. Здесь возможно гнездование этого вида (Гаврилов 1999).

Кроме указанных выше 72 видов, нами были встречены следующие птицы: серощёкая поганка *Podiceps grisegena*, красношейная поганка *P. auritus*, черношейная поганка *P. nigricollis*, большой баклан *Phalacrocorax carbo*, серая цапля *Ardea cinerea*, рыжая цапля *A. purpurea*, большая белая цапля *Egretta alba*, кваква *Nycticorax nycticorax*, волчок *Ixobrychus minutus*, лебедь-шипун *Cygnus olor*, серый гусь *Anser anser*, огарь *Tadorna ferruginea*, пеганка *T. tadorna*, свиязь *Anas penelope*, серая утка *A. strepera*, трескунок *A. querquedula*, свистунок *A. crecca*, кряква *A. platyrhynchos*, шилохвость *A. acuta*, широконоска *A. clypeata*, краснобаш *Netta*

*rufina*, красноголовый нырок *Aythya ferina*, хохлатая чернеть *A. fuligula*, гоголь *Bucephala clangula*, большой крохаль *Mergus merganser*, болотный лунь *Circus aeruginosus*, луговой лунь *C. pygargus*, тювик *Accipiter badius*, перепелятник *A. nisus*, тетеревятник *A. gentilis*, сарыч *Buteo buteo*, мохноногий курганник *B. hemilasius*, дербник *Falco columbarius*, чеглок *F. subbuteo*, гималайский улар *Tetraogallus himalayensis*, кеклик *Alectoris chukar*, серая куропатка *Perdix perdix*, перепел *Coturnix coturnix*, фазан *Phasianus colchicus*, малый погоныш *Porzana parva*, камышница *Gallinula chloropus*, лысуха *Fulica atra*, кулик-сорока *Haematopus ostralegus*, шилоклювка *Recurvirostra avosetta*, луговая тиркушка *Glareola pratincola*, чибис *Vanellus vanellus*, азиатская ржанка *Pluvialis fulva*, галстучник *Charadrius hiaticula*, малый зуёк *Ch. dubius*, морской зуёк *Ch. alexandrinus*, вальдшнеп *Scolopax rusticola*, бекас *Gallinago gallinago*, малый веретенник *Limosa lapponica*, средний кроншнеп *Numenius phaeopus*, мородунка *Xenus cinereus*, перевозчик *Actitis hypoleucos*, черныш *Tringa ochropus*, щёголь *T. erythropus*, большой улит *T. nebularia*, фифи *T. glareola*, камнешарка *Arenaria interpres*, кулик-воробей *Calidris minuta*, белохвостый песочник *C. temminckii*, краснозобик *C. ferruginea*, чернозобик *C. alpina*, турухтан *Philomachus pugnax*, круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*, сизая чайка *Larus canus*, хохотунья *L. cachinnans*, озёрная чайка *L. ridibundus*, малая чайка *L. minutus*, морской голубок *L. genei*, чайконосая крачка *Gelochelidon nilotica*, чеграва *Hydroprogne caspia*, чёрная крачка *Chlidonias niger*, белокрылая крачка *Ch. leucopterus*, речная крачка *Sterna hirundo*, сизый голубь *Columba livia*, клинтух *C. oenas*, вяхирь *C. palumbus*, большая горлица *Streptopelia orientalis*, обыкновенная горлица *S. turtur*, кольчатая горлица *S. decaocto*, малая горлица *S. senegalensis*, обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*, сплюшка *Otus scops*, домовый сыч *Athene noctua*, лесной сыч *Aegolius funereus*, чёрный стриж *Apus apus*, зимородок *Alcedo atthis*, золотистая щурка *Merops apiaster*, сизоворонка *Coracias garrulus*, удод *Upupa epops*, белокрылый дятел *Dendrocopos leucopterus*, береговая ласточка *Riparia riparia*, бледная ласточка *R. diluta*, скальная ласточка *Ptyonoprogne rupestris*, степной жаворонок *Melanocorypha calandra*, двупятнистый жаворонок *M. bimaculata*, чёрный жаворонок *M. yeltoniensis*, белокрылый жаворонок *M. leucoptera*, малый жаворонок *Calandrella brachydactyla*, серый жаворонок *C. rufescens*, рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*, хохлатый жаворонок *Galerida cristata*, полевой жаворонок *Alauda arvensis*, полевой конёк *Anthus campestris*, лесной конёк *A. trivialis*, горный конёк *A. spinoletta*, белая трясогузка *Motacilla alba*, маскированная трясогузка *M. personata*, жёлтая трясогузка *M. flava*, черноголовая трясогузка *M. feldegg*, горная трясогузка *M. cinerea*, желтоголовая трясогузка *M. citreola*, обыкновенный жулан *Lanius collurio*, туркестанский жулан *L. phoenicuroides*, кашгарский жулан *L. isabellinus*, длиннохвостый сорокопут *L. schach*, серый сорокопут *L. excubitor pallidirostris*, иволга *Oriolus oriolus*, клушица *Pyrrhocorax pyrrhocorax*, альпийская галка *P. graculus*, галка *Corvus monedula*, серая ворона *C. cornix*, обыкновенный ворон *C. corax*, пустынный ворон *C. ruficollis*, крапивник *Troglodytes troglodytes*, гималайская завирушка *Prunella himalayana*, бледная завирушка *P. fulvescens*, черногорлая завирушка *P. atrogularis*, широкохвостка *Cettia cetti*, индийская камышевка *Acrocephalus agricola*, садовая камышевка *A. dumetorum*, дроздовидная камышевка *A. arundinaceus*, туркестанская камышевка *A. stentoreus*, северная бормотушка *Hippolais caligata*, южная бормотушка *H. rama*, весничка *Phylloscopus trochilus*, зелёная пеночка *Ph. trochiloides*, теньковка *Ph. collybitus*, индийская пеночка *Ph. griseolus*, тусклая зарничка *Ph. humei*, ястребиная славка *Sylvia nisoria*, горная славка *S. althaea*, славка-мельничек *S. curruca halimodendri*, серая славка *S. communis*, желтоголовый ко-

ролёк *Regulus regulus*, серая мухоловка *Muscicapa striata*, южный соловей *Luscinia megarhynchos*, черногрудая красношейка *L. pectoralis*, варакушка *L. svecica*, тугайный соловей *Cercotrichas galactotes*, красноспинная горихвостка *Phoenicurus erythronotus*, седоголовая горихвостка *Ph. caeruleocephalus*, обыкновенная горихвостка *Ph. phoenicurus*, черноголовый чекан *Saxicola torquata maura*, обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*, пустынная каменка *O. deserti*, пёстрый каменный дрозд *Monticola saxatilis*, синий каменный дрозд *M. solitarius*, чёрный дрозд *Turdus merula*, усатая синица *Panurus biarmicus*, обыкновенный ремез *Remiz pendulinus*, тростниковый ремез *R. macronyx*, джунгарский пухляк *Parus songarus*, московка *P. ater*, большая синица *P. major*, бухарская синица *P. bokharensis*, князёк *P. cyanus*, полевой воробей *Passer montanus*, индийский воробей *P. indicus*, испанский воробей *P. hispaniolensis*, каменный воробей *Petronia petronia*, гималайский вьюрок *Leucosticte nemoricola*, жемчужный вьюрок *L. brandti*, арчовая чечевица *Carpodacus rhodochlamys*, зеленушка *Chloris chloris*, седоголовый щегол *Carduelis caniceps*, красношапочный вьюрок *Serinus pusillus*, арчовый дубонос *Mycerobas carnipes*, краснокрылый чечевичник *Rhodopechys sanguinea*, монгольский снегирь *Bucanetes mongolicus*, буланый вьюрок *Rhodospiza obsoleta*, горная овсянка *Emberiza cia*, скальная овсянка *E. buchanani*, садовая овсянка *E. hortulana*, овсянка Стюарта *E. stewarti*, тростниковая овсянка *E. schoeniclus*, просянка *E. calandra*.

Литература

Гаврилов Э.И. 1999. *Фауна и распространение птиц Казахстана*. Алматы: 1-198.

Хроков В.В. 2009. Орнитологические наблюдения с группами любителей птиц из США, Германии и Японии // *Рус. орнитол. журн.* **18** (496): 1169-1173.

Хроков В.В. 2010. Наблюдения за птицами в Центральном и Юго-Восточном Казахстане в мае 2010 года // *Рус. орнитол. журн.* **19** (594): 1580-1583.

Хроков В.В. 2011. Результаты орнитологических туров по Казахстану в мае 2011 года // *Рус. орнитол. журн.* **20** (691): 1917-1923.

*ISSN 0869-4362*
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **771**: 1544-1545*

# Залёты фламинго *Phoenicopterus roseus* в Алакольскую котловину

Н.Н.Березовиков, Е.А.Анисимов

*Второе издание. Первая публикация в 2002*[*]

Для Алакольской котловины единственный достоверный случай залёта розового фламинго *Phoenicopterus roseus* зарегистрирован 29 августа 1967 в устье Горького ключа на западном берегу озера Алаколь (Ауэзов, Грачёв 1977). В последующие 20 лет случаев появления этих

[*] Березовиков Н.Н., Анисимов Е.И. 2002. Залёты фламинго в Алакольскую котловину // *Каз. орнитол. бюл. 2002:* 56.

птиц не было известно, хотя здесь почти ежегодно проводились орнитологические наблюдения. В последние 10 лет случаи залётов фламинго участились. Так, на северном побережье Алаколя между Заячьей губой и посёлком Рыбачье осенью 1989 года держались 2 птицы, одна из которых была застрелена охотниками. В октябре 1997 года между Сасыкколем и Алаколем на озерке Бескаска, образующем заболоченную низину от Коржинколя до Кошкарколя, около недели держалась группа из 5 птиц. В конце октября 1999 года на мелководьях в устье реки Урджар около посёлка Камыскала (бывшее Рыбачье) держался одиночный фламинго. В заливе Майбирюк на западном берегу Алаколя 20 мая 2000 на мелководье кормились две птицы. По сведениям рыбаков, там же, в урочище Карасу, 15 лет назад охотники добыли одиночного фламинго.

Литература

Ауэзов Э.М., Грачёв В.А. 1977. Исчезающие и редкие птицы Алакольской котловины // *Редкие и исчезающие звери и птицы Казахстана*. Алма-Ата: 121-123.

*ISSN 0869-4362*
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **771**: 1545-1547*

# О некоторых редких видах птиц Владимирской области

В.В.Романов, Ю.А.Быков, В.А.Сербин

*Второе издание. Первая публикация в 2001**

*Podiceps nigricollis*. Редкий вид. Регулярные встречи в Мещере с середины апреля по середину мая. Летние встречи единичны (Анопинское водохранилище – 1998 год, торфокарьеры Орловского болота – 1999). В конце 1990-х годов встречаемость черношейной поганки несколько увеличилась.

*Podiceps auritus*. Очень редкий вид. Отмечалась (1989 год) и гнездилась (1990) на юге Киржачского района (Морозов 1998). В Гусевском районе отмечалась на Анопинском водохранилище, в 1998 году – одиночная птица (с первой декады мая по первую декаду июня), в 1999-2000 годах (третья декада апреля – первая декада июня) отмечена

* Романов В.В., Быков Ю.А., Сербин В.А. 2001. О некоторых редких видах птиц Владимирской области // *Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии*. Казань: 532-534.

пара, демонстрировавшая брачное поведение (в 1999 году – ещё и обособленно державшаяся одиночная птица).

*Ixobrychus minutus*. Добыта в сентябре 1984 года в Собинском районе на прудах Воршанского рыбхоза.

*Ciconia ciconia*. Расселяющийся вид. В начале 1980-х годов белый аист дважды отмечен в Муромском Предочье (в т.ч. гнездование в 1981 году в селе Ковардицы в окрестностях Мурома (Сысоев 1995)). В 1990-х годах три встречи во Владимирском ополье и окрестностях, четыре – в Мещёре, в т.ч. неудачное гнездование в деревне Мокрое (1993 год) в окрестностях озера Святое (С.М.Швед , устн. сообщ). В долине Клязьмы в 1980-х белый аист гнездился на озере Великое Вязниковского района (данные Н.Д.Сысоева, устн. сообщ.), в 2000 году отмечен в Давыдовской пойме (восточнее Владимира).

*Ciconia nigra*. Нерегулярные очень редкие встречи на северо-востоке области (Лухское полесье). В середине 1990-х годов выводок чёрного аиста наблюдался в пойме Клязьмы ниже Коврова.

*Cygnus olor*. Залёты в 1993-1994 годах в окрестности озера Святое. 31 мая 1998 здесь встречена стая примерно из 9 птиц. С 9 по 14 июня 1998 года 9 птиц (возможно, те же) держались на Анопинском водохранилище. Пара шипунов на этом водохранилище держалась в 1999 году с мая до ледостава (5 ноября). По свидетельству местных жителей, в течение второй половины лета (вплоть до 10 сентября) вместе со взрослыми наблюдалась пара молодых этого года, к началу сентября достигших размеров взрослой птицы.

*Circus cyaneus*. По территории области распространён неравномерно. На значительных территориях (например, в Петушинском районе (Ерёмкин 1995), в настоящее время в гнездовой сезон не встречается. В Гусевском районе крайне редок и, возможно, уже перестал гнездиться, хотя на рубеже 1980-1990-х годов был довольно обычен и гнездился на многих полях и отдельных торфяных карьерах. Относительно регулярно и повсеместно в гнездовой сезон встречаются одиночные охотящиеся полевые луни и пары на территории Владимирского ополья, однако и здесь численность этого вида вряд ли превышает 10-12 пар.

*Aquila chrysaetos*. Беркут добыт браконьером осенью в конце 1980-х в окрестностях города Гусь-Хрустальный.

*Larus minutus*. Окрестности города Вязники: в середине 1980-х малые чайки регулярно наблюдались на реке Клязьме. Гусь-Хрустальный район: нерегулярная гнездовая колония на озере Святое, численность и положение которой сильно меняется, максимум численности (15 пар) отмечался в 1996 году; в мае 1999 года группа из 16 малых чаек больше недели держалась на Анопинском водохранилище.

*Streptopelia decaocto*. К настоящему моменту оформилось два локальных ареала встречаемости кольчатой горлицы на территории Вла-

димирской области: южный, «мещёрский» – на территории Гусевского района, и «центральный»: город Владимир и юг Владимирского ополья (Романов и др. 2000).

*Asio otus*. В 2000 году наблюдался «всплеск» встречаемости этого, в общем редкого, вида.

*Coracias garrulus*. В Гусь-Хрустальном районе в конце 1980-х – начале 1990-х годов сизоворонка была малочисленной (но не редкой) гнездящейся птицей. С 1992-1993 годов численность её здесь убывает, с 1994 года отсутствуют данные о гнездовании, во второй половине 1990-х большой редкостью становятся и летние встречи, последние три года сизоворонка отмечалась лишь на весеннем пролёте. В целом в северной половине области она отмечается, в основном, на весенних и послегнездовых миграциях, однако есть основания предполагать периодическое гнездование в окрестностях озера Великое в Вязниковском районе.

*Upupa epops*. В конце XIX века (1894 год) удод отмечен на гнездовании в окрестностях города Покров (Поляков 1911). В Мещёре в конце 1980-х годов малочисленный, к концу 1990-х – редкий, местами в отдельные годы – малочисленный гнездящийся вид, тяготеющий к восточной (менее заболоченной) части, достигая окрестностей (5 км южнее) города Владимира. На послегнездовых кочёвках проникает на левобережье Клязьмы.

*Anthus pratensis*. Очень редкий вид. Токующие самцы отмечались на юго-западе области – в окрестностях озера Святое, и на севере – в долине реки Ирмес (граница с Ивановской областью).

*Lanius excubitor*. Сокращающий свою численность вид. В конце 1980-х годов серый сорокопут отмечался на многих верховых болотах и зарастающих торфоразработках Владимирской Мещёры. В последние годы на указанной территории встречается в основном на осеннем пролёте, изредка зимой, но уже очень редок на гнездовании.

*Emberiza hortulana*. В гнездовой сезон редкий вид Владимирского ополья и долины реки Оки; на северо-востоке Владимирского ополья в 1999-2000 годах обнаружены небольшие (5 и 6 токующих самцов, соответственно) устойчивые «поселенческие скопления» в Каменном овраге у села Якиманское и в низовьях долины реки Каменки восточнее города Суздаль. На остальной территории области садовая овсянка – крайне редкий вид, в типичных полесских районах отмечается лишь на пролёте либо как залётный.