ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2012
XXI

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

778

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XXI

Экспресс-выпуск • Express-issue

2012 № 778

СОДЕРЖАНИЕ

1739-1752 Список птиц, наблюдавшихся в тёплый период 1897-1913 годов в береговой полосе Петергофского уезда, между деревнями Лебяжья и Чёрная Лахта. В.Л.БИАНКИ

1753-1755 Новое появление просянки *Miliaria calandra* в окрестностях «Леса на Ворскле». Т.П.ДЬЯКОНОВА

1755-1756 Осенняя встреча савки *Oxyura leucocephala* в низовьях реки Урал. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ

1756-1765 К расселению малого баклана *Phalacrocorax pygmaeus* на юге России. В.П.БЕЛИК

1765-1766 Болотные крачки *Chlidonias* в дельте Волги. Н.Н.ГАВРИЛОВ, Д.В.БОНДАРЕВ

1766-1767 Кулик-сорока *Haematopus ostralegus* на европейском Северо-Востоке СССР. А.А.ЕСТАФЬЕВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2012
Дата опубликования: 10 августа 2012

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXI
Express-issue

2012 № 778

CONTENTS

1739-1752 The list of birds observed during the warm period 1897-1913 in the coastal strip of Peterhof uyezd between the villages Lebyazhya and Chyornaya Lakhta. V. L. BIANKI

1753-1755 The reappearance of the corn bunting *Miliaria calandra* near the Forest on the Vorskla River. T. P. DYAKONOVA

1755-1756 The record of the white-headed duck *Oxyura leucocephala* in the lower reaches of the Ural River. N. N. BEREZOVIKOV

1756-1765 On expansion pf the pygmy cormorant *Phalacrocorax pygmaeus* in southern Russia. V. P. BELIK

1765-1766 The terns of the genus *Chlidonias* in the Volga delta. N. N. GAVRILOV, D. V. BONDAREV

1766-1767 The oystercatcher *Haematopus ostralegus* on the European northeast of the USSR. A. A. ESTAFIEV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St.-Petersburg University
St.-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2012

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск ***778****: 1739-1752*

Список птиц, наблюдавшихся в тёплый период 1897-1913 годов в береговой полосе Петергофского уезда, между деревнями Лебяжья и Чёрная Лахта

В.Л.Бианки

*Второе издание. Первая публикация в 1913**

С 1897 года я провожу лето у деревни Лебяжьей Петергофского уезда, в 20 верстах к западу от Ораниенбаума, и совершаю орнитологические экскурсии обыкновенно в ближайших окрестностях её – от так называемой Барковской Глади, в трёх верстах к востоку от Лебяжьей, до деревни Чёрной Лахты, в десяти верстах к западу от неё, редко удаляясь к югу от берега моря более, чем на 3-5 вёрст, так как наблюдения над гнёздами – главная моя задача в зависимости от краткости каникулярного времени – на более далёком расстоянии невыполнимы. Далеко не в каждый из этих 18 лет удавалось вести даже более или менее правильные наблюдения над птицами, так как я часто отвлекался различными другими занятиями: в 1897 был занят почти исключительно энтомологическими исследованиями, в 1900, 1902, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912 и 1913 либо совсем не был в Лебяжьей, либо был лишён возможности экскурсировать, так что заносил в свой дневник данные иногда даже со слов других лиц. Довольно полно удалось произвести наблюдения в 1898, 1890, 1901, 1903 и 1906, особенно же в 1907, 1908 и 1909 годах, причём наблюдениями 1908 года я обязан сыну моему Виталию, так как сам был в то время на Камчатке†. Наблюдения над прилётом и весенним пролётом мне удалось организовать несколько полнее лишь в 1907 году, в остальные же годы они очень отрывочны и данные собраны лишь для поздно прилетающих птиц. К 1 сентября я должен был по обязанностям службы всегда покидать природу, а потому наблюдения над осенним течением касаются лишь ранних пролётных и отлётных видов.

---

* Бианки В.Л. 1913. Список птиц, наблюдавшихся в тёплый период 1897-1913 гг. в береговой полосе Петергофского уезда, между деревнями Лебяжья и Чёрная Лахта // *Ежегод. Зоол. музея Акад. наук* **18**, 4: 545-561.

† О большей или меньшей полноте наблюдений различных годов можно судить по числу зарегистрированных в них видов: в 1897 году имеются заметки о 28 видах, в 1898 – о 77 (19), в 1899 – о 86 (22), в 1900 – о 6 (3), в 1901 – о 89 (20), в 1902 – о 10, в 1903 – о 96 (15), в 1904 – о 49 (31), в 1905 – о 35 (22), в 1906 – о 89 (20), в 1907 – о 106 (35), в 1908 – о 108 (26), в 1909 – о 115 (25), в 1910 – о 57 (–), в 1911 – о 70 (20), в 1912 – о 66 (3), в 1913 – о 93 (13). Цифры в скобках указывают число видов, у которых были найдены гнёзда. Из этого видно, что наибольшее число видов, 115, наблюдалось в 1909 году, а наибольшее число видов, у которых были обнаружены гнёзда, 35 – в 1907 году.

Тем не менее, благодаря продолжительному пребыванию в местности и неукоснительному занесению всех наблюдений в дневник, мне удалось констатировать в окрестностях Лебяжьей 171 вид птиц и собрать весьма обширный материал, касающийся гнездования более чем половины выводящих тут видов. Для такого крохотного райончика цифра эта должна быть признана почти исчерпывающей авифауну более тёплого периода года; прибавок к ней можно ожидать почти исключительно из числа пролётных и зимующих. Она указывает нам, конечно, на разнообразие стаций в этой местности, что объясняется главным образом тем, что последняя примыкает к морю.

Полностью все собранные наблюдения утилизируются мною наряду с наблюдениями в других местах губернии и литературными данными для полной «Авифауны Санкт-Петербургской губернии», в этой же краткой заметке я дам только голый перечень найденных птиц для ориентировки лиц, пожелающих заняться орнитологическими исследованиями в этой всё более и более заселяющейся местности впоследствии. Им придётся, несомненно, убедиться в исчезновении некоторых прежде нормальных видов и в появлении таких, которые раньше отсутствовали тут.

Мои исследования были существенно облегчены разрешением коллектировать на землях Их Высочеств Принцессы Елены Георгиевны Сакен-Альтенбургской и герцогов Мекленбург-Стрелицких, в имениях местных владелиц О.К.Ливровской и О.П.фон-Лайминг и на охотничьих угодьях покойного академика А.И.Таренецкого, О.И.Иона и других лиц, которым я приношу за это свою искреннюю благодарность.

Прежде, чем перейти к списку наблюдавшихся птиц, остановлюсь на тех видах, которых положительно не встречаются в окрестностях Лебяжьей, несмотря на то, что обыкновенны уже в весьма недалёком расстоянии от неё. К ним относятся: нормально гнездящаяся под Ораниенбаумом тростниковая овсянка *Cynchramus schoeniclus;* очень обильный под Ораниенбаумом и встречающийся на 11 вёрст к западу от него (в 10 верстах от Лебяжьей) красноголовый воробей *Passer montanus;* нередкая под Ораниенбаумом и далее к востоку садовая малиновка *Acrocephalus dumetorum;* белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos;* нередко появляющаяся под Ораниенбаумом, и по крайней мере прежде гнездившаяся на Кронштадской косе малая крачка *Sternula minuta;* неоднократно добывавшийся под Большими Ижорами, но ни разу не попавшийся ни одному охотнику под Лебяжьей дупель *Gallinago major;* нередко встречающаяся в прибрежных тростниках под Ораниенбаумом выпь *Botaurus stellaris;* и некоторые утки, которые могут, впрочем, найтись ещё на пролёте.

Некоторые другие птицы, нормальные в каких-нибудь 10-20 верстах от Лебяжьей, являются тут не более как случайными гостями; но о них будет сказано ниже.

Номера в скобках соответствуют номерам моего «Списка птиц С.-Петербургской губернии», опубликованного в 1907 году*.

1 (1). *Corax corax* L. Ворон оседлая, но положительно довольно редкая птица.

2 (2). *Corone cornix* (L.). Серая ворона оседла и очень обыкновенна.

3 (3). *Trypanocorax frugilegus* (L.). Грач гнездится под Ораниенбаумом и даже к востоку верстах в 6 от него и постоянно живёт, например, у Малых Ижор. С 1897 по 1902 год он ни разу не наблюдался под Лебяжьей. В 1903 году сюда была занесена 2 июля бурей одна молодая птица. С 1904 по 1907 год его тут не было. С 1908 года грач стал появляться под Лебяжьей ежегодно весной и во второй половине лета, но всё же в небольшом количестве.

4 (4). *Coloeus collaris* (Drum.). Галка, очень обыкновенная в Ораниенбауме, далее на восток от него по прибрежной полосе не идёт; под Лебяжьей она была замечена однажды, 27 сентября 1908, когда пара птиц пролетала с востока на запад над Петровским Хутором.

5 (5). *Nucifraga caryocatactes* (L.). Ореховка случайная, редко появляющаяся осенью птица округи: осенью 1887 года один индивид был добыт А.И.Таренецким у Красной Горки; 27 августа 1909 я встретил семью в лесу О.К.Ливровской.

6 (6). *Garrulus glandarius* (L.). Сойка оседлая, довольно обыкновенная птица.

7 (7). *Perisoreus infaustus* (L.). Кукша оседлая, но редкая, гнездящаяся, по-видимому, под Чёрной Лахтой птица; молодая самка была добыта тут 10 июля 1899.

8 (8). *Pica pica* (L.). сорока оседла и очень обыкновенна.

9 (9). *Sturnus sophiae* Bianchi. Скворец летует и обыкновенен.

10 (11). *Oriolus galbula* (L.). Иволга летующий, но довольно редкий вид: в прежние годы в округе гнездились 3-4 пары, теперь 1 или 2.

11 (12). *Plectrophenax nivalis* (L.). Пуночка, вероятно, лишь пролётная, вряд ли зимняя птица округи: наблюдалась 27 марта 1909 и 25 марта 1911 на дороге по морю.

12 (16). *Emberiza citrinella* L. Обыкновенная овсянка оседла и очень обыкновенна.

13 (18). *Loxia pytyopsittacus* Bechst. Клёст-сосновик оседлая, но редкая птица.

14 (19). *Loxia curvirostra* L. Клёст-еловик оседлый, очень обыкновенный вид.

15 (23). *Carpodacus erythrinus* (Pall.). Чечевица летующая, но редкая птица: в округе ежегодно гнездится не более 1-3 пар, которые почти

* Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук, т. 12, 1907, с. 86-113. Дополнения: *l.c.*, т. 13, 1908, с. XXXVI-XLV; т. 17, 1912, с. XL-XLVIII.

всегда терпят, по-видимому, неудачу при гнездовании. Под Малыми Ижорами вид довольно обыкновенен и мне не раз приходилось слышать тут одновременно несколько самцов.

16 (24). *Aegiothus linaria* (L.). Чечётка обыкновенная зимующая, но редкая летующая птица, гнездящаяся даже не ежегодно. Несомненно выводила она в 1899, 1900 и 1906 годах. Весной пролётные стайки попадаются до конца апреля и начала мая.

17 (27). *Cannabina cannabina* (L.). Коноплянка оседлый и обыкновенный вид: мы наблюдали её 24 марта 1909 и 19 марта 1912.

18 (29). *Passer domesticus* (L.). Домовый воробей оседл и очень обыкновенен: он обыкновенно вытесняет скворцов там, где скворечницы выставляются по одной.

19 (32). *Chloris chloris* (L.). Зеленушка вероятно оседлая, довольно редкая птица округи.

20 (33). *Chrysomitris spinus* (L.). Чиж оседл и очень обыкновенен.

21 (34). *Fringilla coelebs* (L.). Зяблик летующий и очень обыкновенный вид, но в 1908 году был относительно редок.

22 (35). *Fringilla montifringilla* (L.). Юрок обыкновенный пролётный, но редкий летующий вид. Отдельными парами он гнездился в 1902, 1903, вероятно в 1906 и 1909 годах, а в 1907 году я наблюдал по крайней мере 6 выводивших в ближайшей округе пар.

23 (36). *Pyrrhula pyrrhula* (L.). Снегирь оседлый и обыкновенный гнездящийся вид.

24 (38). *Alauda arvensis* L. Полевой жаворонок летует и очень обыкновенен.

25 (39). *Lullula arborea* (L.). Юла летует и довольно обыкновенна.

26 (42). *Galerida cristata* (L.). Хохлатый жаворонок встречается не ежегодно; он наблюдался и выводил, всегда по одной паре, в 1903, 1904 и 1907 годах, в другие же совершенно отсутствовал.

27 (43). *Motacilla alba* (L.). Обыкновенная трясогузка летующий, очень обыкновенный вид.

28 (44). *Budytes flava* (L.). Плиска летующая и довольно обыкновенная птица.

29 (45). *Budytes borealis* (Sundev.). Тёмноголовая плиска летующая, довольно редкая птица.

30 (46). *Anthus trivialis* (L.). Лесная щеврица летующая, одна из обыкновеннейших птиц; в 1903 году была относительно редка, может быть вследствие непрерывных дождей 1902 года, заливавших гнёзда.

31 (47). *Anthus pratensis* (L.). Луговая щеврица летующая, довольно обыкновенная птица; около 1899 года гнездилась в очень большом количестве в вересках на 18-19-й версте от Ораниенбаума, но перестала, когда тут сосняк подрос; уже в 1903 году она совершенно отсутствовала.

32 (47 bis). *Agrodroma campestris* (L.). Полевая щеврица наблюдалась на обширном песчаном мысу, поросшем отдельными соснами, редкой сосновой порослью, *Elymus*, *Thymus* и другими дюнными растениями, в 1906, 1907 и 1908 годах и одна пара несомненно выводила тут в 1907. В 1913 году 8 апреля здесь держалась стайка в несколько штук, а затем осталась одна пара. На этот вид я не обратил достаточного внимания; возможно, что он живёт на песчаных пустырях, возникающих после вырубки соснового леса.

33 (48). *Nannus troglodytes* (L.). Крапивник оседлая, в период гнездования живущая исключительно в высокоствольных смешанных лесах, обыкновенная птица.

34 (49). *Certhia familiaris* L. Пищуха оседлая и обыкновенная птица, не избегающая в период гнездования и парков.

35 (50). *Sitta europaea* L. Поползень не более как случайная птица округи; лично я не наблюдал его; в начале 1902 года один индивид был пойман в западню А.О.Гаген-Торном; в августе 1905 года его подстрелил и поймал мой сын Виталий; 31 августа 1913 поползень наблюдался в саду одной дачи Петровского Хутора.

36 (52). *Poecile borealis* Selys-Longch. Черношапочный пухляк оседл и очень обыкновенен.

37 (55). *Lophophanes cristatus* (L.). Хохлатая синица оседла и очень обыкновенна.

38 (56). *Periparus ater* (L.). Московка, конечно, оседла, но очень редка; наблюдается лишь с 1907 года; в 1908 году сын Виталий нашёл гнездо.

39 (57). *Parus major* (L.). Большая синица оседла и обыкновенна.

40 (59). *Cyanistes caeruleus* (L.). Лазоревка, очень обыкновенная к востоку от Ораниенбаума, под Лебяжьей чисто случайна: за 16 лет наблюдалась однажды – 18 августа 1908 А.О.Гаген-Торном, одиночка.

41 (61). *Acredula caudata* (L.). Длиннохвостая синица оседла, но довольно редка, особенно в последние годы; в 1906 и 1907 годах, например, вовсе не наблюдалась.

42 (62). *Regulus regulus* (L.). Королёк оседл и очень обыкновенен в хвойных, преимущественно еловых насаждениях.

43 (63). *Enneoctinus collurio* (L.). Жулан летующий, обыкновенный вид.

44 (66). *Bombycilla garrulus* L. Свиристель зимующая, вероятно обыкновенная птица; наблюдался 18 и 19 апреля 1907 и 12 апреля 1911. В 1913 году О.Э.Гаген-Торн добыл двух годовалых самок 10 июля в береговом лесу у Чёрной Лахты; было лишь две птицы, которые держались в зарослях молодых сосен и можжевельника.

45 (67). *Sylvia nisoria* Bechst. Ястребиная славка летующая, редкая птица; гнёзда были найдены в 1898 и в 1909 годах.

46 (68). *Sylvia sylvia* (L.). Серая славка летующая, очень обыкновенная птица.

47 (69). *Sylvia simplex* (Lath.). Садовая славка летующая, очень обыкновенная птица.

48 (70). *Sylvia atricapilla* (L.). Черноголовая славка летующая, очень обыкновенная птица.

49 (71). *Sylvia curruca* (L.). Славка-мельничек летующая, очень обыкновенная птица.

50 (73). *Phylloscopus sibilatrix* (Bechst.). Пеночка-трещотка летующая, обыкновенная птица.

51 (74). *Phylloscopus trochilus* (L.). Пеночка-весничка летующий, очень обыкновенный вид.

52 (75). *Phylloscopus rufus* (Bechst.). Пеночка-теньковка летующий, очень обыкновенный вид.

53 (77). *Hypolais hypolais* (L.). Садовая пеночка летующая, очень обыкновенная птица.

54 (79). *Calamodus schoenobaenus* (L.). Кизиловка, очень обыкновенная на побережье от самого Петербурга до Ораниенбаума и далее до 11-й версты, в Приморском Хуторе, где она всё ещё очень обыкновенна, отчего-то останавливается тут и не идёт далее на запад. Под Лебяжьей, правда, нет обширных тростниковых зарослей, но они есть у Чёрной Лахты, а между тем и у последней в 1898-1904 годах я не встречал её. Лишь одна пара выводила в 1899 году у устья речки Лебяжьей; несмотря на вполне счастливо окончившееся гнездование птички затем не появлялись.

55 (80). *Locustella locustella* (Lath.). Обыкновенный сверчок гнездился в 1897 и может быть в следующие 1898 и 1899 годы на болотистых лугах против усадьбы О.П.фон-Лайминг, но с осушением этого места исчез.

56 (81). *Potamodus fluviatilis* (Wolf). Лесной сверчок гнездился в очень небольшом числе в 1898 году, но с тех пор в ближайших окрестностях Лебяжьей не встречался. Он живёт теперь, но тоже редок, на Риголовских покосах к югу от речки Лебяжьей, на Барковских покосах по речке Чёрной и, вероятно, как и прежде, у Чёрной Лахты. Непрерывно идущее осушение местности вытесняет, по-видимому, и его.

57 (82). *Turdus viscivorus* L. Деряба летующий, обыкновенный вид.

58 (83). *Turdus musicus* L. Певчий дрозд летующая, обыкновенная птица.

59 (84). *Turdus iliacus* L. Белобровик летующий, но под самой Лебяжьей довольно редкий вид; в последние годы стал чаще.

60 (85). *Turdus pilaris* L. Рябинник летующий и весьма обыкновенный вид. Обширная колония в парке О.П.фон-Лайминг в 1911 году отчего-то отсутствовала.

61 (87). *Merula merula* (L.). Чёрный дрозд наблюдался всего однажды, на Чёрной Лахте, А.И.Таренецким, хорошо знавшим эту птицу.

62 (89). *Ruticilla phoenicura* (L.). Горихвостка летующая, очень обыкновенная птица, но в 1907 году была относительно очень редка.

63 (90). *Luscinia philomela* (Bechst.). Восточный соловей случайный гость у Лебяжьей: говорят, что до 1897 года он гнездился в саду усадьбы О.П.фон-Лайминг. В моё время наблюдались в 1898, 1901 и 1904 годах лишь бродячие самцы, каждый из этих годов по одному: около половины или конца мая появлялся этот чудный певец, пел ночь в одном месте, на следующую подвигался несколько далее, затем ещё далее и наконец окончательно пропадал бесследно.

64 (91). *Erithacus rubecula* (L.). Зарянка летует и весьма обыкновенна.

65 (93). *Cyanecula wolfi* (Brehm). Варакушка наблюдалась однажды в 1890-х годах А.И.Таренецким.

66 (94). *Pratincola rubetra* (L.). Луговой чекан летующий, обыкновенный вид, в последние годы сделавшийся реже вследствие осушения сырых лугов.

67 (95). *Saxicola oenanthe* (L.). Каменка летующая, далеко не обыкновенная у нас птица.

68 (96). *Prunella modularis* (L.). Завирушка летующий, положительно редкий вид, присутствие которого под Лебяжьей определено находкой оставленных уже гнёзд; у Чёрной Лахты сын мой Лев убил 26 июля 1899 самца.

69 (98). *Muscicapa grisola* (L.). Серая мухоловка летующий, очень обыкновенный вид.

70 (99). *Hedymela atricapilla* (L.). Пеструшка летующий, обыкновенный вид.

71 (100). *Siphia parva* (Bechst.). Лоцманчик летующий, довольно обыкновенный, держащийся исключительно в смешанных высокоствольных лесах вид.

72 (101). *Chelidon urbica* (L.). Городская ласточка летующий, очень обыкновенный вид.

73 (102). *Cotyle riparia* (L.). Береговая ласточка летующий, очень обыкновенный вид.

74 (103). *Hirundo rustica* (L.). Деревенская ласточка летующая, очень обыкновенная птица.

75 (106). *Gecinus canus* (Gmel.). Седой дятел оседлый, но редкий вид, в последние годы гнездящийся в округе почти каждое лето.

76 (107). *Dendrocopos major* (L.). Большой пёстрый дятел оседлый, очень обыкновенный вид.

77 (108). *Xylocopus minor* (L.). Малый пёстрый дятел оседлая, далеко не обыкновенная, особенно в последние годы, птица.

78 (109). *Picoides tridactylus* (L.). Трёхпалый дятел оседлый, редкий, но в последние годы сделавшийся несколько чаще вид; в 1897, 1907, вероятно в 1908, затем в 1909 и 1911 годах он гнездился в округе, в 1911 году даже в парке О.П.фон-Лайминг.

79 (110). *Picus martius* L. Желна оседлый, но довольно редкий вид, гнездящийся в округе ежегодно.

80 (111). *Jynx torquilla* L. Вертишейка летует, обыкновенна.

81 (112). *Cypselus apus* (L.). Стриж летующий, очень обыкновенный вид.

82 (113). *Caprimulgus europaeus* L. Козодой летующий, обыкновенный вид.

83 (114). *Asio otus* (L.). Ушастая сова, по-видимому, редкая оседлая птица, присутствие коей удалось обнаружить благодаря находке 1 июня 1907 и 18 июля 1909 её перьев.

84 (115). *Asio accipitrinus* (Pall.). Болотная сова положительно редка в окрестностях Лебяжьей; я наблюдал её в начале июля 1898 года у Лоцманского селения; сын мой Виталий убил 10 июня 1913 одну из нескольких птиц, державшихся на поросшем редким лесом болоте в самой южной части имения О.П.фон-Лайминг.

85 (117). *Bubo bubo* (L.). Филин оседлый, но редкий вид; гнездится на Чёрной Лахте и в лесах по речке Чёрной, притоку реки Каваша.

86 (119). *Syrnium aluco* (L.). Серая неясыть оседлая, редкая птица; под Лебяжьей я наблюдал её во всё время дважды: 21 августа 1898 и 20 июня 1909, оба раза в высокоствольном сосновом лесу в сумерки.

87 (120). *Syrnium uralense* (Pall.). Уральская неясыть оседлая, редкая птица ближайших окрестностей Лебяжьей, но гнездилась по крайней мере в 1906 и 1910 годах в лесу О.К.Ливеровской.

88 (122). *Nyctala tengmalmi* (Gmel.). Мохноногий сыч оседлый, редкий вид; гнездился по крайней мере в 1905 и 1909 годах.

89 (123). *Surnia ulula* (L.). Ястребиный сирин, вероятно, не редкий зимующий вид, но может быть, иногда и гнездится, судя по тому, что уже 25 августа 1910 О.И.Ион убил самку у деревни Большие Борки.

90 (124). *Glaucidium passerinum* (L.). Воробьиная совка оседлый, но очень редкий вид; гнездовала и вообще наблюдалась лишь в 1909 году.

91 (126). *Coracias garrulus* L. Сизоворонка залётная птица окрестностей Лебяжьей; наблюдалась дважды: 25 августа 1903 и 1 мая 1911; последний раз добыта О.И.Ионом у деревни Большие Борки.

92 (127). *Cuculus canorus* L. Кукушка летующая, обыкновенная птица.

93 (128). *Columba livia rustica* Bogd. Одичалый сизый голубь, конечно, оседл и очень обыкновенен у всякого жилья.

94 (130). *Palumbus palumbus* (L.). Вяхирь летующий, обыкновенный вид.

95 (137). *Hydrocoloeus minutus* (Pall.). Малый рыболов должен считаться лишь случайной птицей ближайших окрестностей Лебяжьей, хотя в 1909 и 1910 годах гнездился, тоже случайно, всего в 10 верстах от неё – в Приморском Хуторе на 11-й версте от Ораниенбаума, о чём я сообщаю в своём «Втором дополнении к списку птиц 1907 года»*. В 1909 году у Лебяжьей он наблюдался время от времени в июне, затем в стаях *Larus canus* 8,9 и 31 июля. В 1910 году я наблюдений не производил. Раньше, во второй половине июня 1902 года, Ф.Д.Плеске наблюдал его на море против Лоцманского селения; возможно, что в этот год он тоже случайно гнездился в Приморском Хуторе.

96 (138). *Chroicocephalus ridibundus* (L.). Обыкновенный рыболов нигде не гнездится под Лебяжей; в очень небольшом по сравнению с *Larus canus* числе он наблюдается в первой трети мая, а затем со второй половины июля, так что должен быть признан пролётным для нашего района.

97 (139). *Larus canus* (L.). Сизая чайка тоже не гнездится в округе. В апреле и в первой трети мая она довольно многочисленна на побережье; всё лето держатся в небольшом количестве старые и более молодые особи; обыкновенно к концу первой трети июля наблюдается массовый лёт с востока на запад молодых данного года, после чего как молодые, так и старые встречаются в большом количестве и держатся стаями, особенно у Борковской Глади, против деревни Старая Красная Горка и в других местах.

98 (140 bis). *Larus cachinnans* Pall. Хохотунья попадается отдельными особями в апреле и с июля; свойство пребывания выяснить не удалось.

99 (141). *Larus fuscus* L. Сельделов встречается отдельными, почти исключительно взрослыми особями в течение всего лета, вероятно, залетая с ближайших к району гнездовий.

100 (145). *Hydrochelidon nigra* (L.). Чёрная крачка залётный вид; одинокую молодую птицу убил 6 августа 1908 у Лоцманского селения мой сын Виталий.

101 (147). *Sterna fluviatilis* Naum. Речная крачка летующая, обыкновенная птица, гнездящаяся, однако, лишь отдельными парами, так на песчаном мысу в имении О.П.фон-Лайминг, на Борковской Глади и в других подходящих местах, но не ежегодно. Постоянная небольшая колония, пар в 10, существует на дюнах в Приморском Хуторе.

102 (150). *Haematopus ostralegus* L. Морская сорока довольно редкая пролётная птица, наблюдаемая на побережье, обыкновенно на камнях, в последней трети апреля и значительно реже с конца июня или с июля.

---

* Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук, т. 17, 1912, с. XL-XLVII.

103 (151). *Vanellus vanellus* (L.). Чибис случайно летующая, редкая птица описываемого района. В 1902 году 4 пары гнездились, по сообщению Ф.Д.Плеске, на так называемых Красногорских полях по речке Лебяжьей; раньше А.Н.Таренецкий не встречал его тут в течение 18 лет. В 1903-1905 годах пигалиц не было. В 1906 году 9 мая наблюдались на берегу моря 5 особей и по крайней мере одна пара гнездилась на тех же Красногорских полях; в 1908 году пара была замечена на берегу 10 мая. В 1912 году в конце июля и в начале августа семья или выводок держался в 10 верстах от Лебяжьей – в Приморском Хуторе. В 1913 году О.Э.Гаген-Торн наблюдал 4 мая стайку в 5 особей у устья речки Лебяжьей; мой сын Виталий видел 3 особи 18 июля в Чёрной Лахте.

104 (152). *Squatarola helvetica* (L.). Тулес редкая пролётная птица, добывавшаяся одинокими особями 24 августа 1907 и 10 августа 1909 на морском берегу.

105 (153). *Charadrius pluvialis* (L.). Ржанка довольно обыкновенная пролётная птица, встречающаяся стайками на полях в первой половине мая и со второй половины августа.

106 (154). *Eudromias morinellus* (L.). Глупая ржанка, вероятно, нормальная, хотя и редкая пролётная птица; один индивид добыт из выводка 27 августа 1901 на Красногорских полях.

107 (155). *Aegialites hiaticula* (L.). Большой зуёк обыкновенная пролётная птица.

108 (156). *Aegialites dubius* (Scop.). Малый зуёк летующий, обыкновенный вид, гнездящийся на песках всего побережья.

109 (157). *Numenius arquata* L. Большой кроншнеп летующая, довольно обыкновенная, но гнездящаяся всё же лишь отдельными парами; в значительном количестве гнездился лишь в 1912 году.

110 (158). *Numenius phaeopus* (L.). Малый кроншнеп редкий пролётный вид; наблюдался осенью 1902 года Ф.Д.Плеске, затем 18 и 29 июля 1909 нами, а около 1 июля 1913 был убит одинокий, очень неосторожный индивид юным охотником Гр. Лавровым на берегу моря в Петровском Хуторе.

111 (160). *Limosa lapponica* (L.). Лапландский веретенник относительно редкий пролётный вид; только в 1908 году был более обыкновенен, когда 24 августа летел стайками в 5-50 штук над морем.

112 (161). *Totanus fuscus* (L.). Щёголь довольно обыкновенный пролётный вид, наблюдаемый в конце апреля и в первой половине мая, а затем с конца июля.

113 (162). *Totanus calidris* (L.). красноножка очень редкая, по-видимому, случайная в округе птица, хотя не редка на побережье, по крайней мере на пролёте, к востоку от Ораниенбаума; 17 июля 1913 убита С.Е.Рахманиным в Чёрной Лахте.

114 (163). *Helodromas ochropus* (L.). Черныш летующая обыкновенная птица.

115 (164). *Tringoides hypoleucus* (L.). Перевозчик летующая обыкновенная птица.

116 (166). *Glottis nebularius* (Gunner.). Большой улит, или травник довольно обыкновенный пролётный вид, появляющийся в первой половине апреля, а затем обыкновенно уже со второй половины июня, так что выводит, вероятно, в недалёком расстоянии от Лебяжьей.

117 (167). *Rhyacophilus glareola* (L.). Фифи летующая, довольно обыкновенная птица.

118 (168). *Pavoncella pugnax* (L.). Турухтан обыкновенная пролётная птица, появляющаяся в конце апреля и в первой трети мая, а затем обыкновенно со второй половины июля.

119 (169). *Calidris arenaria* (L.). Песчанка редкая пролётная птица; наблюдалась стайками в бурю 18 августа 1903 и одинокий 23 августа 1906; оба раза добыта.

120 (170). *Limonites minuta* (Leisl.). Бурохвостый песочник обыкновенная пролётная птица; весною появляется в первой трети мая, затем иногда уже с последних чисел июня или первых чисел июля; в 1906 году был очень обилен и держался всё время с 7 июля до конца августа, когда наблюдения прекратились; в 1909 году вовсе не наблюдался до конца августа.

121 (171). *Limonites temminckii (Leisl.).* Белохвостый песочник обыкновенный пролётный вид, появляющийся с первой трети мая, а затем с первых дней июля; в таком числе, как *L. minuta* в 1906 году, никогда не наблюдался.

122 (172). *Ancylochilus subarquatus* (Güld.). Краснозобик редкий пролётный вид; наблюдался и был добыт в 1909 году: три птицы в стайке *Pelidna alpina* 27 июля, небольшие стайки с *P. alpina* 28 июля и несколько особей 11 июля; в 1913 году: 25 июля сын Виталий убил в Чёрной Лахте одного из стайки с *P. alpina*, а 3 августа adlt. mut. in postnupt. в Петровском Хуторе из стайки с *Pavoncella pugnax*.

123 (173). *Tringa canutus* (L.). Исландский песочник редкий пролётный вид; в августе 1886 года был добыт А.И.Таренецким; 11 мая 1901 наблюдался пролётными стайками; 23 августа 1907 был добыт индивид из стайки в 4 особи.

124 (174). *Pelidna alpina* (L.). Чернозобик очень обыкновенный пролётный вид; тенет с первых дней мая, а затем с начала июля.

— (175). *Limicola platyrhyncha* (Temm.). Грязовик в рассматриваемом районе не замечен, но 5 августа 1912 добыт в Приморском Хуторе.

125 (176). *Lymnocryptes gallinula* (L.). Гаршнеп безусловно редкий вид; убит 17 июля 1913 С.Е.Рахманиным на песчаном мысу в Чёрной Лахте. Обыкновенен на побережье от Приморского Хутора к востоку.

126 (177). *Gallinago gallinago* (L.). Бекас летующий, очень обыкновенный вид.

127 (179). *Scolopax rusticola* (L.). Вальдшнеп летующий, очень обыкновенный вид; в последние годы в ближайших окрестностях Лебяжьей стал значительно реже, чем в конце 1890-х годов.

128 (180). *Phalaropus hyperboreus* (L.). Круглоносый плавунчик залётный вид: 12 августа 1903, в очень высокую воду, была добыта одинокая молодая птица у самого берега в деревне Лебяжьей; 31 июля 1913 при сильном северо-северо-восточном ветре и постоянном мелком дожде убита в 1.5 верстах от берега против Лоцманского селения тоже одинокая птица Н.Кочкиным.

129 (183). *Grus grus* L. Журавль летующая, довольно обыкновенная птица.

130 (185). *Gallinula chloropus* (L.). Камышница случайная летующая птица: наблюдалась в 1898 и 1899 годах у Лоцманского селения и в 1901 году на озере в Чёрной Лахте.

131 (186). *Porzana porzana* (L.). Погоныш летующая, довольно редкая птица.

132 (187). *Crex crex* (L.). Коростель летующая, довольно обыкновенная птица.

133 (188). *Rallus aquaticus* (L.). Водяной пастушок залётная птица района; одинокий, бегавший в кустах у дюны индивид наблюдался 13 июня 1909, на следующий день исчез.

134 (189). *Lagopus lagopus* (L.). Белая куропатка оседлый, обыкновенный вид.

135 (190). *Lyrurus tetrix* (L.). Тетерев оседлый, очень обыкновенный вид.

136 (191). *Tetrao urogallus* L. Глухарь оседлый, обыкновенный вид.

137 (192). *Tetrastes bonasia* (L.). Рябчик оседлый, очень обыкновенный вид.

138 (193). *Perdix perdix* (L.). Серая куропатка оседлая, довольно редкая птица округи.

139 (197). *Falco peregrinus* Tunst. Сапсан редкая, вероятно только летующая птица; наблюдался 1 августа 1898, 4 июня 1901 и 9 июня 1907.

140 (198). *Hypotriorchis subbuteo* (L.). Чеглок летующая, довольно обыкновенная птица.

141 (199). *Aesalon aesalon* (Tunst.). Дербник летующая, но редкая птица; гнездо с 4 птенцами было найдено в 1902 году; один убит 31 июля 1909.

142 (200). *Tinnunculus tinnunculus* (L.). Пустельга летующая, редкая птица; в конце 1890-х годов пара гнездилась под Лебяжьей, потом перестала.

143 (202). *Pernis apivorus* (L.). Осоед летующая, редкая птица; в 1890-х годах гнездилась под Лебяжьей, потом исчезла.

144 (203). *Pandion haliaetus* (L.). Скопа летующая, редкая птица.

145 (205). *Haliaeetus albicilla* (L.). Белохвост наблюдался изредка сидящим на камнях в море далеко от берега.

146 (211). *Circus cyaneus* (L.). Полевой лунь летующая, довольно редкая птица.

147 (214). *Circus macrourus* (S.G.Gmel.). Степной лунь, несомненно, изредка летует у нас: летом 1897 года А.И.Таренецкий убил на Чёрной Лахте молодую птицу в гнездовом наряде.

148 (216). *Buteo desertorum* (Daud.). Рыжий сарыч летующая, довольно редкая птица округи; прежде гнездился под Лебяжьей, теперь прекратил.

149 (217). *Accipiter nisus* (L.). Перепелятник летующая, довольно обыкновенная птица.

150 (218). *Astur palumbarius* (L.). Тетеревятник оседлая, довольно обыкновенная птица.

151 (219). *Cygnus cygnus* (L.). Лебедь-кликун обыкновенный пролётный вид; в апреле, когда вдали от берега образуется полынья, держится большими стадами; по вскрытии моря одиночки остаются иногда до первых чисел мая; осенью появляется в конце сентября, как старые, так и молодые птицы.

152 (221). *Anser anser* (L.). Серый гусь летующий, редкий вид: несколько пар этих птиц гнездится в области мыса Серая Лошадь под Чёрной Лахтой.

153 (223). *Anser finmarchicus* (Gunner.). Малая белолобая казарка наблюдалась, по сообщению Ф.Д.Плеске, 15 июля 1902, «когда стайка штук в 15 летала над Лоцманским селением».

154 (226). *Branta bernicla* (L.). Чёрная казарка, молодой индивид, была убита на побережье в ноябре 1910 года.

155 (229). *Anas boscas* L. Кряква летующая, очень обыкновенная птица.

156 (231). *Mareca penelope* (L.). Свиязь до 1913 года не наблюдалась; в этом году 10 апреля убит моим сыном Виталием одинокий, плававший около берега в Петровском хуторе самец и 17 июля А.Е. Рахманным одна из двух птиц, державшихся в камышовой заросли под Чёрной Лахтой.

157 (232). *Nettion crecca* (L.). Чирок-грязовик летующая, очень обыкновенная утка.

158 (233). *Dafila acuta* (L.). Шилохвость летующая, довольно обыкновенная утка.

159 (234). *Querquedula querquedula* (L.). Чирок-трескунок летующая, довольно обыкновенная птица.

160 (235). *Spatula clypeata* (L.). Широконоска до 1913 года ни разу, никем из охотников не добывалась; в этом году убита под Чёрной Лахтой 24 июля Г.Е.Рахманиным самка в камышах и 25 июля моим сыном Виталием самец в бухте.

161 (237). *Fuligula marila* (L.). Морская чернеть обыкновенна на море в период пролёта – в апреле и сентябре.

162 (238). *Fuligula fuligula* (L.). Хохлатая чернеть довольно редкий летующий вид.

163 (239). *Clangula clangula* (L.). Гоголь обыкновенный летующий вид.

164 (245). *Somateria mollissima* (L.). Обыкновенная гага залётная птица окрестностей Лебяжьей: Ф.Д.Плеске видел около 1 июня 1902 четыре самки на море против Борковской Глади.

165 (248). *Merganser serrator* (L.). Длинноносый крохаль летующий, довольно обыкновенный вид.

166 (251). *Ciconia nigra* (L.). Чёрный аист случайный, но повидимому, изредка гнездящийся вид; пасшегося на лугах по речке Лебяжьей я долго наблюдал в бинокль 8 июля 1901.

167 (252). *Ardea cinerea* (L.). Серая цапля почти несомненно гнездится в окрестностях Лебяжьей, но вряд ли больше, чем одной парой; семья или выводок наблюдался почти во все годы, когда велись наблюдения.

168 (256). *Phalacrocorax carbo* (L.). Баклан очень редкая залётная птица: 25 августа 1903 мною убит один из двух летевших над морем между деревнями Новая и Старая Красная Горка.

169 (258). *Dytes auritus* (L.). Ушастая чомга случайная птица округи: пара наблюдалась однажды в бухточке моря 6 мая 1908.

170 (260). *Colymbus cristatus* (L.). Большая чомга случайная летующая птица; крупные, но сплошь ещё пуховые птенцы добывались на море близ берега в сентябре 1900 и в половине августа 1912 и 1913 годов; 28 мая 1909 наблюдалась одинокая старая птица.

171 (262). *Urinator arcticus* (L.). Чернозобая гагара наблюдалась изредка в береговой полосе моря – 8 июля 1906, 19 апреля 1907, пара 5 мая 1908, пара в начале июля 1909, так что должна считаться случайной птицей.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск 778: 1753-1755

Новое появление просянки *Miliaria calandra* в окрестностях «Леса на Ворскле»

Т.П.Дьяконова

Татьяна Павловна Дьяконова. Кафедра зоологии позвоночных, биолого-почвенный факультет, Санкт-Петербургский университет, Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия

Поступила в редакцию 30 июля 2012

Орнитологические наблюдения в окрестностях «Леса на Ворскле» (Борисовский район Белгородской области) ведутся более 70 лет, но за этот период просянка *Miliaria calandra* наблюдалась здесь лишь в 1949 и 1975 годах. В 1975 году эта овсянка была встречена на остепнённом правом склоне долины речки Гостенки – левого притока Ворсклы (Овчинникова 1999). В 1949 году просянок много раз наблюдали по пойме Ворсклы и склонам пологих степных балок, а у деревни Красный Куток 19 июня 1949 одновременно слышали трёх поющих самцов (Новиков и др. 1963). По всей видимости, в тот год просянки здесь гнездились. Один самец был добыт 19 июня 1949 в полосе мелкого леса, вдающегося в поля около 4-го квартала «Леса на Ворскле». Недалеко от этого места мы снова обнаружили просянок в 2012 году во время проведения студенческой практики.

Рис. 1. Остепнённые склоны балки около урочища «Мелкий лес», где обнаружено поселение просянки. Вдали долина реки Ворсклы. 18 июня 2012. Фото А.В.Бардина.

Первый раз поющий самец просянки встречен 14 июня 2012 на склоне остепнённой балки около урочища «Мелкий лес» (рис. 1). Географические координаты 50°37´55´´ с.ш., 35°59´37´´ в.д. Наверху балки тянутся обрабатываемые поля. По поросшему травянистой растительностью склону разбросаны отдельные деревца берёзы и груши, а в части балки произведены посадки конского каштана и сосны.

Рис. 2. Самец просянки *Miliaria calandra*. Окрестности «Леса на Ворскле». 18 июня 2012. Фото А.В.Бардина.

Рис. 3. Самец просянки во время пения. 18 июня 2012. Фото А.В.Бардина

Рис. 4. Самец просянки издаёт тревожный крик. 18 июня 2012. Фото А.В.Бардина

Экскурсии 15-18 июня показали, что в этой балке держались по крайней мере три самца, певших на своих небольших территориях.

Вели себя просянки весьма скрытно. Их выдавала песня, которую они исполняли сидя на высоких стеблях коровяка густоцветкового *Verbascum densiflorum* или на вершинах небольших груш и берёз, реже на земле. С помощью проигрывания записи видовой песни можно было легко подманить этих птиц на близкое расстояние (рис. 2-4). 17 июня удалось видеть просянку, по-видимому самку, с кормом в клюве. Однако поиски гнёзд этого вида, которым не было возможности уделить много времени из-за рутины учебного процесса, результатов не дали.

Следует отметить, что в 2012 году просянки были встречены и в других местах Белгородской области: в Губкинском районе на участке «Ямская степь» заповедника «Белогорье» и в Ровеньском районе на засоленном лугу около села Нижняя Серебрянка (Соколов 2012), где просянка наблюдалась также в 2010 году (Соколов, Шаповалов 2012).

Я искренне благодарна С.П.Резвому и И.Б.Савинич за товарищескую помощь, а А.В.Бардину также за предоставленные фотографии.

Литература

Новиков Г.А., Мальчевский А.С., Овчинникова Н.П., Иванова Н.С. 1963. Птицы «Леса на Ворскле» и его окрестностей // *Вопросы экологии и биоценологии* **8**: 9-118.

Овчинникова Н.П. 1999. Птицы водно-болотных стаций окрестностей заповедника «Лес на Ворскле» // *Рус. орнитол. журн.* **8** (70): 10-23.

Соколов А.Ю. 2012. Встречи просянки *Miliaria calandra* и зелёной пеночки *Phylloscopus trochiloides* на особо охраняемых территориях Белгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **21** (766): 1384-1386.

Соколов А.Ю., Шаповалов А.С. 2012. Дополнения по авифауне Белгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **21** (768): 1453-1455.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **778**: 1755-1756*

Осенняя встреча савки *Oxyura leucocephala* в низовьях реки Урал

Н.Н.Березовиков

*Второе издание. Первая публикация в 2002**

Достоверных сведений о встречах савки *Oxyura leucocephala* в северо-восточной части Каспийского моря во второй половине XX века в

* Березовиков Н.Н. 2002. О встрече савки в низовьях реки Урал (Северо-Восточный Прикаспий) // *Каз. орнитол. бюл. 2002:* 59.

литературе не приводится. 6 октября 1996 на реке Урал в центре города Атырау у многолюдной пристани выше автомобильного моста держалась группа из 5 молодых савок. Они подпускали снующие вверх и вниз гребные лодки и байдарки на расстояние до 5-10 м, лишь отплывая в сторону. Людей совершенно не боялись. Весь день они были пассивны и большую часть времени отдыхали на воде в 100 м от рыбаков, не обращая внимания на их голоса и движения. Лишь после заката солнца и наступлением глубоких сумерек птицы стали более подвижны. На следующее утро их здесь уже не было, не появлялись они и в течение дня.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск ***778****: 1756-1765*

К расселению малого баклана *Phalacrocorax pygmaeus* на юге России

В.П.Белик

*Второе издание. Первая публикация в 2006**

Малый баклан *Phalacrocorax pygmaeus* относится к видам, находящимся под глобальной угрозой исчезновения и нуждающимся в повсеместной усиленной охране (Collar *et al.* 1994). Как вид, численность которого сокращается, под категорией 2 он был включён в Красную книгу Российской Федерации (1983, 2000). Основными лимитирующими факторами для него на международном уровне считаются осушительная мелиорация гнездовых и зимовочных местообитаний и изменения гидрологического режима водоёмов, а также беспокойство и отстрел птиц (Heredia *et al.* 1996), в России – снижение кормности угодий вследствие загрязнения и эвтрофикации водоёмов, сокращение гнездопригодных территорий и всё то же прямое истребление взрослых птиц (Литвинова 2000). Для организации эффективной охраны малого баклана в России необходимы, прежде всего, точные сведения о его распространении и динамике численности, особенно в маргинальных колониях, как правило – небольших и весьма уязвимых.

Район исследования, материал и методика

Материал собран в 2002-2004 годах на озере Монастырское, расположенном в пойме Нижнего Дона близ города Аксай, в 10 км выше города Ростова. Координаты

* Белик В.П. 2006. К расселению малого баклана (*Phalacrocorax pygmaeus*, Pelecaniformes) на юге России // *Зоол. журн.* **85**, 7: 859-864.

этого водоёма: 47°16´ с.ш., 39°57´ в.д. Озеро представляет собой обширный мелководный ильмень площадью около 200 га, соединённый в 1979 году искусственным каналом с протокой Дона рекой Аксай. В результате обводнения озеро к 1981 году заросло по краям рогозом *Typha angustifolia*, а к 1986 году его полностью сменил тростник *Phragmites australis*, в зарослях которого на площади около 0.5 га сформировалась большая смешанная колония голенастых. В 2004 году она насчитывала до 600-900 гнёзд, в том числе 300-500 пар караваек *Plegadis falcinellus*, около 150 пар малых белых цапель *Egretta garzetta*, до 100 пар квакв *Nycticorax nycticorax*, а также больших белых *Egretta alba*, серых *Ardea cinerea*, рыжих *Ardea purpurea* и жёлтых *Ardeola ralloides* цапель и 3-5 пар колпиц *Platalea leucorodia*.

В предшествующий период Монастырское озеро специально обследовано в 1981-1982, 1986 и 1988 годах мною (Казаков и др. 1986, 1988), а в 1990 и 1991 годах оно было осмотрено Казаковым и Ломадзе (1991, 1992) в ходе авиаучётов колониальных околоводных птиц, проводившихся на Нижнем Дону.

В 2002 году Монастырское озеро было описано как Ключевая орнитологическая территория (Белик 2002), достигающая по соответствующим критериям (Свиридова и др. 1996) международного ранга. Особой охраны, кроме егерского кордона, на нём нет. Озеро используется в качестве охотничьих угодий Ростовским областным обществом охотников. Охота на водоплавающих птиц открывается здесь обычно в конце августа – начале сентября, когда голенастые уже полностью заканчивают гнездование и разлетаются. Поэтому посещение этого озера охотниками никакого негативного воздействия на колониальных птиц не оказывает. Наоборот, его обводнение, регулирование уровня воды в нём, а также практиковавшееся прежде прокашивание тростника на плёсах членами охотколлектива поддерживали экосистемы озера в устойчивом состоянии, обеспечивая существование весьма богатой орнитофауны (не менее 55 гнездящихся видов).

Результаты

Впервые на Монастырском озере малые бакланы были обнаружены в 2002 году (Белик 2002). Здесь 26 мая за 1 ч наблюдений – с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин – были учтены 4 птицы, посещавшие колонию голенастых в зарослях тростника, а позже над колонией отмечены ещё 3 малых баклана, хотя не исключено, что часть птиц могла остаться незамеченной среди многочисленных караваек. Сама колония мною не была обследована.

В 2003 году здесь же 9 июля за 1 ч наблюдений – с 11 ч 30 мин до 12 ч 30 мин – отмечены 3 малых баклана, вылетевших вместе из колонии и направившихся на кормёжку. Как и прежде, часть бакланов я мог пропустить издали в огромной массе караваек, летавших над колонией.

В 2004 году в благоприятную погоду 3 июля удалось учесть всех птиц, летевших в колонию в секторе около 180° (SW-NW-NE). Противоположный сектор был ориентирован к берегу озера, выходившему на обширные сухие луга, и к главному руслу Дона. Определить, каков был поток птиц в том направлении, не представлялось возможным, но можно полагать, что туда летала меньшая часть малых бакланов, кор-

мившихся, в основном, на очень широкой, неглубокой протоке Дона – реке Аксай, протекавшей в 1 км севернее озера Монастырского.

Всего за 1 ч – с 12 ч 30 мин до 13 ч 30 мин – было учтено 9 малых бакланов, вылетевших из колонии на охоту, и 8 птиц, вернувшихся к гнёздам. Сопоставляя количество малых бакланов, учтённых над колонией в 2002, 2003 и 2004 годах, можно полагать, что их численность увеличилась здесь за этот период примерно в 4-6 раз.

При обследовании колонии 3 июля 2004 я обнаружил 1 гнездо малого баклана с кладкой (5 яиц), 2 гнезда с небольшими птенцами, 2 выводка лётных птенцов и группа до 20 слётков, представлявших, очевидно, 5-7 выводков. Всего, таким образом, здесь гнездилось не менее 10-12 пар малых бакланов, но поскольку осмотреть колонию полностью мне не удалось, то их общую численность, судя по учётам птиц на кормовых перелётах, я ориентировочно оценил в 15-20 пар.

Осмотренные гнёзда малого баклана располагались в северной части колонии относительно компактной группой на площади примерно 10×20 м среди гнёзд караваек, цапель и колпиц. Птицы занимали куртины редких, но мощных тростников, чередовавшихся с небольшими окнами открытой воды глубиной до 1.0-1.2 м. Почти все тростники были здесь поломаны птицами для строительства гнёзд и выглядели своеобразным частоколом сухих перепутанных стеблей, среди которых в 0.3-0.8 м над водой, в верхнем и среднем ярусах размещались гнёзда бакланов. Они располагались среди куртин тростника как в одиночку, так и группами, с минимальным расстоянием между центрами гнёзд до 1 м одно от другого.

Гнёзда бакланов отличались от построек мелких видов цапель более грубым сложением и прочностью. Они были довольно плотно свиты из сухих и зелёных стеблей тростника, а лоток выстлан более тонкими стеблями и листьями. Размеры гнезда с кладкой, см: диаметр гнезда 28, высота гнезда 23, диаметр лотка 16, глубина лотка 6. Гнездо было зажато между вертикальными стеблями тростника в 0.3 м над водой и лишь немного не доставало дном до её поверхности. В гнезде находилось 5 яиц, но все они оказались не оплодотворены и протухли, однако, судя по состоянию гнезда и по свежему помёту на листьях тростника, птицы продолжали насиживать их. Размеры яиц, мм: 46.5×29.3; 45.4×27.7; 43.1×30.0; 42.8×28.9; 45.3×29.5. Последние 2 яйца имели сравнительно тонкую голубоватую скорлупу почти без характерного для бакланов белого известкового налёта*.

В 2 гнёздах, располагавшихся на заломах тростника в 1 м друг от друга и в 0.6-0.8 м над водой, находилось по 3 птенца 10-15-сут возраста, покрытых густым чёрным пухом. У старших уже пробились пеньки

* Кладка передана в Зоологический музей Московского университета.

маховых перьев, и они при тревоге покинули гнёзда, спустились по заломам в воду и, ныряя, перебрались в соседние куртины тростника. Слётки, державшиеся на одной из куртин, уже почти достигли размеров взрослых птиц, оперились, но ещё не летали. Потревоженные, все они быстро разбежались, и осмотреть их вблизи не удалось. Возле 2 обособленных гнёзд держалось по 3 уже хорошо летавших птенца, сидевших на вершинах тростниковых заломов. По тревоге они один за другим разлетелись, но вскоре стали возвращаться обратно.

Обсуждение

Время появления малых бакланов на Монастырском озере не прослежено. При обследовании расположенной здесь колонии голенастых в 1981-1982, 1986 и 1988 годах малые бакланы однозначно отсутствовали (Казаков и др. 1986, 1988). Не наблюдались они на озере и при авиаучетах в 1990-1991 годах (Казаков, Ломадзе 1991, 1992).

Впервые на Нижнем Дону несколько малых бакланов было отмечено в конце лета – начале осени 1998 года на пойменном озере у Ростова (Сиденко 2003). Начало же заселения малым бакланом Восточного Приазовья зарегистрировано в 1992 году, когда 2 взрослых и 1 молодая птица были встречены 14 июня недалеко от большой колонии цапель и караваек в обширных плавнях низовий реки Ея – близ станицы Староминская на границе Ростовской области и Краснодарского края (Белик 1994). Затем на Карпиевском лимане в дельте Кубани 7 июля 1994 было найдено одиночное гнездо малого баклана с кладкой из 4 яиц (Заболотный, Хохлов 1997). Позже малые бакланы стали отмечаться в дельте Кубани регулярно, причём численность птиц здесь очень быстро нарастала, и уже в 1998-1999 годах осенью наблюдались их многосотенные стаи (Заболотный, Хохлов 1996; Мнацеканов, Динкевич 2001; Белик 2002; Хохлов и др. 2004). В этот же период на лимане Восточном близ станицы Черноерковская Славянского района было отмечено предположительное местонахождение колонии до 1000 пар (Емтыль и др. 2003), а в 2004 году около 10 пар малых бакланов обнаружено в большой смешанной колонии голенастых на Понурском лимане в Калининском районе (Мнацеканов 2004).

До 1990-х годов распространение малого баклана в России было ограничено лишь дельтами Терека и Волги (Судиловская 1951; Кривенко 1983; Литвинова 2000; и др.), куда краем ареала заходила его каспийская популяция (см. рисунок). В прошлом этот вид гнездился, по-видимому, также в Приазовье (Судиловская 1951), но затем здесь исчез. Однако в конце XX века произошло значительное увеличение численности и началось расселение малого баклана как на Каспии, так и в Азово-Черноморском бассейне (Стоцкая, Кривенко 1988; Ковшарь, Березовиков 2001; Белик и др. 2003; и др.). Быстрый рост попу-

ляций и экспансия этого баклана на юге Украины (Бузун, Гринченко 1991; Панченко, Балацкий 1991; Сиохин 2000; Petrovich *et al*. 2003; Rusev 2003a,b; и др.) привели к его появлению на Днестре и Днепре, на Сиваше, в Крыму, а затем и в России – в Восточном Приазовье, где до этого он несколько раз отмечался и, возможно, гнездился в XIX – начале XX века (Алфераки 1910; Птушенко 1915).



Ареал малого баклана *Phalacrocorax pygmaeus* в России:

1 – распространение до начала 1990-х годов (Литвинова 2000); 2 – ареал новой кубанской группировки (1994-2004 годы); 3 – место гнездования в низовьях Дона (2002-2004); 4 – место встречи птиц в низовьях реки Ея (1992); 5 – места вероятного гнездования в Прикаспии; 6 – направления возможного дальнейшего расселения птиц.

Причины, которые вызвали расселение малых бакланов в последние десятилетия на юге России и Украины, очевидно неоднозначны. Это и охрана птиц, и некоторое улучшение экологической обстановки на водоёмах. Но одним из наиболее существенных факторов, на мой взгляд, могло стать глобальное потепление климата, особенно сильно выраженное, как известно, в зимний период (Ладюри 1971; Сачок 1985; и др.). Оно улучшило условия зимовки и обеспечило выживание этих птиц, в значительном числе остающихся на зиму в районах гнездования, например в дельте Дуная, Днепра, Терека и Кубани (Москаленко 2000; Korzyukov, Rusev 2003a; Хохлов и др. 2004).

Расселение малого баклана на север, вплоть до Англии, в периоды потеплений наблюдалось и прежде (Cowles 1981). Похолодания же приводили к сокращению ареала и численности этих птиц. О влиянии условий зимовки на численность малых бакланов свидетельствуют, например, наблюдения Жмуда (Zhmud, Zhmud 2003) в дельте Дуная, а также данные Ю.В.Пишванова, который в дельте Терека только за один день в феврале 1982 года собрал 72 погибшие птицы (Казаков и др. 2004). Но если в первой половине XX века на Каспии было 6 суровых зим (1911, 1925, 1929, 1940, 1949, 1950 годы), очень сильно отразившихся на численности всех водоплавающих (см.: Спангенберг, Туров 1950; Пишванов, Хонякина 1968; Кривоносов и др. 1972; и др.), то во второй половине минувшего столетия здесь наблюдались всего 3 очень морозные зимы (1954, 1964 и 1972) и еще 2 раза – зимы средней суровости (1981/82 и 1984/85), а в последние 20 лет катастрофических зимовок не отмечалось ни разу. В общем синхронно развивалась синоптическая обстановка в XX веке и в Причерноморье.

По-видимому, именно благоприятные условия зимовки, которые складывались на Азовском, Чёрном и Каспийском морях начиная с 1970-х, а особенно выражено – с 1980-х годов в связи с потеплением климата, изначально обусловили и недавнюю мощную вспышку численности также у большого баклана *Phalacrocorax carbo*, зимующего, в основном, в богатых рыбой прибрежных акваториях этих морей (Скокова 1978; Скокова, Бондарев 1978). Эти же факторы могли привести к улучшению условий зимовки и для оседлого хохлатого баклана *Phalacrocorax aristotelis*, тоже начавшего сейчас увеличение своей численности и расселение на Чёрном море (Белик 2003).

Заключение

Общая численность малого баклана в России в настоящее время достигла, очевидно, около 2-3 тыс. пар, в том числе не менее 550-750 пар – в Дагестане (Джамирзоев и др. 2000,2002; Джамирзоев, Исмаилов 2002), 500-1650 пар – в дельте Волги (Гаврилов 2002; Гаврилов и др. 2003) и, вероятно, не менее 500-1000 пар – в Восточном Приазовье (Емтыль и др. 2003; Хохлов и др. 2004; и др.).

При сохранении нынешних климатических тенденций можно предполагать продолжение роста численности и расселение малого баклана вверх по Дону и появление его гнездовий на Западном Маныче, где на Усть-Манычском и Веселовском водохранилищах в многочисленных колониях голенастых среди тростниковых зарослей имеются подходящие для бакланов гнездовые условия. Не исключено проникновение малого баклана и на Цимлянское водохранилище, где в заливах и вдоль побережья Доно-Цимлянских песков в последние десятилетия сформировались мощные заросли тростника, которые

сейчас начали интенсивно заселять колониальные голенастые птицы и большие бакланы (Казаков и др. 2004).

Судя по дальним поисковым залётам малого баклана в Волгоградскую и Оренбургскую области и в Калмыкию (Шубин 1999; Коршиков 2000; Барабашин и др. 2003), продолжается, вероятно, расселение и его каспийской популяции. Можно ожидать появления его новых гнездовий на Чограйском водохранилище, на Сарпинских озёрах и других опреснённых водоёмах с тростниковыми зарослями и колониями голенастых птиц.

Литература

Алфераки С.Н. 1910. Птицы Восточного Приазовья // *Орнитол. вестн.* 1: 11-35.

Барабашин Т.О., Чернобай В.Ф., Иванов А.П., Касаткина Ю.Н. 2003. Озеро Эльтон // *Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюл.* **1**: 3-5.

Белик В.П. 1994. Новые авифаунистические находки в Ростовской области // *Кавказ. орнитол. вестн.* **6**: 30-32.

Белик В.П. 2002. Основные результаты обследования КОТР Ростовской области в 2002 году // *Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюл.* **16**: 20-25.

Белик В.П. 2003. Гнездовая колония хохлатого баклана на юге России // *Стрепет* 1: 67-71.

Белик В.П., Поливанов В.М., Тильба П.А. и др. 2003. Современные популяционные тренды гнездящихся птиц Южной России // *Стрепет* 1: 10-30.

Бузун В.А., Гринченко А.Б. 1991. О гнездящихся птицах Ойсульских плавней, малом баклане, огаре и пеганке в Крыму // *Редкие птицы Причерноморья.* Киев; Одесса: 182-193.

Гаврилов Н.Н. 2002. Динамика численности колониальных околоводных птиц дельты Волги // *Птицы Южной России: Материалы Международ. орнитол. конф. «Итоги и перспективы развития орнитологии на Северном Кавказе в XXI веке», посвящённой 20-летию деятельности Северокавказской орнитологической группы.* Ростов-на-Дону: 61-66.

Гаврилов Н.Н., Русанов Г.М., Бондарев Д.В. 2003. Состояние колониальных гнездовий птиц в дельте Волги, Западном ильменно-бугровом районе и на острове Малый Жемчужный (1999-2001) // *Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюл.* **2**: 30-42.

Джамирзоев Г.С., Исмаилов Х.Н. 2002. Республика Дагестан: Ачикольские озёра // *Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюл.* **15**: 13.

Джамирзоев Г.С., Маматаева В.Ф, Исмаилов Х.Н. 2002. Республика Дагестан: Аграханский залив // *Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюл.* **15**: 10.

Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2000. *Редкие и исчезающие птицы Дагестана и их охрана.* Ставрополь: 1-145.

Емтыль М.Х., Лохман Ю.В., Иваненко А.М., Емтыль А.М., Короткий Т.В. 2003. Гидрофильные колониальные птицы в Западном Предкавказье // *Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий: Материалы 16-й мужресп. науч.-практ. конф.* Краснодар: 181-187.

Заболотный Н.Л., Хохлов А.Н. 1996. О позднелетней встрече малого баклана на западе Краснодарского края // *Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных и центральных регионов России: Материалы межресп. науч.-практ. конф.* Краснодар: 125.

Заболотный Н.Л., Хохлов А.Н. 1997. Заметки о некоторых птицах низовий Кубани // *Проблемы развития биологии на Северном Кавказе.* Ставрополь, **2**: 56-57.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х. 1991. Результаты авиаобследования поселений колониальных околоводных птиц в долинах Дона и Западного Маныча // *Современные сведения по составу, распространению и экологии птиц Северного Кавказа: Материалы науч.-практ. конф.* Ставрополь: 84-87.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х. 1992. Результаты авиаобследования поселений колониальных околоводных птиц в долинах Дона и Западного Маныча // *Кавказ. орнитол. вестн.* **4**, 1: 104-109.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П. 1986. Колонии голенастых и веслоногих птиц в бассейне Нижнего Дона // *Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учёта животного мира: Тез. докл.* М., **2**: 306-307.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П. 1988. Малый баклан на Северном Кавказе. Колпица на Северном Кавказе. Каравайка на Северном Кавказе // *Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство.* М.: 55-61.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П. 2004. *Птицы Северного Кавказа.* Ростов-на-Дону, **1**: 1-398.

Ковшарь А.Ф., Березовиков Н.Н. 2001. Тенденции изменения границ ареалов птиц в Казахстане во второй половине XX столетия // *Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков.* Казань: 250-270.

Коршиков Л.В. (2000) 2008. Залёт малого баклана *Phalacrocorax pygmaeus* в Оренбуржье // *Рус. орнитол. журн.* **17** (439): 1354.

Красная книга Российской Федерации: Животные. 2000. М.: 1-862.

Красная книга РСФСР: Животные. 1983. М.: 1-454.

Кривенко В.Г. 1983. Малый баклан // *Красная книга РСФСР: Животные.* М.: 160-161.

Кривоносов Г., Васильев В., Худолеев Ф. 1972. Трудная зимовка на Каспии // *Охота и охот. хоз-во* 12: 18019.

Ле Руа Ладюри Э. 1971. *История климата с 1000 года.* Л.: 1-280.

Литвинова Н.А. 2000. Малый баклан // *Красная книга Российской Федерации: Животные.* М.: 376-377.

Мнацеканов Р.А. 2004. Ключевым орнитологическим территориям Краснодарского края – статус ООПТ // *Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюл.* 2 (20): 27-28.

Мнацеканов Р.А., Динкевич М.А. 2001. Малый баклан в Краснодарском крае // *Кавказ. орнитол. вестн.* **13**: 108-111.

Москаленко Ю.А. 2000. Малый баклан в дельте Днепра // *Вестн. зоол.* **34**, 4/5: 114.

Панченко В.А., Балацкий К.Л. 1991. Редкие и исчезающие птицы дельт Дуная, Днестра и прилежащих районов // *Редкие птицы Причерноморья.* Киев; Одесса: 37-53.

Пишванов Ю.В., Хонякина З.П. 1968. Материалы по зимовке и численности пластинчатоклювых птиц в Дагестане // *Вопр. физиол., биохим., зоол. и паразитол.* Махачкала, **3**: 146-154.

Птушенко Е.С. (1915) 2011. К орнитофауне Кубанской области // *Рус. орнитол. журн.* **20** (712): 2469-2471.

Сачок Г.И. 1985. *Сопряжённость колебаний климата в Северном полушарии.* Минск: 1-107.

Свиридова Т.В., Зубакин В.А., Белик В.П. 1996. *Программа «Ключевые орнитологические территории России»: Методические разработки.* М.: 1-40.

Сиденко М.В. 2003. Редкие птицы г. Ростова-на-Дону // *Стрепет* 1: 120-122.

Сиохин В.Д. (ред.) 2000. *Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных угодьях Азово-Черноморского побережья Украины.* Мелитополь; Киев: 1-475.

Скокова Н.Н. 1978. Миграции больших бакланов, гнездящихся в дельте Кубани // *Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии: Гагарообразные – аистообразные.* М.: 86-88.

Скокова Н.Н., Бондарев Д.В. 1978. Миграции больших бакланов дельты Волги // *Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии: Гагарообразные – аистообразные.* М.: 80-86.

Спангенберг Е.П., Туров С.С. 1950. Зимовки птиц в Азербайджане // *Охрана природы* **10**: 88-114.

Стоцкая Е.Э., Кривенко В.Г. 1988. Редкие виды по материалам Всесоюзного учёта колониальных гнездовий околоводных и морских птиц // *Ресурсы редких животных РСФСР, их охрана и воспроизводство.* М.: 39-46.

Судиловская А.М. 1951. Отряд веслоногие Steganopodes или Pelecaniformes // *Птицы Советского Союза.* М., **1**: 13-69.

Хохлов А.Н., Есипенко Л.П., Ильюх М.П., Заболотный Н.Л., Хохлов Н.А. 2004. Малый баклан – новый зимующий вид России // *Современное состояние и проблемы охраны редких и исчезающих видов позвоночных животных Южного федерального округа Российской Федерации.* Ставрополь: 91-92.

Шубин А.О. 1999. Республика Калмыкия // *Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюл.* **10**: 11.

Collar N.J., Crosby M.J., Stattersfield A.J. 1994. *Birds to watch – 2: The World list of threatened birds.* Canbridge: 1-407.

Cowles G.S. 1981. The first evidence of Demoiselle Crane *Anthropoides virgo* and Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmaeus* in Britain // *Bull. Brit. Ornithol. Club* **101**: 383-386.

Heredia B., Rose L., Painter M. (eds.) 1996. *Globally threatened birds in Europe: action plans.* Strasbourg: 1-408.

Korzyukov A., Rusev I. 2003. Wintering of cormorants in NW coast of the Black Sea // *6th Intern. Conf. on Cormorants and 3rd Meeting of Wetland Intern. Cormorant Group.* Odessa: 39-42.

Petrovich Z., Schogolev I., Rudenko A. 2003. Present status of the Pygmy Cormorant *(Phalacrocorax pygmaeus)* in the region of Dnieper delta // *6th Intern. Conf. on Cormorants and 3rd Meeting of Wetland Intern. Cormorant Group.* Odessa: 69-72.

Rusev I.T. 2003a. Status of the Dniester delta cormorants populations // *6th Intern. Conf. on Cormorants and 3rd Meeting of Wetland Intern. Cormorant Group.* Odessa: 75-82.

Rusev I.T. 2003b. Status of the Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmaeus* in Dniester delta // *Пріорітети орнітол. досліджень.* Львів; Кам'янец-Подільський: 167-168.

Zhmud M.E., Zhmud A.M. 2003. Pygmy Cormorant in the Danube delta: dynamics of the numbers and limiting factors // *6th Intern. Conf. on Cormorants and 3rd Meeting of Wetland Intern. Cormorant Group*. Odessa: 98-100.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск ***778****: 1765-1766*

Болотные крачки *Chlidonias* в дельте Волги

Н.Н.Гаврилов, Д.В.Бондарев

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

Прогрессирующее зарастание акватории авандельты Волги плавающей растительностью положительно сказалось на увеличении численности болотных крачек, устраивающих гнёзда на густых сплетениях стеблей и листьев нимфейника, водяного ореха, на образуемых волнами навалах харовых водорослей, роголистника, рдеста гребенчатого и др. Нередко крачки используют для гнездования плавающие листья лотоса.

Chlidonias leucopterus. В низовьях дельты Волги белокрылая крачка весьма обычна на весеннем и осеннем пролёте. В гнездовое время встречается реже. По нашим наблюдениям, белокрылая крачка ежегодно гнездится в Сазаньем култуке Дамчикского участка заповедника, а в 1987 году на Трёхизбинском участке найдена колония из более чем 200 гнёзд. Характерна частая смена мест гнездования и резкие колебания численности по годам. Во время послегнездовых кочёвок образует тысячные скопления. Осенние миграции начинаются в конце июля – начале августа. К концу августа большинство птиц исчезает, отдельные особи встречаются и в сентябре.

Chlidonias hybridus. Белощёкая крачка – многочисленный гнездящийся вид дельты и авандельты Волги. К гнездованию эти крачки приступают только после зарастания ильменей, култуков и авандельты плавающей растительностью, среди которой они располагают свои гнёзда. Птенцы появляются в начале июля, лётные молодые встречаются с первых чисел августа. Послегнездовые кочёвки начинаются в августе, затем они постепенно переходят в не всегда выраженный пролёт. По нашим данным, в авандельте Волги гнездится не менее 7-8 тыс. пар белощёких крачек и около 5 тыс. пар – в култучной и нижней зоне дельты и в западном от дельты ильменно-бугровом районе.

---

* Гаврилов Н.Н., Бондарев Д.В. 1991.Болотные крачки в дельте Волги //*Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф.* Минск, **2**, 1: 133-134.

Chlidonias niger. Чёрная крачка – обычный гнездящийся вид дельты Волги. Птенцы появляются в конце июня – июле. Величина колоний обычно составляет 5-20 гнёзд, иногда до 100. Крупная колония – до 300 гнёзд – обнаружена в 1987 году в авандельте у острова Макаркин. Общая численность чёрных крачек в дельте и авандельте Волги оценивается в 5 тыс. пар. В августе начинается отлёт чёрных крачек к местам зимовок, который заканчивается в 20-х числах сентября. Отдельные особи изредка задерживаются до октября.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск ***778****: 1766-1767*

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus* на европейском Северо-Востоке СССР

А.А.Естафьев

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus* распространён спорадично. Найден гнездящимся на побережье полуострова Канин, Чешской губы, Баренцева моря, на реке Море-Ю, в Большеземельской тундре, в бассейне реки Печоры, на островах в её дельте, на её притоках: Илыче, Большой Сыне, Седью, Северной Мыльве, Цильме (Brown 1877; Банников 1934; Дмоховский 1933; Гладков 1951; Евстафьев 1969, 1981, 1983), в бассейнах рек Вычегды (Андреев, Бианки 1910; наши данные), Лузы и Летки (Плесский 1928; наши данные).

Прилетают в зону тайги раньше: на Лузу 23 мая, на Вычегду 25 апреля – 12 мая, на Печору 5 мая – 22 июня (в среднем за 11 лет 28 мая), позже в зону тундры – в начале июня. Особи северного подвида *H. o. ostralegus* Linnaeus 1758 летят в основном вдоль морского побережья, а материкового подвида *H. o. longipes* Buturlin 1910 – с юга (из бассейна реки Камы). Летом встречаются кочующие одиночные птицы на крупных реках: Печоре, Мезени, Вычегде и Сысоле. Улетают из зоны тайги с середины августа. Одиночные особи встречаются до 4 октября (верхняя Печора, 1985 год, данные А.Б.Бешкарева). В зоне тундры держатся на морском побережье до конца августа.

В зоне тайги кулики-сороки населяют песчаные пляжи, окаймлённые ивами и поросшие редким белокопытником, а также крупные ост-

* Естафьев А.А. 1991.Кулик-сорока на европейском Северо-Востоке СССР //*Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф.* Минск, **2**, 1: 206-207.

рова. Как правило, гнёзда располагаются около мест обитания двустворчатых моллюсков. В зоне тундры занимают песчано-каменистые участки побережья моря, илистые берега рек и острова в дельтах рек, на участках, богатых моллюсками.

Численность кулика-сороки повсеместно низкая: в Большеземельской тундре на реке Море-Ю 0.06-0.07, в бассейне Печоры 0.06-0.18, а на горных её притоках – 0.02, в бассейне Лузы в отдельных местах – до 0.7 особи на 1 км^2.

Районы гнездования используются парами много лет подряд. Гнёзда располагаются открыто, часто у обломков деревьев или у сухих прошлогодних стеблей белокопытника. Диаметр гнездовой ямки до 200 мм, глубина 35 мм; выстилки нет. Яйца откладываются в гнездо каждый день. В завершённой кладке 3 яйца размерами (n = 4) 52.4× 38.3 (50.9-55.0×37.4-39.1) мм. Скорлупа матовая, светло-зелёная с чёрными точками и пятнами чаще округлой формы.

В кладке на реке Луза у села Ношуль 29 мая 1987 было 1 яйцо, 31 мая 1988 – 3 слабо насиженных яйца. В бассейне реки Сысолы у села Иб пару беспокоящихся птиц у выводка видели в начале июля (Андреев, Бианки 1910). На реке Печоре ниже села Усть-Цильма 13 июля 1987 С.К.Кочанов встретил пару куликов-сорок с одним птенцом размером с турухтана. В начале августа 1989 года молодые особи почти не отличались размером от взрослых; вместе они кормились на окраине аэродрома села Усть-Цильма. На морском побережье особи северного подвида начинают размножаться позднее почти на месяц. На полуострове Канин 21 июня в брошенном гнезде было 2 яйца (Банников 1934), у села Койда на побережье Мезенской губы 21 июня в гнезде были 3 слабо насиженных яйца массой 43, 44 и 45 г, у побережья 26 июня встречен выводок из 3 пуховичков (Кузякин, Леонович 1958).

Причин, сдерживающих увеличение численности кулика-сороки, несколько. Основные из них: 1) загрязнение и смена химического состава воды, приводящие к сокращению мест обитания двустворчатых моллюсков; 2) молевой сплав древесины по рекам: при сталкивании осевших на мели брёвен уничтожаются кладки куликов; 3) вытаптывание кладок скотом и беспокойство насиживающих птиц на пляжах.

В связи с этим для сохранения вида в регионе необходимы специальные меры и включение кулика-сороки в региональную Красную книгу.