ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2012
XXI



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

781

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издаётся с 1992 года

Том XXI

Экспресс-выпуск • Express-issue

2012 № 781

СОДЕРЖАНИЕ

1841-1848 Пуночка *Plectrophenax nivalis* в Псковской области. С.А.ФЕТИСОВ

1849-1853 О гнездовой биологии кавказских подвидов снегиря *Pyrrhula pyrrhula* и зяблика *Fringilla coelebs* в Северной Осетии. Н.А.КОМАРОВА, Ю.Е.КОМАРОВ

1853-1856 Новые и редкие виды птиц Орловской области. М.В.ГРАБИЛИНА

1856-1857 Желтобровая овсянка *Emberiza chrysophrys* в Южном Предбайкалье. Ю.В.БОГОРОДСКИЙ

1857 Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* продолжает гнездиться в окрестностях «Леса на Ворскле». Т.П.ДЬЯКОНОВА

1858-1860 Успешность репродуктивного периода у мухоловки-пеструшки *Ficedula hypoleuca* в Ленинградской области. О.П.СМИРНОВ, В.М.ТЮРИН

1860-1861 О гнездовании рябинника *Turdus pilaris* в юго-западном Забайкалье. Э.Н.ЕЛАЕВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2012
Дата опубликования: 14 августа 2012

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXI
Express-issue

2012 № 781

CONTENTS

1841-1848 The snow bunting *Plectrophenax nivalis* in the Pskov Oblast. S.A.FETISOV

1849-1853 Breeding biology of the caucasian subspecies of bullfinch *Pyrrhula pyrrhula* and chaffinch *Fringilla coelebs* in North Ossetia. N.A.KOMAROVA, Yu.E.KOMAROV

1853-1856 New and rare bird species in the Oryol Oblast. M.V.GRABILINA

1856-1857 The yellow-browed bunting *Emberiza chrysophrys* in southern Prebaikalia. Yu.V.BOGORODSKY

1857 The Syrian woodpecker *Dendrocopos syriacus* nesting continues in the vicinity of the natural reserve «Forest on the Vorskla River». T.P.DYAKONOVA

1858-1860 The breeding success and productivity of the pied flycatcher *Ficedula hypoleuca* in the Leningrad Oblast. O.P.SMIRNOV, V.M.TYURIN

1860-1861 On breeding of the fieldfare *Turdus pilaris* in south-western Transbaikalia. E.N.ELAEV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St.-Petersburg University
St.-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2012

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **781**: 1841-1848*

Пуночка *Plectrophenax nivalis* в Псковской области

С.А.Фетисов

*Второе издание. Первая публикация в 2008**

Как гнездящаяся птица, пуночка *Plectrophenax nivalis* встречается в тундрах Нового и Старого Света и на островах Ледовитого океана, но зимой она откочёвывает с мест своего гнездовья к югу, причём в суровые зимы – вплоть до центральных частей Европы и даже южнее, хотя места регулярных зимовок представителей подвида *P. n. nivalis* (Linnaeus, 1758) в пределах европейской части России начинаются уже в южных частях Калужской, Рязанской, Тульской и Горьковской областей (Дементьев 1954; Иванов 1976; Гринвуд 2003; и др.).

На долготе Псковской области регулярные зимовки пуночек расположены южнее, за пределами области. Они начинаются на широте, соответствующей примерно средней или даже южной части Белоруссии (Никифоров 1990; Никифоров и др. 1997; и др.). Таким образом, на территории Псковской области пуночку следует считать пролётным видом. Однако в региональной орнитологической литературе по этому поводу существуют и другие точки зрения. При этом формулировки характера пребывания пуночки даже у одних и тех же авторов иногда существенно различаются. В результате статус данного вида в Псковской области до сих пор не имеет общепринятого точного определения.

На территории в границах современной Псковской области пуночка известна давно. Ещё в конце XIX века И.А.Порчинский (1872) писал, что эта птица была весьма обычна в Гдовском уезде, входившем тогда в Санкт-Петербургскую губернию. Е.А.Бихнер (1884) считал пуночку сугубо пролётным видом, но К.М.Дерюгин (1897) утверждал, что она зимует в «открытой местности» Псковского уезда.

В начале XX века Н.А.Зарудный (1910) неоднократно наблюдал пуночку в Псковском и Порховском уездах не только во время пролёта, но и в зимний период. После этого сложилось устойчивое мнение о том, что пуночка – обычный пролётный, зимующий вид Псковской губернии. Его продолжали разделять после Зарудного П.В.Нестеров и Я.Н.Никандров (1913б), а В.Л.Бианки (1922) считал пуночку обычным пролётным и редким зимующим видом всего Северо-Запада России. Пролётным и зимующим видом пуночку считают и на сопредельных

* Фетисов С.А. 2008. Пуночка *Plectrophenax nivalis* в Псковской области // *Природа Псковского края* **26**: 36-43.

с Псковской областью территориях: в Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983), Эстонии (Rootsmae 1994), Латвии (Петриньш 1983) и Белоруссии (Никифоров и др. 1997).

Тем не менее, сложившееся в начале XX века мнение о статусе пуночки на территории Псковской губернии (области) начало претерпевать не только уточнения, но и изменения по сути. Следуя хронологическому порядку, для изменения и уточнения статуса пуночки были выдвинуты следующие определения. Сначала С.М.Чистовский (1927а, б), довольно часто наблюдавший пуночку в течение всей зимы в Псковском и Порховском уездах*, назвал её кочующим видом. Потом, основываясь на результатах наблюдений преимущественно за осенним пролётом птиц на восточном побережье Псковско-Чудского озера, М.М.Мешков (1960) определил характер пребывания пуночки как пролётного инвазионного вида. Позднее было уточнено, что пуночка – малочисленный, изредка мигрирующий инвазионный вид Псковской области (Мешков и др. 1976). По содержанию от этой характеристики практически ничем не отличаются и более поздние формулировки Л.П.Урядовой (1978, 1986), свидетельствующие о том, что пуночка – пролётный инвазионный, малочисленный на пролёте в области вид.

В 1990-х годах статус пуночки в Псковской области ещё раз резко изменился. Л.П.Урядова и Л.С.Щеблыкина (1993) предложили считать её обычным пролётным видом. Правда, вскоре появилось их же сообщение (Урядова, Щеблыкина 1997) о том, что в 1990-х годах пуночка исчезла из потока осенних мигрантов на восточном побережье Псковско-Чудского озера. Наряду с этим, в Себежском Поозерье, включая территорию национального парка «Себежский», пуночка была охарактеризована как пролётный, зимующий вид (Фетисов и др. 2000, 2002), каковым его считали в губернии ещё в начале XX века.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, автор попытался собрать воедино и проанализировать весь известный ему материал по экологии этого вида на территории нынешней Псковской области, а также сравнить его с аналогичным материалом по сопредельным территориям – Ленинградской области, Эстонии, Латвии и Белоруссии†.

Осенний пролёт

О сроках появления первых пуночек в Псковской области осенью мы можем судить в основном по сведениям, полученным в окрестностях Пскова, чаще всего на восточном берегу Псковско-Чудского озера (в районе деревень Мтеж, Осотно, Пнево и др.), в том числе в дельте

* По данным П.Е.Васильковского (1928), в те же годы пуночка появлялась зимой также в Себежском и Невельском уездах Псковской губернии.

† По пограничным с Псковской областью территориям Новгородской, Тверской и Смоленской областей материал, к сожалению, оказался фрагментарен или недоступен для автора.

реки Великой. Именно эти места фигурируют в качестве постоянных стационаров в обзорных работах, где приводятся детальные списки осенних мигрантов (Зарудный 1910; Нестеров, Никандров 1913а,б, 1914, 1915; Мешков 1960, 1961, 1963, 1978; Урядова 1986; Урядова и др. 1999; Борисов 2003; и др.). Другие места наблюдений за пролётом пуночек совершенно случайны.

В конце XIX – начале XX века пуночки появлялись в окрестностях Пскова в последних числах сентября – начале октября* (Зарудный 1910), иногда немного позднее – в частности, 6 октября 1912, 12 октября 1913, 12 октября 1914 (Нестеров, Никандров 1913а, 1914, 1915). Массовый пролёт пуночек в дельте Великой наблюдали 19 октября 1913 и 18 октября 1914† (Нестеров, Никандров 1914, 1915).

В 1960-1970-х годах пролёт пуночек в тех же местах наблюдали в октябре (Мешков 1975), а иногда уже в конце сентября (Урядова 1986). Например, в 1958 году две пуночки были отмечены на наблюдательном пункте возле деревни Пнево 21 сентября (Вероман 1961). По данным Л.П.Урядовой (1978, 1986), пик пролёта пуночек на восточном берегу Псковско-Чудского озера приходится на вторую декаду октября; при этом пролёт бывает растянут на 2-3 недели.

Начало осеннего пролёта пуночек в Псковской области хорошо согласуется с результатами, полученными орнитологами на сопредельных территориях. Так, в Приладожье, на Ладожском орнитологическом стационаре и его окрестностях (Носков и др. 1981), а также в других местах Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983) осенняя миграция пуночек проходит с первой декады октября до конца ноября. На широтах северной части области, в Эстонии, первые птицы появлялись в 1977-1986 годах с 13 октября по 6 ноября, в среднем 21 октября (Rootsmae 1994). На широтах юга области, в Латвии, первых пуночек наблюдали в середине октября (Петриньш 1983).

Вне наблюдательных пунктов пуночек отмечали в период осеннего пролёта в Островском, Псковском, Печорском и Себежском районах. 21 и 22 октября 2006 одиночных птиц и стайки из 3-5 пуночек, кормившихся на дороге между озёрами Белое и Озерявы в национальном парке «Себежский», видели (независимо друг от друга) Лейф Андерссон, С.А.Фетисов и И.В.Цветкова. 11 ноября 2005, по данным С.А.Фетисова, 2 пуночки кормились возле бывшей фермы в деревне Осыно Себежского района. 14 ноября 1994 И.Г.Милевский и С.А.Фетисов подобрали одну пуночку на обочине шоссе неподалёку от Острова; скорее

* Все даты приводятся дословно, т.е. в данном случае – по старому стилю.

† В 1875 году большая стая пуночек была замечена в середине октября в Торопецком уезде Псковской губернии (ныне Торопецкий район Тверской области), но этот факт был расценён Г.Эсауловым (1878), как раннее появление пуночек, вызванное сильными холодами, наступившими после их прилёта и державшимися до января 1876 года.

всего, она была сбита машиной. Кроме того, возможно, последние в сезоне стайки пролётных пуночек удалось зарегистрировать во второй половине ноября: 18 ноября 1927 – под Псковом (Чистовский 1929), несколько встреч с 16 по 21 ноября 1994 – в Себежском Поозерье (Фетисов и др. 2002), 28 ноября 1961 – в Печорском районе (Бардин 2000, 2002). Наиболее многочисленным в Себежском Поозерье этот вид был в 1994 году, когда в окрестностях Осыно – возле фермы, силосных ям и на окраине деревни – неоднократно встречали стаи, насчитывавших более 30 пуночек.

По данным М.М.Мешкова и других псковских орнитологов, проводивших регулярные наблюдения за осенним пролётом птиц с 16 сентября по 15 октября на побережье Псковско-Чудского озера, пуночки появлялись там в указанные сроки далеко не каждый год. В отдельные годы они летели весьма интенсивно в разных местах. Так, за 7 дней наблюдений осенью 1955 года в Раскопельской бухте, на юго-восточном берегу Чудского озера, было зарегистрировано 556 пролётных особей (Мешков 1961). В другие годы пуночки были довольно редки или даже отсутствовали. Например, с 15 сентября по 15 октября через наблюдательные пункты, расположенные возле деревень Мтеж, Осотно и Пнево, пролетело: в 1959 году – 62 особи, в 1960 – 54, в 1961 – 1, в 1962 – 50, в 1964 – 20, в 1965 – 0, в 1966 – 3, в 1967 – 1, в 1968-1973 – 0, в 1974 – 400, в 1975году – 0 птиц (Мешков 1960, 1961, 1963, 1978; Мешков и др. 1976).

Зимовка

По данным Н.А.Зарудного (1910), пуночка зимовала в наиболее северных – Псковском и Порховском – уездах Псковской губернии. Правда, в зимний период она была там сравнительно редка и только в зимы 1893/94 и 1899/1900 годов была обычна. Помимо того, как сообщал Г.Эсаулов (1878), она появлялась зимой вдоль проезжих дорог на границе современных Псковской и Тверской областей.

Современные же сведения о зимовках пуночки на территории Псковской области, к сожалению, практически отсутствуют. Это может быть связано с двумя причинами: во-первых, в области почти не проводятся зимние орнитологические исследования; во-вторых, зимовки пуночек в Псковской области, по-видимому, действительно стали редкостью. Это, в частности, подтверждает и то обстоятельство, что даже в Белоруссии, где в последние годы интенсивно работают орнитологи и функционирует Белорусская орнитофаунистическая комиссия, пуночка была включена в «Обзор сообщений о наиболее редких находках за 1990-1999 гг.» (Никифоров 2001). Одной из причин общего сокращения численности пуночек на зимовках в последние десятилетия латвийский орнитологи считают резкое сокращение использования гужевого

транспорта (Петриньш 1983). Тем не менее, в 1980-х годах пуночка встречалась зимой в Себежском Поозерье, хотя и в небольшом числе и не каждый год (Фетисов и др. 2002). 29 февраля 1996 две пуночки наблюдались в окрестностях села Подберезье в Псковском районе (Фетисов, Ильинский, Пчелинцев 1998). Ещё три пуночки отмечены мной 18 января 2007 на полях близ Киевского шоссе неподалёку от Опочки. В данном случае важна даже не частота встреч пуночек в зимний период, а тот факт, что пуночки в принципе могут зимовать на территории Псковской области.

О возможности зимовки пуночки в Псковской области свидетельствуют и литературные данные о её зимовке в настоящее время на соседних территориях, причём не только в Белоруссии (Никифоров 1990; Никифоров и др. 1997), где пуночка была раньше иногда даже обычна зимой (Федюшин 1926), но и севернее. В Латвии, например, некоторые пролётные стаи пуночек численностью в 5-15 особей могут оставаться на зимовку и кормиться на дорогах, а в местах, обильных кормом, образовывать небольшие скопления (Петриньш 1983). В Эстонии зимовки пуночки считаются редкостью, но и там зимой встречаются стайки, насчитывающие до 10 птиц (Rootsmae 1994). Более того, случаи регулярной зимовки пуночек известны даже для Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983). Чаще всего пуночки остаются зимовать в мягкие малоснежные зимы. Помимо дорог и полей, они нередко кормятся зимой по побережьям водоёмов и на окраинах сельских населённых пунктов, в первую очередь возле скотных дворов и на местах содержания домашней птицы.

Весенний пролёт

Весенний пролёт пуночек в Псковской области изучен гораздо хуже, чем осенний. По данным Н.А.Зарудного (1910), он начинается в начале марта, и в некоторые годы в конце марта пуночки становятся уже редкими. В другие годы интенсивный пролёт наблюдали в третьей декаде марта – первой декаде апреля, а на полях около дельты реки Великой одиночные пуночки и их маленькие стайки пролетали к северу даже в начале третьей декады апреля. В 1902 году отлёт пуночек в окрестностях Пскова был отмечен 10 марта, в 1905 – 21 марта, в 1913 – 9 марта, в 1914 – 22 марта. (Нестеров, Никандров 1913б, 1914, 1915). В 1913 году массовый пролёт продолжался две недели.

По другим данным, весенний пролёт пуночек начинается и протекает в марте (Чистовский 1927а,б; Мешков 1975) или даже в феврале-марте (Урядова 1978, 1986). 20 марта 1974 пролётные стайки пуночек удалось встретить в Печорском районе (Бардин 2000, 2002). 21 марта 1996 одну пуночку наблюдали возле шоссе на участке Середка – Усадище в Псковском районе (Фетисов, Ильинский, Пчелинцев 1998). Для

сравнения укажем, что в Эстонии весенний пролёт пуночек начинается в конце марта – начале апреля и заканчивается в конце апреля. Последних птиц наблюдали в 1977-1986 годах с 7 апреля до 11 мая, в среднем 22 апреля (Rootsmae 1994). В Ленинградской области начало движения пуночек к северу отмечено в первой-второй декадах марта, но интенсивный пролёт начинается обычно лишь в конце марта и, постепенно затухая, продолжается до конца второй декады апреля (Носков и др. 1981; Мальчевский, Пукинский 1983).

В заключение хочется ещё раз сформулировать статус пуночки на территории Псковской области в последние десятилетия, хотя для этого, конечно, пока явно не хватает фактического материала. Остаются слабо изученными очень многие вопросы, касающиеся экологии вида в регионе, в частности, о начале и продолжительности весеннего и осеннего пролётов, времени и местах зимовки (хотя сам факт зимовки, кажется, бесспорен), возможной численности пуночек в области в разные периоды годового цикла, регулярности их сезонных миграций и т.д. Поэтому, исходя из имеющегося материала, автор предлагает считать пуночку редким и нерегулярно пролётным, очень редким и нерегулярно зимующим видом Псковской области.

Литература

Бардин А.В. 2000. *Инвентаризация орнитофауны Печорского района для составления видового кадастра птиц и формирования кадастра ООПТ Псковской области*. Отчёт по дог. № 510 между Комит. природ. ресурсов по Псковской обл. и Балтийским фондом природы. СПб.: 1-69. (Рукопись).

Бардин А.В. 2002. Видовой список птиц Печорского района Псковской области // *Обзор состояния окружающей природной среды Псковской области за 2000 год*. Псков: 71-77.

Бианки В.Л. (1918-1922) 1922. Распространение птиц в северо-западной части Европейской России // *Ежегодн. Зоол. музея Рос. Акад. наук* **23**, 2: 97-128.

Бихнер Е.А. 1884. Птицы С.-Петербургской губернии: Материалы, литература и критика // *Тр. С.-Петербург. общ-ва естествоиспыт*. **14**, 2: 359-624.

Борисов В.В. 2003. Орнитофауна // *Экологический мониторинг дельты реки Великой. Ч. 1*. Псков: 105-116.

Васильковский П.Е. 1928. Фауна Ленинградской области // *Природа и население Ленинградской области. Справочная книга по краеведению*. М.; Л.: 83-119.

Вероман Х. 1961. Об осенней миграции птиц на восточном берегу Чудского озера в 1958 году // *Ornitol. Kogumik* **2**: 114-129.

Гринвуд Д.Д.Д. 2003. Пуночка *Plectrophenax nivalis* (L.) // *Атлас гнездящихся птиц Европы Европейского совета по учётам птиц*. М.: 318-319.

Дементьев Г.П. 1954. Семейство Овсянковые Emberizidae // *Птицы Советского Союза*. М., **5**: 374-512.

Дерюгин К.М. 1897. Орнитологические исследования в Псковской губернии // *Тр. С.-Петербург. общ-ва естествоиспыт*. Отд. зоол. и физиол. **27**, 3: 17-38.

Зарудный Н.А. 1910. Птицы Псковской губернии // *Зап. Импер. Акад. наук по физ.-мат. отд.* Сер. 8. **25**, 2: 1-181.

Иванов А.И. 1976. *Каталог птиц СССР*. Л.: 1-276.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **2**: 1-504.

Мешков М.М. 1960. Осенние пролёты воробьиных птиц в районе Псковско-Чудского озера // *Тез. докл. 4-й Прибалт. орнитол. конф*. Рига: 68-69.

Мешков М.М. 1961. Осенний пролёт воробьиных птиц в районе Псковско-Чудского водоёма // *Экология и миграции птиц Прибалтики*. Рига: 199-206.

Мешков М.М. 1963. Осенний пролёт птиц в 1959-1961 гг. на восточном побережье Псковского озера // *Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц* **2**: 43-58.

Мешков М.М. 1975. Овсянка // *Газ. «Псковская правда»*. 15 марта 1975 г. № 62 (15127): 4.

Мешков М.М. 1978. Псковско-Чудской микрорайон на Беломорско-Балтийской пролетной трассе // *Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц* **11**: 3-11.

Мешков М.М., Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С., Быкова Л.М. 1976. Инвазионные виды птиц на территории Псковской области // *Материалы 9-й Прибалт. орнитол. конф*. Вильнюс: 152-156.

Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1913а. Материалы к авифенологии окрестностей г. Пскова (1912 г.) // *Птицевед. и птицеводство* **4**. 4: 294-299.

Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1913б. Прилёт, пролёт и гнездование птиц в окрестностях г. Пскова // *Ежегодн. Зоол. музея Импер. Акад. наук* **18**, 1: 102-124.

Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1914. Материалы к авифенологии окрестностей г. Пскова (1913 г.) // *Птицевед. и птицеводство* **5**, 1: 27-39.

Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1915. Материалы к авифенологии окрестностей г. Пскова (1914 г.) // *Птицевед. и птицеводство* **6**, 1: 38-48.

Никандров Я.Н. 1913. Орнитофенологические наблюдения. Весна 1913 года. 14. Погост Корлы, Логазовской волости, Псковского уезда, на берегу Псковского (Талабского) озера, близ устья реки Великой // *Орнитол. вестн.* **4**, 4: 333-338.

Никифоров М.Е. 1990. Полный список птиц фауны Белоруссии (1990 г.) // *Охраняемые животные Белоруссии*. Минск, **2**: 4-14.

Никифоров М.Е. 2001. Белорусская орнито-фаунистическая комиссия: обзор сообщений о наиболее редких находках за 1990-1999 гг. // *Subbuteo* **4**, 1: 25-40.

Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тишечкин А.К. 1997. *Птицы Беларуси на рубеже XXI века: Статус, численность, распространение*. Минск: 1-188.

Носков Г.А., Зимин В.Б., Резвый С.П., Рымкевич Т.А., Лапшин Н.В., Головань В.И. 1981. Птицы Ладожского орнитологического стационара и его окрестностей // *Экология птиц Приладожья*. Л.: 3-86.

Петриньш А. 1983. Пуночка *Plectrophenax nivalis* (L.) // *Птицы Латвии: Территориальное размещение и численность*. Рига: 191.

Порчинский И.А. 1872. О фауне позвоночных Гдовского уезда, Петербургской губернии // *Тр. С.-Петербург. общ-ва естествоиспыт*. **3**: 371-402.

Урядова Л.П. 1978. Некоторые особенности миграций вьюрковых и овсянковых в Псковско-Чудском микрорайоне // *Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц* **11**: 12-23.

Урядова Л.П. 1986. *Сравнительная биология вьюрковых и овсянковых птиц Северо-Запада европейской части СССР*. Автореф. дис. … канд биол. наук. М.: 1-16.

Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. 1993. Наземные позвоночные животные Псковской области // *Краеведение и охрана природы*. Псков: 137-144.

Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. 1997. Сезонные изменения видового разнообразия и численности птиц на восточном побережье Псковско-Чудского озера // *Охрана окружающей среды и устойчивое развитие в водосборном бассейне Псковско-Чудского озера. Материалы регион. эколог. науч.-практ. конф.* Тарту: 47-49.

Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С., Борисов В.В. 1999. Видовой состав наземных позвоночных животных водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозерная низменность» // *Проблемы и перспективы сбалансированного развития в бассейне Псковско-Чудского озера: Материалы международ. общ.-науч. конф. Ч. 2. Статьи*. Псков: 147-155.

Федюшин А.В. 1926. Материалы к изучению птиц Белоруссии: О птицах Витебщины // *Бюл. МОИП*. Нов. сер. Отд. биол. **35**, 1/2: 112-168.

Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2000. Видовой состав и статус птиц Себежского Поозерья и национального парка «Себежский» // *Социальные и экологические проблемы Балтийского региона: Материалы общ.-науч. конф.: Докл. и тез*. Псков: 146-155.

Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2002. *Птицы Себежского Поозерья и национального парка «Себежский»*. СПб., **1**: 1-152, **2**: 1-128 (Тр. С.-Петербург. общ-ва естествоиспыт. Сер. 6. Т. 3).

Фетисов С.А., Ильинский И.В., Пчелинцев В.Г. 1998. Материалы к зимней орнитофауне Псковской области на границе южной тайги и хвойно-широколиственной зоны // *Проблемы сохранения биоразнообразия Псковской области*. СПб.: 101-110. (Тр. С.-Петербург. общ-ва естествоиспыт. Сер. 6. Т. 1).

Чистовский С.М. 1927а. Птицы Псковской губернии // *Познай свой край: Сб. Псков. общ-ва краеведения* **3**: 82-101.

Чистовский С.М. 19276. *Птицы Псковской губернии. («Каталог птиц Псковского краеведческого естественно-научного музея» и «Промысловая или охотничья дичь Псковской губернии»)*. Псков: 1-22.

Чистовский С.М. 1929. Фенологические наблюдения за 1927 г. по Псковскому округу // *Познай свой край: Сб. Псков. общ-ва краеведения* **4**: 112-119.

Эсаулов Г. 1878. Список позвоночных животных, водящихся и встречающихся в Торопецком и Холмском уездах Псковской губернии // *Тр. С.-Петербург. общ-ва естествоиспыт*. **9**: 223-240.

Rootsmae L. 1994. Snow Bunting *Plectrophenax nivalis* (L.) // *Birds of Estonia: Status, Distribution and Numbers*. Tallinn: 241-242.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **781**: 1849-1853*

О гнездовой биологии кавказских подвидов снегиря *Pyrrhula pyrrhula* и зяблика *Fringilla coelebs* в Северной Осетии

Н.А.Комарова, Ю.Е.Комаров

*Второе издание. Первая публикация в 1990**

Материалы собраны в горной части Северной Осетии в 1976-1988 годах. Хотя оба и зяблик, и снегирь относятся к обычным гнездящимся птицам горной фауны, многие вопросы их биологии до сих пор не рассмотрены. Некоторые сведения по гнездовой биологии этих видов для Кабардино-Балкарии имеются в работе Х.Т.Моламусова (1967), а также В.М. Поливанова и Н.Н.Поливановой (1986) для района Тебердинского заповедника (Ставропольский край).

Снегирь *Pyrrhula pyrrhula rossikowi* Deryugin et Bianchi, 1900

В гнездовое время населяет в Осетии сосново-лиственные, сосновые и ольховые леса. Гнездовая плотность в сосняках Пейского хребта составляет 13-18 ос./км^2, в сосново-лиственных лесах Кальперского хребта 25-31 ос./км^2, в ольшанике Суадагского ущелья – 7-9 ос./км^2.

Снегири начинают активно петь с первой декады марта (8 марта 1978, 10 марта 1980, 12 марта 1984). В конце апреля найдены гнёзда в самом начале строительства (22 апреля 1982, 24 апреля 1986), но основная масса птиц начинает строить гнёзда с середины первой декады мая (6 мая 1976, 11 мая 1985, 12 мая 1985, 15 мая 1981). Строящиеся гнёзда найдены 12 июня 1984 и 12 июля 1984.

Из 10 найденных гнёзд 90% располагались на можжевельнике (у ствола на двух боковых ветках) и 10% – на ветвях сосен. Все гнёзда найдены в Цейском ущелье на высоте от 1350 до 1800 м н.у.м. и располагались на лесных полянах. Гнёзда представляют собой довольно рыхлые постройки, внешний слой которых состоит из тонких веточек барбариса, можжевельника. Лоток выстилается более плотно тонкими корешками, иногда с примесью волоса. Размеры гнёзд и их масса приведены в таблице 1. Гнёзда располагались на высоте от 0.5 до 1.6 м от земли, в среднем – на высоте 1.1 м (n = 10). Гнёзда сооружается за три (2 гнезда) или четыре (8 гнёзд) дня. В основном строит самка, самец её только сопровождает в полётах за строительным материалом.

---

* Комарова Н.А., Комаров Ю.Е. 1990. О гнездовой биологии кавказских подвидов снегиря и зяблика // *Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа*. Ставрополь: 63-69.

Таблица 1. Размеры (мм) и масса (г) гнёзд и яиц снегиря *Pyrrhula pyrrhula rossikowi*

Параметры	*n*	Среднее ± *S.E.*	lim
Длина яйца	26	20.2±0.2	18.8-22.3
Ширина яйца	26	14.7±0.06	14.0-15.3
Отношение длины яйца к ширине	25	1.37±0.01	1.26-1.49
Диаметр гнезда	5	98.8	89-115
Диаметр лотка	5	64.6	55-80
Глубина гнезда	5	37.0	31-45
Высота гнезда	5	54.0	51-58
Толщина стенок гнезда	12	12.3	7.4-18.0
Общая масса гнезда	5	12.248	9.12-15.4
Масса 1-го слоя	5	7.922	6.25-10.2
Масса 2-го слоя	5	2.924	1.9-4.12
Масса 3-го слоя	5	1.19	0.75-1.6

Таблица 2. Показатели роста птенцов снегиря *Pyrrhula pyrrhula rossikowi* (длина в миллиметрах, масса в граммах)

Параметры	Дни жизни птенцов					
	2	4	6	9	11	13
Длина клюва (от ноздри)	2.4-2.5	2.9-3.1	3.6-4.0	4.7-5.0	5.5-5.7	5.5-6.2
Длина цевки	6.5-7.0	8.4-8.9	11.1-11.6	15.2-16.3	17.3-17.8	17.0-18.3
Длина тела	39-40	49-52	60.65	69-76	78-83	80-85
Длина хвоста	—	—	—	1.9-2.9	7.3-8.3	14.5-16.0
Длина крыла	—	—	—	24.7-27.0	38.0-38.8	45.8-48.9
Длина 5-го махового	—	—	1.5-2.5	11.5-13.5	21.7-23.6	33.4-37.0
Масса тела	3.02-3.15	4.9-5.3	8.4-9.8	13.15-14.7	16.9-19.5	19.1-21.4

Начало кладки отмечено с конца апреля (26 апреля 1982, 28 апреля 1986), а также 10 мая 1976, 19 мая 1981, 15 мая 1985, 17 мая 1985, 16 июня 1984 и 17 июля 1984. Полные кладки (n = 9) содержат в среднем 4 яйца: в 1 гнезде было 3 яйца, в 1 – 5, в 7 – 4 яйца. Размеры яиц приведены в таблице 1. Длина яиц варьирует больше, чем ширина (коэффициент вариации, соответственно, 4.9 и 2.1%).

Самка начинает насиживать с откладки последнего яйца (n = 9). Птенцы вылупляются на 14-й день после завершения кладки. Вылупление наблюдалось 14 мая 1982, 14 мая 1986, 1 июня 1985, 4 июня 1985, 8 июня 1981, 25 мая 1976, 4 июля 1984, 2 августа 1984. У птенцов серый пух на надглазничной птерилии, венчиком по голове (длиной 9.5 мм), на плечах, спине (10.5 мм), локтях (8.5 мм), крестце. Клювные валики желтовато-белые, зев розовый, по бокам с фиолетовым отливом. Слуховые проходы птенцов открываются на 5-е сут. В 4-дневном

возрасте появляются пеньки на голове, спине, крыльях, а в возрасте 9 сут раскрываются кисточки на маховых. Изменение размеров и массы птенцов с возрастом представлены в таблице 2.

2 июня 1976 проведено наблюдение поведением снегирей у гнезда с 7-суточными птенцами. За 13 ч (с 6 ч 00 мин до 19 ч 00 мин) родители прилетали с кормом 42 раза (самка – 23, самец – 19). У гнезда птицы обычно появляются парой и за прилёт кормят сразу всех птенцов. В гнезде проводят 1-3 мин. За кормом улетают на 100-150 м от гнезда. В течение 13 ч наблюдений самка 58 мин (по 5-25 мин) обогревала птенцов. 22 раза родители удаляли фекальные капсулы. Самка обычно проглатывала капсулы помёта птенцов не сходя с гнезда, а самец уносил их и бросал в 10 м от гнезда.

В гнезде птенцы находятся 15 (1 гнездо) или 16 (7 гнёзд) суток. Вылет отмечен 30 мая 1982, 30 мая 1986, 11 июня 1976, 17 июня 1985, 20 июня 1985, 23 июня 1981, 19 июля 1984 и 17 августа 1984. Вылетевшие птенцы 1, реже 2 суток держатся рядом с гнездом, после чего начинают перемещаться по кормовому участку родителей. Неразбившиеся выводки, которых ещё кормили взрослые птицы, были встречены: в Цейском ущелье – 16 и 23 июня 1976; в ущелье Гуркумта (в сосняке) – 21 июля 1976; в буковом лесу в городе Алагир – 4 июля 1985; в ольшанике Суадагского ущелья – 28 августа 1985 и 21 июня 1988. В последнем случае два самца сопровождали одного слётка.

Эффективность размножения (по судьбе 10 гнёзд) составила 72.5%. Из 40 отложенных яиц вывелось 30 птенцов, а вылетело 29. Хищниками разорены 2 гнезда (6 яиц), в 1 гнезде было 3 неоплодотворённых яйца, 1 яйцо было разбито при проверке, 1 птенец затоптан в гнезде.

Зяблик *Fringilla coelebs caucasica* Serebrowski, 1925

Один из многочисленных видов исследуемой территории. Гнездится во всех лесных биотопах. Гнездовая плотность в сосняках южного склона Цейского хребта составляет 120-173 ос./км^2, в субальпийском березняке Адийкомского ущелья – 52 ос./км^2, в ольшанике Суадагского ущелья – 107 ос./км$_2$. Материалы по гнездованию приводятся только для широколиственных лесов Лесистого хребта (640-1107 м н.у.м.).

Первые песни в окрестностях Алагира слышны с начала второй декады февраля (24 февраля 1982, 24 февраля 1985, 22 февраля 1987). Гнёзда в разных стадиях строительства встречаются с конца первой декады апреля (8 апреля 1985), но большинство пар приступает с постройке гнёзд со второй декады апреля (20 апреля 1986, 26 апреля 1985, 22 апреля 1989). Строящиеся гнёзда можно находить до второй декады июня.

Гнёзда зяблики устраивают на ольхе – 23 случая (56%), бузине – 6 (16%), лещине – 3 (8%), иве, буке и каштане – по 2 (5%), вязе и дикой

яблоне – по 1 (3%). Высота расположения гнёзд варьирует от 1 до 9 м, но чаще всего зяблики устраивают их в пределах 1-3 м. В интервале высот 1-2 м было устроено 43% гнёзд, 2-3 м – 30%, 3-4 м – 15%, 4-5 м – 5%, 5-6 м – 2.5%, 8-9 м – 5%.

Основным материалом для внешнего (1-го) слоя гнезда служит мох с примесью лыка, травинок. В отдельных гнёздах встречаются вкрапления кусочков бумаги, ваты, целлофана и рыболовной лески. Лоток (3-й слой) выстилается в основном перьями и волосом, но иногда и небольшими стебельками злаков. Размеры и масса гнёзд приведены в таблице 3.

Таблица 3. Размеры (мм) и масса (г) гнёзд и яиц зяблика *Fringilla coelebs caucasica*

Параметры	*n*	Среднее ± *S.E.*	*CV*	lim
Длина яйца	52	19.0±0.12	4.4	16.6-20.5
Ширина яйца	52	14.3±0.17	8.6	13.4-15.3
Отношение длины яйца к ширине	30	1.32±0.01	3.8	1.9-1.45
Масса яйца	3	1.970	—	1.89-2.08
Диаметр гнезда	20	93.6±1.3	6.3	84-100
Диаметр лотка	20	55.3±0.93	7.6	47-65
Глубина гнезда	20	44.9±1.16	11.6	36-57
Высота гнезда	20	71.2±3.5	22.2	50-109
Толщина стенок гнезда	22	10.8	—	6.2-27.6
Общая масса гнезда	14	12.925	—	8.1-21.6
Масса 1-го слоя	13	6.082	—	3.15-10.45
Масса 2-го слоя	11	4.765	—	2.3-8.2
Масса 3-го слоя	11	2.877	—	1.05-5-80

Строительство гнезда занимает 4-6 дней: 4 дня – 5 случаев, 5 дней – 2, 6 дней – 2. Первое яйцо появляется через день (3 случая) или два (6 случаев) после завершения строительства. Ещё в одном гнезде кладка началась через 6 дней окончания постройки. Полностью построенные гнёзда находили 15 апреля 1982, 20 июня 1985, 9 июня 1986, 7 июня 1987, 15 апреля 1988, 26 апреля 1989. Откладка первого яйца кладки наблюдалась 17 апреля 1982, 22 июня 1985, 10 июня 1985, 18 апреля 1986, 8 июня 1987, 17 апреля 1988, 26 апреля 1989. Яйца откладываются каждый день. Насиживает только самка. Насиживание начинается со второго яйца при кладке в 4 яйца и с третьего – при кладке в 5 яиц. Найденные 24 гнезда с полными кладками содержали: 3 яйца – 9 гнёзд, 4 яйца – 3, 5 яиц – 7 гнёзд. Размеры и масса яиц приведены в таблице 3.

Насиживание длится 14-15 сут. 19 июня 1987 проведено наблюдение за гнездом на 8-е сут насиживания. За 14 ч (с 5 ч 00 мин до 19 ч 00 мин) самка насиживала 537 мин, или 64% времени. Сеансы насиживания

длились от 1 до 83 мин, в среднем 23 мин за 1 ч. За 14 ч наблюдения самка оставляла кладку 23 раза. Суммарное время отсутствия самки на гнезде составило 290 мин. Отлучки длились от 3 до 25 мин, в среднем 13 мин за 1 ч.

Вылупление птенцов отмечено 5 мая 1982, 6 июля 1985, 5 мая 1986, 2 июня 1987, 17 мая 1988. Птенцы находились в гнёздах 13 (1 случай), 14 (4 случая) и 15 сут (5 случаев). Вылет наблюдался 19 мая 1982, 19 июля 1985, 19 мая 1986, 1 июня 1986, 17 июня 1987, 14 мая 1989. Масса отловленных 18 августа 1979 в Цейском ущелье (1460 м н.у.м.) двух молодых самцов зяблика составила 23.0 и 25.3, в среднем 23.86 г, трёх молодых самок – 21.32 г (от 20.0 г до 22.4 г).

Из 97 яиц в 26 гнёздах, находившихся под наблюдением, вывелось 65 птенцов (67%), вылетело из гнёзд 57 птенцов. Эффективность размножения составила 58.8%. От хищников и неблагоприятных погодных условий погибло 32 яйца (33%). 8 птенцов похитили хищники.

При паразитологическом обследовании 3 гнёзд зяблика обнаружен один вид блохи – *Dasypsyllus gallinulae* (Dale, 1878).

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **781**: 1853-1856*

Новые и редкие виды птиц Орловской области

М.В.Грабилина

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

В ходе исследования орнитофауны Орловской области (в современных границах) с 1974 года выявлены 4 новых вида и для 5 видов птиц впервые отмечено гнездование. Кроме того, для ряда других видов удалось уточнить распространение.

Botaurus stellaris. Большая выпь отмечена на гнездовании 26 июня 1984 на торфяных картах близ села Красное Залегощенского района. 7 мая 1986 наблюдали брачное поведение самца на торфяных картах близ посёлка Жудрё Хотынецкого района. Пара выпей постоянно гнездится в Троснянском районе в окрестностях села Высокое.

Ixobrychus minutus. Единичные пары малых выпей зарегистрированы 6 июня 1977 близ деревни Шахово Кромского района, 17 июня 1979 у деревни Бунино Урицкого района и 27 июня 1982 у деревни Вязки на реке Оке в Орловском районе.

* Грабилина М.В. 1991. Новые и редкие виды птиц Орловской области // *Орнитология* **25**: 151-153.

Ciconia ciconia. Первая пара белых аистов появилась на территории области в 1959 году в селе Сомово Шаблыкинского района. В 1960-1969 годах аисты поселились в сёлах Радовичи, Глыбочки, Хотьково того же района и в городе Дмитровске. До 1975 года численность аистов не возрастала из-за нехватки удобных для гнездования мест. Первая пара, построившая гнездо на водонапорной башне, отмечена в 1975 году в селе Кишкино Болховского района. После этого аисты стали расселяться по всей территории области, устраивая гнёзда на таких сооружениях. К 1991 году известно 27 гнёзд в 13 районах области.

Pandion haliaetus. В Новосильском районе 6 июня 1976 добыта самка. На территории области скопа ежегодно встречается на пролёте.

Pernis apivorus. Единственный раз, 20 августа 1987, отмечена пара осоедов на пойменных лугах реки Вытебети близ посёлка Вытебеть Знаменского района. В 1920-х годах осоед считался обычным видом Орловской области (Горбачёв 1925).

Milvus migrans. Чёрный коршун в 1980-е годы стал редким. Пара отмечена 15 июня 1986 близ села Молодовое Шаблыкинского района. 10 мая 1986 найдено гнездо с кладкой в лесу у Лыковской ГЭС (Мценский район). 28 мая 1986 две пары коршунов встречены близ деревни Корытня Знаменского района.

Circaetus gallicus. Впервые для области гнездо змееяда с оперившимся птенцом найдено 13 августа 1984 в урочище «Чёрные грязи» Хотынецкого района. В 1986 году старое гнездо было разобрано птицами и построено новое в 250 м от первого, где змееяды благополучно выкормили птенца. Прилёт отмечен 26 апреля 1986.

Tetrao urogallus. Отмечен в Хотынецком и Знаменском районах в лесах таёжного типа, примыкающих к Брянским и Калужским лесным массивам. По результатам учёта, в этих районах обитает около 50 глухарей.

Grus grus. 30 мая 1981 обнаружена пара серых журавлей на заболоченном лугу близ села Льгов Хотынецкого района. 15 июля 1984 встречены 8 журавлей близ деревни Глотово того же района.

Streptopelia decaocto. Впервые отмечена в Орловской области 10 июня 1973. В настоящее время кольчатая горлица гнездится во всех крупных посёлках и городах области. Самое раннее гнездо с кладкой найдено 15 апреля 1981, самое позднее (с птенцами) – 29 октября 1975. С 1975 года часть птиц остаётся на зимовку. Зимние ночи они проводят на деревьях в защищённых от ветра местах, рассаживаясь на ветвях парами. Кормятся на элеваторах, на заводах растительных масел. Легко переносят даже сильные морозы (до -30°С).

Aegolius funereus. Мохноногий сыч зарегистрирован 27 августа 1987 в Знаменском районе в Пешковском лесничестве недалеко от деревни Бутырки.

Picus viridis. Единичные гнездящиеся пары зелёных дятлов отмечены с 1981 года в Хотынецком, Знаменском, Дмитровском и Хомутовском районах.

Dryocopus martius. Чёрный дятел регулярно попадается нам с 1978 года в лесах Хотынецкого и Знаменского районов. Три пары гнездятся в лесах Дмитровского района. 7 августа отмечен в лесу близ деревни Гать Орловского района.

Motacilla citreola. Желтоголовая трясогузка впервые отмечена на пролёте 18 апреля 1976. В последующие годы на пролёте зарегистрирована в Мценском, Хотынецком, Малоархангельском районах. 18 июля 1984 пару желтоголовых трясогузок с явными признаками гнездования наблюдали в Кромском районе на заболоченном лугу близ деревни Гуторово. 26 мая 1985 впервые найдено гнездо с птенцами четырёхдневного возраста, и в 200 м от него – второе гнездо с птенцами двухдневного возраста.

Nucifraga caryocatactes. Три кедровки встречены близ посёлка Просвет Знаменского района. 26 июля 1987 три птицы отмечены близ деревни Корытня того же района. 24-29 августа обнаружены 7 особей в районе деревни Бутырки. Инвазии кедровок происходили в 1979, 1980, 1985 годах.

Acrocephalus arundinaceus. Гнездование дроздовидной камышевки впервые установлено 27 мая 1984 в Мценском районе. 16 июня 1985 пара этих камышевок гнездилась в Хотынецком районе на заросших тростником торфяных картах.

Sylvia nisoria. Ястребиная славка прежде была известна как обычный многочисленный вид области. Ныне редка, гнездится единичными парами. 24 мая 1984 пара встречена близ деревни Гать. 4 июня 1985 отмечена ястребиная славка с выводком в урочище «Одинок» Новосильского района.

Regulus regulus. 11 июня 1982 впервые для области найдено гнездо желтоголового королька с птенцами близ села Голунь. Оно располагалось на боковых ветвях ели на высоте 10 м. 28 мая 1986 в ельнике близ деревни Корытня наблюдали пару корольков с явными признаками гнездования.

Phoenicurus ochruros. Горихвостка-чернушка впервые на территории Орловской области отмечена близ деревни Середичи Болховского района 27 июля 1980. В городе Орле поющий самец отмечен 20 мая 1981. С 1981 года чернушка постоянно гнездится в разных районах города. 7 мая 1986 две пары горихвосток отмечены в поселке Жудрё.

Aegithalos caudatus. 20 апреля 1986 найдено гнездо ополовника в стадии завершения строительства в развилке берёзы на высоте 4 м близ посёлка Жудрё.

Remiz pendulinus. Ремез за последнее десятилетие зарегистрирован

на гнездовании на территории области в 1980, 1983, 1985, 1986 годах в Хотынецком и Мценском районах. В 1986 году в Мценском районе прилёт ремезов отмечен 18 апреля, к гнездованию приступили 10 пар 20 апреля. Гнёзда начали строить на 3 берёзах. К 26 апреля строительство гнёзд было почти закончено у 6 пар. 26 апреля все гнёзда были разобраны и птицы исчезли. Остались лишь две пары, которые позднее благополучно вывели птенцов. Их гнёзда были построены на ивах в 30 и 500 м от берёз.

Parus cristatus. 21 июля 1985 поющего самца хохлатой синицы наблюдали в урочище «Чёрные грязи».

Spinus spinus. 29 мая 1986 отмечена пара чижей с явными признаками гнездования близ посёлка Просвет.

Pyrrhula pyrrhula. 6 июля 1986 найдены перья самца снегиря, съеденного пернатым хищником близ поселка Просвет. 3 мая 1987 отмечен поющий самец в урочище «Чёрные грязи». 26 июля 1987 наблюдалась пара снегирей близ деревни Корытня.

Литература

Горбачёв С.Н. 1925. Позвоночные животные // *Природа Орловского края*. Орёл: 411-463.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **781**: 1856-1857*

Желтобровая овсянка *Emberiza chrysophrys* в Южном Предбайкалье

Ю.В.Богородский

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

16 июля 1988 в долине реки Нижний Кочергат примерно в 2 км от места впадения её в Голоустую в пойменном ельнике с густыми кустарниковыми зарослями был встречен одиночный самец желтобровой овсянки *Emberiza chrysophrys*. 10 июля 1989 примерно на этом же участке были встречены несколько птиц, одна из которых добыта. Это оказался молодой самец. Под кожей у него находился слой жира, в желудке – хитиновые остатки насекомых, пауков, несколько мелких семян, песчинки. 13 июля 1989 при проведении учётов птиц в этой части долины Нижнего Кочергата на расстоянии 4.7 км встречены три желтобровые овсянки. Вероятно, это был тот самый выводок, из кото-

* Богородский Ю.В. 1991. Желтобровая овсянка в Южном Предбайкалье // *Орнитология* **25**: 148.

рого добыт самец. Регулярные наблюдения в Южном Предбайкалье, в том числе и в долине Нижнего Кочергата, мы проводили с 1971 года, однако никогда ранее желтобровая овсянка здесь не отмечалась.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **781**: 1857*

Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* продолжает гнездиться в окрестностях «Леса на Ворскле»

Т.П.Дьяконова

Татьяна Павловна Дьяконова. Кафедра зоологии позвоночных, биолого-почвенный факультет, Санкт-Петербургский университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия

Поступила в редакцию 5 августа 2012

Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* обнаружен на гнездовании в окрестностях посёлка Борисовка Белгородской области в 2005 году, но, видимо, эти птицы появились здесь уже в конце 1990-х или самом начале 2000-х годов (Бардин 2005). Снова приехав в «Лес на Ворскле» на студенческую практику в 2012 году мы убедились, что сирийский дятел продолжает оставаться обычной птицей этого района. 14 июня 2012 мы обнаружили гнездо этого дятла на северной окраине Борисовки, в аллее по дороге на Крюково (50°36′21′′с.ш., 35°59′29′′в.д.). Дупло было выдолблено в стволе подсыхающего ясеня *Fraxinus excelsior* на высоте 6 м. Подросшие птенцы высовывались из летка и кричали, родители их кормили. На следующий день, 15 июня, птенцы вылетели. 14 июня по дороге на Стригуны в долине Ворсклы (50° 37′07′′с.ш., 36° 02′00′′в.д.) мы встретили ещё один выводок сирийских дятлов, в котором молодые продолжали получать корм от взрослых.

Литература

Бардин А.В. 2005. Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* гнездится в окрестностях «Леса на Ворскле» // *Рус. орнитол. журн.* **14** (291): 554-556.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **781**: 1858-1860*

Успешность репродуктивного периода у мухоловки-пеструшки *Ficedula hypoleuca* в Ленинградской области

О.П.Смирнов, В.М.Тюрин

Второе издание. Первая публикация в 1986[*]

Материалом для данного сообщения послужили сведения, собранные авторами в период с 1968 по 1979 год в окрестностях Ленинграда и в Ленинградской области. Ежегодно на стационарных участках вывешивали 150-200 искусственных гнездовий. На каждое зарегистрированное гнездо составляли карточку, в которую при посещении гнезда записывали необходимые сведения. Некоторые гнёзда осматривали от 2 до 7 раз за сезон. За 10 лет получены сведения о 493 гнёздах мухоловки-пеструшки *Ficedula hypoleuca*. Кроме этого, проводили визуальные наблюдения за поведением птиц на гнездовых участках в разные сроки репродуктивного цикла.

Анализ 10-летних наблюдений показал, что к постройке гнёзд в Ленинградской области мухоловки-пеструшки приступают в середине мая. Самая ранняя дата начала гнездостроения зарегистрирована 12 мая, массовая откладка яиц начинается в третьей декаде мая.

Таблица 1. Сроки откладки первого яйца у мухоловки-пеструшки *Ficedula hypoleuca* в Ленинградской области

Год	Самая ранняя дата откладки первого яйца	Число гнёзд	Количество гнёзд, где первое яйцо появилось					
			20-25 мая		26-31 мая		1-5 июня	
			Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
1968	18 мая	23	14	60.9	5	21.7	3	13.0
1971	18 мая	71	7	9.8	47	66.2	12	16.9
1972	20 мая	47	20	42.6	17	36.2	7	14.9
1973	19 мая	82	55	67.0	17	20.7	6	7.3
1974	29 мая	70	—	—	9	12.9	32	45.7
1975	18 мая	16	6	37.5	—	—	6	37.5
1976	19 мая	14	10	71.4	1	7.1	—	—
1977	21 мая	12	6	50.0	6	50.0	—	—
1978	25 мая	13	2	15.4	10	76.9	1	7.7
1979	23 мая	26	2	7.7	22	84.6	2	7.7
Итого:	21 мая	347	122	35.2	134	38.6	68	19.9

[*] Смирнов О.П., Тюрин В.М. 1986. Успешность репродукционного периода мухоловки-пеструшки в Ленинградской области // *Орнитология* **21**: 170-171.

Таблица 2. Количество яиц в полных кладках у мухоловки-пеструшки *Ficedula hypoleuca* в Ленинградской области

Год	Число гнёзд	Количество гнёзд с числом яиц							Всего яиц	Среднее число яиц в кладке
		4	5	6	7	8	9	10		
1968	31	2	4	10	11	3	1	—	198	6.4
1970	5	—	—	5	—	—	—	—	30	5.4
1971	71	3	5	24	24	10	5	—	474	6.7
1972	63	—	4	21	33	5	—	—	417	6.6
1973	73	—	3	12	46	12	—	—	505	6.9
1974	67	—	11	39	15	1	—	1	412	6.1
1975	11	—	1	2	7	1	—	—	74	6.7
1976	6	—	1	2	3	—	—	—	38	6.3
1977	9	—	2	3	3	1	—	—	57	6.3
1978	27	—	3	10	12	2	—	—	175	6.5
1979	28	1	3	15	9	—	—	—	172	6.1
Итого:	391	6	37	143	163	35	6	1	2552	6.5

Таблица 3. Количество слётков, благополучно вылетевших из гнёзд, у мухоловки-пеструшки *Ficedula hypoleuca* в Ленинградской области

Год	Число гнёзд	Количество гнёзд с числом вылетевших слётков								Всего слёт-ков	Среднее количество вылетевших слётков
		2	3	4	5	6	7	8	9		
1968	27	2	1	—	6	9	6	2	1	158	5.9
1970	5	—	1	—	—	4	—	—	—	27	5.4
1971	7	—	—	1	1	2	2	1	—	43	6.1
1972	21	—	3	—	5	8	5	—	—	117	5.6
1973	28	—	2	1	3	3	11	3	—	174	6.2
1974	29	—	3	3	9	11	3	—	—	153	5.3
1975	11	2	—	1	2	4	3	—	—	68	6.2
1976	6	2	—	3	—	1	—	—	—	22	3.7
1977	9	1	2	2	1	3	—	—	—	39	4.3
1978	3	—	—	—	—	2	1	—	—	19	6.3
1979	14	—	1	1	2	7	3	—	—	80	5.7
Итого:	160	7	13	12	19	59	34	6	1	900	5.6

На сроки размножения определённое влияние оказывают погодные условия. Так, в 1974 году весна запоздала, и первые яйца в гнёздах мухоловок-пеструшек появились лишь с 29 мая, т.е. на неделю позже обычного (табл. 1). Самая ранняя дата появления первого яйца – 18 мая, самая поздняя – 26 июня. Откладка яиц основной массой мухоловок происходит в исключительно сжатые сроки. В третью декаду мая у 70% самок в гнёздах имеются яйца, а в начале июня всё население мухоловок-пеструшек приступает к насиживанию.

В случае разорения гнезда самка способна начать повторную кладку. Известны случаи появления первого яйца в гнёздах пеструшек 20-

26 июня. Поздние кладки, если судить только по срокам, можно принять за вторые. Но так как специальных наблюдений не проводилось, утверждать о наличии бициклии нельзя.

В полных кладках мухоловки-пеструшки мы находили 4-10 яиц. Средняя величина кладки была довольно стабильна на протяжении всех лет исследования и составила 6.5 яйца (табл. 2).

Из 492 обследованных гнёзд разорёнными оказалось 10.8%.

С 21 по 27 июня проходит массовый вылет слётков. В среднем из гнезда благополучно вылетает 5.6 птенца (табл. 3). Однако с учётом разоряемости гнёзд каждая пара за лето выводит 4.5-5 птенцов.

Анализ оологических параметров 14 кладок, которые содержали 82 яйца, показал, что масса полной кладки колеблется в пределах 8-12 г, средняя масса 1 яйца – 1.6 г, а средние размеры – 13.3×17.5 мм.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **781**: 1860-1861*

О гнездовании рябинника *Turdus pilaris* в юго-западном Забайкалье

Э.Н.Елаев

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

Юго-восточная граница распространения рябинника *Turdus pilaris* в Сибири проходит по Байкалу до Витимского плоскогорья. В последнее время наблюдается тенденция к расширению ареала. В.Р.Жаров (1967) отмечал рябинника на гнездовье в районе Баргузинского хребта. И.В.Измайлов и Г.К.Боровицкая (1973) наблюдали слётков в долине реки Темник. Такие же сведения имеются у А.А.Васильченко (1987) по Прибайкальской равнине.

В период с 1987 по 1989 год нами отмечалась колония рябинника в зарослях ив, черёмух, красной смородины и шиповника в пойме реки Селенги (окрестности Улан-Удэ). В начале мая 1987 года на маршруте была встречена смешанная стая рябинников, белобровиков *Turdus iliacus* и дроздов Науманна *T. naumanni* в 30-35 особей. 21-31 мая 1987 было найдено 5 гнёзд рябинника. В 2 из них было 5 и 6 птенцов, в остальных – яйца. Гнёзда располагались на высоте 2-6 м на ивах (3 гнезда), сосне (1) и черёмухе (1). Здесь же держались ещё 3-4 пары, но

* Елаев Э.Н. 1991. О гнездовании рябинника *(Turdus pilaris)* в Юго-Западном Забайкалье // *Орнитология* **25**: 193.

гнёзда их найти не удалось. Рябинники гнездились в этом месте и в 1988 и 1989 годах.

Гнездо рябинника компактное. Снаружи оно выложено грязью, веточками ивы; лоток довольно широкий, выстлан сухими травинками, стеблями злаков, лубяными волокнами древесных растений. Размеры гнёзд (n = 5), мм: диаметр гнезда 160-180, в среднем 173.4; диаметр лотка 115-125, в среднем 119.8; высота гнезда 155-205, в среднем 184.2; глубина лотка 60-75, в среднем 66.6. Гнёзда располагались в основном в развилке стволов или боковых ветвей крупных деревьев. Лишь одно гнездо находилось прямо на толстой ветке без какой-либо дополнительной опоры.

Первые яйца в 1987 году появились в конце апреля – начале мая. Средняя величина кладок (n = 5) 5.4 яйца. Размеры яиц (n = 11) в среднем 28.5×20.5 мм, масса насиженных яиц 5.5-7.1 г. Насиживание начинается с откладки последнего яйца и длится 13-15 сут. Птенцы вылупляются во второй половине мая – начале июня. Выкармливают их оба родителя в течение 12-14 сут. Первые слётки в 1987 году встречались в конце мая.

С 1987 по 1989 год рябинники каждую зиму оставались в указанном районе. Зимой 1988/89 встречались стаи численностью в 13-22 особи и одиночные птицы. Они держались в дачном посёлке и на недалеко расположенных островах Селенги, где корм был в изобилии (черёмуха и другие ягодные породы).

Литература

Васильченко А.А. 1987. *Птицы Хамар-Дабана*. Новосибирск: 1-103.

Доржиев Ц.З., Хабаева Г.М., Юмов Б.О. 1986. *Животный мир Бурятии (Состав и распределение наземных позвоночных)*. Иркутск: 1-123.

Жаров В.Р. 1967. Дополнение к списку птиц Баргузинского заповедника // *Тр. Баргузинского заповедника* **5**: 136-137.

Измайлов И.В., Боровицкая Г.К. 1973. *Птицы Юго-Западного Забайкалья*. Владимир: 1-315.