ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2012
XXI

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

783

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XXI

Экспресс-выпуск • Express-issue

2012 № 783

СОДЕРЖАНИЕ

1893-1915 Материалы к фауне птиц хребта Манрак. Часть 2. Воробьиные.
Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ, А.С.ЛЕВИН

1915-1916 Гнездование желтоголовой трясогузки *Motacilla citreola calcarata* на реке Чилик в северных предгорьях Заилийского Алатау.
А.В.КОВАЛЕНКО

1916-1917 Случай гнездования обыкновенного ворона *Corvus corax* на дереве в Южном Алтае.
С.В.СТАРИКОВ

1917-1918 Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides* в окрестностях «Леса на Ворскле».
А.В.БАРДИН

1918-1920 О встречах некоторых редких видов птиц на юге Тверской области.
И.М.МАЛЫХ, Я.А.РЕДЬКИН

1920-1921 Гнездование врановых на металлических опорах линий электропередач в Верхнем Приамурье.
В.А.ДУГИНЦОВ, Н.С.ПАНЬКИН

Редактор и издатель А.В.Бардин

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2012
Дата опубликования: 18 августа 2012

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXI
Express-issue

2012 № 783

CONTENTS

1893-1915 Materials on avifauna of the ridge Manrak. Part 2. Passeriformes. N.N.BEREZOVIKOV, A.S.LEVIN

1915-1916 Breeding of the citrine wagtail *Motacilla citreola calcarata* near Chilik River in the northern foothills of Trans-Ili Alatau. A.V.KOVALENKO

1916-1917 Case of the raven *Corvus corax* nesting in a tree in the southern Altai. S.V.STARIKOV

1917-1918 The greenish warbler *Phylloscopus trochiloides* in the vicinity of the natural reserve «Forest on the Vorskla River». A.V.BARDIN

1918-1920 Registration of some rare birds in the southern part of the Tver Oblast. I.M.MALYKH, Ya.A.RED'KIN

1920-1921 Nesting of corvids on metal pylons of power lines in the Upper Amur. V.A.DUGINTSOV, N.S.PANKIN

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St.-Petersburg University
St.-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2012

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **783**: 1893-1915*

Материалы к фауне птиц хребта Манрак. Часть 2. Воробьиные

Н.Н.Березовиков, А.С.Левин

*Второе издание. Первая публикация в 2007**

Riparia diluta. Редкий гнездящийся вид по западной и восточной окраинам Манрака. Более десятка бледных ласточек видели 1 июня 2000 в пойме Кандысу у посёлка Покровка (Манырак). У восточного подножия хребта, в 4-5 км южнее аула Талды, в небольшом глиняном карьере близ разрушенной фермы в 2000 году обнаружена прошлогодняя колония из 15 нор. В 2001-2004 годах бледные ласточки здесь не гнездились.

Ptyonoprogne rupestris. Редкий гнездящийся вид, найденный лишь в трёх пунктах Манрака, как правило, приуроченных к местам гнездования балобана *Falco cherrug*. Так, в глубоком ущелье реки Тайжузген, ниже устья речки Кошантай (948 м), в нише скального обрыва высотой 10-12 м, занятой парой балобанов, в колонии городских ласточек 15 мая 2000 держалось 3 скальных ласточки, а 28 мая – 2 пары. В 2001-2004 годах они здесь отсутствовали. У северо-западного подножия Большого Манрака между посёлками Сагындык и фермой Абыс, в вершине одного из ущелий (1300-1400 м над уровнем моря), 4 июня 2001 в карнизе скалы с гнездом балобана обнаружено 2 жилых гнезда скальных ласточек, в которых шло насиживание кладок. В северо-восточной части Манрака между ущельями Кенсай и Талды (838 м) в глубине одного из безводных ущелий 9 июня 2002 в нише скалы найдено жилое гнездо *P. rupestris* по соседству с двумя гнёздами *Delichon urbica*. Ещё одно гнездо скальных ласточек обнаружено под самой вершиной горы (1000 м) в утёсе с гнездом балобана.

Hirundo rustica. По окраинам Манрака деревенская ласточка гнездится в сёлах Сарыолен, Бозша, Покровка, Жетыарал, Акжар, Тугыл, Карабулак, в горах – Сагындык, Кенсай, Талды, Дауал. Обитает в Чиликтинской долине у южного подножия Манрака в сёлах Тасбастау и Кемпирбулак, на фермах Айнабулак и Зор-Торгай (1100-1250 м), на отдельных зимовках вдоль западного подножия Большого Манрака по горной дороге между посёлками Сагындык и Бозша (1200-1450 м). Между Сагындыком и ущельем речки Кошантай 5 июня 2002 пара ласточек гнездилась в чабанской юрте среди холмистой местности, а по

* Березовиков Н.Н., Левин А.С. 2007. Материалы к фауне птиц хребта Манрак. Часть 2. Воробьиные // *Selevinia:* 83-94.

реке Эспе – в древнем мазаре. В каньоне Тайжузгена в 2000-2002 годах одна пара держалась среди разрушенных построек рудника. Суммарно в 20 пунктах Манрака в 2000-2004 годах обитало 50-55 пар скальных ласточек. В брошенной зимовке в ущелье Жангызтобе (5 км северо-восточнее посёлка Бозша) 3 июня 2002 найдено: 1) в пустующем доме готовое гнездо с выстилкой, но без яиц); 2) в скотном дворе гнездо с 4 яйцами; 3) в кошаре на балке гнездо с 4 яйцами (в двух последних случаях самки обогревали кладки). В пустующей избе крестьянского хозяйства на реке Кызылкайын 8 июня 2002 обнаружено 3 гнезда скальных ласточек с кладками по 4, 5 и 6 яиц, готовое гнездо с перьевой выстилкой и ещё одно гнездо с недостроенными краями и грубой выстилкой из злаков.

Delichon urbica. Малочисленный, спорадично распространённый вид, найденный гнездящимся лишь в 5 пунктах Манрака. Постоянное место гнездования городских ласточек – скальная теснина глубокого ущелья реки Тайжузген, ниже устья речки Кошантай (948 м), где в нише отвесной скалы, занятой балобанами, 15 мая 2000 держалось 12 ласточек, залетающих и осматривающих старые гнёзда. При повторном осмотре 28 мая здесь оставалось 3 пары, самки насиживали кладки в гнёздах под скальным карнизом в 1.5-3 м от жилого гнезда балобана, устроенного в старой постройке чёрного аиста *Ciconia nigra*. Здесь же 31 мая 2001 держалось 4 пары, 5 июня 2002 – 10 пар. У северо-западного подножия Большого Манрака, в утёсе в 6 км южнее посёлка Сагындык (1233 м), 29 мая 2000 обнаружена колония из 5 пар, а 4 июня 2002 здесь же держалась лишь одна пара. В северо-восточной части хребта, в верхней части ущелья Кенсай (762 м), 8 июня 2002 в карнизе одной из скал осмотрено 3 жилых гнезда с насиживаемыми кладками. Между Кенсаем и Талды (838 м) 8 июня 2002 и 17 июня 2004 в тенистой щели скалы находилось поселение из 3 гнёзд. На восточной окраине Манрака 17 мая 2000 пару городских ласточек видели в посёлке Карабулак.

Calandrella brachydactyla. Обычный гнездящийся вид подгорных каменистых шлейфов Манрака (500-800 м н.у.м.). В западной части хребта малый жаворонок гнездится в верхнем течении реки Эспе (700 м) среди глинистой полынной равнины с щебёнкой и по полынно-эбелековым берегам с чиевниками и россыпью галечника. Часто встречался в нижних частях полынных долин Тайжузгена, Кусты, Кызылкайына и на прилежащих холмах, а также по каменистому полынному шлейфу Манрака между реками Кызылкайын, Ушбулак и Талды. В восточной части Манрака между реками Талды и Карасу малый жаворонок весьма обычен в межгорной полынной долине с меловыми холмами и россыпью аллювия, а также по широкой каменисто-щебнистой долине реки Карасу выше посёлка Карабулак. Отдельные

поющие самцы наблюдались по правобережью Кандысу между посёлками Покровка, Бозша и Сарыолен, а также в Чиликтинской долине между зимовками Аймамбет и Айнабулак (1250 м) на полынных участках среди глинистых холмов. В период с 12 по 31 мая всюду наблюдались поющие и токующие самцы. В широких долинах Кусты и Кызылкайын 7 июня 2002 отмечены выводки с хорошо летающими птенцами, а 17 июня 2004 между Тайжузгеном и Карабулаком часто встречались группы по 5-10 молодых жаворонков.

Melanocorypha calandra. Обычный, местами фоновый гнездящийся вид в западных, северных и восточных предгорьях Манрака между долинами рек Эспе, Тайжузген, Кызылкайын, Ушбулак, Талды. Многочислен на увалистом плато между Тайжузгеном и Эспе (600-800 м) в полынно-типчаково-ковыльной степи с ферулой, особенно на участках с густыми зарослями желтых крестоцветных. В заметном числе степной жаворонок встречается в среднем и верхнем течении реки Эспе в широких долинах (700-750 м), густо поросших типчаком, ковылём и полынью с куртинами спиреи и ферулы по ложбинкам, понижениям или безводным руслам ручьев. По увалам на высотах 800-1000 м уступает в численности полевому жаворонку. В нижней части долины Тайжузгена единично встречался среди глинистой равнины с полынями и солянками. По северному и восточному шлейфу Манрака между долинами рек Кызылкайын, Ушбулак и Талды живёт среди полынной каменистой равнины с порослью спиреи, караганы и ферулы. В течение мая и первой половины июня всюду наблюдались активно поющие и токующие самцы. Между посёлками Талды и Карабулак 9 июня 2002 отмечен выводок из 4 слётков.

Melanocorypha bimaculata. Немногочисленный гнездящийся вид, встречающийся в холмисто-увалистых предгорьях в западной, северной и восточной частях Манрака (500-800 м). В 2000-2004 годах двупятнистый жаворонок регулярно наблюдался по увалам между реками Эспе, Тайжузген, Кусты и Кызылкайын, где населяет каменистые сопки и глинистые холмы, тогда как степной и полевой жаворонки встречались по соседству в злаковых долинах. Между 12-31 мая в подобных местах в радиусе 500 м от наблюдателя отмечалось по 1-3 активно поющих и токующих самцов. В широкой полосе подгорного шлейфа в северной и восточной частях Манрака между Кызылкайыном, Ушбулаком, Талды и Карасу также встречался всюду по вершинам каменистых сопок, поросших полынью и типчаком.

Melanocorypha leucoptera. Малочисленный гнездящийся вид западных и северных предгорий Манрака. Основное место обитания белокрылого жаворонка – холмисто-увалистая степь между долинами Эспе и Тайжузген (500-700 м), где населяет типчаковые или полынно-типчаковые участки с редкой порослью спиреи. В мае-июне 2000-2001

годах в этих местах был исключительно редок (1 пара на 10 км), однако в 2002-2004 годах его численность здесь заметно увеличилась и он наряду с полевым и степным жаворонками стал фоновым видом, расселившись вплоть до северного и западного подножия Большого Манрака почти до посёлка Сагындык (1000-1100 м).

В 2004 годах эти жаворонки стали в заметном числе встречаться на северном и восточном каменистом шлейфе Манрака между долинами рек Тайжузген, Кусты, Кызылкайын, Кенсай и Талды, где отмечали по 3-5 самцов на 10 км автомаршрута. Подобное явление в этом году наблюдалось также и вдоль северного и южного подножия Тарбагатая (Березовиков 2004).

В типчаковой степи с мозаичной порослью караганы и спиреи между посёлком Сагындык и урочищем Кошантай (1024 м) 16 июня 2004 найдено гнездо в ямке под прикрытием кустиков типчака. Внешний диаметр 110×100, диаметр лотка 80×75, его глубина 70 мм. Свито из плотного слоя стеблей типчака. В гнезде содержалось 5 голых птенцов в возрасте 2-3 суток. Бледно-белый эмбриональный пух располагался на надглазничной, затылочной, спинной, плечевой, локтевой и надбедренной птерилиях. Самка обогревала птенцов и при появлении человека уползла в сторону, имитируя подранка.

Melanocorypha yeltoniensis. Малочисленный гнездящийся вид северо-западной окраины Манрака, в годы максимума численности населяющий холмистую типчаково-полынную степь между реками Эспе, Тайжузген и Кусты, а также долины Кандысу между Покровкой, Акжаром и Приозёрным (Березовиков, Щербаков 2000, 2004). В мае 2000 года его единично встречали в щебнистой полынной пустыне вдоль зайсанского тракта между рекой Эспе и посёлком Тугыл (Приозёрный). Между долинами рек Тайжузген и Эспе (600-700 м) чёрный жаворонок изредка встречался в холмистой полынно-типчаково-ковыльной степи с ферулой, на участках с густыми зарослями жёлтых крестоцветных, обитая совместно с полевым, степным и белокрылым жаворонками. Однако после суровой многоснежной зимы 2000/01 годов численность чёрных жаворонков в Зайсанской котловине сократилась до минимума и они в 2001-2004 годах перестали гнездиться не только в Манраке, но и на прилежащей равнине (Березовиков, Самусев 2003). Лишь как исключение, одного самца мы видели 5 июня 2002 в верхней части долины реки Эспе в районе древнего мазара.

Eremophila alpestris. Немногочисленный гнездящийся вид подгорной зоны Манрака (600-1200 м). Встречен в 47 пунктах (131 особь). Вдоль северного подножия Манрака пары рогатых жаворонков встречались между ущельями рек Кызылкайын, Ушбулак, Талды (650-700 м) по щебнистым вершинам сопок и на покрытых аллювием и щебёнкой верхних террасах глубоких речных долин. Между Талды и Карасу

обитает в глинисто-щебнистой полынной равнине с белыми и жёлтыми глинистыми холмами. Обычен у западного подножия Манрака восточнее посёлка Покровка, где встречается по глинистым увалам с мелкой и редкой полынкой, местами с выходами красных глин, похожих на выбитые скотом пастбища (2-3 пары на 1 км маршрута). Приурочен здесь в основном к щебнистым или глинистым вершинам сопок, на которых нередко имеются древние кладбища из камней. Отдельные пары попадаются по полынным увалам, усеянных щебёнкой. У западного подножия Большого Манрака между посёлком Сагындык и зимовкой Макжан (1100 м) рюм встречался по типчаково-полынно-спиреевым увалам и сопкам на полянках, усеянных гранитной крошкой. Реже попадается в нижних частях долин Эспе, Тайжузгена, Кусты и Кызылкайына. В широкой сухой долине Сарыбулака восточнее посёлка Бозша встречается на пустынных участках с полынью и щебёнкой, где почти на каждой каменистой сопочке или бугре держалось по паре этих жаворонков (8 пар на 4.5 км автомаршрута). Характерно присутствие отдельных пар также на «тырлах» около зимовок или кошар. Достаточно обычен рогатый жаворонок также вдоль южной окраины Манрака в Чиликтинской долине между посёлками Тасбастау и Сарыолен, где его часто отмечали вблизи зимовок Кемпирбулак, Аймамбет, Айнабулак и Зор-Торгай (1110-1260 м) по глинистым холмам и полынно-типчаковым сопкам с живописными маленькими скалами по вершинам и выходами разрушенных пород (1-2 пары на 1 км).

На подгорной щебнистой равнине между аулами Дауал и Сатбай 11 июня 2002 отмечен выводок из 5 особей с доросшими молодыми. У входа в ущелье Жангызтобе, в 5 км северо-восточнее посёлка Бозша, на навозном тырле у фермы 16 июня 2004 держался выводок с самостоятельным молодняком.

Alauda arvensis. Многочисленный гнездящийся вид степных и луговых долин Манрака (600-1500 м н.у.м.), являющийся в большинстве мест доминирующим среди других птиц. На полынно-типчаковой водораздельной степи с порослью спиреи и караганы между реками Эспе и Тайжузгеном полевой жаворонок обычен, а по полынно-ковыльно-типчаковым ассоциациям даже многочислен. На подгорном шлейфе в северной части Манрака между реками Кызылкайын, Канай, Ушбулак и Талды в каменистой типчаково-ковыльной степи у самых гор, с мозаичными зарослями ферулы и спиреи по безводным промоинам ручьев, наблюдается поразительное перемешивание степного, двупятнистого, малого и полевого жаворонков, при доминировании последнего. У южного подножия Манрака в Чиликтинской долине между посёлками Тасбастау и Сарыолен (1300-1400 м) в подгорной типчаково-полынной степи с мозаичной порослью спиреи, караганы, ковыля и чия полевой жаворонок – массовый вид. На маршруте 16-17

июня 2004 в Манраке всюду встречались уже доросшие лётные молодые полевые жаворонки

Anthus campestris. Немногочисленный гнездящийся вид холмисто-увалистых предгорий и степных долин Манрака (500-1500 м). В 2000-2002 годах в 16 точках зарегистрировано 19 токующих самцов полевого конька. Наиболее часто встречался в долинах Сарыбулака, Эспе, Тайжузгена, Кусты и Кызылкайына, где основные местообитания приурочены к каменистым или глинистым террасам, поросшим полынью (в среднем 1 пара на 1 км^2). Вдоль южного подножия Манрака в Чиликтинской долине между посёлками Тасбастау и Сарыолен (1300-1400 м) полевой конёк встречается в типчаковой степи, где его чаще всего видели у входа в ущелья или вблизи животноводческих зимовок. Токующих самцов на гнездовых участках наблюдали между 15 мая и 17 июня.

Motacilla flava. Во внутренних долинах Манрака жёлтая трясогузка не гнездится. Лишь однажды, 3 июня 2002, одиночку встретили на пойменном лугу реки Кандысу ниже посёлка Бозша (976 м).

Motacilla cinerea. Редкий гнездящийся вид, отмеченный лишь в 6 пунктах. Так, 19 мая 2000 одну пару горной трясогузки встретили в скальной теснине ущелья реки Тайжузген, ниже устья речки Кошантай (940 м), другую в верховьях этой речки (1116 м) с заболоченной низиной, поросшей тальниками и берёзами. Вдоль западного подножия Большого Манрака по горной дороге между посёлками Сагындык и Бозша 29 мая 2000 две одиночки наблюдались на горных ручьях в луговой зоне (1450-1500 м). В северо-восточной части хребта между Ушбулаком и Талды (686 м) 16 мая 2000 видели самку у родника, а 8 июня 2002 на ручье в верхней части ущелья Кенсай (762 м) отмечена птица с кормом.

Motacilla personata. Редкий гнездящийся вид. В долине Кандысу маскированная трясогузка гнездится в посёлках Покровка и Акжар. У западного подножия Большого Манрака в 2000-2002 годах одна пара наблюдалась в посёлке Сагындык, другая 29 мая 2000 у жилой зимовки Макжан, в 5 км южнее этого посёлка.

Lanius phoenicuroides. Редкий гнездящийся вид (14 особей в 6 пунктах). Основные встречи номинальной формы туркестанского жулана *L. ph. phoenicuroides* приходятся на северо-западное подножие Большого Манрака на высотах 1000-1300 м, где они предпочитают широкие безводные ущелья, заросшие кизильником, шиповником, спиреей и жимолостью. Лишь в одном месте, между посёлком Сагындык и зимовкой Абыс 5 июня 2002 на 2 км маршрута встретили 7 поющих и токующих самцов, занявших гнездовые участки (самок ещё не было видно). Здесь же держался гибридный жулан, имевший окраску самца *Lanius collurio*, однако рулевые перья у него были рыжими. В

остальных местах самцы жуланов попадались редко и в одиночку: 15 мая 2000 – в верховьях реки Тайжузген (1116 м); 4 июня 2002 – на перевале между посёлками Покровка и Сагындык (1145 м); 4 июня 2002 – в 5 км южнее Сагындыка (1229 м); 16 июня 2004 – по дороге между Сагындыком и урочищем Кошантай; 16 мая 2000 – у северо-восточного подножия Манрака между речками Ушбулак и Талды в группе старых ив у зимовки Арасан Талды (695 м).

Lanius collurio. Редкий гнездящийся вид. Обнаружен лишь в трёх точках в западной части Манрака. Двух территориальных самцов европейского жулана наблюдали в зарослях караганы и спиреи в ущельях у западного подножия Большого Манрака: 29 мая 2000 близ посёлка Сагындык (1065 м) и 16 июня 2004 между Сагындыком и зимовкой Абыс (1145 м). В сухом ущелье на перевале от посёлка Покровка к Сагындыку (990 м) 1 июня 2003 пара жуланов строила гнездо в зарослях караганы и шиповника.

Lanius minor. Случаев гнездования в пределах Манрака не установлено. Встреченный 16 мая 2000 в северных предгорьях хребта чернолобый сорокопут в зарослях караганы среди каменистых сопок ниже ущелья Ушбулак (588 м) был явно пролётным. Ближайшие места гнездования находятся в вязово-лоховой лесополосе между посёлком Карабулак и городом Зайсан, где эти сорокопуты наблюдались в одиночку и гнездовыми парами 17 мая 2000 и 9 июня 2002.

Sturnus vulgaris. Обыкновенный скворец гнездится по окраинам Манрака в сёлах Бозша, Покровка, Жаналык, Жетыарал, Акжар, Тугыл, Карабулак, в горах – Сагындык, Кенсай, Талды, Дауал (1200-1450 м), а также в Чиликтинской долине у южного подножия Манрака в сёлах Тасбастау, Шиликты, Сарыолен, Кемпирбулак и на зимовке Аймамбет (1100-1250 м). Отдельные пары селятся в крестьянских хозяйствах, брошенных фермах и кошарах у входа в ущелья. Так, одну пару обнаружили 17 мая 2000 на ферме в каменисто-щебнистой долине реки Карасу выше посёлка Карабулак (630 м), другую 29 мая 2000 на жилой зимовке на перевале между посёлками Покровка и Сагындык (1000 м). В верхнем течении реки Эспе (715 м) 27 мая 2000 в норах лёссового обрыва около жилого гнезда балобана обнаружена колония из 15 пар скворцов, в гнёздах которых находились птенцы. При осмотре 31 мая 2001 здесь было 4-5 пар, носящих в гнёзда корм, а 5 июня 2002 – только одна пара. В ущелье Жангызтобе (976 м) напротив посёлка Бозша 3 июня 2002 у дома и кошары держалось 10 взрослых скворцов; утром 4 июня под камышитовой крышей на глинобитной стене обнаружено гнездо с 4 птенцами в пеньках, а в другом гнезде ещё шло насиживание яиц. На плотине через реки Кандысу выше села Покровка 16 июня 2004 обнаружена пара скворцов, носившая в гнездо корм.

Pastor roseus. Розовый скворец – одна из характерных и многочисленных птиц сухих ущелий в южной, западной и восточной частях Манрака (700-1300 м н.у.м.), включая Чиликтинскую долину. В холмистой полынно-типчаковой степи между Сарыбулаком, Тайжузгеном и Кызылкайыном в мае-июне это одна из наиболее часто встречаемых птиц, постоянно курсирующих стайками по 10-50, иногда по 100-300 самцов. Розовые скворцы часто садятся на отдых на кусты караганы и спиреи, целиком их облепляя, отчего иногда вся степь кажется розовой. Среди них особенно бросались в глаза самцы с яркой малиновой окраской оперения! Наиболее крупные колонии по 1-3 тыс. особей обнаружены в ущелье Жангызтобе северо-восточнее села Бозша (47° 23´ с.ш., 83°02´ в.д., 986 м), в ущелье восточнее села Покровка (47° 25´ с.ш., 83°56´ в.д., 990 м), в скальной теснине Тайжузгена выше рудника (47°37´ с.ш., 83°56´ в.д., 714 м), между ущельями Кенсай и Талды (47°32´ с.ш., 84°22´ в.д., 838 м). Занимают обычно обширные осыпи длиной около 100 м на крутых склонах ущелий или скальные обнажения с обилием разрушенных пород у подножия.

По наблюдениям 12-17 мая 2000, скворцы уже часто встречались стаями до 300-500 особей в долинах рек Эспе, Тайжузген, Кызылкайын и Талды, а 26-30 мая они уже заняли свои колонии. В каньоне реки Тайжузген 31 мая 2001 после заката солнца в зарослях шиповника по речке собралось на ночёвку около 1 тыс. самцов скворцов, облепивших кусты и весь обрывистый скальный склон. Уже в глубоких сумерках с 21 ч 30 мин до 21 ч 50 мин вверх по ущелью шёл чрезвычайно интенсивный лёт скворцов стаями от 10-50 до 100-500 особей, продвигавшихся непрерывным потоком через каждые 5-10 с. Сюда слетелись десятки тысяч скворцов, заполнивших весь каньон!

Acridotheres tristis. Расселяющийся вид. Отмечен лишь один раз – 7 июня 2002 у северного подножия Манрака на автобусной остановке у свёртка к посёлку Тугыл, расположенному на южном берегу озера Зайсан (Березовиков 2002).

Pica pica. Основные гнездовья сороки сосредоточены в тальниковой пойме Кандысу между Акжаром и Сарыоленом, отдельные пары гнездятся в садах посёлках Покровка, Акжар, Тугыл и Карабулак. Во внутренних частях Манрака наблюдалась в основном в пойменных зарослях речек Кызылкайын, Кусты, Тайжузген, Кошантай. В среднем и верхнем течении Тайжузгена и Кошантая (600-1100 м) 15 мая 2000 найдено 3 гнезда, устроенные на боярышнике, берёзе, жимолости татарской. В каньоне Тайжузгена в 2000-2004 годах 1-2 пары сорок гнездились в густых зарослях тростника, шиповника и жимолости. Отдельные пары отмечались в куртинах тальника у западного подножия Большого Манрака (1100-1200 м) вдоль горной дороги между посёлками Сагындык и Бозша. В восточной части Манрака 16-17 мая 2000 сорока

наблюдалась в урочище Талды среди каменистых сопок в густых зарослях шиповника среди высоких чиевников, а также в яблоневом саду у аула Талды. В посёлке Сагындык 4 июня 2002 отмечены слётки в заброшенном саду.

Pyrrhocorax pyrrhocorax. У западного подножия Большого Манрака по горной дороге между посёлками Сагындык и Бозша отдельные пары клушиц встречены 29 мая 2000 в утёсах среди луговых увалов в 6 и 19 км южнее посёлка Сагындык (1230 и 1525 м). В глубоком ущелье восточнее посёлка Бозша (47°23′ с.ш., 84°02′ в.д., 1172 м) 31 мая 2000 в скалах отмечены ещё 2 пары и одиночка. Между посёлками Бозша и Сарыолен (1150 м) на спуске по одному из отщелков к Бозшинскому водохранилищу в этот же день видели ещё одну клушицу.

Corvus monedula. В ущельях Манрака галка отсутствует. Гнездится по окраинам хребта в пустотелых торцах бетонных столбов ЛЭП между посёлками Акжар, Покровка и Бозша, у посёлками Тугыл (Приозёрное), а также между посёлками Карабулак и Талды. Колонию из 15 особей отметили также 26 мая 2000 в конструкциях автомобильного моста через реки Эспе. Между сёлами Покровкой и Бозша 30-31 мая 2000 галки кормили в гнёздах на столбах оперяющихся птенцов, а 16 июня 2004 на металлических траверсах держались докармливаемые выводки по 3-5 слётков.

Corvus frugilegus. Гнездится по окраинам Манрака в старых тополевых садах и парках посёлков Карабулак и Акжар. В последнем 11 июня 2002 уже произошёл массовый вылет птенцов, которые докармливались в кронах деревьев у гнёзд.

Corvus corone orientalis. Редкий гнездящийся вид по окраинам Манрака в тополевых садах в посёлка Акжар и Карабулак и совершенно отсутствующий во внутренних частях хребта. Лишь однажды, 17 мая 2000 в восточной части Манрака одиночку видели на подгорной равнине около аула Дауал (междуречье Талды и Карасу).

Corvus corax. Редкий гнездящийся вид, встреченный в 10 пунктах Манрака. Гнездится преимущественно у входа в скалистые ущелья (500-1300 м), кормиться вылетает на подгорную равнину, иногда до трассы между посёлками Тугыл и Карабулак. Отдельные пары воронов наблюдались в ущельях Тайжузгена, Кызылкайына, Кенсая, Талды, между селом Сагындык и урочищем Кошантай, в отщелках севернее и восточнее посёлка Бозша, на перевале между посёлками Сарыолен и Бозша. В Чиликтинской долине, в одном из ущелий южного склона Манрака севернее посёлка Тасбастау (47°16′ с.ш., 84°30′ в.д., 1220 м), 30 мая 2001 на уступе скалы видели гнездо с 4 оперёнными птенцами. В ущелье Жангызтобе, в 5 км северо-восточнее Бозши (47°23′ с.ш., 83°57′ в.д., 986 м), на уступе гранитной скалы среди шумной колонии розовых скворцов 30 мая 2001 осмотрено гнездо во́рона

с 3 оперёнными птенцами. В безводном ущелье 2-3 км южнее аула Талды (47°28´ с.ш., 84°26´ в.д., 903 м) у гнезда вóрона, устроенного на длинной полке отвесной скалы, 28 мая 2003 содержалось 4 доросших молодых, готовых к вылету. В ущелье Кенсай (47°34´ с.ш., 84° 21´ в.д., 722 м) 8 июня 2002 встречен выводок с 6 слётками, сопровождаемых взрослыми.

?***Troglodytes troglodytes***. На северо-западном склоне Большого Манрака между посёлком Сагындык и зимовкой Абыс (47°28´ с.ш., 84° 02´ в.д., 1300 м) в глубине тенистого ущелья в густых зарослях кизильника 3 июня 2005 слышали характерную песню самца крапивника (Ф.Ф.Карпов, устн. сообщ.). Ближайшие места гнездования этого вида находятся на северном склоне Саура (Щербаков 1999).

Cettia cetti. Расселяющийся вид, впервые отмеченный в Манраке в 1979 году (Щербаков 1989). В 2000-2004 годах широкохвостка была здесь достаточно обычной птицей (встречено 37 поющих самцов в 22 пунктах). Из них 22 самца были отмечены в среднем и верхнем течении реки Тайжузген (700-1116 м), где встречается в густых зарослях тальников, тростника, жимолости и шиповника и на заболоченных осоковых низинах с тальниками и березами, нередко в узких скальных теснинах (в среднем 2-3 самца на 1 км). По речным поймам поющие самцы обычно встречались через каждые 300 м, однако в пышных пойменных зарослях реки Кызылкайын их слышали даже через 100 м (здесь они составляют конкуренцию южному соловью). Один из самцов в Тайжузгене отмечен в куртине шиповника в сухом отщелке, где едва сочилась вода. В верхней части ущелья Кенсай (47°33´ с.ш., 84°20´ в.д., 762 м) 8 июня 2002 единственный самец пел в тенистом отщелке в зарослях кизильника. Встречается во многих местах тополево-ивовой поймы реки Кандысу между посёлками Покровка и Бозша. По луговым увалам Большого Манрака между посёлками Сагындык и Бозша (1200-1300 м) 28-29 мая 2000 широкохвостки встречались в совершенно необычной обстановке: в отдельных кустах тальников по ручьям или же в пятнах кустарников в логах.

Locustella naevia. Гнездится в пойме Кандысу (Щербаков, Березовиков 2004). Нами поющий самец обыкновенного сверчка отмечен единственный раз 31 мая 2001 в тальниках каньона реки Тайжузген. Вероятнее всего, это была пролётная птица, так как при посещениях в последующие годы его ни разу в этом месте больше не отмечали.

Acrocephalus dumetorum. Возможность гнездования садовой камышевки в Манраке не подтвердилась. В 2000 году с 15 по 28 мая поющие самцы изредка встречались в зарослях тальников и жимолости пойме реки Тайжузген, в густейших зарослях караганы и шиповника по ручьям Канай и Талды (5 встреч). Несомненно, это были пролётные птицы, т.к. при обследовании этих мест 3-11 июня 2002 и 16-17 июня

2004 в наиболее подходящих для гнездования местах мы не встретили ни одной садовой камышевки, которая легко обнаруживается по характерной песне.

Hippolais caligata. В 1960-х годах северная бормотушка была обычной в ущельях в северных отрогах Манрака (Сурвилло 1971). В настоящее время исключительно редка. В 2000-2004 годах встречена нами лишь в двух пунктах вдоль западного подножия Большого Манрака на высотах 1000-1200 м. Поющие самцы встречены 4 июня 2002 в 5 км южнее посёлка Сагындык (47°26´ с.ш., 84°01´ в.д.) и 5 июня 2002 между Сагындыком и зимовкой Абыс (47°28´ с.ш., 84°02´ в.д.). В последнем случае на 1 км маршрута отмечено 5 поющих самцов в густых обширных зарослях кизильника, шиповника, спиреи и жимолости по безводному днищу ущелья, где они держались среди серых славок.

Sylvia nisoria. Редкий гнездящийся вид, отмеченный лишь в четырёх пунктах Манрака. Поющие и токующие самцы ястребиной славки на гнездовых участках в зарослях жимолости татарской, караганы и шиповника наблюдались 28 мая 2000 и 31 мая 2001 на крутом восточнее реки Тайжузген, ниже устья Кошантая (948 м). В Чиликтинской долине, в ущелье Манрака напротив посёлка Тасбастау (1188 м), 29 мая 2001 держался самец, токующий по густым зарослями спиреи на склоне со скалами и крупными обломками гранита. На перевале между посёлками Покровка и Сагындык (1145 м) 4 июня 2002 в лощине, заросшей шиповником, спиреей и кизильником, в кусте жимолости татарской на высоте 45 см был заложен рыхлый каркас гнезда из тонких сухих веточек жимолости и стеблей злаков. Самка занималась строительством, самец пел и токовал на гнездовом участке.

Sylvia communis. Малочисленный гнездящийся вид Манрака, встреченный в 17 пунктах (32 самца). Отмечена в долинах Эспе, Тайжузгена, Кусты, Кызылкайына, на перевалах от посёлка Сарчий в Тасбастау, между посёлками Сарыолен и Бозша, на горных лугах вдоль подножия Большого Манрака между Сагындыком и Бозша (600-12000 м). Населяет густые обширные заросли кизильника, шиповника, спиреи и жимолости по безводным днищам ущелий и заросли шиповника и кизильника на крутых типчаковых склонах со скальными выходами (10 самцов), лугово-степные увалы с куртинами спиреи, шиповника и жимолости (9), поймы речек в густыми зарослями тальников, жимолости и берёзы (7), куртинки спиреи и караганы в степных долинах (3), заросли крапивы у зимовок (2), чиевники и караганники вдоль речного русла (1). Численность в ущельях не превышала 5 самцов на 1 км маршрута. В период с 15 мая по 8 июня встречались поющие и токующие самцы на гнездовых участках.

?***Sylvia altaea***, ?***Sylvia curruca***. Ранее в Саур-Тарбагатайской горной системе, включая Манрак, славка-завирушка *S. curruca* на

гнездовании отсутствовала (Корелов 1972). Известные в Манраке встречи относятся к периоду миграций: 7-8 августа 1955 в ущелье реки Тайжузген (Долгушин 2002) и 27 августа 1979 по речке Кызылкайын (Щербаков, Березовиков 2004). Нахождение в этом хребте славок в гнездовое время в 2000-2004 годах и их встречи в ксерофитных каменистых ущельях с кустарниками, в местах, не свойственных *S. curruca*, привело нас к заключению, что вероятнее всего мы имеем дело с горной славкой *S. altaea*, уже расселившейся из Джунгарского Алатау в Тарбагатай. К сожалению, нам не удалось добыть для подтверждения ни одного экземпляра, а определить встреченных до вида по внешним признаком и песне в полевой обстановке мы не смогли с полной уверенностью. Поэтому до выяснения видовой принадлежности этих славок приводим их под знаком вопроса.

Места наблюдений следующие. На холмисто-увалистом отроге между посёлками Сагындык и Покровка (800-1000 м) встречается по каменистым типчаково-полынно-спиреевым сопкам и сухим долинкам. Здесь 29 и 30 мая 2000 в сухом ущелье с утесами и осыпями наблюдали парочку славок на гнездовом участке в зарослях спиреи и ферулы на каменистом склоне, однако гнезда найти не удалось. В глубоком ущелье реки Тайжузген, ниже устья Кошантая, вверху кустарниковой лощины с зарослями татарской жимолости, шиповника и караганы в кусте жимолости 31 мая 2000 держался поющий самец; концовка его песни звучала как *«тё-тё-тё…»*. На северо-западном склоне Большого Манрака между Сагындыком и зимовкой Абыс (1300 м) в глубине тенистого ущелья в зарослях кизильника 4 июня 2002 слышали песню самца, которую можно передать как *«три-трё-трё-трё…»*. В восточной части Манрака в урочище Талды (470-500 м) 17 мая 2000 и 10-11 июня 2002 в сухих безводных отщелках и долинках между каменистых сопок с зарослями караганы и спиреи изредка встречались поющие и токующие самцы. Некоторые из них держались по кустарникам по днищу ущелий и на крутых склонах с осыпями.

Phylloscopus collybita. В тальниковой пойме реки Тайжузген ниже устья реки Кошантай 15 мая 2000 отмечена позднепролётная теньковка.

Phylloscopus trochiloides. Поющие самцы зелёной пеночки встречены 15 мая 2000 в тальниках среднего и верхнего течения реки Тайжузген (15 мая 2000), в пойме реки Кандысу ниже посёлка Бозша (30 мая 2000) и в ущелье реки Кызылкайын с густым пойменным лесом из тальников, берёзы, черёмухи, боярышника (8 июня 2002).

Phylloscopus humei. Поющие самцы тусклой зарнички из числа пролётных отмечены дважды: 15 и 28 мая 2000 в заболоченной низине с тальниками и берёзами, а также в тальниках в глубоком ущелье речки Кошантай.

Saxicola torquata. Малочисленный гнездящийся вид, крайне спорадично распространенный в Манраке. В 2000-2001 годах черноголовый чекан отмечен лишь в 15 пунктах (22 особи). Встречался в холмистых предгорьях между Тайжузгеном и Эспе, где две пары наблюдались в лощинах между каменистых сопок по промоине безводного русла ручья, густо заросшего спиреей, караганой и ферулой. На перевале между посёлками Сарчий и Тасбастау 29 мая 2000 пару черноголовых чеканов встретили на осоковом болотце у зимовки Сеит (1178 м), а 3 самцов видели в кустарниках сухой злаковой долины у зимовки Унгиркара (1200 м) и на вершине перевала (1285 м). Изредка отмечался в Чиликтинской долине между посёлками Тасбастау и Сарыолен у зимовок Кемпирбулак и Аймамбет (1230-1300 м). Вдоль западного подножия Большого Манрака по горной дороге между сёлами Сагындык и Бозша (1300-1455 м) отдельные пары черноголовых чеканов отмечались по ручьям среди луговых увалов. Первая брачная пара, занявшая гнездовой участок, отмечена 13 мая 2000. В верховьях реки Кошантай (1116 м) 15 мая 2000 наблюдалась пара, начавшая строить гнездо в зарослях осоки среди заболоченной низины с тальниками и берёзами.

Oenanthe oenanthe. Редкий гнездящийся вид, распространённый спорадично. В верховьях реки Тайжзузген в районе зимовки Абыс (1116 м) 15 мая 2000 гнездовую пару обыкновенной каменки встретили в развалинах саманной чабанской избушки. Отдельные пары также наблюдались 14 мая 2000 на стойбище в среднем течении Тайжзузгена (744 м), 27 мая 2000 – в верхнем течении реки Эспе у древнего мазара (715 м), 29 мая 2000 – у западного подножия Большого Манрака в чиевниках по горной дороге между посёлка Сагындык и Бозша (1525 м). В долине Сарыбулака (976 м) 3 июня 2002 2 самца каменки держались у развалин фермы; утром 4 июня в выемке разрушенной каменной стены чабанского дома пара строила гнездо, формируя из травинок лоток; другая самка поблизости была с кормом. По подгорной окраине Манрака встречалась также редко. Территориальные самцы отмечены в посёлке Акжар на крыше автозаправочной станции (12 мая 2000), в чиевой долине реки Кандысу у посёлка Жетыарал (16 июня 2004) и на окраине посёлка Тугыл (7 июня 2002).

Oenanthe pleschanka. Каменка-плешанка – одна из фоновых птиц холмисто-увалистых предгорий и практически всех скалистых ущелий Манрака. Встречена в 50 пунктах (106 особей). В предгорьях (600-800 м) населяет полынно-типчаковые глинистые холмы и каменистые сопки с выходами камней и пятнами зарослей спиреи, а также древние могильники, сложенные из камней. Численность плешанки заметно возрастает в ксерофитных отрогах хребта (800-1000 м) с сухими безводными ущельями, на крутых склонах которых встречаются об-

ширные осыпи, выходы разрушенных пород и утёсы. Плотность населения достигает 3-5 пар на площади 500×500 м. Поющие самцы плешанок и жёлчных овсянок создают основной фон птичьего населения этих мест. В мае-июне токующие самцы, взлетающие высоко вверх, постоянно встречаются по вершинам всех выдающихся скал и скальных гребней. Их полёты можно видеть даже в сильный дневной зной, когда смолкают все другие птицы. Поющие и токующие самцы на гнездовых участках наблюдались с 12 мая по 17 июня. В ущелье ручья Канай 16 мая 2000 самка строила гнездо в скале, таская в него длинные растительные стебли. Пары плешанок, кормящие птенцов в гнездах, часто наблюдались 16-17 июня 2004.

Oenanthe isabellina. Каменка-плясунья – обычный гнездящийся вид горных долин Манрака (500-1500 м), встреченный в 65 пунктах (150 особей). Обитает в долине Кандысу между посёлками Акжар, Покровка и Сарыолен, на подгорном шлейфе вдоль трассы Акжар – Тугыл – Карабулак. Обычна в долинах рек Сарыбулак, Эспе, Тайжузген, Кусты, Кызылкайын, Талды, Карасу, а также по южной окраине Манрака (Чиликтинская долина) между посёлками. Тасбастау и Сарыолен. Наибольшей плотности населения (3-5 пар на 10 км маршрута) достигает в глинистых и щебенистых долинах с полынно-типчаковой растительностью в местах обитания краснощёкого суслика *Spermophilus erythrogenus*. По опустыненным участкам среднего и верхнего течения реки Эспе встречалась в колониях песчанок. Часто наблюдается парами на стойбищах и «тырлах» около чабанских зимовок и кошар.

Monticola saxatilis. Пёстрый каменный дрозд – одна из обычных и характерных гнездящихся птиц большинства ущелий Манрака (600-1500 м). В 2000-2002 годах в 27 пунктах было зафиксировано 47 поющих самцов. Особенно часто наблюдался в ущельях речек Сарыбулак, Тайжузген, Кусты, Кызылкайын, Кенсай, Талды, Карасу, а также по южной окраине Манрака (Чиликтинская долина) между посёлками Тасбастау и Сарыолен. Отдельные поющие самцы наблюдались на перевалах между посёлками Сарчий и Тасбастау, Покровка и Сагындык. Населяет сухие, чаще всего безводные ущелья и отщелки, где на крутых склонах с «языками» осыпей и нагромождений разрушенных пород выступают отдельные скалы, занимаемых территориальными самцами. В некоторых местах пары поселяются в ущельях с гранитными скалами и крупными обломками гранита по их днищу. Охотно используют для гнездования скальные стенки, покрытые ячеистыми углублениями, сформированными в результате выветривания. Кроме того, самцов часто можно видеть по утёсам на высоких гребнях гор, а их токовые полёты, даже в самые жаркие часы дня, являются одним из характерных элементов манракских пейзажей. В отдельных случаях селятся в

скалах, занятых балобанами. В Чиликтинской долине поющего самца наблюдали в прилежащей к горам полынной равнине на развалинах саманной фермы. В отдельных ущельях на учетных площадках размером 500×500 м встречали до 3-5 пар. По наблюдениям 13-17 мая 2000, уже встречались поющие и токующие самцы, занявшие гнездовые участки. В сухом безводном ущелье восточнее посёлка Покровка (900 м) 30 мая 2000 найдено 2 гнезда пёстрого каменного дрозда: первое на склоне под камнем с 5 яйцами, второе – на днище ущелья под валуном с 4 яйцами. Оба гнезда были свиты из разнотравья, из них одно выстлано сухим мхом. Самца с кормом первый раз видели 9 июня 2002. В скальной гряде севернее каньона реки Тайжузген 17 июня 2004 видели самцов и самок, кормивших птенцов в гнёздах, устроенных в недоступных для осмотра нишах. В это же время местами еще встречались активно поющие и токующие самцы.

Monticola solitarius. Синий каменный дрозд – расселяющийся вид. В восточной части Манрака, в безводном ущелье в 3-5 км южнее аула Талды (47°31´ с.ш., 84°27´ в.д., 780 м) с зарослями спиреи по днищу и осыпями на скалистых склонах, 11 июня 2002 наблюдался поющий самец на утёсе (Левин, Березовиков 2002). Ближайшие места гнездования этого дрозда установлены в южных и западных предгорьях Тарбагатая (Березовиков, Левин 2001).

Phoenicurus ochruros. Редкий гнездящийся вид, отмеченный лишь в двух пунктах Манрака. В сухом безводном ущелье со скалами и кустарниковыми склонами напротив посёлка Покровка (900 м) 30 мая 2000 наблюдалась территориальная пара. Другая пара чернушек обнаружена 5 июня 2002 на северном склоне Большого Манрака, по дороге от посёлка Сагындык к ферме Абыс, в вершине большого ущелья (47°28´ с.ш., 84°02´ в.д., 1300 м), в утёсе, занятом парой балобанов.

Luscinia megarhynchos. В ущельях Манрака южный соловей обычен в поймах речек Тайжузген, Кусты, Кызылкайын, Талды (600-1000 м), где населяет участки, густо заросшие тальниками, боярышником, шиповником и жимолостью. Особенно многочислен по реке Казылкайын, где самцы встречаются через каждые 20-30 м, заполняя ущелье оглушительным пением. Поразительна способность этого соловья забираться отдельными парами в самую глубь логов и ущелий Манрака, занимая там порой единственную куртинку кустарников. Так, на северном и восточном склонах Манрака в сухих безводных ущельях Канай (717 м) и Каракойын (890 м) поющих самцов встречали в густейших зарослях караганы. В верхней части ущелья Кенсай в безводном тенистом отщелке, густо заросшем спиреей и кизильником, загроможденном спускающимися с крутых склонов крупнообломочными осыпями, 9 и 17 июня 2002 слышали двух поющих самцов. У западного подножия Большого Манрака, по дороге вдоль хребта среди

луговых увалов между посёлками Сагындык и Бозша (1300-1500 м), там, где по руслам ручьев встречались фрагментарные заросли тальников, в них сразу же отмечалось пение отдельных самцов соловья и широкохвостки. Поющие самцы встречались также в безводных ущельях хребта, густо заросших жимолостью, спиреей и кизильником между Сагындыком и зимовкой Абыс. По окраинам Манрака южный соловей обычен в тополево-ивовой пойме реки Кандысу и в садах посёлков Покровка, Акжар, Тугыл, Карабулак.

Luscinia svecica. Редкий гнездящийся вид, отмеченный только в западной части Манрака. В верховьях реки Тайжузген (1116 м) 15 мая 2000 двух поющих самцов варакушки наблюдали в заболоченной осоковой низине с тальниками и берёзами. Ещё двух токующих самцов встретили 16 июня 2004 в прирусловых зарослях мелкого лоха и мерикарии у плотины через реки Кандысу выше посёлка Покровка.

Turdus viscivorus. Малочисленный гнездящийся вид, встречи с которым единичны. У западного подножия Большого Манрака, в 6.5 км южнее посёлка Сагындык (1233 м), 29 мая 2000 встречено 2 пары и на уступе скалы в 3.5 м от основания осмотрено строящееся гнездо, в котором дерябы производили обмазку лотка. Через 1 км встретили ещё одного дрозда на скале среди луговых увалов. В глубоком ущелье ручья восточнее посёлка Бозша (47°23´ с.ш., 84°02´ в.д., 1172 м) пару видели 31 мая 2000. В северо-восточной части Манрака, в верхней части ущелья Кенсай (47°33´ с.ш., 84°20´ в.д., 762 м), 8 июня 2002 наблюдали дерябу, беспокоившегося на гнездовом участке в тенистом отщелке среди утёсов. Выше по этому ущелью попадался часто.

Remiz coronatus. Малочисленный гнездящийся вид. В северной части хребта, в ущелье реки Кызылкайын (752 м), 7-8 июня 2002 в густом пойменном лесу из тальников, берёзы, черёмухи, боярышника и жимолости встречено несколько пар черноголового ремеза на гнездовых участках и найдено гнездо на берёзе, в котором насиживалась кладка. В широкой тальниковой пойме Кандысу ниже посёлка Бозша 30 мая 2000 наблюдались одиночки.

Passer domesticus. Малочисленный гнездящийся вид, населяющий небольшие аулы у подножия Манрака: Сагындык (20-25), Талды (8-10), Дауал (5-10 пар). В Чиликтинской долине обычны в сёлах Сарыолен, Тасбастау и Кемпирбулак.

Passer indicus. Редкий гнездящийся вид. В верхнем течении реки Эспе (715 м) 28 мая 2000 наблюдали 5 пар индийских воробьёв, живущих совместно со скворцами в норах глинистого обрыва.

Passer montanus. Малочисленный гнездящийся вид. Кроме аулов и посёлков у подножия Манрака гнездится на некоторых фермах у входа в ущелья хребта. Так, ущелье Жангызтобе, северо-восточнее посёлка Бозша, 3-4 июня 2002 в кошаре и чабанском доме отмечены 3

гнездовые пары. В верховьях реки Эспе (715 м) в глинистом обрыве в 2000 и 2002 годах в норах обитало по одной паре полевых воробьёв. В скальной теснине глубокого ущелья реки Тайжузген, ниже устья Кошантая (948 м), 15 мая 2000 пара воробьев строила гнездо в нише скалы в веточном каркасе старого гнезда чёрного аиста *Ciconia nigra*, занятого парой балобанов. В долине Кандысу восточнее посёлка Бозша 16 июня 2004 пара носила корм в гнездо, устроенное в веточном каркасе гнезда орла-могильника *Aquila heliaca* на столбе высоковольтной линии электропередачи.

Petronia petronia. Редкий гнездящийся вид. В ущелье Жангызтобе, напротив посёлка Бозша (47°23′ с.ш., 83°57′ в.д., 976 м), вечером 3 июня 2002 в саманной кошаре наблюдалась брачная пара каменных воробьёв, в которой самец, распушив оперение, токовал перед самкой; утром 4 июня здесь же держалось 2 пары, занявших гнездовые участки под шиферной крышей брошенного чабанского дома, при этом самцы преследовали друг друга, а самки подыскивали места для гнезда, осматривая щели по крышей. В северо-восточной части Манрака, в ущелье между Кенсаем и Талды (47°32′ с.ш., 84°22′ в.д., 838 м), 9 июня 2002 в скалах держалась гнездовая пара.

Serinus pusillus. На северо-восточном склоне Манрака, в верхней части ущелья Кенсай (47°33′ с.ш., 84°20′ в.д., 760-800 м), 8 июня 2002 в скальных отщелках с густыми зарослями можжевельника в двух местах слышали голоса красношапочных вьюрков. Ближайшие места гнездования находятся на северном склоне Саура (Долгушин 2002).

Acanthis cannabina. Обычный гнездящийся вид Манрака (500-1500 м), где населяет холмисто-увалистую каменистую степь с порослью спиреи, караганы и выходами скал и разрушенных пород. Вдоль западного подножия Большого Манрака между посёлками Сагындык и Бозша пары и поющие самцы коноплянки часто наблюдались в зелёных долинках среди луговых увалов (1400-1500 м), а также на выгонах около зимовок и кошар. Отдельные пары встречаются в сухих безводных ущельях с нагромождениями камней и порослью спиреи, караганы и шиповника. В Чиликтинской долине, вдоль южного подножия Манрака, коноплянка часто встречалась между посёлками Тасбастау, Кемпирбулак и зимовкой Аймамбет около брошенных и разрушенных зимовок с арыками и огородами у входа в ущелья. Здесь же, между зимовками Айнабулак и Зор-Торгай (1255 м), наблюдалась парами среди шатрообразных холмов, поросших полынью и типчаком, с живописными скалками по вершинам и выходами разрушенных пород (1 пара на 1 км). Всего в 2000-2002 годах в 30 пунктах встречено 128 особей. В ущелье Жангызтобе, в 5 км северо-восточнее посёлка Бозша, в кустике спиреи по его днищу, 31 мая 2000 самец и самка начали закладку основания гнезда на высоте 10 см.

Rhodopechys sanguinea. Редкий гнездящийся вид, отмеченный в двух пунктах. У северо-восточного подножия Манрака между речками Ушбулак и Талды (47°35´ с.ш., 84°17´ в.д., 686 м) 16 мая 2000 к роднику в течение часа прилетело на водопой 2 пары краснокрылых чечевичников. У западного подножия Манрака между посёлками Сагындык и Покровка в холмисто-увалистом отроге (800-1000 м) с каменистыми типчаково-полынно-спиреевыми сопками и сухими долинками, в безводной щели с утесами и осыпями (47°25´ с.ш., 83°56´ в.д.), 29 мая 2000 встречено ещё 2 пары (Березовиков, Левин 2002а,б).

Bucanetes mongolicus. Малочисленный гнездящийся вид, обитающий преимущественно в нижнем поясе гор. В каньоне реки Тайжузген близ рудника 13 мая 2000 на разрушенной скалке наблюдалась брачная пара монгольских снегирей, в которой самец токовал перед самкой, издавая тихие мелодичные звуки *«чоп-чоп»*, *«вжить-вжить»;* а когда на участке появился другой самец, хозяин его изгнал. На следующий день в урочище в среднем течении Тайжузгена (47° 37´ с.ш., 83°55´ в.д., 744 м) на родник с ближайшей ксерофитной гряды прилетало 2 пары монгольских снегирей, а между Тайжузеном и Эспе (695 м) на глинистых полынно-типчаковых холмах и каменистых сопках с пятнами зарослей спиреи по лощинам и долинкам безводных ручьев держалась ещё одна пара. В холмисто-увалистом отроге между посёлками Сагындык и Покровка (800-1000 м) с каменистыми типчаково-полынно-спиреевыми сопками и сухими долинками 29 мая 2000 по склонам и скалам видели перелетающие пары и группы снегирей. У северного подножия Манрака между речками Ушбулак и Талды (47° 35´ с.ш., 84°17´ в.д., 686 м) 16 мая 2000 у двух родников в течение часа отмечено появление двух групп по 4 и 5 особей. Между Кенсаем и Талды (47°32´ с.ш., 84°22´ в.д., 838 м) 9 июня 2002 одну пару видели в нижней части ущелья, другую на скальной гряде под самым водоразделом (900-1000 м) в утёсе близ гнезда балобана, где самка, трепеща крылышками, просила у самца корм. Отмечены также 27 мая 2000 в ущелье выше аула Кенсай (799 м). В 2000-2004 годах монгольский снегирь сравнительно часто наблюдался в восточной части Манрака между аулами Талды и Дауал, где в сухих скалистых отщелках гор встречалась в среднем 1 пара на 3 км маршрута. На восточной окраине Манрака в каньонообразной долине реки Карасу выше посёлка Карабулак (628 м) 17 мая 2000 часто наблюдались пары, прилетающие на водопой с соседних глинистых холмов и обрывов. В Чиликтинской долине у южного подножия Манрака 30 мая 2001 видели 2 пары на арыке у зимовки Аймамбет (1300 м).

Carpodacus erythrinus. Немногочисленный гнездящийся вид. Чечевица наиболее обычна в пойменных зарослях из тальников, берёзы, черёмухи, боярышника и жимолости в ущельях рек Кызылкайын и

Тайжузген. В западной части Большого Манрака между посёлками Сагындык и зимовкой Абыс (1300-1400 м), где склоны приобретают луговой характер, 5 июня 2002 также встречено множество чечевиц. На 1 км маршрута по зарослям кизильника отмечали свыше 10 самцов. Особенно много их было в глухой тенистой части одного из ущелий, днище которого заросло густыми непроходимыми зарослями спиреи, шиповника и боярышника. Также нередко встречали поющих самцов между посёлками Сагындык и Бозша (1200-1300 м) по луговым увалам с куртинами тальника и кизильника. В верхней части ущелья Кенсай (760-800 м н.у.м.) 8 июня 2002 отмечен самец в пойме ручья. С 15 по 17 мая 2000 встречено лишь 2 поющих самца и 1 самка, а с 27 по 31 мая в предгорьях еще изредка встречали явно пролётных самцов и самок чечевицы.

Emberiza cia. Горная овсянка – обычная гнездящаяся птица Манрака, предпочитающая каменистые склоны гор и ущелья с типчаково-полынной растительностью и разреженной порослью спиреи, караганы и эфедры. Доминирует в верхних поясах гор (1300-1500 м), постепенно замещая красноухую овсянку. В ущельях между Кызылкайыном, Кенсаем и Талды поющие самцы встречались на крутых склонах через каждые 50-100 м. Отмечена в 15 пунктах (53 особи). Между посёлками Сагындык и Покровка (800-1000 м) среди типчаково-полынно-спиреевых сопок с сухими долинками; на каменистом склоне безводного отщелка со спиреей 29 мая 2000 найдено гнездо с 4 птенцами в пуху в возрасте 2-3 сут (глаза ещё не прорезались). Располагалось гнездо на камне под свисающими стеблями большого пучка типчака и представляло собой плотную массивную постройку из стеблей типчака с выстилкой из мягких злаков и конского волоса. В одном из ущелий юго-восточнее аула Талды 11 июня 2002 отмечены слётки.

Emberiza cioides. Красноухая овсянка – обычная, местами фоновая гнездящаяся птица предгорий и ущелий в западной, северной и восточной частях Манрака в долинах Сарыбулака, Узунбулака, Тайжузгена, Кусты, Кызылкайына, Кенсая и Талды (600-1500 м). Встречена в 36 пунктах (99 особей). В холмисто-увалистой местности в безводных скалистых отщелках с зарослями спиреи и караганы преобладала красноухая овсянка, тогда как у входа в ущелья – жёлчная и скальная. Отдельные пары встречались по островкам зарослей караганы среди каменистых сопок. В Большом Манраке (1100-1500 м) часто наблюдается по каменистым лугово-степным склонам и днищам ущелий, обильно поросшим спиреей, шиповником и кизильником с многочисленными камнями и глыбами (10-14 пар на 3 км маршрута). С 29 по 30 мая 2001 поющие самцы красноухой овсянки часто наблюдались на перевале между посёлками Сарчий и Сарыбастау, а также по горной дороге между посёлками Сарыолен и Бозша. В период с 12 мая по 17

июня часто встречаются поющие самцы. В восточной части Манрака, в урочище Талды, 17 мая 2000 осмотрены 2 полные кладки, содержащие по 5 яиц. Первая из них находилась в сухом безводном отщелке между каменистых сопок в кустике полыни в 3 см от земли, вторая – среди разреженных высоких зарослей караганы по сухому руслу ручья у основания маленького кустика караганы, окружённого полынью. В каньоне реки Тайжузген 1 июня 2001 найдено гнездо с 5 яйцами, а в среднем течении этой реки на кустарниковом склоне ущелья в кусте спиреи на высоте 5 см 5 июня 2002 обнаружено гнездо с 5 яйцами. В окрестностях Сагындыка 31 мая 2003 на маленьком кустике спиреи у самой земли осмотрено гнездо с 4 яйцами средней насиженности. Гнёзда свиты из полыни и злаков, выстланы конским волосом. В ущелье Жангызтобе, в 5 км северо-восточнее посёлка Бозша, 31 мая 2000 отмечены слётки, а в ущелье в 3-5 км юго-восточнее аула Талды 10 июня 2002 у одной из 10 встреченных пар были слётки. В районе ущелья Кенсай 17 июня 2004 отмечен короткохвостый птенец, пролетающий не более 10 м.

Emberiza hortulana. Малочисленный гнездящийся вид луговых увалов в западной части Большого Манрака между истоками Тайжузгена, селами Сагындык и Бозша (1200-1500 м). Наиболее ранняя встреча садовой овсянки произошла 13 мая 2000. Поющие самцы и пары на гнездовых участках часто наблюдались уже 28-29 мая 2000 в зелёных долинках среди луговых увалов у подножия Большого Манрака (1100-1455 м).

Emberiza buchanani. Скальная овсянка – обычный гнездящийся вид Манрака, населяющий преимущественно предгорья и нижнюю часть гор (600-1000 м). Отмечена в 43 пунктах (106 особей). В западных, северных и восточных отрогах Манрака между Сарыбулаком, Эспе, Тайжузгеном, Кызылкайыном, Талды и Карасу наряду с жёлчной овсянкой встречается у входа практически в каждое ущелье и наиболее обычна в высотных пределах 500-700 м метров над уровнем моря. У западного подножия Большого Манрака исчезает на луговых увалах на высотах 1100-1200 м, где замещается садовой овсянкой. Как исключение, поющие самцы встречены 28 мая 2000 в верховьях Тайжузгена у зимовки Абыс (1210 м), 4 июня 2001 на типчаково-ковыльных увалах со спиреей и редкими камнями между посёлком Сагындык и крестьянским хозяйством Макжан (1059-1145 м) и 29 мая 2001 на перевале между посёлками Сарчий и Тасбастау на лужайке-тырле у зимовки Сеит (1178 м). Нередко встречали их в южной части Манрака (Чиликтинская долина) у посёлка Тасбастау (1200-1255 м), где они держались по днищу ущелий с крупными гранитными обломками и порослью спиреи, а у зимовок Айнабулак и Зор-Торгай по шатрообразным холмам, поросшим полынью и типчаком со скалками по вершинам и выходами

разрушенных пород (1 пара на 1 км). Отдельные поющие самцы отмечены также на перевале между посёлками Сарыолен и Бозша (1118 м) в зарослях спиреи по скалистым отщелкам. На каменистых типчаково-ковыльных склонах с порослью спиреи, скалками и осыпями встречали до 5 поющих самцов на участках площадью 200×200 м. Активно поющие самцы на гнездовых участках наблюдались между 12 мая 2000 и 17 июня 2004. На перевале между Покровкой и Сагындыком (1000 м) 29 мая 2000 в сухой скалистой щели на осыпи в куртине типчака найдено гнездо с незавершенной выстилкой лотка, а 16 июня 2004 обнаружено строящееся гнездо под навесом камня по днищу ущелья, в которое самка трижды приносила длинные растительные стебли.

Emberiza bruniceps. Жёлчная овсянка – одна из фоновых гнездящихся птиц холмисто-увалистых предгорий и нижнего пояса гор Манрака (500-1200 м). Отмечена в 65 пунктах (237 особей). Наряду со скальной овсянкой, встречается у входа практически в каждое ущелье (3-5 самцов на 1 км маршрута). В районе каньона реки Тайжузген по зарослям спиреи, караганы и ферулы в лощинам между сопок поющие самцы встречались через 100-200 м, иногда по 2 самца на 100 м. Лишь на южной периферии Манрака в Чиликтинской долине между Тасбастау и Сарыоленом жёлчная овсянка встречается единично, где наблюдалась по ручью Айнабулак (1255 м) среди жёлтых глинистых холмов с чиевниками. Наиболее многочисленна в высотных пределах 500-700 м над уровнем моря, выше становится редкой. В период с 13 по 17 мая 2000 отмечено 68 самцов и лишь 7 самок, в том числе 4 брачных пары, которые только начали формироваться. Большинство самцов уже заняли гнездовые участки и активно пели. Ухаживание и преследование самцами самок наблюдали также 31 мая 2000. Самку, начавшую строить гнездо, видели 1 июня 2003. В каньоне Тайжузгена в кустике спиреи 6 июня 2002 найдено гнездо с 4 яйцами.

Заключение

В ходе обследования Манрака в 2000-2004 годах отмечено 63 вида воробьиных птиц, из них 56 гнездящихся. Фауна птиц этого хребта весьма своеобразна, свойственна ксерофитным низкогорьям и является важнейшим очагом биологического разнообразия на востоке Казахстана (Березовиков, Щербаков, Левин 2004).

В Манраке воробьиные птицы наиболее богато представлены в хорошо сохранившихся горных степях, основными фоновыми видами которых являются жаворонки (полевой, степной, белокрылый, двупятнистый, малый, рогатый), жёлчная овсянка, полевой конёк, каменка-плясунья, коноплянка и черноголовый чекан. Для ущелий и каменистых склонов гор характерными видами являются овсянки (скальная,

горная, красноухая), ласточки (скальная, городская), розовый скворец, каменка-плешанка, пёстрый каменный дрозд, деряба, туркестанская горихвостка-чернушка, клушица, обыкновенный ворон, туркестанский жулан, краснокрылый чечевичник, монгольский снегирь, каменный и индийский воробьи. В пойменных зарослях обычны южный соловей, широкохвостка, сорока, обыкновенная чечевица, серая и ястребиная славки, черноголовый ремез. По луговым участкам встречается садовая овсянка. В постройках человека гнездятся деревенская ласточка, скворец, маскированная трясогузка, полевой и каменный воробьи, обыкновенная каменка.

Из расселяющихся видов в Манраке впервые обнаружен синий каменный дрозд, а также отмечен залёт майны. Кроме того, в средней части ущелья реки Кызылкайын на высоте 800 м над уровнем моря 8 июня 2002 в скальном обрыве мы слышали своеобразную песню, по всей видимости, принадлежащую овсянке Стюарта *Emberiza stewarti*. Приводим этот вид с целью обратить внимание будущих исследователей на возможность нахождения в Манраке этой овсянки, имеющей устойчивую тенденцию к расселению (Ковшарь, Березовиков 2001). Не исключено, что в ближайшие годы в Манраке появится и певчая славка *Sylvia hortensis*, в 2000-2002 годах обнаруженная на северном склоне Тарбагатая между реками Шет-Бугаз и Тебиске (Березовиков, Левин 2001, 2002). Есть все основания предполагать возможность появления здесь и горной славки *Sylvia althaea*, уже заселившей Джунгарский Алатау и также имеющей тенденцию к расселению на северо-восток. Поэтому в дальнейшем необходимо уделить особое внимание славкам из группы *«curruca»*.

Литература

Березовиков Н.Н. (2002) 2012. О появлении майны *Acridotheres tristis* в Зайсанской котловине // *Рус. орнитол. журн.* **21** (743): 725-726.

Березовиков Н.Н. 2004. О расширении ареала белокрылого жаворонка в области Тарбагатая // *Каз. орнитол. бюл. 2004:* 181.

Березовиков Н.Н., Левин А.С. 2001. Новые данные о расширении ареала широкохвостой камышевки и певчей славки на востоке Казахстана // *Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии*. Казань: 87-90.

Березовиков Н.Н., Левин А.С. 2001. О гнездовании синего каменного дрозда *Monticola solitarius* в Тарбагатае // *Рус. орнитол. журн.* **10** (168): 1027-1029.

Березовиков Н.Н., Левин А.С. 2002а. Экспедиции: Джунгарский Алатау, Восточное Прибалхашье, Тарбагатай, Манрак, Казахский мелкосопочник // *Каз. орнитол. бюл. 2002:* 29-37.

Березовиков Н.Н., Левин А.С. (2002б) 2012. Новые данные о распространении краснокрылого чечевичника *Rhodopechys sanguinea* в Тарбагатае и Манраке // *Рус. орнитол. журн.* 21 (739): 611-613.

Березовиков Н.Н., Левин А.С. (2006) 2012. Материалы к фауне птиц хребта Манрак. Часть 1. Неворобьиные // *Рус. орнитол. журн.* **21** (782): 1865-1882.

Березовиков Н.Н., Самусев И.Ф. 2003. Птицы Зайсанской котловины. VI. Passeriformes // *Рус. орнитол. журн.* **12** (220): 431-465.

Березовиков Н.Н., Щербаков Б.В. (2000) 2011. Чёрный жаворонок *Melanocorypha yeltoniensis* в Зайсанской котловине // *Рус. орнитол. журн.* **20** (690): 1879-1886.

Березовиков Н.Н., Щербаков Б.В., Левин А.С. 2004. Гнездовая фауна птиц Тарбагатайского заказника (хребет Манрак) // *Selevinia:* 97-106.

Долгушин И.А. 2002. Материалы к авифауне Саура, Манрака и Чиликтинской долины // *Selevinia:* 61-72.

Ковшарь А.Ф., Березовиков Н.Н. 2001. Тенденции изменения границ ареалов птиц в Казахстане во второй половине XX столетия // *Selevinia:* 33-56.

Корелов М.Н. 1972. Род Славка – *Sylvia* // *Птицы Казахстана.* Алма-Ата, **4**: 153-205.

Левин А.С., Березовиков Н.Н. (2002) 2012. Первое нахождение синего каменного дрозда *Monticola solitarius* в Манраке (Саур-Тарбагатайская горная система) // *Рус. орнитол. журн.* **21** (739): 613.

Сурвилло А.В. 1971. *Птицы Зайсанской котловины и их связь с арбовирусами.* Автореф. дис. … канд. биол. наук. Алма-Ата: 1-23.

Щербаков Б.В. 1989. Орнитологические находки в горной части Восточного Казахстана // *Экологические аспекты изучения, практического использования и охраны птиц в горных экосистемах.* Фрунзе: 113-115.

Щербаков Б.В. (1999) 2012. Орнитологические находки на хребте Саур (Восточный Казахстан) // *Рус. орнитол. журн.* **21** (744): 752-754.

Щербаков Б.В., Березовиков Н.Н. 2004. Птицы хребта Манрак // *Рус. орнитол. журн.* **13** (261): 435-461.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **783**: 1915-1916*

Гнездование желтоголовой трясогузки *Motacilla citreola calcarata* на реке Чилик в северных предгорьях Заилийского Алатау

А.В.Коваленко

*Второе издание. Первая публикация в 2002**

На заболоченном лугу в пойме реки Чилик у окраины села Алагабас 7 июня 2001 найдено гнездо черноспинной желтоголовой трясогузки *Motacilla citreola calcarata* Hodgson 1836 с 5 оперёнными птенцами, уже готовыми к вылету. Оно располагалось в небольшой полости в

* Коваленко А.В.. 2002. Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola* // *Каз. орнитол. бюл. 2002:* 105.

небольшом обрыве у лужи с родниками. Одна птица с кормом в клюве беспокоилась рядом. Ранее гнездование этой формы в подгорной зоне Заилийского Алатау не было известно.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **783**: 1916-1917*

Случай гнездования обыкновенного ворона *Corvus corax* на дереве в Южном Алтае

С.В.Стариков

*Второе издание. Первая публикация в 2007**

На востоке Казахстана все найденные до настоящего времени гнёзда обыкновенного ворона *Corvus corax* располагались на скалах (Стариков 1994, 1999, 2005, 2006; Березовиков, Левин 2007). Одно из таких гнёзд, найденное в окрестностях села Катон-Карагай, было под моим наблюдением в 2004 и в 2005 годах. При регулярных моих посещениях гнезда для осмотра содержимого пара воронов всегда вела себя очень беспокойно. В 2006 году гнездо не было обнаружено, несмотря на тщательные поиски. Вóроны на этом месте вели себя точно так же, как и у гнезда – летали кругами, присаживались на скалы, постоянно кричали. То же повторилось в апреле 2007 года. Птицы беспокоились, а гнезда не было. Лишь 2 мая 2007 я совершенно случайно обнаружил гнездо этой пары воронов в 1.5 км от старого гнезда. Устроено оно было в очень густом участке старого елового леса в урочище Согра и помещалось на боковых ветвях у ствола старой ели высотой около 15 м в 3 м от вершины. Постройка была очень хорошо скрыта ветвями. Если бы не крики самки, сидевшей в гнезде, обнаружить его было бы невозможно. Не удивительно, что в котловине озера Маркаколь в ущелье Тесного ключа Н.Н.Березовиков (1989) наблюдал 9 мая 1980 пару воронов, носивших корм в горный пихтач, но гнезда так и не нашёл. Интересно, что после того, как жилое гнездо на ели было найдено, вóроны перестали имитировать беспокойство у своего старого гнезда на скалах.

Литература

Березовиков Н.Н. 1989. *Птицы Маркакольской котловины (Южный Алтай).* Алма-Ата: 1-200.

* Стариков С.В. 2007. Случай гнездования обыкновенного ворона *(Corvus corax)* на дереве в Южном Алтае // *Каз. орнитол. бюл. 2007:* 150-151.

Березовиков Н.Н., Левин А.С. (2007) 2012.. Материалы к фауне птиц хребта Манрак. Часть 2. Воробьиные // *Рус. орнитол. журн.* **21** (783): 1893-1915.

Стариков С.В. (1994) 2012. Первые находки гнёзд ворона *Corvus corax* в горах Восточного Казахстана // *Рус. орнитол. журн.* **21** (733): 462-463.

Стариков С.В. 1999. Гнездование ворона в Тарбагатае и Зайсанской котловине // *Проблемы охраны и устойчивого использования биоразнообразия животного мира Казахстана*. Алматы: 87.

Стариков С.В. 2004. Наблюдения птиц в окрестностях с. Катон-Карагай весной 2004 г. // *Каз. орнитол. бюл. 2004:* 93-95.

Стариков С.В. 2005. О гнездовании обыкновенного ворона в Бухтарминской долине (Южный Алтай) // *Каз. орнитол. бюл. 2005:* 208-209.

Стариков С.В. 2006. Аннотированный список птиц Катон-Карагайского национального парка и прилегающих территорий Алтая // *Тр. Катон-Карагайского национального парка*. Усть-Каменогорск, **1**: 147-241.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **783**: 1917-1918*

Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides* в окрестностях «Леса на Ворскле»

А.В.Бардин

Александр Васильевич Бардин. Кафедра зоологии позвоночных, биолого-почвенный факультет, Санкт-Петербургский университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: ornis@mail.ru

Поступила в редакцию 9 августа 2012

Поющие самцы зелёной пеночки *Phylloscopus trochiloides* наблюдались в «Лесу на Ворскле» и его окрестностях в июне 1958, 1973, 1981 годов (Новиков и др. 1963; Овчинникова 1999), а также 14 июня 2012, когда поющий самец держался на нагорном участке между дендрарием заповедника и посёлком Борисовка (Соколов 2012). К этим опубликованным материалам нужно добавить, что мы регулярно встречали зелёных пеночек во время проведения студенческой практики в 2003, 2004, 2005 и 2012 годах. Наиболее излюбленном местом токования самцов, обычно остававшихся, по-видимому, холостыми и исчезавшими через две-три недели, был поросший деревьями крутой склон долины Ворсклы у спуска к Борисовке в районе дендрария, т.е. там, где наблюдал этот вид А.Ю.Соколов. Отсюда они залетали и на территорию базы заповедника «Белогорье». Наибольшее число зелёных пеночек отмечено в 2004 и 2012 годах – по 4 поющих в разных местах самцов. Только один раз, 13 июня 2005, мы наблюдали беспокоившуюся птицу невысоко над землёй, т.е. когда можно было предполагать гнездование.

Эта пеночка держалась на крутом склоне заросшего оврага у бывшего склада ГСМ (50°37´02´´с.ш., 35°59´39´´ в.д.). Ещё одно место встреч зелёных пеночек в 2012 году – деревья по крутому склону правого берега Ворсклы по улице Комсомольской посёлка Борисовки. 11 июня здесь одновременно можно было слышать и видеть двух самцов.

Поведение и характер пребывания зелёных пеночек в Борисовке очень напоминает описанное для лесостепной части Сумской области, где зелёная пеночка впервые наблюдалась в 1980 году (Кныш 1982). Весной там эти птицы появляются в среднем 17 мая. Даты первых встреч – от 11 мая в 1981 и 1997 годах до 24 мая в 1988 (Кныш 2001).

Литература

Кныш Н.П. (1982) 2009. Находка зелёной пеночки *Phylloscopus trochiloides* на северо-востоке Украины // *Рус. орнитол. журн.* **18** (477): 617-618.

Кныш Н.П. 2001. Заметки о редких и малоизученных птицах лесостепной части Сумской области // *Беркут* **10**, 1: 1-19.

Новиков Г.А., Мальчевский А.С., Овчинникова Н.П., Иванова Н.С. 1963. Птицы «Леса на Ворскле» и его окрестностей // *Вопросы экологии и биоценологии* **8**: 9-118.

Овчинникова Н.П. 1999. Птицы водно-болотных стаций окрестностей заповедника «Лес на Ворскле» // *Рус. орнитол. журн.* **8** (70): 10-23.

Соколов А.Ю. 2012. Встречи просянки *Miliaria calandra* и зелёной пеночки *Phylloscopus trochiloides* на особо охраняемых территориях Белгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **21** (766): 1384-1386.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **783**: 1918-1920*

О встречах некоторых редких видов птиц на юге Тверской области

И.М.Малых, Я.А.Редькин

*Второе издание. Первая публикация в 2009**

В настоящем сообщении приведены сведения о встречах некоторых редких и спорадично распространённых в пределах Нечернозёмного центра России видах птиц. Наблюдения проводились в летние месяцы 2006-2009 годов на границе Ржевского и Зубцовского районов Тверской области: в окрестностях деревни Коммуна (56°15.4´ с.ш.; 34° 45.841´ в.д., бывший совхоз «Коммунар»), в окрестностях деревни Карамзино (56°16´ с.ш.; 34°44´ в.д.) по левобережью реки Волги от посёлка Троицкое (56°14.9´ с.ш.; 34°46.3´ в.д.) до деревни Саблино (56°14.6´ с.ш.; 34°49.1´ в.д.)

* Малых И.М., Редькин Я.А. 2009. О встречах некоторых редких видов птиц на юге Тверской области // *Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России*. М.: 295-296.

и нежилого посёлка Волыново (56°16´ с.ш.; 34°48´ в.д.), в окрестностях посёлков Большое и Малое Пищалино (56°13.0´ с.ш.; 34°41.2´ в.д. и 56°13.8´ с.ш.; 34°46.8´ в.д.), Боброво (56° 13.21´ с.ш.; 34°45.5´ в.д.), Троицкое (56°14.26´ с.ш.; 34°46.6´ в.д.).

Ciconia ciconia. Пара белых аистов на гнезде наблюдалась в деревне Большое Пищалино 4 июня 2006. Один аист встречен 24 июля 2006 в деревне Боброво. Две особи – судя по размерам, самец и самка – наблюдались в деревне Коммуна в конце июля 2007 года, ещё одна птица встречена 21 августа 2007 в деревне Большое Пищалино. 13 июля 2008 пара белых аистов с выводком из трёх молодых особей прилетали кормиться на пруд в деревне Коммуна.

Anas strepera. 6 июня 2006 две серых утки встречены на берегу Волги у места впадения в неё ручья Каменка близ деревни Коммуна.

Pernis apivorus. Два осоеда, судя по размеру самец и самка, наблюдались 23 августа 2007 над левым берегом Волги в районе посёлка Саблино. Самец один раз выполнил токовой полёт, чуть позже одна из птиц летала с сухой веткой в лапах, но вскоре её бросила.

Circus cyaneus. Один самец полевого луня отмечен 12 августа 2006 в окрестностях деревни Коммуна, на берегу Волги. Одна взрослая самка наблюдалась на поле у посёлка Троицкое 24 августа 2007.

Circus pygargus. В июле-августе 2006 года мы постоянно наблюдали пару взрослых и двух молодых луговых луней, охотившихся над полем в окрестностях деревни Малое Пищалино. Пустое гнездо этой пары, располагавшееся в неглубокой канаве с густыми зарослями крапивы и хмеля в центре заброшенного поля, нашли 2 июля 2006.

Falco vespertinus. В июле 2006 года два выводка кобчика неоднократно наблюдались близ деревни Большое Пищалино. 24 августа 2007 два выводка (9 молодых и 2 самки) отмечены между посёлками Малое Пищалино и Боброво, в тот же день был встречен выводок (4 молодых и 1 самка) у окраины посёлка Большое Пищалино.

Grus grus. Пара серых журавлей наблюдалась 2 июля 2006 на заброшенном поле между деревнями Коммуна и Карамзино. 25 июля 2006 девять особей пролетели над деревней Коммуна. Голоса журавлей многократно фиксировались севернее деревни Коммуна в утренние и вечерние часы 22 и 23 августа 2007, а также в последних числах августа 2008 года.

Tringa nebularia. 5 больших улитов встречены на берегу Волги близ деревни Коммуна 23 августа 2007.

Haematopus ostralegus. 7 июля 2006 отмечены 2 кулика-сороки летящими западнее деревни Коммуна в районе впадения реки Держа в Волгу. На следующий день, вероятно, эти же два кулика кормились в том же месте на берегу Волги.

Picus viridis. В июле 2006 года в берёзовой роще в окрестностях деревни Троицкое многократно наблюдались одна взрослая и одна

молодая птицы. Две территориальные пары зелёных дятлов держались там же 13 июля 2008.

Picus canus. Седой дятел единственный раз встречен 21 августа 2007 в деревне Коммуна.

Dendrocopos leucotos. В июле 2007 года взрослые белоспинные дятлы несколько раз наблюдались южнее нежилого посёлка Волыново.

Locustella naevia. Одиночные поющие самцы обыкновенного сверчка зарегистрированы 1 июля 2006 в деревне Коммуна, 2 июля 2006 в высокотравье у дороги между деревнями Коммуна и Карамзино, 6 июля 2006 в кустарнике у нежилого посёлка Волыново и 7 июля 2006 у устья ручья Каменка. Два поющих самца встречены 13 июля 2008 у пруда в деревне Коммуна.

Hippolais caligata. 24 июля 2006 один поющий самец северной бормотушки встречен у деревни Боброво, несколько птиц отмечено визуально. В конце июля 2007 года у деревни Боброво найдено небольшое поселение бормотушек, состоявшее не менее чем из 3 пар; птицы проявляли беспокойство.

Parus palustris. Болотная гаичка – фоновый вид сырых приречных ольшаников и смешанных лесов. По численности в обсуждаемом районе примерно вдвое превосходит пухляка *Parus montanus*.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **783**: 1920-1921*

Гнездование врановых на металлических опорах линий электропередач в Верхнем Приамурье

В.А.Дугинцов, Н.С.Панькин

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

Изучали гнездование сорок *Pica pica* и грачей *Corvus frugilegus* на опорах ЛЭП в Верхнем Приамурье в 1982-1990 годах. Модельный участок из 50 опор (12.5 км) пересекает левобережную пойму реки Зеи.

Сорока освоила опоры ЛЭП для гнездования ещё в начале 1960-х годов, а с 1970-х на юге Верхнего Приамурья происходит резкое увеличение численности грачей (до 170-180 гнёзд). Дефицит древесной растительности в земледельческих районах Зейско-Буреинской равнины обусловил освоение грачами опор ЛЭП для гнездования. Гнёзда

* Дугинцов В.А., Панькин Н.С. 1991.Гнездование врановых на металлических опорах линий электропередач // *Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф.* Минск, **2**, 1: 203.

врановых на опорах ЛЭП занимали пустельги *Falco tinnunculus* (6-13 ежегодно), амурский кобчик *Falco amurensis* и чеглок *Falco subbuteo* (единично). С 1982 по 1990 год произошло сокращение числа гнездящихся пар сорок (до 8-19 гнёзд ежегодно) и вторично заселяющих их гнёзда мелких соколов на фоне роста численности грачей. Сокращение численности сорок происходит за счёт вытеснения грачами. Колониальное гнездование грачей определяет «этажное» расположение гнёзд на опорах ЛЭП; при дефиците строительного материала грачи растаскивают строящиеся гнёзда сорок, не охраняемые ими в начале гнездования. В результате грачи вытесняют сорок с наиболее удобных верхних элементов конструкций опор, а сороки начинают осваивать нижние горизонтальные стяжки в местах их крепления к вертикальным стойкам мачты.

Незащищённые стяжками опор массивные шарообразные гнездовые постройки сороки на начальных этапах освоения этих элементов конструкций сдувались сильными ветрами. В этой ситуации успешно размножались пары, имевшие невысокие, уплощенные гнёзда с крышей в виде навеса. Второй элемент конструкций опор ЛЭП, активно застраиваемый сороками,– вершина опоры. Грачам это место малодоступно из-за частого расположения боковых стяжек опоры. Сороки освоили его до вселения грачей, но из-за неудобства гнездования занимали более выгодные элементы опор. Усиление конкуренции с грачами за места гнездования вынудило сорок занимать эти элементы. В 1990 году 21% сорок гнездилось в углах нижних стяжек опор и 52.6% – в вершинах. Освоение новых элементов конструкций опор сороками снизило напряженность межвидовой конкуренции и обеспечило рост численности относительно минимума 1983 года в 2.4 раза. Сокращение численности мелких соколов обусловлено нехваткой пустующих сорочьих гнёзд, которым они отдают предпочтение.