

ISSN 0869-4362

Русский
орнитологический
журнал

2013
XXII



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
869
EXPRESS-ISSUE

2013 № 869

СОДЕРЖАНИЕ

- 1005-1010 Март-Олав Никлус – эстонский орнитолог
и правозащитник. Е. Э. ШЕРГАЛИН
- 1010 Колония колпицы *Platalea leucorodia*
на озере Сорколь в западной части
Волжско-Уральского междуречья.
Г. В. ЛИНДЕМАН
- 1011-1027 Орнитологические наблюдения в Калбинском
нагорье в 2006 году. Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ,
И. Э. СМЕЛЯНСКИЙ, А. Н. БАРАШКОВА,
А. А. ТОМИЛЕНКО
- 1027-1028 Колония колпицы *Platalea leucorodia*
на озере Караколь в Илийской долине.
В. В. ХРОКОВ, Э. И. ГАВРИЛОВ
- 1028-1029 Необычные случаи вокализации зяблика
Fringilla coelebs и чёрного дрозда *Turdus merula*:
пение самки и пение самцов на лету.
Н. П. КНЫШ
-

Редактор и издатель А. В. Бардин

Кафедра зоологии позвоночных

Биолого-почвенный факультет

Санкт-Петербургский университет

Россия 199034 Санкт-Петербург

CONTENTS

- 1005-1010 Mart-Olav Niklus – Estonian
ornithologist and human rights defender.
E . E . S H E R G A L I N
- 1010 Breeding colony of the white spoonbill *Platalea
leucorodia* on Lake Sorkol in western part of area
between Volga and Ural. G . V . L I N D E M A N
- 1011-1027 Ornithological observations
in Kalba Highlands in 2006.
N . N . B E R E Z O V I K O V , I . E . S M E L Y A N S K Y ,
A . N . B A R A S H K O V A , A . A . T O M I L E N K O
- 1027-1028 Breeding colony of the white spoonbill *Platalea
leucorodia* on Lake Karakol in the Ili valley.
V . V . K H R O K O V , E . I . G A V R I L O V
- 1028-1029 Singing of a female in the chaffinch *Fringilla
coelebs*, and singing on the fly in males of the
blackbird *Turdus merula*. N . P . K N Y S H

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
S.-Petersburg University
S-Petersburg 199034 Russia

Март-Олав Никлус – эстонский орнитолог и правозащитник

Е.Э.Шергалин

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское Орнитологическое Общество. E-mail: zoolit@mail.ru

Поступила в редакцию 21 июля 2012

Первый раз наша встреча с этим человеком произошла при весьма необычных обстоятельствах и поэтому запомнилась на всю жизнь. Во время международной конференции по журавлям в Олимпийском центре парусного спорта в Таллине в сентябре 1989 года для участников симпозиума была организована экскурсия в Матсалуский заповедник. При посещении административного центра заповедника мы собрались все вместе, чтобы сделать групповое фото. Рядом оказался человек, прежде мне неизвестный, хотя в ту пору я уже неплохо знал всех эстонских профессиональных орнитологов. За пару дней до этого, ещё в Таллине, в кулуарах между пленарными заседаниями я невольно обратил внимание на него потому, что он совершенно свободно общался с разными иностранными орнитологами на их языках: с немцами по-немецки, с французами по-французски, с англичанами и американцами по-английски и так далее. Говорил он очень чисто и по-русски, хотя у эстонцев, как известно, вполне явственно ощущается характерный акцент в русской речи.

Я не выдержал и спросил: «А где Вы выучили столь много языков?» – «В тюрьме». – «Не, я серьезно...» – «И я серьезно». – «Да я не шучу». – «И я не шучу, в тюрьме, я же сказал...».

После понятного замешательства с моей стороны мы разговорились. Так состоялась первая встреча. Оказалось, что всего за год до этого события Март-Олав Никлус был освобождён из тюрьмы, где он находился как политический заключённый, и во время его возвращения домой, в Тарту, студенты пронесли его в тюремной полосатой робе на руках от железнодорожного вокзала до актового зала Тартуского университета. Позже я узнал много нового об этом удивительном человеке. Сейчас в Эстонии трудно найти эстонца, который бы его не знал.

Март-Олав Никлус родился в Тарту 22 сентября 1934 года в семье школьного учителя. Он был старшим сыном. Интерес к наблюдениям птиц и к естествознанию проснулся у Марта-Олава ещё в школьные годы и особенно развился в начале 1950-х годов. Первая статья по птичьей теме у него вышла в 1953 году, когда автору было 19 лет. Она называлась «Ropka luha ja Aardla järve linnustikust» (Об орнитофауне поймы Ропка и озера Аардла) и была напечатана в юбилейном сбор-

нике Эстонского общества естествоиспытателей (1953, с. 375-181). В 1952 году Март-Олав заканчивает Первую среднюю школу в Тарту и поступает в единственный в те годы университет Эстонии. В 1952-1957 годах он учится на биофаке Тартуского университета. Дипломную работу он пишет по орнитологии.



Март-Олав Никлус (Scanpix/ Sille Annuk).

Авторские права защищены. Фото с сайта: <http://gossip.ee/articles/13361-bioloog-ja-vabadusvoitleja-mart-niklus-gossip-ee-le-soja-ajal-erilisi-unistusi-polnud-koige-tahtsam-oli-ellu-jacaeda?locale=et>

Одновременно с занятиями орнитологией Март-Олав начинает серьёзно интересоваться историей и политикой. Вместе с несколькими друзьями-студентами он требует признать незаконность присоединения Эстонии к СССР, рассекретить секретные приложения к пакту Молотова-Риббентропа, вывода советских войск, организует тайные студенческие собрания и расклеивает листовки. Вокруг его имени поднимается шумиха. Дальнейшая работа по специальности была заблокирована его научным руководителем – в то время в Эстонии орнитологом «номер один» – профессором Э.В.Кумари, который в 1959 году заявил, что из-за политических взглядов Март-Олав Никлус к научной работе «абсолютно не подходит». Многие сейчас осуждают Эрика Вольдемаровича за такую позицию, но в то время это был единственный выход и шанс не подставить эстонскую орнитологию под удар и чрез-

мерное внимание компетентных органов. Поэтому Э.В.Кумари вполне можно понять. Возможно, что по этой же причине имя Никлуса было вычеркнуто из списка авторов обзора «Эстонская орнитологическая литература 1656-1975 – Eesti ornitoloogilise kirjanduse 1656-1975», составленного супругами Роотсмяэ и изданного в Тарту на трёх языках в 1983 году (Rootsmae, Rootsmae 1983). Однако Главлит проморгал главное – вымарав имя Никлуса в списке авторов в конце книги, они не стёрли сами названия его работ, а поскольку на роль персоны нон-грата в тот период претендовал только один Март-Олав Никлус, то все пользователи этой обширной библиографии прекрасно знали настоящее имя автора нескольких «анонимных» печатных работ по птицам Эстонии.



Вручение Марту-Олаву Никлусу удостоверения почётного члена Эстонского орнитологического общества председателем этого общества Андросом Каламеезом в Тарту в мае 2011 года во время празднования 90-летия Общества.
С сайта – <http://toomasjuriado.blogspot.co.uk/2011/05/linnurahva-sunnipaevast.html>

В качестве известного правозащитника Март-Олав Никлус арестовывался трижды и провёл в тюрьме в общей сложности 16 лет: 1958-1966, 1976, 1980-1988 годы. Он был выпущен на свободу только благодаря горбачёвской перестройке. Для того, чтобы не сойти с ума сидя в камере-одиночке, он учил европейские языки и сейчас на многих из них говорит совершенно свободно. В 1991 году он опубликовал свои воспоминания об Андрее Дмитриевиче Сахарове, с которым был знаком лично и дружил. Никлуса иногда называют эстонским Владимиром Буковским, потому что их объединяет не только высшее биологическое образование, но и правозащитная деятельность. По политическим и другим причинам в своей дальнейшей жизни Март-Олав не

работал по специальности, а также не защитил диссертации. Ему пришлось переквалифицироваться в новую профессию учителя иностранных языков и профессионального переводчика.



Во время празднования 90-летия Эстонского общества естествоиспытателей в Тарту в мае 2011 года.

Самые уважаемые старейшины Общества: (слева направо): Рут Линг, Вилью Лиллелехт, Ээт Тууле, Олав Ренно, Март-Олав Никлус и Линда Метсаорг.

С сайта: <http://toomasjuriado.blogspot.co.uk/2011/05/linnurahva-sunnipaevast.html>

С тех пор орнитология стала для него сердечным и сокровенным увлечением. Он опубликовал о птицах много статей в различных периодических изданиях – в журналах «Eesti Loodus», «Rahvuslik Kontakt», газете «Postimees» и т.д. При первой же возможности Март-Олав стремился выбираться на природу, где вёл наблюдения и любовался птицами, посещая места своих давнишних полевых работ, иногда даже возглавляя орнитологические экскурсии. Кроме любимой орнитологии, Март-Олав Никлус до сих пор интересуется и другими областями биологии. Именно он перевёл на эстонский язык три основные работы великого Чарльза Дарвина.

Март-Олав Никлус вступил в орнитологическую секцию Эстонского общества естествоиспытателей в 1953 году. Как почётный гражданин города Тарту он в 2011 году был избран почётным членом Эстонского орнитологического общества.

И ещё один эпизод с Никлусом мне запомнился на всю жизнь. В 1990 году для участников 8-х Совместных дней эстонских и финских

орнитологов была организована поездка в пограничный город Печоры, в Псково-Печерский монастырь. Эстония, хоть и была тогда уже в пяти шагах от своей независимости, ещё входила в состав СССР, и поэтому для финских гостей и в основном ради них и была организована экскурсия в знаменитый монастырь, находящийся на территории России, хоть и рядом с эстонско-российской границей. Пять интуристовских автобусов доставили около 300 человек на небольшую площадь перед входом в монастырь. На площадке ненадолго образовалось большое столпотворение и я решил пропустить всех вперед. Так же решил поступить и Март-Олав. Вместе с ним мы замыкали шествие. Перед входом в монастырь стоял довольно большой, сделанный из плексигласа ящик для сбора пожертвований. Его стенки были прозрачны и было хорошо видно, кто и сколько пожертвовал. Заметно отстав от всех, у узкого входа перед этим ящиком мы стали пропускать друг друга вперед, как в известном эпизоде перед лифтом из фильма «Ирония судьбы». Ссылкой на возраст Никлуса мне, наконец, удалось убедить его пройти первым. Так я случайно смог увидеть, сколько он положил в этот прозрачный ящик. До него ящик был наполнен рублёвыми и трёхрублёвыми купюрами и монетами, лишь кое-где розовели десятки. Март-Олав положил 25 рублей, то есть сделал максимальный взнос. Боюсь, что это было самое крупное пожертвование не только за этот день. Несмотря на уже начинавшуюся гиперинфляцию, 25 рублей тогда ещё были ощутимой суммой. Я открыл рот от изумления и с вытаращенными глазами, не сдержавшись, возопил: «Как же так, Вы же сидели трижды и провели 16 лет в России за решеткой?» А Март, улыбнувшись, спокойным голосом ответил: «А я разделяю простой русский народ, многих представителей которого люблю и уважаю, и тоталитарную идеологию, которую ненавижу».

На этом и хочется завершить статью об этом смелом, открытом, и бескомпромиссном человеке, к большому сожалению, так и не реализовавшем себя как учёный, но хорошо известном как правозащитник.

Орнитологические публикации Марта-Олава Никлуса

- Niklus M.-O. 1953. Ropka luha ja Aardla jarve linnustikust // *Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos*. Tallinn: 375-381 [Об орнитофауне поймы Ропка и озера Аардла].
- Никлус М.-О. 1956. Осенняя миграция птиц (август 1954 г.) на морском острове Хобулайд // *Loodusuurijate Seltsi aastaraamat* **49**: 53-64.
- Niklus M.-O. 1957. Andmeied Happsalu umbruse merelinnustikust // *Loodusuurijate Seltsi aastaraamat* **50**: 271-278 [Данные о морской орнитофауне окрестностей г. Хаапсалу].
- Никлус М.-О. 1957. Гнездование и перелёты крачки-чегравы в Эстонской ССР // *3-я Прибалт. орнитол. конф.: тез. докл.* Вильнюс: 60-61.
- Niklus M.-O. 1958. Haapsalu umbruse linnustiku koostisest ja elupaigalisest levikust // *Ornitoloogiline kogumik* **1**: 119-138 [О составе и распределении по биотопам орнитофауны окрестностей г. Хаапсалу].

- Niklus M.-O. 1958. Lindude sugisranne Hobulailul (Haapsalu rajoon) // *Abiks loodusevaatlejale* 36: 28-29 [Осенняя миграция птиц на морском острове Хобулайд в августе 1955 года].
- Никлус М.-О. 1959. Гнездование и перелёт крачки-чегравы в Эстонской ССР // *Тр. 3-й Прибалт. орнитол. конф.* Вильнюс: 205-208.
- Niklus M.-O. 1973. Naaskelnokk Saaremaal // *Eesti Loodus* 6: 354 [Шилоклявка на острове Сааремаа].

Л и т е р а т у р а

Rootsmae, I., Rootsmae L. 1983. *Eesti ornitoloogiline kirjandus 1656-1975*. Tartu: 1-318.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск 869: 1010

Колония колпицы *Platalea leucorodia* на озере Сорколь в западной части Волжско-Уральского междуречья

Г.В.Линдеман

Второе издание. Первая публикация в 1991*

В западной части Волжско-Уральского междуречья гнездовья колпицы *Platalea leucorodia* известны только на озере Сорколь, в 90 км к востоку от посёлка Джаныбек. Впервые 2 колпицы встречены здесь в июне 1978, а в 1980 году они загнездились на низменном солончаковом острове вблизи больших колоний сизой чайки *Larus canus*, хохотуньи *Larus cachinnans* и черноголового хохотуна *Larus ichthyaetus*. Здесь 13 гнёзд колпицы, около 25 гнезд серой *Ardea cinerea* и 2 гнезда большой белой цапли *Egretta alba* составляли смешанную колонию и помещались на заламах тростниках в небольших его куртинах по берегу острова и на низких усохших кустах тамарикса. В 1982 году здесь гнездилось 6 пар колпиц, в 1983 – более 20 пар, а число гнёзд серой и большой белой цапель достигло 100.

На других водоёмах даже бродячих колпиц летом не встречено. В низовьях Кушума (левы приток реки Урал) на затопленном соре в 12 км восточнее озера Бирказанколь (Пеликанье озеро) 8 сентября 1981 держались стаей около 2 тысяч колпиц.



* Линдеман Г.В. 1991. Краткие сообщения о колпице [в западной части Волжско-Уральского междуречья] // *Редкие птицы и звери Казахстана*. Алма-Ата: 42.

Орнитологические наблюдения в Калбинском нагорье в 2006 году

Н.Н.Березовиков, И.Э.Смелянский,
А.Н.Барашкова, А.А.Томиленко

*Второе издание. Первая публикация в 2006**

С 23 мая по 18 июня 2006 в рамках программы по выявлению ключевых орнитологических территорий Восточно-Казахстанской области нами обследованы южные, восточные, центральные и западные предгорья Калбинского хребта в бассейнах рек Кулуджун, Буконь, Кокпекты, Чар, Кызылсу, Сибинка, Урунхай, Уланка, Манат, Черновая и Войлочевка.

Маршрут и сроки экспедиции: 23 мая – Усть-Каменогорск – Казнаковка – село Бастауши; 24 мая – долина реки Кулуджун у села Московка – верховья речки Аксёновки (приток Каргалды); 25-26 мая – Преображенка – Воздвиженка – Малая Буконь – Шигилек – Косагаш – Холодный ключ (приток Шигилека); 27 мая – Косагаш – Луговое – пойма реки Кокпекты, 6 км выше посёлка Кокпекты; 28 мая – долины Кокпекты и Киндикти – село Бигаши – село Комсомол – водораздел реки Большая Каргала; 29 мая – долина Большой Каргалы – в истоки речки Баскурмельты (хребет Каражал, урочище Айдабол); 30 мая – зимовка Баскурмельты – село Зосимовка – село Комсомол – село Бигаши – пойма реки Кокпекты, 6 км выше посёлка Кокпекты; 31 мая – посёлок Кокпекты – посёлок Георгиевка – пойма реки Каныма (протока-рукав реки Чар); 1 июня – Георгиевка – озеро Айыр (Монастыри) – перевал Чечек; 2 июня – г. Усть-Каменогорск – село Таинты – Царская долина – река Черновая, 4 км выше села Манат; 3 июня – верховья речки Улькен-Коке (приток Черновой); 4 июня – перевал между Черновой и Каратобаем; 5 июня – долина речки Каратобай до подножия Ляпуновой горы (Кировский залив Бухтарминского водохранилища) – река Караатсайган – село Караколь (бывшая Ново-Обуховка) – приток реки Войлочевки, 11 км выше села Караколь; 6 июня – село Подгорное – село Палатцы – посёлок Самарка – перевал Умыш – село Васильевка – горный массив Кызылтас; 7 июня – Усть-Каменогорск; 8 июня – горы Кызылтас – Сибинские озёра (Коржинколь, Караколь) – южное подножие горы Кызылкайын у Сибинских озёр; 9 июня – ущелья рек Байча и Талды (горы Коктау) – посёлок Бозанбай (бывшая Никитинка) – ущелье реки Жыланды (приток Уланки) у горы Кокбертас; 10 июня – село Уланское – Монастырские озера (Айыр); 11 июня – село Узунбулак – гора Косбармак у фермы Коктурма (близ села Новая Канайка) – село Бурсак – посёлок Ауэзов – мелкосопочник по ручью Шыбынды (Чубунский ключ); 12 июня – река Кызылсу – село Слусары (бывшая Игоревка) – озеро Сулусор – посёлок Георгиевка – железнодорожная станция Чар (Шар) – горы Сарыбиик у села Суыкбулак; 13 июня – село Кобырбулак (бывшая Громовка) – село Малое Карасу – ущелье реки Шатбастау в Дельбегетее – село Аскаралы – северная оконечность

* Березовиков Н.Н., Смелянский И.Э., Барашкова А.Н., Томиленко А.А. 2006. Орнитологические наблюдения в Калбинском нагорье в 2006 г. // *Каз. орнитол. бюл.* 2006: 91-102.

Дельбегетей; 14 июня – озеро Альжан у северного подножия Дельбегетей – село Аскаралы – станция Чар – 14 км юго-восточнее села Еспе (бывший Октябрьский); 15 июня – река Карабай – река Жалгызгап (урочище Майский луг) – село Острыковка – река Кызылсу (урочище Ближний луг); 16 июня – вниз по долине реки Кызылсу до устья речки Еспе – устье реки Куйели; 17 июня – вдоль Кызылсу до села Шалабай – посёлок Ауэзов – останец Уштас у гор Монастыри; 18 июня – Монастыри – Усть-Каменогорск.

Общая протяжённость маршрутов составила 2350 км, на этом пути отмечено 113 видов птиц. Сведения по хищным птицам опубликованы в отдельной работе (Смелянский и др. 2006). Ниже приводим данные по 101 виду птиц.

Podiceps nigricollis. Редкий вид, исчезнувший на большинстве озёр Калбы (Егоров и др. 2000). Две брачные пары черношейных поганок отмечены 10 июня на небольшом озере у северного подножия гор Монастыри, одна пара 11 июня – на озере Маметкуль, в 3 км западнее гор Монастыри. В Дельбегетее пару этих поганок наблюдали 13 июня на небольшом пруду в верхнем течении речки Шатбастау у села Малый Карасу.

Podiceps cristatus. На озере Айыр 1 и 10 июня видели 3 и 2 взрослых чомги, на озере Сулусор 12 июня встретили одиночку, 3 пары и самку с 3 пуховичками в возрасте 5-7 сут. В восточной части Калбы, южнее села Палатцы (49°02' с.ш., 83°43' в.д.), на небольшом озере, окружённом тростниками, 6 июня держалось 3 пары и 2 одиночки.

Phalacrocorax carbo. На том же озере южнее села Палатцы 6 июня видели двух взрослых больших бакланов, залетевших сюда с Бухтарминского водохранилища.

Botaurus stellaris. Голос самца большой выпи слышали 12 июня в тростниках озера Сулусор у села Слусары.

Egretta alba. Большая белая цапля отмечена единственный раз 24 мая в южных предгорьях Калбы на придорожной луже близ села Бастаушы.

Ardea cinerea. Одиночная серая цапля встречена 28 мая по руслу реки Кокпекты, в 6 км выше посёлка Кокпекты.

Ciconia nigra. В южной части Калбы 28 мая найдено прошлогоднее горелое гнездо чёрного аиста на уступе скалы в нижней трети склона по борту долины реки Большая Каргала (48°49' с.ш., 81°56' в.д.), близ которого отмечен один аист. На соседнем ручье, впадающем в Большую Каргалу, встречен другой кормившийся аист. В восточной части Калбы одиночку, пролетевшую вниз по реке Черновой из её верховьев, видели 3 июня выше села Манат (49°24' с.ш., 83°26' в.д.), а 5 июня встретили ещё двух аистов, кружившихся над долиной реки Войлочевки у села Караколь. В южной части массива Коктау утром 9 июня группа из 3 аистов кругами набирала высоту из ущелья в истоках реки

Урунхай для полёта на кормёжку. В этот же день один аист кормился в пойме реки Сибинки у села Алгабас. Вероятно, это была птица из гнездовой пары в соседнем ущелье реки Талды. Ещё одного аиста видели 17 июня пролетавшим вниз по долине реки Кызылсу близ села Остряковка (49°44' с.ш., 81°27' в.д.).

Tadorna ferruginea. В южной части Калбы пару огарей встретили 28 мая по дороге между посёлками Бигаши и Комсомол. На озере Айыр 1 июня держалась группа из 14 взрослых огарей, 10 июня – пара, на озере Сулусор 1 и 12 июня – по одной паре. На Сибинских озёрах между селом Алгабас и озером Коржинколь на придорожной осоковой луже 8 июня отмечена взрослая птица с 2 пуховичками в возрасте 7 сут. На озерке у северного подножия гор Монастыри 10 июня видели двух огарей без птенцов и пару с 1 крупным пуховым птенцом. На солёном озерке Маметкуль, в 3 км западнее Монастырей, 11 июня держался выводок из 8 пуховых птенцов в возрасте около 10 сут. Одиночку видели 18 июня на пруду по реке Уланке близ посёлка Передовой. Вдоль трассы Георгиевка – Чарск 12 июня на придорожной луже севернее села Бирлик 12 июня отмечена пара с 6 пуховичками. У южного подножия Дельбегетей 13 июня на небольшом пруду в верхнем течении речки Шатбастау близ села Малое Карасу встречена пара с 2 пуховыми птенцами. На следующий день у северной оконечности Дельбегетей между селом Аскарлы и озером Альжан видели пару огарей, летавшую с беспокойными криками в гранитном ущелье с берёзами. На мелководьях соленого озера Альжан у северного подножия Дельбегетей 14 июня держалось 179 огарей, в том числе 2 выводка с 8 и 9 пуховыми птенцами. По сравнению с 1960-1990 годами (Егоров и др. 2000), численность огаря в Калбе значительно увеличилась.

Tadorna tadorna. В прошлом гнездилась на Монастырских озёрах, но в 1960-х годах исчезла (Егоров и др. 2000). 10 июня мимо останцов Салыктас одиночка пролетела к озерку Маметкуль со стороны озера Айыр. У северного подножия Дельбегетей на солёном озере Альжан 14 июня держалось 35 пеганок, в основном парами и поодиночке.

Anas platyrhynchos. На озере Коржинколь 8 июня держались 2 выводка кряквы с 6 и 12 пуховыми птенцами в возрасте 7-10 сут и две одиночные самки. На озере Маметкуль, в 3 км западнее гор Монастыри, 11 июня отмечен 1 самец. На мелководьях озера Альжан (Дельбегетей) 14 июня учтены 3 брачные пары и 39 линных селезней в одиночку, группами по 2-3, в одном случае 16 особей.

Anas crecca. На озере Караколь (первое в группе Сибинских) 8 июня отмечена брачная пара свистунков. На озере Альжан (Дельбегетей) 14 июня держались группы по 8, 5 и 4 селезней.

Anas strepera. На озере Альжан 14 июня наблюдались 2 брачные пары серой утки и 1 самец.

Anas penelope. Связь найдена только на озере Альжан, где 14 июня держалось 8 селезней.

Anas acuta. На озере Альжан 14 июня обнаружено скопление из 75 селезней шилохвости.

Anas querquedula. Чирок-трескунок наблюдался 12 июня на озере Сулусор (1 самец) и 14 июня на озере Альжан (9 селезней).

Anas clypeata. Группу из 4 самцов широконоски видели 14 июня на озере Альжан.

Aythya ferina. На небольшом озерке у северного подножия гор Монастыри 10 июня отмечено 3 брачных пары и 6 селезней, а на озере Сулусор 12 июня вдоль тростников держалось линное скопление из 40 особей, из них 30 самцов.

Aythya fuligula. На озерке у северного подножия гор Монастыри 10 июня держались 4 брачные пары хохлатых чернетей, на озере Маметкуль 11 июня – 1 брачная пара и группа из 8 самцов, на озере Альжан 14 июня – 2 самца.

Lyrurus tetrix. В восточной части Калбы следы зимнего пребывания тетеревов (помёт, перья) отмечены в густом пойменном лесу верхнего течения речки Улькен-Коке (правый приток Черновой), а на перевале между реками Черновая и Каратобай в редком сосняке на гранитах 4 июня отмечен 1 самец. В тальниковой пойме реки Талды (горы Коктау) 9 июня поднята самка с выводком пуховых птенцов в возрасте до 10 сут величиной менее скворца, способных перелетать лишь на 5-10 м.

Perdix perdix. В южной части Калбы 25-29 мая серая куропатка встречена в трёх пунктах: западнее села Жанажол (трасса Казнаковка – Кокпекты), в урочище Айдабол (долина реки Баскурмельты) и в долине Большой Каргалы. Остатки взрослой птицы найдены в гнезде беркута *Aquila chrysaetos* в долине ручья Шыбынды между посёлками Ауэзов и Слусары.

Coturnix coturnix. Повсеместно редок. В южной части Калбы 25-30 мая отмечен в пойме реки Шигилек, в сазовой степи Кокпекты выше посёлка Кокпекты и в окрестностях села Петропавловский (Каргалы). В восточной части Калбы 2-6 июня перепел отмечался в поймах рек Черновая, Улькен-Коке и Каратобай (5 одиночек, 1 пара). В центральной и западной частях нагорья 8-12 июня слышали голоса лишь 4 самцов, в том числе у озёр Караколь, Сулусор и по ручью Шыбынды между посёлками Ауэзов и Слусары.

Anthropoides virgo. За время поездки по Калбинскому нагорью журавлей-красавок зарегистрировали в 18 пунктах (79 особей), из них в двух случаях это были территориальные одиночки и в 12 – гнездовые пары (26 особей). Отмечены они были 28-30 мая в сазовой степи в долине реки Кокпекты (48°45' с.ш., 86°16' в.д.), между сёлами Бигаши и

Комсомол. В Чарской долине одну пару 31 мая встретили в пойме реки Каныма (49°17' с.ш., 81°38' в.д.), а на следующий день другую пару видели на лугу среди брошенных полей в 6 км севернее посёлка Георгиевка по трассе на Усть-Каменогорск. Отдельные пары встречали 12 июня на побережье озера Сулусор, 16 и 17 июня на левобережье реки Кызылсу (49°46' с.ш., 81°23' в.д.) и на реке Куйели (49°49' с.ш., 81°24' в.д.), 1 июня на берегу озера Айыр у гор Монастыри, 6-7 июня на старой пашне у северной оконечности массива Кызылтас (49°43' с.ш., 82°36' в.д.). В южных и восточных предгорьях Дельбегетей 2 пары встречены на придорожных лужах в окрестностях села Конырбулак. Ещё одна пара красавок отмечена у подножия Дельбегетей на реке Шатбастау у села Малое Карасу, другая – на озере Альжан. Как и в 1970-1990 годах, красавка отсутствовала во восточной части Калбы в долинах Таинты, Черновой и Войлочевки. Линные группы красавок отмечены в следующих пунктах: 24 мая в окрестностях села Бастауши (48°52' с.ш., 83°17' в.д.) – 5 птиц; 27 мая на реке Кокпекты (48°43' с.ш., 82°16' в.д.) – 16; 11 июня на озере Маметкуль (49°45' с.ш., 81°58' в.д.) – 15 и на озере Сасыкколь у Монастырей (49°28' с.ш., 81°57' в.д.) – 57.

Crex crex. За время поездки брачные крики самцов коростеля зафиксированы только в трёх пунктах: 25 мая в долине Кулуджуна (48°53' с.ш., 82°19' в.д.), 31 мая в сазовой степи по протоке Каныма у посёлка Георгиевка (49°17' с.ш., 81°38' в.д.), 8 июня на сыром осоковом лугу с обилием купальницы у подножия горы Кызылкайын южнее Сибинских озёр (49°25' с.ш., 82°43' в.д.).

Gallinula chloropus. Беспokoящаяся камышница отмечена 8 июня в тростниках на озере Коржинколь (Сибинские озера).

Fulica atra. Одиночка встречена только 12 июня на озере Сулусор.

Charadrius dubius. Одиночки отмечены 25 и 28 мая по галечниковым берегам речек Талменка и Кокпекты.

Vanellus vanellus. В южной части Калбы чибис отмечен только в 6 пунктах (13 особей): в поймах речек Шигилек, Кокпекты, Баскурмельты (урочище Айдабол), Холодный ключ у села Косчагыл, а также по дороге от села Петропавловское вверх по реке Каргалы. Чаще встречался в центральных и западных частях: у озера Сулусор (1 пара), на Монастырских озёрах (Айыр, Сасыкколь, 3 пары), у подножия Дельбегетей на небольшом пруду по реке Шатбастау (2 пары) и на озере Альжан (5 пар).

Himantopus himantopus. Ходулочник оказался обычным на солёном озере Альжан у северного подножия Дельбегетей, на мелководьях которого 14 июня учтена 51 особь, в том числе 7 гнёзд с насиживаемыми кладками на илистых кочках. Этот вид приводится гнездящимся для Калбы впервые.

Recurvirostra avosetta. Ранее шилоклювка на озёрах Калбы не от-

мечалась (Егоров и др. 2001). Нами обнаружена на солёном озере Альжан у северного подножия Дельбегетей, где 14 июня отмечено 4 гнездовых пары.

Haematopus ostralegus. На реках Калбы кулик-сорока на гнездовании не отмечался (Егоров и др. 2001). Нами обнаружен в южных предгорьях Калбы, где 25 мая трёх куликов видели на галечниковом острове реки Талменка (48°52' с.ш., 82°44' в.д.). Кроме того, 26 июня 2005 в течение суток 4 особи наблюдались на одном участке в пойме реки Кокпекты близ устья ручья Тентекжыра.

Tringa totanus. В южной части Калбы 25-30 мая брачные пары травников и одиночки отмечены в 4 пунктах: на реке Шигилек, в пойме реки Кокпекты выше одноименного посёлка и вдоль дороги между посёлками Бигаши и Комсомол. В Дельбегетее 13-14 июня 2 пары держались по осоковым берегам пруда по реке Шатбастау, 1 – на придорожных разливах между сёлами Малое Карасу и Аскарлы, свыше 50 травников – на илистых берегах озера Альжан.

Actitis hypoleucos. Одиночные перевозчики отмечены 4 и 8 июня в поймах речек Улькен-Коке (приток Черновой) и Сибинка между сёлами Точка и Алгабас.

Gallinago gallinago. В южных предгорьях Калбы 24 мая токующий бекас наблюдался над опушкой балочного леса в верховьях реки Аксёновка (49°00' с.ш., 83°10' в.д.). Другой токующий самец отмечен 10 июня у северного подножия гор Монастыри на осоковом лугу по ручью, впадающему в озеро Айыр. Ещё один самец токовал 12 июня на озере Сулусор.

Scolopax rusticola. На луговых увалах юго-восточнее Сибинских озёр в вечерних сумерках 8 июня из тальниково-березовой поймы ручья у северного подножия горы Кызылкайын (1493 м н.у.м.) поднялся и улетел один вальдшнеп к озеру Караколь.

Numenius arquata. В южной части Калбы большой кроншнеп зарегистрирован 24-29 мая в 6 пунктах (29 особей): 1) село Бастаушы (49°52' с.ш., 83°17' в.д.), 2) пойма реки Шигилек (48°58' с.ш., 82°28' в.д.), 3-4) пойма Кокпекты, в 6 км выше посёлка Кокпекты (48°43' с.ш., 82°16' в.д.), 5) река Баскурмельты в урочище Айдабол (48°52' с.ш., 81°48' в.д.); 6) вдоль дороги между сёлами Бигаши и Комсомол. В восточной части Калбы 6 июня отмечен в песчаной ковыльной степи вдоль речки Баты между сёлами Палатцы и Мирлюбовка. По осоковым берегам озера Сулусор у села Слусары 12 июня держалось 4 особи, проявлявших сильное беспокойство. В южных и восточных предгорьях Дельбегетей 13-14 июня большой кроншнеп наблюдался на зеленом осоковом лугу между сёлами Суыкбулак и Конырбулак (1 птица), по высохшему руслу ручья с осокой и пышным разнотравьем в широкой горной долине (49°53' с.ш., 81°04' в.д.) между сёлами Конырбулак и Малое Карасу

(3) и на степном берегу озера Альжан (3 особи).

Limosa limosa. В южной части Калбы 5 больших веретенников видели 29 мая у ручья в степи в долине реки Баскурмельты (урочище Айдабол) и трёх 30 мая в пойме реки Кокпекты, 6 км выше посёлка Кокпекты. Севернее гор Монастыри 10-11 июня обнаружено 2 пары, проявлявших беспокойство на гнездовых участках по сырым осоковым лугам на берегах озёр Айыр и Маметкуль, а 12 июня видели ещё пару на осоковой лужайке в долине ручья Шыбынды (49°35' с.ш., 81°46' в.д.) среди мелкосопочника между посёлками Ауэзов и Слусары.

Glareola nordmanni. Одиночную степную тиркушку наблюдали 12 июня на берегу озера Сулусор у посёлка Слусары.

Larus ridibundus. На озере Альжан (Дельбегетей) 14 июня держалось 12 озёрных чаек.

Larus cachinnans. В восточной части Калбы на озерке южнее села Палатцы 6 июня охотилось 6 взрослых хохотуний, прилетающих сюда с Бухтарминского водохранилища. На озере Сулусор у села Слусары 12 июня наблюдали явно гнездовую пару. На озере Айыр 1 июня видели 2 годовалые особи с тёмной концевой полосой на хвосте и тёмной третью крыльев. На озере Альжан 14 июня держалось 9 взрослых птиц.

Larus canus. Двух взрослых сизых чаек встретили 14 июня на озере Альжан.

Sterna hirundo. Двух речных крачек видели 5 июня в пойме реки Войлочевка у посёлка Караколь, куда они, вероятнее всего, залетели с Бухтарминского водохранилища. На небольшом озерке южнее села Палатцы 6 июня летало 7 крачек, явно загнездившихся здесь. Изредка встречались они 12 июня на озере Сулусор у села Слусары (4), в пойме реки Чар у станции Шар (1), а 14 июня – на озере Альжан (6 особей).

Columba livia. За последнее десятилетие, после сокращения площадей зерновых полей, численность голубей в посёлках Калбы снизилась до минимума. Исчезли колонии полудиких сизарей в скалах.

Streptopelia orientalis. Большая горлица ещё довольно обычна в Калбе (34 встречи, 44 особи). Чаще всего пары и токующих самцов встречали 4-6 июня в тополево-ивовых поймах Манат, Черновая, Улькен-Коке, Каратобай, Караатсайган, Войлочевка, а также в прилежащих сосняках, осинниках и горных кустарниках (32 особи). Единично их видели в окрестностях Сибинских озёр (7), в лесополосах между посёлками Георгиевка и Слусары (2), Таргын и Таинты (1), Малое Карасу и Конырбийик (2 особи).

Cuculus canorus. В южной части Калбы с 23 по 31 мая кукушка отмечена в 5 пунктах: у села Бастауши, в поймах рек Кулуджун (у села Московка), Косагаш, Баскурмельты (урочище Айдабол), Каныма у села Георгиевка. С 1 по 17 июня встречено всего лишь 13 токующих самцов, в том числе в восточной части Калбы в поймах речек Манат, Чер-

новая, Улькен-Коке, Каратобай, Войлочевка, Кызылсу (8), на перевале Умыш (1), у Сибинских озёр (3) и на озере Сулусор (1 особь).

Asio otus. Ушастая сова встречена в двух пунктах: 24 мая в пойме речки Аксёновки (48°59' с.ш., 83°11' в.д.) и 27 мая в горелом березняке на реке Кокпекты (48°55' с.ш., 82°20' в.д.). В 2005 году была отмечена также в горах Дельбегетей (Смелянский, Томиленко 2005).

Asio flammeus. Болотная сова отмечена 27 мая в пойме реки Кокпекты, в 6 км выше посёлка Кокпекты и 1 июня на перевале Чечек (между Самсоновкой и Усть-Каменогорском).

Otus scops. В южной части Калбы 23 и 24 мая сплюшка отмечена в трёх пунктах: в лесополосе у села Бастауши, в осиннике и в урёме речки Аксёновки. С 2 по 6 июня голоса ещё 3-х самцов слышали в топольниках реки Черновой выше села Манат и в ущелье реки Войлочевки, в 11 км выше села Караколь. Вечером 8 июня крики самца слышали в тальниково-березовой пойме ручья у северного подножия горы Кызылкайын близ Сибинских озёр (1493 м н.у.м.), а 9 июня в пойме реки Жыланды (приток Уланки). На северной оконечности Дельбегетее между селом Аскарлы и озером Альжан 13 июня мы слышали сплюшку в живописном гранитном ущелье с берёзами на скалах (50°02' с.ш., 81°03' в.д.).

Caprimulgus europaeus. В южной части Калбы козодой отмечен 25 и 28 мая в поймах рек Шигилек и Большая Каргала. В восточной части нагорья с 2 по 6 июня голоса 4 самцов слышали по степным террасам речек Черновая, Каратобай и Войлочевка. В западных районах Калбы отмечался единично в мелкосопочнике в ущелье реки Жыланды между посёлками Бозанбай и Уланское, по ручью Шыбынды между посёлками Ауэзов и Слусары, а также 15 июня в долине реки Кызылсу. В Дельбегетее между селом Аскарлы и озером Альжан вечером 13 июня слышали пение 2 самцов.

Arus arus. У северной оконечности Дельбегетее между селом Аскарлы и озером Альжан в гранитном ущелье вечером 13 июня летали 4 чёрных стрижа.

Alcedo atthis. Зимородок встречен в 2 пунктах: 31 мая у моста через реки Чар близ посёлка Георгиевка и 5 июня в ущелье реки Войлочевка, в 11 км выше посёлка Караколь.

Merops apiaster. Сведений о нахождении золотистой щурки во внутренних частях Калбы в литературе нет. Колония из 10 особей обнаружена нами 17 июня в долине реки Кызылсу на месте бывшего посёлка близ Остряковки (49°44' с.ш., 81°26' в.д.). На южной окраине Калбы до десятка золотистых щурок наблюдалось 28 мая на окраине села Комсомол (долина Кокпекты).

Urua eops. В южной части Калбы удог отмечен 27 мая в долине Холодного ключа в посёлка Косагаш. Совершенно не встречалась эта

птица 2-6 июня в восточной части Калбы в долинах рек Манат, Черновая, Каратобай, Войлочевка. В центральных и западных районах 8-17 июня удод был исключительно редок и отмечен лишь в 5 пунктах: на зимовке у входа в ущелье реки Талды (горы Коктау), в развалинах домов посёлка Бозанбай, в старой могиле в ущелье реки Жыланды напротив гор Кокбертас, в развалинах кошар между посёлками Ауэзов и Слусары, на месте бывшего посёлка близ села Остряковка.

Jynx torquilla. В тополево-ивовой пойме речки Улькен-Коке (правый приток Черновой) 4 июня слышали брачный крик самца.

Dendrocopos major. Отмечен 5 июня в сосняках на гранитах на перевале между реками Черновая и Каратобай.

Dendrocopos minor. В тополовой пойме реки Черновой (4 км выше села Манат) в обломке толстого ствола старого тополя высотой 10 м, в 2 м от вершины, обнаружено дупло малого пёстрого дятла, в которое 3 июня взрослые носили корм птенцам. Ещё трёх одиночных дятлов встретили 4 июня в густой пойменном лесу верхнего течения речки Улькен-Коке (правый приток Черновой).

Riparia diluta. Бледная ласточка обнаружена 31 мая в пойме Кокпекты, в 6 км выше посёлка Кокпекты. Во внутренних частях Калбы совершенно отсутствовала.

Hirundo rustica. По сравнению с 1970-1980 годами, деревенская ласточка стала поразительно редка в посёлках и крестьянских хозяйствах Калбы и лишь в 9 из них встречали по 1-2 пары (Айтыков, Караколь, Алгабас, Точка, Алгабас, Коктурма, Ауэзов, Суыкбулак, Малое Карасу).

Melanocorypha leucoptera. В южной части Калбы белокрылый жаворонок наблюдался в межсопочных долинах между посёлками Кокпекты, Бигаши и Комсомол, а также в долине Баскурмельты. Сравнительно обычен в ковыльных степях в долине реки Кызылсу и по прилегающему мелкосопочнику. Изредка встречался в типчаковой долине реки Канайки между сёлами Новая Канайка и Бурсак, включая котловины солёных озёр западнее гор Монастыри.

Alauda arvensis. Полевой жаворонок единично встречался в долинах рек Урунхай, Сибинка, Уланка, в районе Сибинских озёр. Сравнительно чаще этот вид стал наблюдаться в Калбе западнее линии Усть-Каменогорск – Георгиевка, в частности, в межсопочных котловинах Монастырских озёр, в долинах рек Канайки и Кызылсу, в холмистой степи между посёлками Ауэзов и Слусары. В горах Сарыбиик и Дельбегетей между сёлами Суыкбулак и Аскаралы единично наблюдался в долинах и каменистых сопках с типчаком, спиреей, астрагалом и ферулой.

Motacilla flava. Жёлтая трясогузка повсеместно стала редкой, особенно во внутренних долинах Калбы. Отдельные пары 31 мая наблю-

дались в пойме протоки Каныма (пойма Чара) у посёлка Георгиевка. Одну пару отметили 12 июня на осоковом берегу озера Сулусор.

Motacilla cinerea. Горная трясогузка встречена лишь в восточной части Калбы 3-4 июня в верхнем течении Улькен-Коке и пойме Черновой (4 одиночки).

Motacilla personata. Маскированная трясогузка стала редка. Одиночки отмечены в посёлках Пантелеймоновка, Алгабас, Георгиевка.

Lanius minor. Чернолобый сорокопут сравнительно обычен в южной части Калбы, где 25 мая одиночки наблюдались в придорожных лесополосах между посёлками Жанажол и Белое и в пойме реки Шигилек. Встречен 27 мая в пойме Холодного ключа у села Косагаш, а 28 мая 7 пар отмечены в лесополосах вдоль дороги между посёлками Кокпекы и Бигаши. В восточной части Калбы, южнее села Палатцы, в угнетённой вязовой лесополосе среди закреплённых песков, 7 июня на сухом вязе на высоте 2.5 м на боковой ветке найдено готовое гнездо из свежих стеблей полыни и люцерны. В западной части Калбы наблюдался 12 и 15 июня в долине Кызылсу у сёл Слусары и Острияковка.

Oriolus oriolus. В южной части Калбы 24 мая иволга наблюдалась в долине Кулуджуна у села Московка. Сравнительно обычна в восточной части Калбы в тополево-ивово-берёзовых поймах речек Манат, Черновая, Улькен-Коке, Войлочевка, где встречается в среднем 1-2 пары на 1 км. Отдельных поющих самцов слышали в поймах Сибинки, Талды и Жыланды, а также в тополевых садах в посёлках Бозанбай и Георгиевка (всего 15 встреч в 11 пунктах).

Sturnus vulgaris. Скворец встречался редко, лишь в некоторых населённых пунктах. В окрестностях посёлка Кокпекты 30 и 31 мая дважды видели стаю по 100 особей. В селе Алгабас 8 июня встречен слётки, а в селе Бозанбай из гнёзд ещё доносился писк птенцов.

Pastor roseus. В Восточной Калбе розовый скворец отсутствовал. В южной части нагорья 26-31 мая курсирующие стаи 5 раз наблюдались в мелкосопочнике долин Косагаша, Холодного ключа, Кокпекты, между сёлами Петропавловское (Каргалы), Бигаши и Кокпекты (164 особи). Чаще встречался в центральных и западных районах Калбы. Так, в пойме реки Сибинка между сёлами Точка и Алгабас у крестьянского хозяйства Каракоз (49°02' с.ш., 82°27' в.д.) на старом кладбище из камней 8 июня находилась колония около 1200 пар. Самки насиживали кладки в трещинах плитняка, самцы носили корм, летая стаями по 50-100 особей. В соседней группе из трёх древних мазаров осмотрена ещё одна колония из 500-700 пар. В холмисто-увалистой степи между посёлками Бозанбай и Уланское в ущелье реки Жыланды 10 июня встречались стайки из 10-20 самцов, пролетающие вниз по речке. В посёлке Уланское на чердаках домов гнездились свыше 1000 пар (Березовиков 2006). Отдельные самцы отмечены 10-11 июня у северного

подножия гор Монастыри и в гранитных останцах у села Узынбулак, а на окраине посёлка Ауэзов видели стаю 50 особей. Небольшую колонию розовых скворцов свыше 100 особей обнаружили развалинах каменной кошары между посёлками Ауэзов и Слусары. В долине Кызылсу (49°38' с.ш., 81°53' в.д.) в старых могилах на действующем кладбище 17 июня найдена ещё одна колония из 500 птиц. В восточных предгорьях Дельбегетея стаю из 50 самцов видели 14 июня между сёлами Малое Карасу и Конырбиик.

Pica pica. Поразительным образом сорока отсутствовала на маршруте в восточной части Калбы по долинам речек Манат, Черновая, Каратобай и Войлочевка, где прежде была обычной. Редкие одиночки встречались в ущельях гор Кызылтас и Коктау, в поймах речек Сибинка, Уланка, в котловинах озёр Айыр и Сулусор, вдоль юго-восточного подножия Дельбегетея между сёлами Суыкбулак, Конырбиик, Малое Карасу и Аскаралы.

Corvus monedula. В восточной части Калбы 3-6 июня галка наблюдалась в гранитных утёсах реки Черновой близ могилы Енбек (свыше 50 особей с докармливаемым молодняком), в развалинах кошары верхней долины реки Каратобай (12 особей), в гранитных скалах среди сосняков ущелья реки Войлочевка, в 11 км выше посёлка Караколь (25), в ковыльной степи между сёлами Палатцы и Миролубовка у речки Баты (30). В северных отрогах Калбы большая колония галок отмечена в скалах перевала Чечек. Отдельные пары и группы галок отмечены у сёл Самсоновка, Васильевка, Ленинка, Алгабас, Ауэзов. В посёлках Бозанбай и Уланское гнездятся в развалинах многоэтажных домов и ферм (Березовиков 2006). Стаи с молодняком наблюдались 8-11 июня у северной оконечности гор Кызылтас (30 особей), в ущелье реки Талды (22), между посёлками Ауэзов и Слусары (21 особь). В восточной части Дельбегетея галки гнездятся в пустотелых торцах столбов ВЛЭП вдоль трассы между сёлами Конырбулак, Малый Карасу и Аскаралы (свыше 30 особей); 13-14 июня во всех гнёздах были птенцы, около одного – слётки.

Corvus frugilegus. В южной части Калбы грач населяет старые придорожные лесополосы между посёлками Казнаковка, Белое, Преображенка, Кокпекты. По трассе между Георгиевкой и Усть-Каменогорском в карагачовых лесополосах отмечено 5 колоний по 100, 300, 150, 100, 50 и 200 гнёзд. В долине реки Чар между Георгиевкой и Чарском встречено 3 колонии (100, 200, 600 гнёзд). В восточной части Дельбегетея 3 колонии грачей отмечены в высокоствольных тополевых садах посёлков Конырбулак, Малое Карасу и Аскаралы. Кочующие стаи грачей с докармливаемым молодняком наблюдались 7-8 июня у подножия гор Кызылтас между Васильевкой и Ленинкой (100), 11 июня у села Узынбулак, севернее гор Монастыри (400) и между посёлками

Ауэзов и Слусары (50), 13 июня – в горах Сарыбиик у селе Суыкбулак (50 особей).

Corvus corone orientalis. Восточная чёрная ворона населяет южные, восточные и центральные части Калбинского нагорья, в западных замещена серой вороной, местами образуя гибридные формы. С 2 по 6 июня встречалась в долинах рек Манат, Черновая, Улькен-Коке, Каратобай, Караатсайган, Войлочевка (11 встреч, 27 особей). Между посёлками Таинты и Манат отмечена семья из 6 особей, среди которых был 1 гибрид ошейниковой формы. В пойме Черновой 2-3 июня наблюдался докармливаемый выводок из 3 птенцов. С 6 по 11 июня чёрная ворона отмечалась также на перевале Умыш, в долинах рек Таргын, Урунхай, Сибинка, Талды, Уланка, в горах Кызылтас и Коктау (26 встреч, 47 особей). Наиболее западное нахождение – река Канайка, в 7-8 км от гор Монастыри.

Corvus cornix. Серая ворона населяет Калбинское нагорье западнее линии Усть-Каменогорск – Георгиевка. Наиболее часто встречается в придорожных лесополосах между Георгиевкой и Меновное. В центральной части одиночную ворону (возможно, гибрид) видели лишь однажды – 9 июня в пойме Сибинки у села Алгабас. С 10 по 12 июня вороны встречались в котловинах озёр Сулусор и Айыр, в поймах Кызылсу и Канайка, а среди сопков между сёлами Бурсак и Ауэзов видели стаю из 16 особей. В горах Сарыбиик и Дельбегетей 13-14 июня была достаточно обычна между сёлами Суыкбулак, Конырбиик, Малое Карасу, Аскаралы и озером Альжан (10 встреч, 33 особи), в том числе выводки с 3-5 докармливаемыми птенцами.

Corvus corax. В долине Сибинки между сёлами Точка и Алгабас над скальной грядой у развалин Шаулен 8 июня с беспокойными криками летал один ворон. Несомненно, где-то рядом у него находилось гнездо.

Cettia cetti. Широкохвостка продолжает расселяться в Калбе. Поющие самцы наблюдались 6 июня в тростниках небольшого озера южнее села Палатцы (49°02' с.ш., 83°43' в.д.), 8 июня в густом лесу из тополя, ивы, черёмухи, клёна в пойме Сибинки между сёлами Точка и Алгабас (49°35' с.ш., 82°27' в.д.), 8-9 июня в тальниково-берёзовой пойме ручья среди луговых увалов юго-восточнее Сибинских озёр (49°25' с.ш., 82°43' в.д.), 9-10 июня в тополево-берёзово-ивовой пойме Жыланды (приток Уланки) у южного подножия гор Кокбертас (49°40' с.ш., 82°16' в.д.). В западной части Калбы встречена только 13 июня у юго-восточного подножия Дельбегетея в припойменных зарослях караганы, жимолости и шиповника у входа в ущелье реки Шатбастау (49°58' с.ш., 81°04' в.д.).

Acrocephalus dumetorum. Садовая камышевка обнаружена только в центральной Калбе, где двух поющих самцов наблюдали 8 и 9 июня в

пойменных зарослях тополя, ивы, черёмухи и клёна на речке Сибинка между сёлами Точка и Алгабас и в тальниково-березовой пойме ручья у северного подножия горы Кызылкайын южнее Сибинских озёр.

Acrocephalus arundinaceus. Одного поющего самца дроздовидной камышевки встретили 6 июня в восточной части Калбы в тростниках озера южнее села Палатцы и двух – 12 июня на озере Сулусор.

Sylvia nisoria. Обычная в 1970-1990 годах ястребиная славка стала в Калбе исключительно редка. Поющий самец отмечен 9 июня в тальниковой пойме реки Талды (горы Коктау).

Sylvia communis. Серая славка также встречалась редко. Трёх поющих и токующих самцов наблюдали 8-9 июня по кустарниковым увалам в районе Сибинских озёр, где в 1970-1980-х годах она была обычной птицей. В южной части Дельбегетея отмечена 13 июня между посёлками Конырбиик и Малое Карасу.

Phylloscopus collybita. Поющие самцы теньковки отмечены дважды 4 и 9 июня в густом пойменном лесу речки Улькен-Коке (приток Черновой) и в тальниково-берёзовой пойме ручья юго-восточнее Сибинских озёр у северного подножия горы Кызылкайын.

Muscicapa striata. Серая мухоловка сравнительно часто встречалась 2-4 июня в тополево-ивовых поймах рек Черновая и Улькен-Коке (4 пары и 3 одиночки на 4 км).

Saxicola torquata. Черноголовый чекан встречался поразительно редко, хотя в 1970-1990-х годах был обычной птицей горных долин Калбы. В южной части Калбы 29 мая 2 пары отмечены в зарослях караганы и жимолости в долине Большой Каргалы, а 30 и 31 мая несколько пар видели в сазовой степи по рекам Кокпекты и Каныма. С 2 по 14 июня зафиксированы лишь 4 пары в зарослях шиповника на древнем кладбище из камней в Царской долине между сёлами Таинты и Манат, на осоковых лужайках у озера Сулусор и в мелкосопочнике между посёлками Ауэзов и Слусары, а также в одной из кустарниковых долин Дельбегетея между сёлами Конырбулак и Малое Карасу.

Oenanthe oenanthe. Обыкновенная каменка также стала повсеместно редкой. В южной части Калбы 27-31 мая единично наблюдалась между посёлками Кокпекты, Бигаши и Комсомол. С 1 по 14 июня на маршрутах лишь в 5 пунктах зарегистрированы одиночки и пары (Старая Канайка, Караколь – Подгорное – Палатцы, Ауэзов – Слусары, посёлок Суыкбулак).

Oenanthe pleschanka. В восточной части Калбы 2-6 июня отдельные самцы и пары плешанки встречались в скальниках рек Манат, Черновая и Каратобай. С 7 по 12 июня плешанок чаще видели в горах Кызылтас и Кокбертас (долины рек Сибинка и Жыланды), среди гранитных останцев у Монастырских озёр, в мелкосопочнике между посёлками Ауэзов и Слусары.

Oenanthe isabellina. Плясунья встречена единственный раз 29 мая в южной части Калбы в долине Баскурмельты (урочище Айдарбол).

Phoenicurus phoenicurus. Горихвостка сравнительно обычной оказалась 2-4 июня в тополево-ивовых поймах рек Черновая и Улькен-Коке, где наблюдались пары и поющие самцы. Ещё один поющий самец отмечен 9 июня в тальниковой пойме Талды (горы Коктау).

Luscinia megarhynchos. В южной Калбе поющие самцы южного соловья наблюдались 28 мая в пойме реки Большая Каргала. В восточной части нагорья 2-6 июня соловьи часто наблюдались в поймах речек Манат, Черновая, Каратобай, Войлочевка, где они предпочитают участки с зарослями черёмухи (1-2 поющих самца на 1 км маршрута). Пение отдельных самцов отмечали в скальном массиве Кызылтас по безводным логам, густо заросшим караганой и шиповником. В горах Коктау изредка наблюдался в тальниковых поймах речек Талды и Байча, обычным был густых в пойменных зарослях речки Сибинки. В Дельбегетее 13-14 июня поющие самцы встречались в большинстве ущелий в березово-ивово-осиновых перелесках и припойменных зарослях караганы, жимолости, шиповника, где самцы регистрировались в среднем через каждые 100 м.

Luscinia svecica. Пара варакушек отмечена 31 мая в пойме речки Каныма у посёлка Георгиевка.

Turdus pilaris. В южной части Калбы рябинник отмечен в пойме Большой Каргалы (28 мая). Единичными парами встречался в густых тополево-ивовых поймах Черновой, Улькен-Коке и Войлочевки с примесью берёзы, черёмухи и боярышника (5 пар на 14 км), Сибинка между сёлами Точка и Алгабас выше развалин Шаулен (1 пара), в тальниково-березовой пойме ручья у северного подножия горы Кызылкайын (2 пары).

Aegithalos caudatus. В густом тополево-ивовом лесу реки Черновой, 4-5 км выше села Манат, 4 июня в черемошнике отмечен выводок длиннохвостой синицы из 10 короткохвостых птенцов.

Remiz coronatus. Редкие одиночки черноголового ремеза наблюдались 3-8 июня в тополево-ивовых поймах рек Черновая и Войлочевка, Сибинка (между сёлами Точка и Алгабас).

Parus major. В тополево-ивовой пойме реки Черновой 2-3 июня наблюдалось 3 поющих самца на 1 км. Ещё одного самца встретили 8 июня в зарослях тополя, ивы, черёмухи, клёна на речке Сибинка между сёлами Точка и Алгабас.

Passer domesticus. Обычен во всех посёлках Калбы.

Passer montanus. В крупных посёлках полевой воробей малочислен. Чаще встречается в крестьянских хозяйствах (зимовки, фермы).

Fringilla coelebs. Зяблик оказался довольно обычным в тополево-ивовой пойме рек Черновая, Улькен-Коке и Войлочевка, где 2-6 июня

учитывали по 5-10 самцов на 1 км поймы, местами через каждые 100-150 м. Одного поющего самца наблюдали 9 июня в тальниках реки Талды (горы Коктау).

Carduelis caniceps. Седоголовый щегол встречен лишь в восточной части Калбы, где 4 июня видели 3 пары, кормившихся семенами одуванчиков на поляне в густом пойменном лесу реки Черновой. Ещё одну пару отметили 6 июня в ущелье реки Войлочевка, в 11 км выше посёлка Караколь.

Acanthis cannabina. Этот ранее обычный в Калбе вид оказался исключительно редок. Одиночную коноплянку встретили лишь 6 июня на горном лугу перевала Умыш.

Carpodacus erythrinus. Ранее многочисленная птица Калбы стала повсеместно редкой (8 встреч, 10 особей). Поющие самцы чечевицы регистрировались в поймах речек Улькен-Коке (приток Черновой), Караатсайган, Войлочевки, Сибинка и у озера Сулусор.

Emberiza leucosephala. В ущелье реки Войлочевка, в 11 км выше посёлка Караколь, 6 июня отмечен самец белошапочной овсянки на кустарниковом склоне со скальниками и соснами.

Emberiza schoeniclus. Одиночная камышовая овсянка 28 мая отмечена в тростниковых зарослях придорожных разливов между сёлами Бигаши и Комсомол.

Emberiza cioides. Красноухая овсянка наблюдалась 29 мая в двух пунктах южной Калбы: в межсопочной долине рек Баскурмельты и Большая Каргала. Поющий самец отмечен также 4 июня в верхнем течении Улькен-Коке (приток Черновой) на крутом склоне с редкими выходами камней и густыми зарослями спиреи. Ещё двух самцов встретили на перевале между реками Черновая и Каратобай среди редких сосняков с гранитами и зарослями караганы, спиреи и шиповника. В центральной части Калбы наблюдалась 8 июня среди гранитных останцев с берёзами и соснами на северной оконечности гор Кызылтас (между реками Урунхайка и Сибинка). В долине речки Сибинки выше села Точка один самец красноухой овсянки пел на столбе у трассы в группе низеньких вязов.

Emberiza hortulana. Поющие самцы садовой овсянки отмечены 6 июня на перевале Умыш (1067 м н.у.м.) и 8 июня на осоково-тролиусовом лугу вдоль ручья у северного подножия горы Кызылкайын (Сибинские озера).

Emberiza bruniceps. В южной Калбе 24-31 мая жёлчная овсянка единично наблюдалась в межсопочных понижениях в долинах рек Кокпекты и Большая Каргала. В остальной части Калбы была также поразительно редкой (12 встреч, 16 особей). Отдельные самцы и пары отмечались в ущелье реки Манат, между Песчанкой и Палатцами, в горах Кызылтас, Кокбертас, Монастыри и Дельбегетей.

Заключение

Обследование нескольких интересных в орнитологическом отношении территорий Калбы показало, что в населении птиц, по сравнению с 1970-1990 годами, произошли существенные изменения, выражающиеся в основном в резком снижении численности ранее фоновых и многочисленных видов птиц. Особенно ярко эти изменения произошли в восточной части Калбы. В посещённых степных и луговых долинах рек Таинты, Манат, Черновая, Каратобай и Войлочевка особенно бросалось в глаза отсутствие полевого жаворонка, полевого конька *Anthus campestris*, обыкновенной каменки, коноплянки, коростеля, перепела, а в пойменных и горно-кустарниковых ассоциациях — обыкновенного жулана *Lanius collurio*, лесного конька *Anthus trivialis*, маскированной трясогузки, серой и ястребиной славки, садовой камышевки, зелёной пеночки *Phylloscopus trochiloides*, обыкновенной *Emberiza citrinella* и горной *E. cia* овсянок, сороки. Единичными особями встречены жёлчная, красноухая и белошапочная овсянки, обыкновенная чечевица, черноголовый чекан, плешанка, чёрная ворона, козодой. В скальниках совершенно не видно было сизого голубя, обыкновенной пустельги *Falco tinnunculus* и пёстрого каменного дрозда *Monticola saxatilis*, однако такие виды, как большая горлица, сплюшка, иволга, галка, рябинник, южный соловей, зяблик, обыкновенная горихвостка, серая мухоловка были местами ещё достаточно обычны. Поражала пустынность некоторых местообитаний и отсутствие здесь ранее обычных видов, хотя великолепные ландшафты района Аюдинского бора сохранились в первозданном виде, а присутствие людей и выпасаемого скота было минимальным.

Сравнительно больше птиц встречалось в центральных районах Калбы, особенно в районе Сибинских озёр и гор Коктау. Однако увеличение численности полевого и белокрылого жаворонков, жёлчной овсянки, сороки, серой вороны отмечалось только в западных частях между Монастырскими озёрами и Дельбегетеем, хотя обитавший здесь ранее чёрный жаворонок *Melanocorypha yeltoniensis* полностью исчез. Здесь же выявлены значительные очаги обитания степной пустельги *Falco naumanni*, степного орла *Aquila nipalensis*, беркута *Aquila chrysaetos* и розового скворца. Совершенно не встречались полевые коньки, обыкновенные жуланы и обыкновенные коноплянки, ранее обычные в этих местах. Редкими были удод, обыкновенная каменка, жёлтая трясогузка.

Обследование Калбы ещё раз убедило в необходимости слежения за состоянием популяций фоновых видов птиц. К сожалению, сложившееся в последние два-три десятилетия стремление публиковать только «самое интересное», преимущественно фаунистические находки и све-

дения по «краснокнижным» видам, игнорируя данные по тривиальным птицам, привело к тому, что мы зачастую перестаём замечать глобальные изменения в орнитофауне не только отдельных местностей, но и целых регионов.

Л и т е р а т у р а

- Березовиков Н.Н. 2006. Синантропное гнездование розового скворца *Pastor roseus* и галки *Corvus monedula* в Калбинском нагорье // *Рус. орнитол. журн.* **15** (338): 1130-1131.
- Егоров В.А., Самусев И.Ф., Березовиков Н.Н. 2000. Водоплавающие птицы Калбинского нагорья (Восточный Казахстан) // *Selevinia*: 117-124.
- Егоров В.А., Самусев И.Ф., Березовиков Н.Н. 2001. Околоводные птицы Калбинского нагорья (Восточный Казахстан) // *Рус. орнитол. журн.* **10** (165): 935-951.
- Смелянский И.Э., Барашкова А.Н., Томиленко А.А., Березовиков Н.Н. 2006. Пернатые хищники предгорий Калбинского Алтая, Казахстан // *Пернатые хищники и их охрана* 7: 46-55.
- Смелянский И.Э., Томиленко А.А. 2005. Новые находки некоторых видов пернатых хищников в Калбинском Алтае (Восточный Казахстан) // *Пернатые хищники и их охрана* 4: 50-51.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск 869: 1027-1028

Колония колпицы *Platalea leucorodia* на озере Караколь в Илийской долине

В.В.Хроков, Э.И.Гаврилов

Второе издание. Первая публикация в 1991*

На озере Караколь (Алма-Атинская область Казахстана) колпицы *Platalea leucorodia* гнездятся в смешанной колонии серых *Ardea cinerea* и больших белых *Egretta alba* цапель. Гнёзда располагаются внутри тростникового массива на кочках, сплавидах и заломах, невысоко от воды. В 1974 году 28 и 29 мая в 3 гнёздах были кладки из 2, 4 и 4 яиц. В большинстве гнёзд найдены разновозрастные птенцы: 1 (1 гнездо), 2 (4), 3 (13), 4(5); в том числе 21 пуховой птенец, 7 – в пеньках, 29 – в кисточках, 11 – оперившихся. Гнёзда размещались на расстоянии от 1.5-2 до 5-10 м друг от друга. Колония состояла из двух участков, разделённых плёсом шириной около 100 м. В 1975 году колония колпиц примерно той же численности располагалась на прежнем месте. При осмотре 25 мая в гнёздах обнаружены: 1) 3 яйца; 2) 2 яйца и 1 пуховой

* Хроков В.В., Гаврилов Э.И. 1991. Краткие сообщения о колпице [в долине р. Чу] // *Редкие птицы и звери Казахстана*. Алма-Ата: 45.

птенец; 3) 3 пуховых птенца; 4-7) 1, 3, 4 и 4 птенца в пенёчках; 8-9) 2 и 4 птенца в кисточках перьев.

В 1979 году 26 и 27 мая в кладках было по 1 (1 гнездо), 3 (5) и 4 (5) сильно насиженных яиц. Около двух гнёзд обнаружены 3 расклёванных воронами яйца. В одном из гнёзд шло вылупление (1 птенец уже появился). В 1980 колпицы гнездились там же, но в начале мая резко поднявшийся уровень воды затопил гнёзда. В 1981 году 8 мая в юго-западной части тростникового массива в гнёздах найдены в основном незаконченные кладки, тогда как в восточной его части были уже оперяющиеся птенцы. В гнёздах содержалось: 2 яйца (1 гнездо), 4 яйца (1), 3 яйца и 1 только вылупившийся птенец (3). Окольцован 31 птенец, в том числе 4 пуховых, 13 – в пенёчках, 14 – в кисточках. Всего в колонии гнездились 60-70 пар колпиц.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск 869: 1028-1029

Необычные случаи вокализации зяблика *Fringilla coelebs* и чёрного дрозда *Turdus merula*: пение самки и пение самцов на лету

Н.П.Кныш

Николай Петрович Кныш. Гетманский национальный природный парк, ул. Мира, д. 6, г. Тростянец, Сумская область, 42600. Украина. E-mail: knysh.sumy@email.ua

Поступила в редакцию 3 апреля 2013

Известно, что самки зяблика *Fringilla coelebs* в редких случаях способны петь. Так, в дубовых рощах под Нижним Новгородом с 30 апреля по 7 августа 1962 встречено 8 поющих самок, причём у двух из них были найдены гнёзда (Аникин, Парахин 1965). По мнению исследователей, такое аномальное поведение является, возможно, особенностью данной микропопуляции зябликов, так как в других местах оно не отмечалось. Это предположение оказалось в общем справедливым. Например, в Ленинградской области и на сопредельных территориях, где регулярные наблюдения за птицами проводятся уже не первый десяток лет, пение самок отмечать не приходилось (Мальчевский, Пукинский 1983). Не упоминают об этом и другие орнитологи.

За многие годы в Сумской области Украины наблюдать поющую самку зяблика мне удалось лишь однажды – в мае 1986 года на зоологическом стационаре Сумского педагогического университета «Вакаловщина» вблизи города Сумы. Птица нормальной самочьей окраски

постоянно держалась на стыке старого яблоневого сада и куртины молодого ельника на опушке нагорной дубравы. Впервые она привлекла внимание своим пением 11 мая, затем наблюдалась ежедневно почти до конца месяца (27 мая). Всё это время самка оставалась холостой, хотя 24 мая за ней на земле ухаживал самец. Её пение – громкая торопливая трель «*тюв-ти-ти-ти-ти-лип*» – похожа на первую строфу нормальной песни зяблика. Интенсивность пения высокая, по временам не уступает интенсивности пения самца. Можно полагать, что аномальное поведение самки зяблика связано с определенным сдвигом в её гормональной сфере, то есть имеет физиологическую основу. Возможно, это была старая птица.

Вызывают интерес и не менее редкие случаи пения зябликов на лету. В разные годы в Сумском районе мною отмечены 4 таких вокализации. Всегда это было в самый разгар брачной активности зябликов (18 и 20 мая 1983, 25 мая 1989, 19 мая 2010), как в природном (опушка дубравы), так и в антропогенном биотопах. Однажды самец торопливо пропел, высоко летя через широкую остепнённую балку. В другом случае самец, перелетая сельскую улицу, тоже исполнил полную песню в полете, перед этим он азартно пел сидя на ели. По всем признакам, эти птицы были холостыми.

Отметим, что и некоторые другие певчие птицы, например чёрный дрозд *Turdus merula*, в моменты наивысшего брачного возбуждения изредка могут петь на лету, о чём есть упоминание в литературе (Ковшарь 1979). Подобные случаи вокализации чёрного дрозда мне пришлось наблюдать в лесостепных дубравах Сумской области 27 и 29 мая 1980, 27 мая 1989, 13 июня 1990. Всегда это был несколько укороченный вариант песни, воспроизводимый от одного до трёх раз в энергичной, даже агрессивной, манере.

Л и т е р а т у р а

- Аникин В.И., Парахин Г.А. 1965. О пении самок зябликов // *Орнитология* 7: 456.
- Ковшарь А.Ф. 1979. *Певчие птицы в субвысокогорье Тянь-Шаня: Очерки летней жизни фоновых видов*. Алма-Ата: 1-311.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. История, биология, охрана*. Л., 2: 1-504.

