ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2013
XXII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
907
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XXII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2013 № 907

СОДЕРЖАНИЕ

2133-2157 Орнитологические наблюдения в водно-болотных угодьях Кустанайской области осенью 2001 года. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ, С.Н.ЕРОХОВ

2157-2162 Новые и редкие птицы в районе озера Чаны (Западная Сибирь). К.Т.ЮРЛОВ, В.М.ЧЕРНЫШОВ, А.И.КОШЕЛЕВ, Р.А.САГИТОВ, В.М.ТОТУНОВ, Г.И.ХОДКОВ, А.К.ЮРЛОВ

2162-2163 Интересный случай гнездования ушастой совы *Asio otus*. Н.Д.БАРЫШНИКОВ

2164-2165 Дополнение к списку гнездящихся птиц Чуйской долины. В.И.ТОРОПОВА, В.К.ЕРЕМЧЕНКО

2165 О весеннем пролёте фламинго *Phoenicopterus roseus* в приэмбинской пустыне (Северо-Восточный Каспий). Е.Г.САМАРИН, Ф.А.САРАЕВ, Ф.Г.БИДАШКО

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2013
Дата опубликования: 20 августа 2013

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXII
Express-issue

2013 № 907

CONTENTS

2133-2157 Ornithological observations in the wetlands of the Kustanai Oblast in autumn 2001. N.N.BEREZOVIKOV, S.N.EROKHOV

2157-2162 New and rare birds around the Lake Chany (Western Siberia). K.T.YURLOV, V.M.CHERNYSHEV, A.I.KOSHELEV, R.A.SAGITOV, V.M.TOTUNOV, G.I.KHODKOV, A.K.YURLOV

2162-2163 An interesting case of nesting of the long-eared owl *Asio otus*. N.D.BARYSHNIKOV

2164-2165 Addition to the list of breeding birds of Chu Valley. V.I.TOROPOVA, V.K.EREMCHENKO

2165 On the spring migration of flamingos *Phoenicopterus roseus* in Emba desert (North East Caspian area). E.G.SAMARIN, F.A.SARAEV, F.G.BIDASHKO

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
S.-Petersburg University
S-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2013

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск **907**: 2133-2157*

Орнитологические наблюдения в водно-болотных угодьях Кустанайской области осенью 2001 года

Н.Н.Березовиков, С.Н.Ерохов

Николай Николаевич Березовиков. Лаборатория орнитологии и герпетологии, Институт зоологии Центра биологических исследований Министерства образования и науки, пр. Аль-Фараби, 93, Академгородок, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru
Сергей Николаевич Ерохов. Департамент мониторинга природной среды Казахского агентства прикладной экологии. Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: syerokhov@mail.ru

Поступила в редакцию 22 марта 2013

Очередная экспедиционная поездка в рамках международной программы по изучению гуся-пискульки на ключевых водоёмах Кустанайской области осуществлена нами с 29 сентября по 12 октября 2001.

Маршрут и сроки экспедиции: 29 сентября – г. Кустанай – г. Рудный – г. Тобол – Каратомарское водохранилище на реке Тобол – пос. Перелески – оз. Сопылынсор (130 км); 30 сентября – оз. Сопылынсор – пос. Перелески – пос. Денисовка на реке Тобол – пос. Сахаровка – оз. Кулыколь (112 км); 1 октября – юго-западная часть озера Кулыколь; 2 октября – оз. Кулыколь – пос. Уркаш – оз. Тениз (Тоунсорский заказник) – с. Жаилма – оз. Батпакколь (117 км); 3 октября – оз. Батпакколь – пос. Дружба – оз. Аксу в 6 км южнее пос. Дружба – с. Раздольное – оз. Сулуколь - пос. Мырзаколь (Диевка) – пос. Аулиеколь (Семиозёрное) – с. Дузбай – пойменное озеро у соснового бора Кояндыгаш (214 км); 4 октября – с. Дузбай – ж.-д. ст. Койбагар – пос. Карасу – оз. Койбагар (88 км); 5 октября – оз. Койбагар – пос. Кара Мырза – оз. Биесайган – оз. Тюнтюгур (50 км); 6 октября – пос. Тюнтюгур – пос. Жамбыл – пос. Павловский - пос. Вишнёвка – оз. Бозшаколь (87 км) – пос. Сарыколь (Урицк) – пос. Тимирязево – пос. Чехово – оз. Жаксы Жарколь между сёлами Анновское и Богдана Хмельницкого (117 км); 7 октября – с. Анновское – озеро у с. Акчиколь – оз. Жаман – оз. Лебяжье (40 км); 8 октября – оз. Лебяжье – пруд в степной балке у с. Королёвка – оз. Речное у с. Амречье – оз. Акужан (41 км); 9 октября – оз. Акужан – пос. Узынколь (Ленинское) – пос. Косколь – с. Красная Пресня – оз. Каракамыс – оз. Карасор – оз. Малое Солёное у пос. Косколь – оз. Ащиколь – оз. Шошкалы у впадения реки Убаган (120 км); 10 октября – оз. Шошкалы; 11 октября – с. Абай – пос. Борки – с. Михайловка (48 км); 12 октября – с. Михайловка – пос. Боровской – г. Кустанай (90 км). Общая протяжённость маршрута составила 1254 км.

Кроме ежедневных учётов гусей и казарок на 20 водоёмах с использованием зрительных труб, выполнено 26 учётов водоплавающих и околоводных птиц на площади 34 км^2. Производился также сбор фаунистических сведений по другим птицам, оценивалось гидрологическое состояние водоёмов, степень охотничье-рыболовных нагрузок на них. Краткие результаты учётов этой поездки нами опубликованы ранее (Ерохов, Березовиков 2003). В этой статье приводим фаунистический обзор по 107 отмеченным нами в 2001 году видам, а также дан-

ные по численности и особенностям осеннего распределения водяных птиц на обследованных озёрах.

Podiceps nigricollis. Черношейные поганки отмечены с 2 по 10 октября на 9 из 20 посещённых водоёмов (учтено 49 особей), в том числе на озёрах Тениз (1), Батпакколь (2), Кояндыгаш (7), Бозшаколь (5), Акчиколь (4), Жаман (1), Лебяжье (2), Шошкалы (1) и Ащиколь вдоль реки Убаган (26 особей). Численность на большинстве озёр была в пределах 1-7 особей/км^2 и лишь на солёном Ащиколе достигала 26 особей. Поганки чаще держались по 1-2, реже – группами по 4-6 штук.

Podiceps auritus. Стайку из 12 красношейных поганок наблюдали 9 октября на озере Ащиколь в долине Убагана.

Podiceps grisegena. Серощёкая поганка отмечена только 2 и 10 октября на озёрах Батпакколь (2) и Шошкалы (1 особь).

Podiceps cristatus. Чомга встречалась чаще других поганок (учтено 246 особей). С 29 сентября по 11 октября она отмечалась на Каратомарском водохранилище (3), озёрах Сопылынсор (4), Батпакколь (28), Сулуколь (43), Кояндыгаш (16), Койбагар (4), Тюнтюгур (6), Бозшаколь (2), Жаксы Жарколь (4), Акчиколь (43), Жаман (23), Лебяжье (8), Акужан (6), Карасор (36), Ащиколь (12) и Шошкалы (8 особей).

Pelecanus crispus. Нами не встречены, но по сообщению рыбаков на озере Тюнтюгур в течение лета наблюдались небольшие группы кудрявых пеликанов, в одной из которых было 9 особей. В Узынкольском районе в июле-августе охотоведом В.Н.Крутневым отмечались на озёрах Акужан и Тран (8 и 22 особи). На озере Шошкалы из-за сильного обмеления пеликаны в этом году не загнездились, однако держались здесь стаями всё лето до сентября включительно.

Phalacrocorax carbo. С 3 по 10 октября большие бакланы отмечены на озёрах Батпакколь (13), Кояндыгаш (3), Тюнтюгур (25), Бозшаколь (7), Акужан (170), Шошкалы (19+36 особей). В северо-восточной части Кустанайской области этим же летом по опросным данным много бакланов держалось по водоёмам Узынкольского района, особенно на озёрах Жаргайын, Акужан, Речное, Сарыоба и других. На Шошкалы в 2000-2001 годах, по сообщению егеря Ю.Соловьёва, существовало не менее трёх колоний. Примечательно, что бакланы гнездились здесь и в предыдущие годы, но егерями охотхозяйства с целью отпугивания бакланов каждую весну производилось изъятие яиц из всех гнёзд. Представляет интерес сообщённый рыбаками факт гнездования бакланов на озере Тюнтюгур, на котором летом 2001 находили небольшую колонию с птенцами, располагавшуюся на сплавинах.

Botaurus stellaris. Вечером 2 октября одиночку наблюдали на озере Батпакколь.

Egretta alba. С 29 сентября по 11 октября больших белых цапель

встречали на озёрах Сопылынсор (5), Батпакколь (5), Сулуколь (4), Кояндыгаш (9), Тюнтюгур (11), Жаксы Жарколь (13), Акчиколь (2), Жаман (1), Лебяжье (16) и Шошкалы (8 особей).

Ardea cinerea. Серые цапли встречались с 2 по 10 октября на озёрах Батпакколь (1), Кояндыгаш (3), Койбагар (8), Жаман (1), Карасор (1) и Шошкалы (4 особи). Между озёрами Лебяжье и Речное ещё 2 цапель видели 8 октября на запруде в степной балке у села Королёвка.

Rufibrenta ruficollis. По сведениям В.А.Сахно, первые краснозобые казарки на озере Кулыколь появились 31 августа, в массе – 11 сентября, в конце этого месяца здесь держалось до 20 тыс. особей. На озере Сопылынсор 29 сентября встречено 215 казарок, в одной из выборок среди 35 казарок было 11 взрослых и 24 молодых особи. Основная концентрация наблюдалась на Кулыколе, на остальных озёрах были малочисленны или редки среди массы серых и белолобых гусей (Бозшаколь – 3, Тюнтюгур – 76, Бозшаколь – 283, Акужан – 235 особей). Расчётная численность краснозобых казарок на водоёмах Кустанайской области в первой половине октября 2001 составляла 36700 особей (Ерохов, Березовиков 2003). Численность их была примерно такой же, как и в предыдущем году.

Anser anser. По сведениям, сообщённым председателем Денисовского общества охотников Г.А.Червяковым, на озере Ашалы, где в качестве биотехнических мероприятий весной этого года было создано 280 искусственных гнёзд для гусей, в их выводках было по 2-8, в среднем 3.7 птенцов. Кроме размножающихся, здесь держалось около 5000 «гулевых» гусей. На сильно заросшем тростниками Карпыковском озере, имеющем всего три открытых плёса, размножалось 38 пар гусей. На мелководном озере Светлое в охотхозяйстве «Лесное» (граница Кустанайской и Челябинской областей) весной 2001 года было известно до 46 гусиных гнёзд. Примечательно, что на этом озере, расположенном на краю посёлка, выводки диких гусей нередко перемешивались с домашними. Летом здесь держалось до 5 тыс. гусей. На охраняемом озере Сопылынсор в начале сентября концентрировалось до 10 тыс. местных серых гусей, однако после проведения охот к 27 сентября здесь осталось лишь 5 тыс., остальные переместились на соседние озёра. Так, на озере Баталы (Жаксы Алаколь) 25 сентября концентрировалось до 12 тыс. серых гусей. На соседнем Карпыковском озере в это же время наблюдались временные скопления до 5 тыс. особей, но это, в большинстве своём, были гуси, распуганные охотниками на Баталы. Небольшие концентрации по 3-5 тыс. гусей отмечались на Верхне-Тобольском водохранилище, озёрах Лесном и Чебындысор. На озере Сурколь у села Ждановка, где охота на гусей временно закрыта, в сентябре держалось 700 местных особей, но при появлении транзитных стай количество гусей увеличивалось. На Каратомарском и Забелов-

ском водохранилищах постоянных скоплений серых гусей не наблюдается, осенью здесь останавливаются на отдых лишь небольшие транзитные стаи. На озере Кулыколь, по сведениям В.А.Сахно, летом 2001 года держалось до 1500 линных гусей, к 20 августа их число увеличилось до 5000 особей. После открытия охоты наблюдалось некоторое увеличение числа, за счёт гусей, распуганных охотниками на соседних озёрах. Первая миграционная волна серых гусей вместе с краснозобыми казарками началась с 11 сентября. На озере Тюнтюгур в этом году отмечались выводки и линные скопления серых гусей. В северо-восточной части области, по оценке охотоведа В.Н.Крутнева, на озере Сарыоба в августе этого года держалось 2000 «гулевых» гусей. В первой декаде октября на нём же оставалось 1500, на соседних озёрах Бабье, Речное и Жаргайын по 200, 300 и 500, на небольших озёрах Курколь, Попов, Мамонов, Займище – по 100-150, Долбилово – до 200 гусей. В долине Убагана на озере Каракамыс 9 октября отмечено до 300, а на Шошкалы – 2000-2500 гусей. Суммарная численность серых гусей на контрольных водоёмах Кустанайской области в первой половине октября 2001 года составляла 57600 особей (Ерохов, Березовиков 2003).

Anser albifrons. На озере Батпакколь первое появление белолобых казарок в 2000 и 2001 годах местными охотниками наблюдалось 9 и 15 сентября, хотя ещё десять лет назад они прилетали 18-22 сентября. На водоёмах Узынкольского района (Акужан, Сарыоба, Речное и др.) пролёт начался 12-15 сентября. На озёрах Сопылынсор, Батпакколь, Сулуколь, Тюнтюгур, Жаксы Жарколь, Жаман, Акужан в первой декаде октября белолобые гуси держались в небольшом числе – по 100-300 особей, на Койбагаре, Бозшаколе, Лебяжьем – по 500-1000. Расчётная численность на водоёмах Кустанайской области в первой половине октября 2001 года составляла 32 тыс. особей (Ерохов, Березовиков 2003). В целом осенью 2001 года произошло многократное снижение численности белолобых гусей на кустанайских водоёмах, вероятнее всего, за счёт смещения основной массы гусей южнее.

Anser erythropus. Первую группу из 2 взрослых и 4 молодых пискулек отметили 1 октября на озере Сопылынсор. Основная их концентрация наблюдалась на озёрах Батпакколь и Кулыколь. На остальных озёрах пискулька встречался реже, в основном среди массы других гусей. Величина групп (n = 17) составляла от 2 до 14, в среднем 6.0 особей. Лишь на озере Сулуколь 3 октября отмечены стаи из 57 и 61 пискульки. Численность пискулек на водоёмах Кустанайской области в первой половине октября 2001 года оценена в 3700 особей (Ерохов, Березовиков 2003), что составило около 20% размера мигрирующей через данный регион западной популяции этого вида.

Anser fabalis. В отличие от предыдущих лет, этой осенью отмечалось некоторое увеличение числа мигрирующих гуменников. Так, в

северо-восточной части области с 1 по 7 октября охотоведом В.Н.Крутневым на озере Жаргайын наблюдался их пролёт стаями до 20-50 особей. Присутствовали они и в добыче охотников. По сведениям этого корреспондента, прежде, в 1962-1963 годах, в этих же местах гуменники осенью по численности были сравнимы с серыми гусями, но в последующие десятилетия вновь встречались редко. Нами 6 октября, во время вечернего вылета гусей на кормёжку на озере Койбагар, отмечена группа из 6 гуменников. На озере Акужан 9 октября одиночку видели в стае летящих серых гусей.

Cygnus olor. Лебеди-шипуны в первой декаде октября были уже малочисленны и отмечены только на 10 из 20 озёр: Кулыколь (2), Тениз (1), Батпакколь (9), Аксу (2), Сулуколь (1), Кояндыгаш (12), Жаман (110), Каракамыс (7), Ащиколь (55), Шошкалы (9 особей). Всего из 208 учтённых особей взрослых было 144 (69.2%), молодых – 64 (30.8%). Основная концентрация шипунов отмечена в северной части области на озёрах Жаман (52.9%) и Ащиколь (26.4%), на остальных встречались по 1-2, реже по 7-12 особей. Величина выводков (n = 14): 1(5)- 2(3)-3(1)-5(1)-7(4), в среднем 3.4 птенца. В 11 случаях молодняк сопровождали оба родителя и только в 3 присутствовал лишь один из них. Взрослые, державшиеся обособленно, в 30 случаях имели следующую величину групп: 1(6)-2(13)-3(6)-4(2)-5(2)-7(1), в среднем 2.6 особей. В 7 случаях они держались по 4-12, в среднем 6.1 особи с присутствием среди них 1-4, в среднем 2.1 молодых. На обмелевшем озере Кулыколь 30 сентября – 2 октября видели 2 ещё нелётных молодых шипунов, которые постоянно находились на илистых мелководьях и при беспокойстве уходили в ближайшие тростники, не предпринимая попыток улететь. Взрослых птиц с ними не было. На озере Шошкалы 9-11 октября наблюдали, как около кормящегося выводка из 7 молодых и 2 взрослых шипунов собиралось множество водоплавающих других видов. Пользуясь тем, что кормящиеся лебеди, способные глубоко погружать голову в воду, выдирали из донного грунта стебли и корневища рдестов и других растений, лысухи, свиязи, кряквы, хохлатые и красноголовые чернети быстро подбирали то, что не успевали съедать шипуны. Всего в таких трофических ассоциациях мы насчитывали до 30-40 уток указанных видов, при этом, присутствие в них свиязей нами было отмечено впервые.

Cygnus cygnus. Лебеди-кликуны с 30 сентября по 11 октября встречены на 13 озёрах: Сопылынсор (50), Батпакколь (5), Аксу (4), Сулуколь (187), Тюнтюгур (203), Бозшаколь (11), Жаксы Жарколь (40 и 32), Жаман (4), Акужан (51), Каракамыс (5), Карасор (20), Ащиколь (32), Шошкалы (57), на которых подсчитано 697 особей, в том числе 373 (53.5%) взрослых и 184 (26.5%) молодых. В наиболее крупных скоплениях на Сулуколе и Тюнтюгуре насчитывалось от 50 до 145 особей на

1 км² акватории, преобладающая величина отдельных стай – от 25 до 50 особей. Размер выводков (n = 33): 1 (6)-2(6)-3(9)-4(6)-5(5)-6(1), в среднем 3.0 молодых. В 26 случаях выводки сопровождались парой взрослых, в 7 – только одной птицей. Два выводка по 4 молодых были без родителей. Встречались и смешанные группы, состоящие из взрослых и молодых птиц (n = 14), при этом взрослых в них насчитывалось от 3 до 36 (в среднем 10.9), молодых от 1 до 14 (5.4). Обособленные группы взрослых (n = 38) состояли от 2 до 18, в среднем 4.4 особи. В утреннее и вечернее время наблюдались вылеты кликунов на кормёжку на стерню пшеничных поля за 5-10 км от озера. В целом осенний пролёт лебедей-кликунов в этом году в Кустанайской области был продолжительнее обычного. По сообщению Д.Д.Жукова, 5 ноября 2001, после установления зимней погоды, над Кустанаем весь день шёл пролёт кликунов в южном направлении, а 19 ноября 2001 зоолог Б.Есжанов на полынье реки Тобол у села Кунай (20 км южнее г. Кустанай) также наблюдал пару взрослых кликунов.

Cygnus bewickii. Малые лебеди, как и в предыдущие осенние сезоны, встречались редко и были отмечены только на трёх озёрах (всего 42 особи, из них 29 взрослых). Так, в мелководной восточной части озера Тюнтюгур 6 октября среди кликунов держалось 23 взрослых малых лебедя, с которыми были также 2 выводка из 2 и 4 молодых. На озере Жаксы Жарколь 7 октября наблюдали группу из 4 взрослых малых лебедей, а на озере Шошкалы 10 октября видели 3 выводка этих лебедей – из 2, 4 и 4 молодых, каждый из которых сопровождали по паре взрослых птиц.

Tadorna ferruginea. На илистых мелководьях озера Кулыколь, по сообщению егерей, в течение сентября держалось 1500-2000 огарей, которые к моменту нашего обследования, по-видимому, уже откочевали южнее и 30 сентября – 1 октября здесь мы видели лишь 2 и 23 особи. При обследовании других водоёмов группу из 3 особей встретили 6 октября на Бозшаколе.

Tadorna tadorna. На озёрах Кулыколь и Сулуколь 1 и 3 октября учтено 8 и 2 пеганки, а на солёном озере Карасор между сёлами Сорколь и Красная Пресня 9 октября отметили группу из 9 особей.

Anas platyrhynchos. Кряквы встречены на 17 из 20 озёр: Сопылынсор (6796), Кулыколь (10000), Тениз (2), Батпакколь (45), Аксу (2), Сулуколь (930), Кояндыгаш (3), Койбагар (25), Тюнтюгур (96), Бозшаколь (305), Жаксы Жарколь (33), Акчиколь (54), Жаман (44), Лебяжье (286), Акужан (176), Каракамыс (23) и Шошкалы (62 особи) – всего 18882 особи. Максимальная концентрация этих уток была на озёрах Кулыколь и Сопылынсор, откуда они вылетали кормиться зерном на ближайшие убранные пшеничные поля, возвращаясь обратно для отдыха и водопоя. При этом излюбленными местами на озёрах были

илистые мелководья и пологие берега, на которых они во время отдыха образовывали плотные скопления в несколько тысяч особей, рассаживаясь в виде длинных лент вдоль уреза воды. На озере Кулыколь кряквы вместе с шилохвостями и другими речными утками образовали смешанное скопление из 15 тыс. особей. На Сопылынсоре скопление из 7 тыс. крякв размещалось отрезке береговой линии длиной 2 км. Высокой численность мигрирующих крякв была и на Сулуколе – до 1000 ос./км^2. Все добытые охотниками на перечисленных озёрах кряквы уже накопили значительные жировые резервы. На большинстве остальных степных озёр подсчитывали обычно 20-50, редко до 200-300 ос./км^2. Здесь кряквы чаще всего встречались мелкими группами по 3-10 особей, рассредоточившись по всей акватории среди мозаично растущих тростников. В пяти выборках (n = 176) самцов было 124 (70.5%), самок – 52 (29.5%). Взрослые селезни и самки были уже в ярком зимнем наряде. Селезни часто встречались в одиночку и группами по 2-4 особи, но отмечались и стаи, насчитывающие до 25 самцов. Некоторые группы, из 3-12 птиц, были «обоеполые», но самцы в них всегда преобладали. В 14 случаях кряквы были уже в парах.

Anas crecca. С 29 сентября по 10 октября чирки-свистунки встречены на озёрах Сопылынсор (4), Кулыколь (414), Батпакколь (79), Кояндыгаш (71), Койбагар (50), Тюнтюгур (581), Бозшаколь (5), Жаксы Жарколь (1), Акчиколь (14), Акужан (55), Каракамыс (3), Карасор (26), Шошкалы (172), всего 1479 особей. Из 34 групп и стай в 15 случаях они держались по 2-7 особей (56), в 5 по 12-18 (78), в 8 по 22-30 (207), в 4 по 40-50 (178), в среднем 16 особей. Лишь в двух случаях видели их стаями по 150 и 155 особей. Дважды свистунки встречены парами.

Anas strepera. Серая утка в первой декаде октября отмечена на 14 из 20 озёр: Сопылынсор (4), Батпакколь (57), Аксу (38), Сулуколь (257), Кояндыгаш (60), Тюнтюгур (12), Бозшаколь (1), Жаксы Жарколь (27), Акчиколь (5), Жаман (660), Лебяжье (150), Акужан (176), Карасор (149), Каракамыс (15) – всего 1611 особей. В большинстве случаев серые утки встречались стаями по 20-40 особей, в которых наблюдалось резкое преобладание селезней в ярком брачном наряде (80%). В одном случае (9 октября) на солёном озере Карасор видели стаю из 50 самцов (!). Нередко отмечались группы по 2-6 селезней с 1-2 самками. На озере Батпакколь 2-3 октября видели брачные игры, когда два самца азартно гонялись за самкой. В 13 случаях видели уже сформировавшиеся брачные пары, державшиеся обособленно. Следует отметить, что на обследуемых нами озёрах серая утка была распространена не столь равномерно, как другие массовые виды. На ключевых кустанайских озёрах, где учёты уток проводятся уже 6-й год, наблюдается устойчивое снижение численности этого вида. Это же явление подтверждают местные охотники и егеря, сообщившие, что серая утка в 2001 году

почти не встречается в ряде районов, в том числе и на Сопылынсоре и соседних с ним водоёмах, где прежде была обычной гнездящейся и пролётной птицей. Подобная тенденция прослеживается и в других регионах Казахстана и, в частности, на Алаколь-Сасыккольской системе озёр. Примечательно, что этой осенью исчезли массовые осенние скопления серой утки на озере Жаксы Жарколь, отмеченные здесь в октябре 2000 года (Березовиков, Ерохов 2011), но зато в большом количестве она концентрировалась на соседнем озере Жаман, где была третьим по числу видом после лысухи и свиязи.

Anas penelope. С 29 сентября по 11 октября свиязи учтены на 12 из 20 озёр: Сопылынсор (39), Аксу (6), Сулуколь (60), Биесайган (23), Тюнтюгур (111), Жаксы Жарколь (2), Акчиколь (6), Жаман (660), Лебяжье (150), Акужан (24), Карасор (149), Шошкалы (60), всего 2218 особей. В большом количестве их видели 9 октября на солёном озере Ащиколь в долине Убагана, где на 2 км^2 отмечено 928 особей. На плёсах встречалась стаями от 15 до 110, чаще по 40-70 особей. Взрослые птицы были в брачном наряде, в 3 случаях отмечены уже сформировавшиеся пары.

Anas acuta. Основная концентрация шилохвостей (5000 особей), как и в предыдущие годы, наблюдалась на озере Кулыколь, где они вместе с кряквами, стаями по 100-200 особей, совершали вылеты на кормёжку на убранные пшеничные поля. Другим местом скопления шилохвостей были илистые мелководья озера Тюнтюгур, где насчитывали по 334-367 особей на 1 км^2. Всего же с 29 сентября по 10 октября шилохвостей наблюдали на озёрах Сопылынсор (84), Кулыколь (5000), Батпакколь (45 и 26), Кояндыгаш (5), Тюнтюгур (473 и 589), Бозшаколь (3), Жаксы Жарколь (14), Акчиколь (11), Акужан (13), Каракамыс (4), Карасу (1), Шошкалы (8 особей), общим числом 6276 особей. Большинство селезней были уже в ярком зимнем наряде.

Anas clypeata. Широконоска с 29 сентября по 11 октября отмечена на 14 из 20 озёр: Сопылынсор (1), Батпакколь (160), Сулуколь (337), Кояндыгаш (15 и 165), Тюнтюгур (65), Бозшаколь (3), Акчиколь (2), Жаман (3), Лебяжье (1), Акужан (54), Каракамыс (263), Ащиколь (38), Шошкалы (22), всего – 1129 особей. Максимальная плотность составляла от 131 до 340 ос./км^2. Размер обособленных небольших скоплений – 40-80 особей, в них величина отдельных стай по 10-30 особей, обычно состоявших из взрослых самок, молодых самцов и молодых самок. Взрослые селезни в брачном наряде были ещё редки – в среднем 1-3 штуки на 50 особей. В некоторых группах из 5-19 самок нередко было только по одному взрослому самцу. Среди них зафиксирована одна сформировавшаяся брачная пара.

Netta rufina. Красноносые нырки были сравнительно редки и с 29 сентября по 9 октября встречены только на 8 из 20 озёр: Сопылынсор (2), Сулуколь (140), Жаксы Жарколь (5), Акчиколь (18), Жаман (95),

Лебяжье (97), Акужан (4), Карасор (1) – всего 362 особи.

Aythya ferina. С 29 сентября по 11 октября красноголовых чернетей учли на 15 озёрах: Сопылынсор (144), Тениз (12), Батпакколь (156), Аксу (195), Сулуколь (135), Кояндыгаш (105), Тюнтюгур (52), Бозшаколь (14), Жаксы Жарколь (23), Жаман (6), Лебяжье (112), Акужан (80), Карасор (1), Ащиколь (6), Шошкалы (73) – всего 1114 особей. Отмечены преимущественно небольшими группами – до 10-20 штук, образуя на центральных плёсах озёр небольшие, но плотные скопления по 40-80 особей. На некоторых мелководных водоёмах с мозаичными зарослями тростников по всей акватории часто встречались селезни, кормящиеся и отдыхающие, в одиночку, или по два. Плотность этих уток на озёрах составляла от 50 до 200, в среднем 68 ос./км^2. Во всех случаях отмечено абсолютное преобладание самцов (до 89%).

Aythya nyroca. На озере Сопылынсор, как и в предыдущем году, 30 сентября зарегистрировали пару белоглазых чернетей. На других озёрах не отмечена, хотя поиску этого вида среди массы других уток мы всегда уделяли особое внимание.

Aythya fuligula. Хохлатые чернети с 29 сентября по 11 октября были многочисленны, являясь фоновым, а местами доминирующим видом нырковых уток. Отмечены на 17 из 20 посещённых озёр учтено 5035 особей: Сопылынсор (144), Тениз (15), Батпакколь (560), Аксу (210), Сулуколь (51), Кояндыгаш (288 и 455), Тюнтюгур (273), Бозшаколь (19), Жаксы Жарколь (1272), Акчиколь (155), Жаман (114), Лебяжье (299), Акужан (164), Каракамыс (50), Карасор (378), Ащиколь (313) и Шошкалы (275 особей). Держались как на пресных, так и солёных озёрах, причём на последних (Карасор, Ащиколь) достигали плотности 156-378 ос./км^2. Максимальная их концентрация отмечена 6-7 октября на озере Жаксы Жарколь, на котором вместе с лысухами они покрывали всю поверхность воды с плотностью до 371 ос./км^2, держась группами по 3-10 штук и плотными стаями по 20-50 особей. Средняя плотность населения хохлатой чернети по 18 учётам на 16 водоёмах (общая площадь 24 км^2) в первой половине октября составила 209 ос./км^2.

Aythya marila. Морские чернети были малочисленны и с 30 сентября по 10 октября отмечены на 11 из 20 озёр (456 особей): Сопылынсор (8), Батпакколь (17), Аксу (3), Кояндыгаш (56 и 76), Тюнтюгур (11), Жаман (4), Лебяжье (1), Акужан (43), Карасор (50), Ащиколь (171), Шошкалы (16 особей). В большинстве случаев они держались в центральных глубоководных частях плёсов растянутыми лентами, особняком от других видов и лишь мелкие их группы были отмечены среди массы лысух и хохлатых чернетей. Из 19 встреч в 9 случаях их видели группами по 1-8 (38 особей), в 9 – по 11-22 (151 особь) и лишь в одной стае насчитывалось 50 птиц.

Bucephala clangula. Гоголи с 30 сентября по 10 октября были

встречены на 14 из 20 озёр, где были немногочисленны (всего 878 особей): Сопылынсор (8), Батпакколь (1), Кояндыгаш (89 и 213), Тюнтюгур (6), Бозшаколь (21), Жаксы Жарколь (35), Акчиколь (32), Жаман (26), Лебяжье (63), Акужан (43), Каракамыс (78), Карасор (41), Ащиколь (171), Шошкалы (51 особь). Средняя их плотность здесь составила 45 ос./км^2, максимальной (до 213 ос./км^2) она была на глубоких плёсах Кояндыгаша с проточной пресной водой, на солёных озёрах Карасор и Ащиколь в долине Убагана – 41 и 85 ос./км^2. На большинстве осмотренных водоёмов гоголи встречались по всей акватории, в одиночку и группами по 2-5 особей, в местах отдыха – стайками по 10-16 штук. В большинстве их преобладали самцы, некоторые стайки состояли только из одних селезней. Было также отмечено и несколько обособленных пар. В ветреную погоду гоголи укрывались среди разреженных тростников, часто перемещаясь с места на место.

Oxyura leucocephala. На озере Сопылынсор 30 сентября отмечен 1 взрослый самец савки, на плёсе озера Кояндыгаш 3 октября также держался 1 самец, но на следующее утро здесь видели группу из 12 селезней и 6 самок или молодых.

Mergellus albellus. С 30 сентября по 11 октября лутки были малочисленны и отмечены только на 7 озёрах (99 особей): Сопылынсор (5), Батпакколь (21), Аксу (1), Тюнтюгур (9), Акчиколь (11), Жаман (9), Ащиколь (15), Шошкалы (28 особей). Встречались мелкими группами по 2-3 особи на плёсах в разреженных тростниках, чаще среди гоголей и хохлатых чернетей. Вероятнее всего, это были особи, обитавшие здесь и в летний период, а пролёт проходил в более позднее сроки – вторая половина октября и первая половина ноября. На озере Шошкалы их поднимали поодиночке и группами по 2-5 особей с небольших плёсов канала в густых массивах тростников вдоль дамбы. Как выяснилось, их привлекла сюда многочисленная молодь рыбы.

Mergus merganser. Небольшую группу больших крохалей из 2 самцов и 5 самок отметили вечером 29 сентября на озере Сопылынсор. Позднее этих крохалей наблюдали 7-9 октября на озёрах Жаман (4), Акужан (3) и Ащиколь (4 особи). На озере Шошкалы 10 октября видели пару, кормящуюся вместе с лутками молодью рыбы на канале.

Pandion haliaetus. Одиночную скопу, охотившуюся на озере Жаксы Жарколь у села Анновское, видели 7 октября.

Circus cyaneus. Полевые луни изредка встречались с 30 сентября по 9 октября над тростниками озёрных котловин, а также на жнивье и в бурьянниках брошенных полей. Всего учтено 17 особей, в том числе 7 взрослых самцов.

Circus aeruginosus. Взрослого самца болотного луня наблюдали 1 октября на озере Кулыколь, а двух молодых птиц – 4 и 9 октября на озёрах Койбагар и Акужан.

Accipiter nisus. Перепелятников отметили трижды: 30 сентября в посёлке Денисовка, 2 октября на озере Батпакколь и 5 октября – на озере Койбагар, где самец охотился за мелкими воробьиными птицами среди карагачей, клёнов и развалин домов с бурьянниками.

Buteo lagopus. Между озёрами Бозшаколь и Жаксы Жарколь 6 октября наблюдали одного зимняка на жнивье поля среди берёзовых колков у бывшего совхоза имени Чехова.

Aquila heliaca. Одиночный могильник встречен 29 сентября на стерне пшеничных полей у озера Сопылынсор.

Haliaeetus albicilla. С 30 сентября по 11 октября 8 одиночных орланов-белохвостов встретили на 7 озёрах: Сопылынсор, Кулыколь, Кояндыгаш, Тюнтюгур, Жаксы Жарколь, Акужан и Шошкалы, на которых водоплавающие птицы концентрировались в большом количестве. На Кулыколе взрослый белохвост 1-2 октября периодически облетал скопление гусей, краснозобых казарок и речных уток, в результате чего они каждый раз шумно поднимались стаями по 5-10 тысяч особей, перелетали и рассаживались в другой части озера. Кружась, орлан осматривал место их отдыха в поисках подранков и мёртвых птиц. По сообщению егерей, на Кулыколь-Талдыкольской озёрной системе во второй половине октября 2000 года на протяжении 10 км держалось до 22 орланов, которые своими частыми перемещениями над акваторией и по побережью доставляли много беспокойства отдыхающим гусям и казаркам.

Falco peregrinus. Сапсана, охотившегося вдоль тростниковых зарослей озера Шошкалы, наблюдали 10 октября.

Falco columbarius. Вечером 30 сентября видели двух дербников, охотящихся над илистыми отмелями высохшего дна озера Кулыколь в местах концентрации куликов и трясогузок. На следующее утро здесь же дербник охотился за мелкими воробьиными птицами в бурьянниках брошенного поля. На дальнейшем маршруте ещё двух одиночек встречали 4 и 6 октября по берегам озёр Койбагар и Жаксы Жарколь.

Falco tinnunculus. На протяжении всего маршрута с 29 сентября по 12 октября зарегистрировано 12 пустельг, из них 8 встреч было приурочено к земледельческим районам вдоль дороги Денисовка – Талдыколь – Дружба (233 км), где они держались по столбам ЛЭП вдоль полей. Остальные, по одиночке, отмечены на полях с лесными колками у озёр Койбагар, Лебяжье, Бозшаколь и Шошкалы.

Lagopus lagopus major (Lorenz, 1904). В бурьяннике среди брошенных полей между Сахаровкой и озером Кулыколь 30 сентября встречена одиночная белая куропатка. Ранее видеть их в этих местах нам не приходилось. В северной части области, по опросным данным, белая куропатка достаточно обычна в берёзовых перелесках между посёлками Узынколь и Кировское. Ранним утром 8 октября крики самца

мы слышали в осиннике у озера Лебяжье, а по дороге вдоль Убагана между селом Косколь и озером Шошкалы 9 октября выпугнули пару и две одиночки.

Perdix perdix. На полевой дороге вдоль Убагана между селом Косколь и озером Шошкалы 9 октября на высокотравном полынно-злаковом участке степи встречены 3 группы по 5, 10 и 12 серых куропаток.

Coturnix coturnix. На пути от озера Шошкалы к селу Борки 11 октября одного перепела выпугнули из придорожного бурьяна.

Grus grus. В третьей декаде сентября в северной части Кустанайской области проходил выраженный пролёт серых журавлей на запад. По информации от наших корреспондентов, они в большом количестве летели над Кустанаем 27-28 сентября, а на озере Сопылынсор весь день 28 сентября держалось несколько тысяч журавлей, однако, посетив это место 29-30 сентября, мы уже не застали их здесь. Несколько ранее, 25 сентября, Г.А.Червяков в посёлке Денисовка наблюдал выраженный пролёт на запад стаями по 300-400, в одном случае 800 особей. На Кулыколе днём 30 сентября на запад пролетела большая транзитная стая, а вечером наблюдали группу из 4 серых журавлей, прилетевших на ночёвку с ближайших полей. На убранных полях у посёлка Дружба 28 сентября, по опросным данным, держалось многотысячное скопление журавлей, занимавшее не менее 4 «клеток» (стандартное поле площадью 200 га). Однако 3 октября журавлей здесь мы уже не обнаружили. На озере Тюнтюгур вечером 5 октября встречена группа из 8 птиц. В посёлке Узынколь в полдень 8 октября на запад пролетело свыше 100 особей, а на озере Акужан – одна стая из 94 особей.

Anthropoides virgo. По опросным данным, между озёрами Сопылынсор и Баталы летом 2001 года держалась семья красавок из 2 взрослых и 2 птенцов. На озере Кулыколь вечером 30 сентября на ночёвку остановились 3 стаи (всего 58 особей).

Fulica atra. В первой декаде октября лысухи были обычны, а местами многочисленны на 15 из 20 озёр: Сопылынсор (1368), Батпакколь (315), Аксу (334), Сулуколь (3255), Кояндыгаш (681), Тюнтюгур (263), Бозшаколь (5), Жаксы Жарколь (10977), Акчиколь (35), Жаман (18004), Лебяжье (1750), Акужан (74), Каракамыс (39), Карасор (1), Малое Солёное (15), Шошкалы (32), суммарно 37148 особей. Основная концентрация наблюдалась на озёрах Жаман и Жаксы Жарколь, где отмечено 85.5% от общего числа учтённых лысух. На остальных водоёмах насчитывалось обычно от 50 до 350 ос./км^2.

Tetrax tetrax. В холмисто-увалистой местности между посёлками Денисовка и Жетикара в августе 2001 года на полях встречались стаи по 40-70 стрепетов, а в окрестностях озера Кулыколь, по наблюдениям В.А.Сахно, в течение сентября концентрировалось около 150 особей. Нами 30 сентября на пышном типчаково-осоковом участке степи между

Сахаровкой и Кулыколем зарегистрирован самец, а на пути между озёрами Батпакколь и Аксу 3 октября на пшеничной стерне поля отмечена группа из 3 особей.

Pluvialis squatarola. Тулесов наблюдали 29 сентября на озере Сопылынсор (18), 1 и 2 октября – на Кулыколе (4); 3 октября – на Батпакколе (10), 5 и 6 октября – на Тюнтюгуре (17). В большинстве случаев они держались по отлогим илистым берегам озёр и лишь в одном случае группу из 6 особей видели на прилегающей к водоёму пашне.

Pluvialis apricaria. Одна золотистая ржанка отмечена 5 октября на озере Тюнтюгур.

Charadrius hiaticula. На озере Кулыколь 1 октября наблюдали 8 молодых галстучников.

Eudromias morinellus. Одиночного хрустана 1 октября видели на песчаных участках среди широкой полосы солероса на усохшем дне озера Кулыколь, где он держался особняком от других куликов, временами подавая мелодичный посвист. Птица была в зимнем наряде с бурым брюшком и чёткой светлой бровью.

Vanellus vanellus. Встречи с чибисами зарегистрированы с 29 сентября по 7 октября только на 6 водоёмах: Сопылынсор (5), Тениз (2), Батпаккколь (3), Тюнтюгур (42), Бозшаколь (9) и Жаман (3 особи).

Himantopus himantopus. Одиночный ходулочник наблюдался 6 октября на озере Бозшаколь.

Tringa erythropus. С 1 по 10 октября щёголей встречали на озёрах Кулыколь (1), Тюнтюгур (7), Акужан (7), Ащиколь (2) и Шошкалы (1 особь).

Calidris minuta. Кулики-воробьи наблюдались 1 и 5 октября по грязевым берегам озёр Кулыколь и Тюнтюгур (25 и 23 особи).

Calidris alpina. На грязевых отмелях озера Кулыколь 2 октября держалась стая из 60 чернозобиков, а на озере Батпакколь 7 октября встречено 16 особей. На мелководьях озера Тюнтюгур 5 октября учтено 123 чернозобика на 2 км береговой линии.

Lymnocryptes minimus. Одиночный гаршнеп встречен 8 октября на озере Акужан.

Gallinago gallinago. С 2 по 10 октября бекасов встретили только на 4 озёрах: Батпакколь (5), Лебяжье (1), Акужан (6) и Шошкалы (1), где их поднимали по залитым водой мелким тростникам.

Numenius arquata. Нами большой кроншнеп не наблюдался. По сообщению Г.А.Червякова, в северо-западной части Кустанайской области между посёлками Денисовка и Жетикара начало летнего пролёта большого кроншнепа в 2000 и 2001 годах приходилось на 9 и 11 июля. В большом количестве они летели в юго-западном направлении до 25 июля, образуя на «парах» в районе озера Баталы скопления до 400, у Сопылынсора – до 700 особей. На соседнем озере Сурколь 17-20

августа 2001 держалось около 300 кроншнепов, при этом в эти дни проходил пролёт в основном среднего кроншнепа *N. phaeopus*, тогда как *N. arquata* оставалось уже очень мало.

Limosa limosa. На Кулыколе 1 октября отмечена стая из 37, а на озере Акужан 8 октября видели 12 больших веретенников.

Larus ichthyaetus. На озёрах Кулыколь и Бозшаколь 1 и 6 октября отмечено по два взрослых черноголовых хохотуна.

Larus minutus. На озере Батпакколь 2 октября наблюдали одну взрослую малую чайку.

Larus ridibundus. Озёрные чайки с 29 сентября по 11 октября встречены на озёрах Сопылынсор (5), Батпакколь (134), Аксу (14), Кояндыгаш (38), Койбагар (137), Тюнтюгур (914), Бозшаколь (67), Жаксы Жарколь (35), Акчиколь (2), Малое Солёное (50), Ащиколь (3), Шошкалы (14) и на пруду у села Королёвка (150 особей) – всего 1563 особи. Кроме того, они были отмечены на дорогах и полях между посёлками Денисовка и Сахаровка (30), Раздольное и Мырзаколь (55 особей). Характерно, что в эту пору с относительно невысокими дневными температурами озёрных чаек часто видели охотящимися за насекомыми не только над тростниковыми зарослями озёр, но и над прилежащими полями и степью.

Larus heuglini. Взрослые восточные халеи, судя по черноватой окраске оперения спины, встречены только дважды: 1 и 6 октября на озёрах Кулыколь и Бозшаколь (2 и 3 особи).

Larus barabensis, ***Larus cachinnans***. В связи со сложностью идентификации барабинских чаек в полевой обстановке мы условно относим в эту группу всех встреченных крупных чаек со светлой спиной. С 29 сентября по 10 октября они встречались на большинстве посещённых озёр: Сопылынсор (14), Кулыколь (22), Тениз (11), Батпакколь (10), Кояндыгаш (3), Койбагар (102), Тюнтюгур (39), Бозшаколь (10), Жаксы Жарколь (1), Акчиколь (6), Жаман (12), Лебяжье (5), Речное (78), Ащиколь (5) и Шошкалы (14 особей). При этом, свыше 95% отмеченных чаек были взрослыми, лишь изредка в стаях и скоплениях отмечали по 1-2 пёстрых молодых. Характерной особенностью кормового поведения этих чаек являются их вылеты на кормёжку стаями по 10-20 особей с озёр на жнивьё убранных пшеничных полей, а также на вспаханные поля. Нередко они встречались сидящими в одиночку на грейдерных и асфальтовых дорогах, куда также вылетали в поисках корма. На полях, где завершалась уборка зерновых, неоднократно доводилось видеть этих чаек около работающих комбайнов. Птицы следовали за техникой в поисках грызунов. Видимой дневной миграции этих чаек не было заметно, лишь однажды (4 октября) у станции Койбагар отмечена стая из 25 особей, транзитом летящая на высоте более 100 м со стороны озера Койбагар на запад.

Larus canus. Сизая чайка наблюдалась с 30 сентября по 10 октября на 13 озёрах: Кулыколь (25), Батпакколь (185), Кояндыгаш (30), Койбагар (20), Тюнтюгур (272), Бозшаколь (106), Жаксы Жарколь (81), Жаман (23), Лебяжье (3), Акужан (1), Карасор (3), Малое Солёное (12), Шошкалы (3), всего 764 особи. На большинстве озёр они держались небольшими группами по 3-10 штук или стаями по 20-100 взрослых, в которых отмечалось присутствие лишь 1-3 молодых (90-99%). Иногда встречались кормящимися на трассах, по которым производилась перевозка зерна, а также на жнивье пшеничных полей. Чаще можно было видеть сизых чаек парящими и охотящимися за насекомыми над степью или тростниками.

Chlidonias leucopterus. Взрослая белокрылая крачка отмечена 6 октября на озере Тюнтюгур.

Columba palumbus palumbus (Linnaeus, 1758). Одиночный вяхирь, кормящийся рассыпанным зерном, встречен 3 октября на трассе между посёлками Аулиеколь и Дузбай. На озере Тюнтюгур 6 октября отмечена группа из 10 вяхирей, летящая транзитом на запад в сотенной стае клинтухов. Ещё трёх вяхирей видели 9 октября в лесополосе у села Миролюбовка вдоль трассы Узынколь – Боровской.

Columba oenas oenas (Linnaeus, 1758). Как и в предыдущие годы, основные встречи клинтухов приурочены к земледельческим районам, где голуби кормились на жнивье пшеничных полей и дорогах. Несомненно, концентрация их в подобных местах связана с тем, что клинтухи активно откармливаются зерном, накапливая энергетические запасы перед зимовкой. Часто наблюдали их отдыхающими на проводах линий электропередачи и в группах тополей и осины вдоль автотрасс. Так, на маршруте Денисовка – Сахаровка – Кулыколь зарегистрировано 3 встречи (215 особей), Талдыколь – Батпакбулак – Дружба – Раздольное – Аулиеколь (9 встреч, 119 особей), Аулиеколь – Карасу – Тюнтюгур – Бозшаколь – Сарыколь (15 встреч, 454 особи), Узынколь – Боровской – Кустанай (4 встречи, 103 особи). На всём маршруте длиной 1254 км зарегистрирована 31 встреча клинтухов суммарной численностью 891 особь. Величина групп и стай (n = 31): 1-7 особей (11 встреч), 10-15 (6), 25-35 (3), 40-60 (8), 8 (1), 120 (2). Видимая дневная миграция имела чёткую западную направленность.

Columba livia* var. *domestica. В земледельческих районах на юге и юго-западе области стайки по 10-20 сизарей регулярно встречались по трассам, где кормились рассыпанным зерном. На окраинах сёл были характерны сотенные стаи, держащиеся около элеваторов, а также кормящиеся вместе с грачами по обочинам дорог или на жнивье ближайших полей.

Streptopelia orientalis. Одиночную большую горлицу встретили 5 октября в карагачах на южном берегу озера Койбагар.

Dendrocopos minor. Один малый пёстрый дятел отмечен 8 октября в осиннике у озера Лебяжье.

Hirundo rustica. Группу из 4 касаток наблюдали 30 сентября на озере Сопылынсор и одиночку 4 октября на озере Кояндыгаш.

Calandrella brachydactyla. Малые жаворонки наблюдались 30 сентября у озера Сопылынсор и 3 октября между посёлками Дружба и Раздольное (3 встречи, 22 особи).

Melanocorypha leucoptera. Белокрылые жаворонки изредка отмечались с 30 сентября по 2 октября на типчаковых и полынно-злаковых участках степи между озёрами Кулыколь и Батпакколь (7 встреч, 19 особей).

Melanocorypha yeltoniensis. Чёрные жаворонки встречены только в юго-западной части области на маршрутах с 30 сентября по 4 октября между озёрами Кулыколь, Батпакколь, Аксу и Сулуколь (29 встреч, 497 особей). Наиболее часто их видели в типчаковой и полынной степи между озёрами Кулыколь и Батпакколь (136 ос. на 85 км), а также на стерне убранных пшеничных полей между озером Батпакколь и посёлком Дружба (266 ос. на 42 км). Далее среди полынно-ковыльной равнины с закреплёнными песками между посёлками Дружба, Раздольное и Мырзаколь встречались редко (35 ос. на 90 км). В это время они держались в основном стайками по 10-30, реже по 50-100 самцов.

Alauda arvensis. С 30 сентября по 2 октября пролётные полевые жаворонки были многочисленны на брошенных полях, участках пшеничной стерни и типчаковой степи в районе озёр Кулыколь и Батпакколь, где учтено в общей сложности свыше 150 особей, чаще всего встречавшихся в одиночку, группами по 2-5, реже до 12 штук. В заметном числе их видели 3-4 октября вдоль дороги Раздольное – Мырзаколь – Аулиеколь на равнине с закреплёнными песками и полынно-ковыльными ассоциациями. На дальнейшем маршруте с 5 по 10 октября одиночки и группы по 2-3 особи лишь изредка наблюдались у озёр Койбагар, Биесайган, Тюнтюгур и Шошкалы, преимущественно на грунтовых дорогах через поля и залежи (всего 15 особей).

Eremophila alpestris. Между посёлком Перелески и озером Сопылынсор 30 сентября на пашне наблюдали стаю из 18 рюмов.

Anthus sp. На типчаковом берегу озера Кулыколь 30 сентября мы наблюдали одиночного конька, обратившего на себя внимание зеленоватым оттенком оперения на верхней стороне тела. Не исключено, что это мог быть *A. hodgsoni*.

Motacilla flava. Двух жёлтых трясогузок отметили 1 октября по илистым берегам озера Кулыколь.

Motacilla citreola. На этом же озере 2 октября встречена одиночная желтоголовая трясогузка.

Motacilla alba. С 1 по 3 октября белых трясогузок наблюдали на

озёрах Кулыколь (15) и Батпакколь (17), а 5 и 6 октября на берегах Тюнтюгура и Бозшакол (6 особей).

Lanius excubitor. Одиночных серых сорокопутов встретили трижды: 9 октября на озере Жаксы Жарколь у села Анновское, 9 октября в тростниках у озера Акужан и 11 октября вдоль дороги между озером Шошкалы и селом Борки.

Sturnus vulgaris. Наиболее крупные скопления скворцов наблюдались 30 сентября, 2 и 5 октября у озёр Сопылынсор (3000), Батпакколь (2000) и Тюнтюгур (3000 особей). Иногда их видели по обочинам дороги вдоль трассы Мырзаколь – Аулиеколь – Дузбай (161 шт.). На Шошкалы 10-11 октября во время штормовых ветров изредка встречались стаи по 10-15, иногда до 40 скворцов, перелетающих в тростниках.

Pica pica. На протяжении всего маршрута (1254 км) учтено 397 сорок (3.2 ос./км). Сравнительно часто они встречались по лохово-карагачёвым и кленовым лесополосам вдоль трассы г. Кустанай – г. Рудный – пос. Денисовка (67 ос. на 160 км), пос. Аулиеколь – с. Дузбай (45 ос. на 30 км), ст. Койбагар – пос. Карасу (51 ос. на 30 км). Величина групп сорок на дорогах (n = 72): 1(27)-2(13)-3(9)-4(2)-5-9(3)-10-13(5), в среднем 2.4 особи. На озёрах Койбагар и Тюнтюгур их видели в обширных массивах тростников, местами до 12 особей одновременно. Весьма интересно осеннее размещение сорок в безлесной юго-западной и южной частях Кустанайской области, где основные их встречи приурочены как к дорогам, так и к садам редких населённых пунктов (Шункурсай, Небендовка, Уркаш, Дружба, Раздольное и др.). В некоторых посёлках отмечалось до 10-15 особей на 1 км улиц. Необычно высокой численность сорок была в степной местности по трассе между посёлками Мырзаколь и Аулиеколь (55 км), где встречено 114, в среднем 2.3 ос./ км. Сороки кормились зерном по выбоинам дорог, держась группами по 5-15 особей, иногда вместе с 3-5 серыми воронами. Из-за отсутствия кустов в прилежащей степи деревянные столбы ЛЭП играли для них роль деревьев. Создаётся впечатление, что столь значительная концентрация сорок по этой трассе и частая встречаемость их стайками является следствием осенней перекочёвки на зиму из степной зоны с редкими населёнными пунктами в область сосновых боров.

Corvus monedula. Галки встречались сравнительно редко. Двух видели 29 сентября на плотине Каратомарского водохранилища. У озера Кулыколь ранним утром 1 октября отмечены 2 смешанные стаи по 500 и 3000 грачей и галок, летевших на запад. На остальном маршруте 2-7 октября небольшие их группы отмечались у сёл Жаилма (6), Койбагар (10 и 15), Симферополь (7), Вишнёвка (10), Сарыколь (10), Анновское (2 особи). У озера Лебяжье группа из 6 галок 6-7 октября ночевала в пустотелом торце бетонной опоры высоковольтной линии электропередачи среди поля.

Corvus frugilegus. На 1254 км маршрута учтено 34020 грачей (27.1 ос./км). Величина встреченных групп и стай грачей (n = 94): 1-5(24)-6-10(8)-11-30(18)-31-50(5)-51-70(2)-100-300(20)-500-700 (12)-1000 (3)-4000 (1)-7000 (1). Чаще всего они наблюдались группами до 10 особей (38.1%), стаями по 11-50 (27.4%) и 100-700 (40.5%) особей. Держались они преимущественно на дорогах и стерне полей, где кормились зерном. Отмечались также их вылеты на кормёжку на горелые участки степи и полей, свежие пашни. Характерным явлением были небольшие группы грачей по обочинам дорог и зелёным газонам в центральной части Кустаная и большинства посёлков. В степной части грачи держались, главным образом, на окраинах сёл: по обочинам дорог и степных выгонах, на сельских улицах, у зернотоков или на убранных полях в 1-3 км от деревень. Примечательная черта грачей в безлесной местности – устраиваться на дневной отдых на асфальте автотрасс около сёл, где их много раз видели сидящими сплошной массой по 1000-3000 особей на асфальте. Ночёвки грачей отмечались в осиново-берёзовых колках среди полей, при этом они по вечерам в 18 ч – 18 ч 30 мин перелетали к ним от деревень непрерывными лентами до 5000-7200 особей.

Corvus cornix. На маршруте протяжённостью 1254 км учтено 320 серых ворон (3.9 ос./км). Большинство из них встречалось по дорогам, где кормились рассыпанным при перевозках зерном – 51 встреча (58.6%) или 202 особи (66.2% от общего числа). Реже наблюдались по берегам озёр и рек (31.2% встреч), окраинам деревень (17.6%), в степи (7.8%), на стерне убранных полей (5.9%) и единично (по 2%) на сенокосах, горелых полях, в лесополосах и осиновых колках. Величина групп и стай серых ворон (n = 87) следующая: 1(38)-2(17)-3(10)-4(7)-5(2)-6(1)-7(2)-8(2)-9(1)-10(1)-11(1)-12(1)-15(1)-30(1)-45(1), в среднем 3.7 особи. Чаще попадались в одиночку (43.7%) и группами по 2-4 особей (39%%), реже – по 5-15 (13.8%). Лишь 9 октября, с началом похолодания, отмечены стаи по 30 и 45 особей.

Corvus corax corax (Linnaeus, 1758). На озере Сопылынсор 29 сентября наблюдалась семья из 4 воронов, совершавшая облёт береговой линии, где во множестве отдыхали речные утки. На озере Жаксы Жарколь 6 октября также видели пару воронов, курсирующих в поисках корма вдоль берега. Ещё одного ворона отметили ранним утром 12 октября в осиннике у Михайловки.

Phylloscopus collybita. Одиночные теньковки отмечались 4 и 5 октября по берегам озёр Кояндыгаш и Койбагар.

Turdus pilaris. Стаю из 12 рябинников видели 9 октября в тальниках по реке Убаган у озера Шошкалы.

Turdus iliacus. Один белобровик наблюдался 8 октября в осиновом колке у озера Кулыколь.

Panurus biarmicus. Мелкие группы по 3-5 усатых синиц наблюдались 3 и 10 октября на озёрах Батпакколь и Шошкалы.

Remiz pendulinus. В осиннике у села Михайловка (между посёлками Борки и Боровское) найдено гнездо ремеза, устроенное на ветвях осины на высоте 4 м.

Parus major. На озере Койбагар в группах клёнов и вязов 5 октября встречали кочующие группы по 2 и 15 особей. В этот же день одиночку видели в тростниках у озера Тюнтюгур. Группу из 3 особей отметили 7 октября в осиннике у озера Лебяжье.

Passer domesticus, ***Passer montanus***. Встречались во всех посещённых посёлках, при этом домовой воробей доминировал. Стайку из 10 полевых воробьёв 3 октября встретили в тальниках на берегу озера Батпакколь.

Fringilla coelebs. Пролётных зябликов наблюдали 30 сентября и 1 октября по берегам озера Кулыколь, а также 3 и 5 октября вдоль дороги Дружба – Мырзаколь и на озере Койбагар. Одиночного видели 11 октября в осиннике у села Михайловка.

Spinus spinus. Мелкие группы чижей, летящие на запад, наблюдались 4 октября на берегу озера Койбагар.

Pyrrhula pyrrhula. Снегирь наблюдался 12 октября в осиннике у села Михайловка.

Emberiza citrinella. Группу из 4 обыкновенных овсянок отметили 3 октября на обочине дороги между посёлками Раздольное и Мырзаколь, а 5 октября на берегу озера Койбагар насчитали 12 особей в бурьянниках среди развалин домов и карагачей.

Emberiza leucocephala. Три белошапочные овсянки встречены 5 октября на берегу озера Койбагар, из них взрослые самец и самка, а также молодая птица.

Emberiza schoeniclus. Тростниковые овсянки наблюдались 30 сентября у озера Сопылынсор (1), 3 октября – на Батпакколе (40), 5 октября у озёр Койбагар и Биесайган (2 и 8 особей).

Заключение

Конец сентября 2001 года на севере Казахстана характеризовался сравнительно сухой погодой с умеренными и сильными ветрами. На полях в Кустанайской области уже завершалась уборка зерновых (на 28 сентября обмолочено зерно на 86% полей площадью 2525 тыс. га). Первое понижение температуры до минус 1.5°С с инеем и замерзанием воды в лужах произошло ночью с 1 на 2 октября. В последующую неделю стояла переменная погода, чаще ветреная, с кратковременными дождями и подъёмами температуры в отдельные дни до +10°С. Традиционное похолодание началось 8-9 октября с проливных дождей, шквалистых ветров и резкого понижения температур, завершившись

10-12 октября выпадением снежной крупы и ночными заморозками. В третьей декаде сентября уже прошла основная миграционная волна гусей и казарок, а в первой декаде октября завершался пролёт последних стай серых журавлей, серощёких, черношейных и красношейных поганок. Отмечалась задержка пролётных галстучников, ходулочников, малых чаек, белокрылых крачек. Вместе с тем, по сравнению с осенью предыдущих лет, сравнительно низкой была численность гоголей и лутков. Распределение водяных птиц на водоёмах Кустанайской области в первой половине октября были следующим.

Северо-западная часть Кустанайской области. На озере Сопылынсор нами отмечено 28 видов водоплавающих и околоводных птиц общей численностью 9263 особей, из них гусеобразные составляли 7836 (84.6%), лысухи 1368 (14.8%). Из уток (n = 7249) абсолютными доминантами были кряквы (93.8%). Только здесь мы встретили белоглазых чернетей.

Кулыколь-Талдыкольская система озёр. Обширный плёс площадью 2 км^2 в юго-западной части озера Кулыколь (51°20'25" с.ш., 61°49'43" в.д.), где в предыдущие годы находились крупнейшие гусиные скопления, в этом году совершенно высох и представлял собой такыровидную поверхность, густо поросшую по краям малиново-оранжевыми зарослями солероса. Вдоль южного берега осталась лишь узкая илистая полоса мелководий длиной 1.5-2 км с мозаичными куртинками тростников. На этих остатках воды держались скопления гусей, казарок и речных уток, использующих это место в качестве водопоя, а илистые отмели для отдыха и ночёвок. В связи с усыханием Кулыколь-Талдыкольская система озёр стала постепенно утрачивать своё значение основного места осенней концентрации гусей, которое она прибрела с середины 1990-х годов (Ерохов и др. 2000). Если в предыдущие годы здесь в массе концентрировался белолобый гусь, то в этом засушливом сезоне остались, главным образом, серые гуси и краснозобые казарки, тогда как *A. albifrons* были в небольшом числе. Основная масса гусей из-за безводья сместилась южнее, в сторону Аркалыка. Несмотря на резко уменьшившееся число гусей, на озере продолжалась вестись так называемая элитная охота, для чего здесь с августа находился большой полевой лагерь из десятка передвижных вагонов, двух больших гостевых юрт с множеством обслуживающих машин. Охота велась на полях, куда вылетают гуси на кормёжку, но нередко и с берегового вала, о чём свидетельствовали кучи стреляных гильз.

Вечерний вылет гусей на поля 30 сентября начался в 16 ч 20 мин с подъёма отдельных семейных групп белолобых гусей, а через 10 мин характеризовался дружным подъёмом свыше 4 тыс. краснозобых казарок. Основной перелёт шёл до 19 ч, вначале большими табунами шли *R. ruficollis*, среди которых были небольшие группы *A. albifrons*. Затем

начался массовый отлёт *A. anser*. Вместе с ними иногда летели *R. ruficollis*, наиболее поздняя группа которых ушла на поля в глубоких сумерках в 19 ч 40 мин. Возврат с полей белолобых гусей начался сразу же после захода солнца и продолжался до полной темноты в 20 ч 30 мин. Утром 1 октября первая группа *A. albifrons* поднялась с озера ещё в сумерках, задолго до восхода солнца, в 7 ч 30 мин, массовый вылет начался в 7 ч 42 мин с участием *R. ruficollis* и *A. erythropus*. Отлёт последних групп серых гусей и краснозобых казарок завершился в 9 ч 10 мин. Возврат с полей на озеро первых групп белолобых гусей отмечен 10 ч 25 мин, серых гусей и краснозобых казарок – в 10 ч 40 мин и продолжался до 12 ч 55 мин.

Сыпсынагашская ложбина. Озеро Тениз у посёлка Уркаш (51° 19'56" с.ш., 62°20'37" в.д.), как и в предыдущие 3 года, характеризовалось низкой численностью водоплавающих птиц. На его берегах и акватории 2 октября отмечено лишь 9 видов водяных птиц (74 ос./км^2), из числа которых основной фон составляли красноголовые и хохлатые чернети (36.5%) и чайки (14.9%). Из гусей отметили только один табунок из 29 *A. anser*. Искусственное озеро Батпакколь (51°33'10" с.ш., 62° 39'34" в.д.) между посёлками Уркаш и Дружба, расположенное в холмистой типчаковой степи вблизи обширных полей, является местом постоянных миграционных остановок гусей и уток. Его значение для гусей, несмотря на небольшие размеры, увеличивается в годы обмеления Кулыколь-Талдыкольской системы озёр и Мамырколя. В эти же годы возрастают охотничьи нагрузки, т.к. сюда традиционно приезжают охотники из ближайшего города Рудного. На озере Аксу (51°22'66" с.ш., 62°44'23" в.д.) основу населения водяных птиц составляли красноголовые и хохлатые чернети. На озере Сулуколь держалось 13 видов водоплавающих птиц (5436 ос./км^2), из которых доминировали лысухи – 3225 (59.3%), речные утки (кряквы, широконоски, серые утки, свиязи) – 1584 (29.1%), красноносые нырки, красноголовые и хохлатые чернети – 326 (6%), лебеди-кликуны – 187 особей (3.4%). Гусей оказалось очень мало – учтено лишь 36 *A. albifrons*.

Койбагар-Тюнтюгурская группа озёр. Уровень воды на Койбагаре (52°33' с.ш., 65°35' в.д.) в этом году оставался ниже среднего. Основной плёс с мозаичными куртинами тростников находился в центральной части озера. На нём концентрировалось около 20 тыс. серых и белолобых гусей, среди которых было 3-5 тыс. краснозобых казарок. Группами до 16-22 особей отмечались и пискульки. Гусиное скопление на Койбагаре было сильно распуганным охотниками, т.к. активная охота за ними ведётся не только на соседних полях, но и с береговых валов во время вылета, а также с моторных лодок, курсирующих по озеру в местах их отдыха. Последнее явление особенно пагубно влияет в последние годы на существующий здесь гусиный «котёл».

Соседнее озеро Тюнтюгур (52°43'47" с.ш., 65°49'56" в.д.), по сравнению с предыдущим годом, выглядело сильно обмелевшим. Низинный берег, ещё несколько лет назад бывший озёрным дном, теперь густо зарос осотом, поэтому вся приозёрная равнина выглядела «заснеженной» от белого осотового пуха. Из-за резкого падения уровня воды на Тюнтюгуре введён запрет на охоту и рыбалку. На самом озере, окружённом высокой стеной тростников, стоял многотысячный гомон серых и белолобых гусей, слетающихся сюда с полей на отдых, общая численность которых оценена в 25 тыс. особей. Среди них присутствовали небольшие группы краснозобых казарок и пискулек. На мелководной акватории во множестве держались кликуны, лысухи, речные и нырковые утки.

Озеро Биесайган, ещё в 1996-1997 годах славившееся как место массовой остановки мигрирующих гусей, было совершенно заросшим тростниками и фактически уже утратило своё прежнее значение. Отмечались лишь небольшие табунки гусей, садившиеся на небольшие, недоступные плёсы в глубине тростниковых массивов.

Бозшаколь (53°06' с.ш., 65°54' в.д.). Уровень воды был ниже среднего, глубины около 1-1.5 м, вся акватория мозаично покрыта куртинами тростников, а южная, более глубокая часть, густо заставлена сетями. На озере активизировался промысловый лов рыбы, значительно возрос фактор беспокойства. Численность водоплавающих птиц была поразительно низкой. Всего отмечено 26 видов водно-болотных птиц (8538 особей), из которых на долю гусей и казарок приходилось 7979 особей (93.5%). Уток было очень мало – 412 особей (4.8%), редкими были также чайки (117), лебеди (11), кулики (10), поганки (7), бакланы (7) и лысухи (5 особей). По сравнению с 1997-1998 годами, озеро постепенно утратило своё былое значение в качестве места массовых миграционных остановок гусей и казарок, численность которых достигала здесь до 45-46 тыс. особей (Ерохов и др. 2000; Березовиков 2002).

Группа озёр Жаксы-Жарколь, Жаман и Лебяжье, расположенная среди колковой лесостепи и пшеничных полей на границе Кустанайской и Северо-Казахстанской областей, характеризовалась в последнем десятилетии лишь незначительными колебаниями уровня воды благодаря достаточному наполнению в весеннее время. Так, на Жаксы Жарколе (53°49' с.ш., 65°59' в.д.) этой осенью уровень воды был выше среднего, поэтому на акватории виднелись лишь редкие куртины тростников, но в центральной части плёса имелись обширные «поля» погруженной растительности, среди которой в массе держались лысухи и речные утки. Рыбопромысловые нагрузки слабые: на берегу стоял только один рыбацкий вагон с 2 рыбаками. На озере отмечено 19 видов водяных птиц (13081 особи), из них, как и в прежние осени, абсолютно доминировала лысуха (83.9%), хотя её численность сократилась

здесь в 2-3 раза по сравнению с 1999-2000 годами, когда здесь концентрировалось до 40 тыс. лысух. В заметном числе держались хохлатые чернети (9.7%). Остальных уток было очень мало (596 особей или 4.6%), хотя предыдущей осенью было множество серой утки. Гораздо больше, чем прежде, было лебедей-кликунов (всего 72). Практически не было на озере гусей и казарок, но в августе-сентябре, по словам рыбаков, здесь держалось до 1500 серых гусей. Нами отмечена лишь одна стая из 26 *Anser albifrons*.

В два раза больше водоплавающих птиц держалось на озере Жаман (53°57' с.ш., 65°59' в.д.), на котором отмечено 23 вида (20081 особь), среди которых доминировала лысуха (89.6%). Из речных и нырковых уток (1625 особей) преобладали свиязи и серые утки (по 40.6%). Белолобых и серых гусей было мало (17 и 257 особей), а пискульки и краснозобые казарки вообще отсутствовали. На соседнем озере Лебяжье (53° 58' с.ш., 65°54' в.д.) учтено 18 видов птиц (5255 особей), из числа которых белолобые и серые гуси, краснозобые казарки составляли 3443 особи (65.5%), лысухи – 1750 (33.3%), нырки – 460 (8.6%), речные утки – 587 (11.2%). Из них в заметном числе держались хохлатые чернети, красноносые нырки, кряквы, серые утки и свиязи. Лебяжье в этом году утратило былую славу водоёма с многотысячным скоплением белолобых и серых гусей, многие годы бывшее популярным местом охоты кустанайских охотников. Несмотря на то, что уровень воды в озере заметно поднялся выше среднего уровня, а тростниковые заросли по его акватории стали разреженными, гуси по каким-то причинам перестали задерживаться здесь в большом количестве. Исчезли и знаменитые скопления лебедей-кликунов. Из рыбы на Лебяжьем сохранился карась, промышляемый только одним рыбаком. Охотничьи нагрузки на озёра снизились до минимума, т.к. в южной части озера Лебяжье установлен инспекторский пост, на котором дежурили два егеря фирмы «Биско». Следует отметить, что в этом году заметно возросла роль в качестве места отдыха и кормёжки водоплавающих птиц небольшого, но глубокого озерка Акчиколь (500×500 м), расположенного западнее Лебяжьего. На нём отмечено 14 видов птиц (378 особей), из которых преобладали хохлатые чернети, большие поганки, лысухи, гоголи и лутки. Минувшим летом на Акчиколе был акклиматизирован рипус *Coregonus albula ladogensis*, что в дальнейшем, безусловно, улучшит кормовые условия для рыбоядных птиц.

Лесостепные озёра Узынкольского района. Располагаются в северо-восточном углу Кустанайской области на границе с Северо-Казахстанской и Курганской областями. Это небольшие озёра в холмисто-увалистой местности среди полей и берёзово-осиновых колков. Из них наиболее значительными являются Речное, Сарыоба, Жаргайын, Акужан (Неклюдово) и др. Все эти водоёмы являются важным

местом размножения, линьки и миграционных остановок серого гуся, а также других гусей, краснозобых казарок, лебедей, речных и нырковых уток, лысух. Кроме того, с весны до осени на этих водоёмах стали регулярно встречаться летующие кудрявые пеликаны, большие бакланы, серые и большие белые цапли. Основная масса белолобых гусей и краснозобых казарок «прошла» через озёра Жаргайын, Акужан и Речное в третьей декаде сентября, почти не задерживаясь на них. Посещённое нами озеро Акужан имело низкий уровень воды и было сильно заросшим тростниками, за исключением центральных плёсов. После зимних заморных явлений рыбный промысел на нём не вёлся, фактор беспокойства птиц был минимальным. Всего отмечено 26 видов водяных птиц (3800 особей), из них до 1800 серых и белолобых гусей, краснозобых казарок. Единично среди них были пискульки и гуменники. Из других водяных птиц в заметном числе держались хохлатые и красноголовые чернети, серые утки и кряквы.

Шошкалинская система озёр на реке Убаган. Уровень воды в Шошкалы в этом году упал ниже среднего. Мелководья вдоль дамбы в западной части Шошкалы в течение лета обсохли, поэтому здесь отсутствовали традиционные многотысячные скопления речных уток, особенно шилохвостей и крякв. На утренних и вечерних перелётах наблюдалось около 2500 уток и 2500-3000 гусей, из них около 80% составляли *A. anser*, остальные – *A. albifrons* и *R. ruficollis*. Всего на озере отмечено 24 вида водяных птиц общей численностью около 10000 особей. На плёсах с мозаичной порослью тростников, как и в прежние годы, доминировали хохлатые чернети, в заметном числе держались красноголовые чернети, гоголи, кряквы, свистунки, свиязи и кликуны.

В целом на 20 водоёмах Кустанайской области в первой декаде октября 2001 держалось свыше 210 тыс. водоплавающих птиц, в том числе гусей и казарок – 130313, лебедей – 947, лысух – более 37000, уток – около 39000 особей. Среди последних преобладали речные утки (77%). Количество белолобых гусей составило около 32 тыс. особей, что было в 4 раза меньше, чем в 2000 году и более чем в 10 раз меньше, чем осенью 1999. Численность серого гуся и краснозобой казарки была на уровне 2000 года, тогда как у пискульки вдвое превысила прошлогоднюю (Ерохов, Березовиков 2003; Березовиков, Ерохов 2010, 2011; Yerokhov *et al*. 2008).

Авторы выражают искреннюю признательность Э.Н.Келломяки (Региональный центр окружающей среды Хяме, Финляндия) за финансовую поддержку исследований, а также председателям Денисовского, Камыстинского и Узынкольского районных обществ охотников и рыболовов Г.А.Червякову, В.А.Сахно, В.Н.Крутневу, предоставившим нам информацию по размещению и численности гусей и других охотничьих птиц. Мы благодарны нашему водителю и проводнику Д.Д.Жукову (Кустанайское общество охотников и рыболовов), благодаря мастерству которого удалось успешно осуществить эту поездку в сложных условиях осеннего бездорожья и непогоды.

Литература

Березовиков Н.Н. 2002. Озеро Бозшаколь // *Важнейшие водно-болотные угодья Северного Казахстана (в пределах Костанайской и западной части Северо-Казахстанской областей)*. М.: 70-74.

Березовиков Н.Н., Ерохов С.Н. 2010. Материалы по фауне и численности птиц на водоёмах Кустанайской области осенью 1999 года // *Рус. орнитол. журн.* **19** (567): 747-772.

Березовиков Н.Н., Ерохов С.Н. 2011. Орнитологические наблюдения на водоёмах Кустанайской области осенью 2000 года // *Рус. орнитол. журн.* **20** (686): 1771-1792.

Ерохов С.Н., Березовиков Н.Н., Келломяки Э.Н., Рипати Н.Л. 2000. Пискулька и сопутствующие ей виды гусей в Казахстане в период миграций // *Казарка* **6**: 121-159.

Ерохов С.Н., Березовиков Н.Н. 2003. Мониторинг водоплавающих и околоводных птиц на водоёмах Кустанайской области (Северный Казахстан) в октябре 2001 и 2002 годов // *Рус. орнитол. журн.* **12** (228): 744-749.

Yerokhov S., Berezovikov. N., Kellomaki, E., Ripatti N., Kahanpaa L. 2008. Results of the 10-th years period of the goose autumn migration observations on the Northern-Western Kazakhstan // *Vogelwelt* **129**, 3: 204-214.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск **907**: 2157-2162*

Новые и редкие птицы в районе озера Чаны (Западная Сибирь)

К.Т.Юрлов, В.М.Чернышов, А.И.Кошелев, Р.А.Сагитов, В.М.Тотунов, Г.И.Ходков, А.К.Юрлов

Второе издание. Первая публикация в 1977[*]

Лабораторией орнитологии при стационарных исследованиях мигрирующих птиц в лесостепной зоне Западной Сибири за 1971-1976 годы получено много новых данных о видовом составе и периодических явлениях жизни птиц. Некоторые из них опубликованы (Юрлов 1974) . В данной статье приведены сведения о слабоизученных видах птиц, которые редко отмечались или вовсе не встречались прежде в Барабинской низменности.

Большая часть наблюдений относится к участку Сартлан-Чановского лугово-солончакового района лесостепной зоны, прилегающему с востока к озеру Малый Чан в нижнем течении рек Чулым и Каргат. На этом участке или в непосредственной близости от него располагаются все водоёмы, упоминаемые в тексте статьи. Почти по всем приве-

[*] Юрлов К.Т., Чернышов В.М., Кошелев А.И., Сагитов Р.А., Тотунов В.М., Ходков Г.И., Юрлов А.К. 1977. Новые и редкие птицы в районе озера Чаны (Западная Сибирь) // *Миграции птиц в Азии*. Новосибирск: 205-209.

дённым видам нами собраны коллекционные экземпляры, которые хранятся в зоологическом музее Биологического института СО АН СССР.

Podiceps auritus. Красношейная поганка очень редка в Барабинской низменности, одиночные птицы отмечены на весеннем и осеннем пролёте. Добыто два экземпляра: 24 сентября 1973 на озере Белуха и 6 мая 1975 в Селезневском заливе озера Малый Чан.

Egretta alba. Одиночная большая белая цапля держалась в течение августа 1971 года на заливе озера Малый Чан недалеко от устья реки Чулым. Две особи этого вида отмечены в стае серых цапель *Ardea cinerea* 1 мая 1973. В том же году летом одна птица неоднократно встречалась на правобережье реки Чулым у озера Белуха. Здесь же наблюдали одну большую белую цаплю 5 августа 1974 и 7 мая 1975.

Ixobrychus minutus. Гнездо волчка найдено в займище дельты реки Чулым 13 июля 1975.

Ciconia nigra. Два чёрных аиста отмечены 18 августа 1971 на берегу залива Глухая Курья в восточной части озера Малый Чан.

Plegadis falcinellus. На озере Белуха 6 августа 1973 добыта взрослая самка каравайки, которая кормилась на мелководье среди стаи чибисов *Vanellus vanellus*.

Clangula hyemalis. Одна морянка добыта 22 октября 1971 на заливе озера Малый Чан.

Oxyura leucocephala. В небольшом числе гнездится на озере Мыс (окрестности села Петраки). Здесь 10 июня 1973 найдено гнездо. На озере Белуха 7 мая 1975 наблюдали брачные игры савок в группе, состоящей из трёх пар. На озере Хорошенькое (окрестности деревни Широкая Курья) в 1973 году встречали от 5 до 15 особей савки, которые, по-видимому, линяли на этом водоёме. Здесь же 2 и 5 августа 1975 отмечено 15 самок савки.

Pandion haliaetus. Одиночные скопы отмечались несколько раз с постоянного наблюдательного пункта на весеннем пролёте в конце апреля и на осеннем пролёте в конце августа 1974 года.

Falco cherrug. Молодой балобан встречен 29 августа 1974.

Porzana parva. В 1976 году в устье Чулыма среди зарослей рогоза найдено 2 гнезда малого погоныша: 15 июня – с 1 яйцом и 28 июня – с 8 яйцами, из которых на следующий день началось вылупление птенцов. Молодая птица поймана сетью 19 августа на озере Фадиха.

Pluvialis apricaria. Стаи золотистых ржанок птиц из 30, 10, 8 и 20 особей встречены 24 мая 1975 на заливном лугу у села Ипатово; одна птица добыта.

Chettusia gregaria. Весной и летом 1974 и 1975 годов неоднократно наблюдали кречёток с характерным «гнездовым» поведением. Три пары, объединённые в одну стайку, встречены 29 мая 1975. У самки, до-

бытой из этой стайки, в яичнике были хорошо развитые фолликулы (достигали 22 мм в диаметре).

Himantopus himantopus. Две молодые птицы добыты 18 августа 1975 на озере Ипатово. Ходулочники держались стаей из 3 взрослых и 3 молодых птиц на открытом илистом берегу. Три птицы встречались на илистой отмели озере Фадиха 8-11 августа 1976.

Recurvirostra avosetta. Шилоклювка гнездится в районе озера Чаны, по-видимому, не ежегодно. Гнёзда находили на озере Горькое (окрестности деревни Широкая Курья), острове Редкий на озере Большой Чан. Кочующие группы и стаи каждый год встречаются в период с мая по сентябрь; обычно они состоят из 2-20 особей; в августе 1971 года на озере Горькое несколько дней находилась стая шилоклювок около 300 особей, 7-13 августа 1976 на озере Фадиха держалась стая из 40 особей.

Haematopus ostralegus. Одиночная птица 20-25 июня 1975 находилась на открытом илистом берегу озера Малый Чан около деревни Широкая Курья. Молодой кулик-сорока отмечался на озере Фадиха 6-10 сентября 1976.

Arenaria interpres. Три птицы отмечены 10 сентября 1973. Несколько раз одиночных птиц наблюдали в сентябре 1975 года. Много камнешарок пролетело в начале июня 1976 года.

Calidris alba. Одна песчанка замечена среди стаи песочников на берегу озера Щелчиха 16 сентября 1974. Три особи этого вида встречены на озере Хорошенькое, где они кормились на песчаной отмели по урезу воды.

Scolopax rusticola. Два вальдшнепа отмечены 18 мая 1975 с наблюдательного пункта в дельте Чулыма; одна – 26 сентября 1976 в берёзовом колке в окрестностях села Светлое.

Limosa lapponica. Одиночная молодая птица добыта на осеннем пролете 27 августа 1975. Стая из 15 особей пролетела 30 августа 1976 близ дельты Чулыма; из этой стаи добыт один малый веретенник.

Limnodromus semipalmatus. Очень редкий кулик. Последний раз гнёзда азиатского бекасовидного веретенника в Западной Сибири находили более 50 лет назад. В 1974 году было найдено три гнезда с кладками и три пуховых птенца. Гнёзда располагались в местах, значительно удалённых друг от друга, но всегда в колониях чайковых: озеро Гольянское, долины рек Чулым и Каргат.

Numenius tenuirostris. Одиночная старая самка добыта 28 мая 1976 на южном берегу озера Малый Чан. Птица кормилась на типчаковой гриве. Перья на крыльях и спине птицы сильно обношены.

Glareola nordmanni. Гнездится в небольшом количестве. В 1973 году на гриве Верткова встречена пара степной тиркушки в колонии больших веретенников *Limosa limosa*. В том же году слабо летающая

молодая птица с двумя взрослыми отмечена 18 июля у озера Белуха. В 1975 году у села Светлое найдена колония степной тиркушки из 12 пар. В 1976 году обнаружено несколько колоний на островах озера Большой Чан, у сёл Светлое, Чулым, Ипатово.

Gelochelidon nilotica. На острове Редкий (озеро Большой Чан) 28 июня 1975 обнаружено гнездо с 2 яйцами, расположенное в колонии речных крачек *Sterna hirundo* и малых чаек *Larus minutus*. Здесь держалось несколько чайконосых крачек.

Sterna albifrons. Одиночные особи и группы из 2-3 птиц несколько раз отмечены в сентябре 1973 года на мысе Чёрненький. Один взрослый самец малой крачки добыт 14 сентября 1973.

Hydroprogne caspia. Очень редко встречающийся вид. Одиночных птиц регистрировали весной 1973 года. В следующем году чеграва отмечена всего дважды – 18 мая и 31 июля. Небольшое скопление (около 15 особей) обнаружено 26 июня 1976: чегравы отдыхали на песчаной отмели острова Перекопный (озеро Большой Чан) вместе с серебристыми чайками *Larus cachinnans*, черноголовыми хохотунами *Larus ichthyaetus* и речными крачками.

Columba oenas. Клинтуха наблюдали ежегодно в небольшом числе на пролёте.

Otus scops. Три сплюшки отловлены паутинными сетями в берёзовом колке 24 мая, 26 и 27 августа 1974.

Glaucidium passerinum. Один воробьиный сычик добыт на осеннем пролете 28 сентября 1972 в берёзово-черёмуховом колке на гриве Верткова.

Aegolius funereus. Один экземпляр добыт 30 сентября 1973 в берёзово-осиновом колке. По одной особи отловлено также в берёзовом колке 5 сентября 1974 и 8 августа 1975. «Поющего» самца мохноногого сыча наблюдали вечером 21 мая 1976 в берёзовом колке.

Alcedo atthis. Молодой зимородок пойман в паутинные сети в сентябре 1972 года. Взрослая самка добыта 15 мая 1975 на реке Чулым.

Upupa epops. Встречен дважды – 8 сентября 1974 на гриве Загонная и 9 мая 1976 у реки Чулыменок.

Picoides tridactylus. Инвазии трёхпалого дятла отмечены в сентябре 1972, 1973 и 1975 годов, особенно многочислен он был в 1975 году.

Melanocorypha leucoptera. Белокрылый жаворонок гнездится спорадично и неежегодно. В 1975 году в большом количестве встречался по участкам типчаково-ковыльной степи. 15 июня 1975 найдено 3 гнезда с полными кладками; 14 июля 1975 пойман слёток.

Garrulus glandarius. Встречались в сентябре 1973 и 1975 годов.

Nucifraga caryocatactes. Одиночные кедровки отмечены 21 августа 1971, 7 и 14 сентября 1975.

Certhia familiaris. Пищуху наблюдали и отлавливали паутинными

сетями несколько раз в сентябре и октябре 1972 года. Три особи были отловлены в берёзовом колке в сентябре 1975 года. В том же году дважды отмечали пищуху на постоянных маршрутах – 13 и 17 сентября. Молодой самец пойман сетью 28 сентября 1976.

Ficedula hypoleuca. Мухоловка-пеструшка найдена гнездящейся на острове Перекопный (озеро Большой Чан). Гнездо, расположенное в дупле пня, 25 июня 1975 содержало 5 насиженных яиц.

Luscinia calliope. Взрослый самец пойман паутинной сетью 22 сентября 1971. Ещё один самец отловлен 5 июня 1974.

Oreocincla dauma. Пёстрого дрозда регулярно наблюдали с 1971 года. Весной в разные годы он встречался с 16 по 27 мая, осенью – с 23 августа по 30 сентября. За все годы наблюдений зарегистрировано 17 особей.

Hippolais icterina. Зелёная пересмешка отмечена на осеннем пролёте 7, 14 и 20 августа 1971, с 5 по 14 августа 1974, 7 августа 1975; весной встречена 26 мая 1975, летом – 2 и 3 июня 1974.

Sylvia nisoria. Отловлено паутинными сетями 12 особей в августе 1971, мае, июне и августе 1974 года.

Prunella modularis. Одна лесная завирушка поймана в паутинную сеть 23 сентября 1973.

Prunella atrogularis. Немногочисленный вид на осеннем и весеннем пролёте. Весной черногорлая завирушка встречалась и попадала в сети с 25 апреля по 10 мая, осенью – с 19 сентября по 9 октября.

Prunella montanella. Одиночная сибирская завирушка поймана паутинной сетью в октябре 1972 года; ещё одна одиночка замечена с наблюдательного пункта 28 апреля 1973.

Motacilla cinerea. Одиночные горные трясогузки отмечены на весеннем и осеннем пролётах, добыты 17 августа и 6 сентября 1973, 23 и 31 мая 1975.

Anthus cervinus. В 1976 году паутинными сетями пойманы два краснозобых конька: молодой самец 28 августа на илистой отмели около рогозового займища озера Фадиха и взрослый самец 29 августа в тростниковом займище реки Чулым.

Bombycilla garrulus. Два свиристеля отловлены паутинными сетями в 1971 году и одна птица встречена в берёзовом колке 16 июля 1974.

Pastor roseus. Стаи и одиночные особи розового скворца отмечены в конце мая – начале июня 1975 года.

Emberiza bruniceps. Залётный самец жёлчной овсянки добыт на пустыре 29 мая 1975.

Emberiza pallasi. Одиночные самцы отмечены 20-23 апреля 1975.

Calcarius lapponicus. Взрослый самец добыт во время осеннего пролёта 13 сентября 1975. В мае 1976 года лапландские подорожники в массе встречались на весеннем пролёте.

Acanthis cannabina. Летом 1971 года коноплянки постоянно держались на окраине деревни Широкая Курья. В августе и сентябре 1974, в конце июля и середине августа 1975 года эти птицы неоднократно наблюдались на пролёте.

Spinus spinus. Одиночный чиж отловлен паутинными сетями в берёзовом колке 3 октября 1974, а 27 сентября 1975 в этом же колке наблюдали стайку из 4 птиц.

Loxia leucoptera. Молодой белокрылый клёст отловлен паутинной сетью 13 июля 1974.

Loxia curvirostra. Одиночный клёст-еловик добыт 26 июля 1973 в берёзовом колке.

Coccothraustes coccothraustes. Одиночные дубоносы отмечены 5 мая 1974 и 26 мая 1975 в небольшом берёзовом колке.

Литература

Юрлов К.Т. 1974. Изучение миграций птиц Западной Сибири // *Миграции птиц в Азии*. Фрунзе: 54-78.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск **907**: 2162-2163*

Интересный случай гнездования ушастой совы *Asio otus*

Н.Д.Барышников

Николай Дмитриевич Барышников. Центрально-Черноземное отделение Союза охраны птиц России, ул. Тимирязева, д.12, кв. 3, село Тимирязево, Новоусманский район, Воронежская область, Россия. E-mail: baryshnikov.1965@mail.ru

Поступила в редакцию 23 мая 2013

Интересный случай гнездования ушастой совы *Asio otus* наблюдался в 2012 году в Новоусманском районе Воронежской области. На одном из деревьев (тополь серебристый *Populus alba)*, растущих на окраине села Крыловка, на месте сломанного толстого сука образовался выступ, на котором со временем накопился опад из мелких ветвей и листьев и образовалась своеобразная площадка, находящаяся на высоте 2.5 м от земли. Весной 2012 года не раз приходилось наблюдать, что на этом выступе часто сидит ушастая сова. На этой присаде мы соорудили ограждение, после чего дерево долго не осматривалось.

30 июля 2012 в импровизированном гнезде были обнаружены два птенца и взрослая ушастая сова (см. рисунок).

Взрослая ушастая сова *Asio otus* и её птенцы на огороженной площадке на месте выпавшего сука на тополе белом *Populus alba*.
Село Крыловка, Новоусманский район Воронежской области.
31 июля 2012. Фото Натальи Гущиной.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск **907**: 2164-2165*

Дополнение к списку гнездящихся птиц Чуйской долины

В.И.Торопова, В.К.Еремченко

*Второе издание. Первая публикация в 1977**

Материал для данной статьи собран в 1971-1974 годах в Токмакском охотничьем хозяйстве в Чуйской долине.

Scolopax rusticola. Вальдшнеп неоднократно встречен нами в лесопосадках карагача, вербы, тополя, а также на заболоченных : участках и луговинах, поросших кустами облепихи, шиповника и ежевики в Токмакском охотничьем хозяйстве. 15 мая 1972 в капкан случайно попался молодой вальдшнеп, ещё не полностью сменивший птенцовый наряд, (длина крыла 125 мм, вес 107.6 г). В течение всего мая мы часто встречали взрослых птиц; 6 июня 1973 в лесопосадках у заболоченного участка с кустами облепихи наблюдался вальдшнеп с поведением явно гнездового характера. Птица часто садилась и вспугнутая далеко отлетала. Гнездо не найдено, но вальдшнепа на этом месте повторно встречали 12 и 14 июня.

Glareola pratincola. Нами обнаружены три колонии луговых тиркушек. В первой колонии, расположенной возле дороги в посевах овса, насчитывалось около 200 птиц, во второй (возле Чёрного ключа на посевах кукурузы) – менее сотни и в третьей (на заболоченных посевах кукурузы) гнездилось 25-30 птиц. Тиркушки добывались с конца апреля по август. Самец с увеличенными семенниками добыт 23 апреля (начало пролёта). 9 мая добыта самка с вполне сформированным яйцом. Найдены и проведены наблюдения за 20 гнёздами. Пуховички добывались 4 и 9 июня 1972, нелётные молодые – 4 июня 1972, лётные молодые – 18 июля 1974.

Anthus campestris. Самцов полевого конька с увеличенными семенниками коллектировали с 9 по 31 мая 1973 в Токмакском охотничьем хозяйстве на степных буграх. Самка с развитым наседным пятном добыта здесь же 25 мая 1972. 19 мая 1973 найдено гнездо с 3 яйцами, расположенное под кустами бузины. 25 мая 1974 под кустиком полыни найдено гнездо с 5 яйцами.

Lanius schach. В 1974 году нами найдено в Чуйской долине два гнезда: 26 мая с 5 насиженными яйцами, 31 мая тоже с полной кладкой – 5 яиц. Гнезда расположены в 150 м друг от друга, в лесопосадках

* Торопова В.И., Еремченко В.К. 1977. Дополнение к списку гнездящихся птиц Чуйской долины // *Миграции птиц в Азии*. Новосибирск: 222.

из тополя, карагача, клёна и шелковника. Одно гнездо располагалось на клёне в 3-4 м от земли, другое – на шелковнике, немного ниже.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск **907**: 2165*

О весеннем пролёте фламинго *Phoenicopterus roseus* в приэмбинской пустыне (Северо-Восточный Каспий)

Е.Г.Самарин, Ф.А.Сараев, Ф.Г.Бидашко

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

На весенних разливах реки Эмбы в районе города Кульсары весенний пролёт фламинго *Phoenicopterus roseus* в разные годы отмечали в следующие сроки: 10 апреля 1979 в урочище Жаманушкан, в 52 км к юго-востоку – стая около 20 особей на артезианском водоёме; 16 апреля 1981 в урочище Джарчик, в 72 км на юго-запад – стая до 50 особей; 12 мая 1982 в урочище Тайлан, в 130 км на юго-восток – около 100 особей на артезианском водоёме; 12 мая 1983 в урочище Шубартпалы, в 62 км на юго-запад – 20 особей; 12 июня 1983 в урочище Деукара, в 160 км на восток-юго-восток – 10 особей кормились на артезианском водоёме; 8 июня 1983 в у посёлке Каратон – 7 особей.

* Самарин Е.Г., Сараев Ф.А., Бидашко Ф.Г. 1991. Краткие сообщения о фламинго [в Гурьевской области] // *Редкие птицы и звери Казахстана*. Алма-Ата: 79.