ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2015
XXIV

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1116

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXIV

Экспресс-выпуск • Express-issue

2015 № 1116

СОДЕРЖАНИЕ

829-832 Священномученик Иван Никанорович Кесарийский (1878-1937) – помощник Русского орнитологического комитета. Е.Э.ШЕРГАЛИН

833-837 К столетию со дня рождения Владимира Степановича Петрова (31 марта 1915 – 21 апреля 1991). В.П.БЕЛИК, В.А.КОНЕВА

837-841 Результаты учёта численности савки *Oxyura leucocephala* на водоёмах Северо-Казахстанской области летом 2014 года. И.А.ЗУБАНЬ, В.С.ВИЛКОВ, М.Н.КАЛАШНИКОВ

841-843 Формирование зимовки грачей *Corvus frugilegus* в Катон-Карагае на Южном Алтае. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ, Ф.И.ШЕРШНЁВ

843-845 Морянка *Clangula hyemalis* в Таймырском заповеднике. А.А.ГАВРИЛОВ

845-847 Весенний пролёт пластинчатоклювых в среднем течении реки Олёкмы. Д.И.ТИРСКИЙ

847-849 Гусеобразные птицы Anseriformes техногенных водоёмов Мордовии. С.Н.СПИРИДОНОВ

849 Скалистый голубь *Columba rupestris* в Приморье. В.К.РАХИЛИН

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2015
Дата опубликования: 9 марта 2015

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXIV
Express-issue

2015 № 1116

CONTENTS

829-832 Hieromartyr Ivan Nikanorovich Kesariysky (1878-1937) – the assistant to Russian Ornithological Committee. E.E.SHERGALIN

833-837 On the centenary of Vladimir Stepanovich Petrov (31 March 1915 - 21 April 1991). V.P.BELIK, V.A.KONEVA

837-841 Estimation of the white-headed duck *Oxyura leucocephala* number on reservoirs of the North-Kazakhstan region in the summer of 2014. I.A.ZUBAN, V.S.VILKOV, M.N.KALASHNIKOV

841-843 Formation of the rook *Corvus frugilegus* wintering in Caton-Karagai, Southern Altai. N.N.BEREZOVIKOV, F.I.SHERSHNEV

843-845 The long-tailed duck *Clangula hyemalis* in Taimyr Reserve. A.A.GAVRILOV

845-847 Spring migration of waterfowl in the middle reaches of the Olyokma River. D.I.TIRSKY

847-849 Anseriformes of technogenic water bodies in Mordovia. S.N.SPIRIDONOV

849 The hill pigeon Columba rupestris in Primorye. V.K.RAKHILIN

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2015

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1116**: 829-832*

Священномученик Иван Никанорович Кесарийский (1878-1937) – помощник Русского орнитологического комитета

Е.Э.Шергалин

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское орнитологическое общество. E-mail: zoolit@mail.ru

Поступила в редакцию 6 февраля 2015

Среди духовенства, проявлявшего интерес к птицам, выделяется супружеская чета Ольги Владимировны и Ивана Никаноровича Кесарийских. Ольга Владимировна является автором трёх небольших статей о птицах: «Как я кормлю своих птичек», «Отзыв о книге З.Мостовенко «Из жизни птиц»» и «Реполов (коноплянка)», – опубликованных в 1910 году в «Дневнике Кружка любителей певчей и другой вольной птицы» (Кесарийская 1910а,б,в). Однако здесь мы хотим рассказать о судьбе её мужа – протопресвитера Иоанна Кесарийского.

На первом заседании Русского орнитологического комитета (РОК) 7 февраля 1913 года собравшиеся постановили «озаботиться составлением популярного народного чтения о пользе птиц для распространения при посредстве духовенства и ведомства Министерства Народного Просвещения» (Первое… 1913). Распространение знаний через духовенство возлагалось на плечи Ивана Никаноровича Кесарийского.

На втором заседании Комитета 22 марта 1913 года было решено «по предложению Б.М.Житкова приступить к выполнению существующих в России вполне запретных на охоту мест на монастырских землях для нанесения таковых существующих уже заповедников на карту, вместе с заявлением его, что предстоящим летом им лично будут выяснены заповедники Валаамского монастыря, а пока известны заповедники Соловецкого монастыря, островные заповедники на Балтийском море и заповедники Аскания-Нова в Таврической губ. Фр. Эд. Фальцфейна, причём весьма желательно выяснить важное влияние на окрестные места заповедника Саровского монастыря, путём сношений с духовенством повлиять на увеличение числа таких заповедников в смысле воспрещения малодоходный сдачи под охоту монастырских угодий и поставив в первую голову выяснение таких заповедников для Московской губернии, позже стремиться соответственными сношениями к установлению такого запрета на охоту и законодательным путём, постановлено: принять предложение Б.М.Житкова и вступить в сношения по этому вопросу с духовенством интересных в этом отношении мест» (Второе... 1913).

Координатором именно этой работы и стал Иван Никанорович Кесарийский, пользующийся авторитетом, влиянием и своими связями с выпускниками Московской духовной Академии. На третьем заседании РОКа, состоявшемся 15 мая 1913 года, присутствовали и Ольга Владимировна, и Иван Никанорович Кесарийские. На этом заседании было решено: «По вопросу о выяснении русских запретных на охоту мест на монастырских угодьях постановлено: просить И.Н.Кесарийского составить необходимый для обращения по этому вопросу список русских монастырей. По вопросу о брошюре о пользе птиц постановлено: просить О.В.Кесарийскую и Ф.А.Визенберг представить свои соображения по этому вопросу» (Второе... 1913).

Мы не знаем, успел ли 35-летний Иван Никанорович выполнить это данное ему Комитетом задание в полном объёме, поскольку вскоре разразилась Великая война, закончившаяся приходом богоборческой власти. Известно лишь, что «в сентябре 1913 года Русский орнитологический комитет (РОК) разослал настоятелям русских мужских монастырей обращение: «Русский Орнитологический Комитет, озабоченный выяснением вопросов об охране птиц в Российской империи, обращается с покорнейшей просьбой не отказать в уведомлении, есть ли в Вашем монастыре угодья, на которых воспрещалась бы охота и ловля птиц, а равно и о том, какое население животными и птицами находится в этих угодьях. Поручая себя молитвам монастыря, РОК уверен, что с вашей помощью ему удастся выяснить необходимое для богоугодного дела защиты животного мира и выработать необходимые к тому мероприятия». Утвердительные ответы были получены от 21 из 46 опрошенных монастырей» (Селезнева 2012).

Церковь Петра и Павла на Якиманке 1882 год.

Когда Комитет был создан, для О.В.Кесарийской был указан такой адрес: Москва, Большая Якиманка, дом церкви Петра и Павла. Позже эта церковь была разрушена, но сохранилась её фотография.

Иван (Иоан) Никанорович Кесарийский родился 30 января 1878 года в селе Адищево Кинешемского района Ивановской области (в то время Костромской губернии) в семье священника Никанора Васильевича и Александры Кесарийских. Наш герой был единственным ребёнком в семье, что в те времена было большой редкостью. У Ивана Никаноровича священниками служили не только его отец, но и дед. Такие подробности удалось выяснить поэту и краеведу Лидии Константиновне Егоровой (1956-2015), чья жизнь трагически оборвалась в январе этого года. Иван Никанорович получил высшее духовное образование, обучаясь сперва в Костромской духовной семинарии, а затем в Московской духовной Академии в 1899-1903 годах, которую закончил со степенью кандидата богословия. В 1904 году в Московской губернии он был рукоположен в сан, после чего начал службу в различных храмах Московской епархии.



Иван Никанорович Кесарийский.
Таганская тюрьма, 1937 год.

На момент ареста в 1937 году он служил настоятелем в храме Владимирской Иконы Божией Матери в селе Быково Раменского района Московской области. 2 ноября 1937 года он был арестован по так называемому групповому делу «церковников» села Быково. При аресте проживал по адресу: Москва, Воробьёвское шоссе, 7-й проезд, д. 3. Вместе с ним были арестованы священник Петр Косменков, диакон Симеон Кречков, староста Евдокия Сафронова, члены церковного совета Пётр Пискарев-Молоков, Александр, Елизавета и Дмитрий Чиликины.

Допросы начались в день ареста. На допросах Иван Никанорович держался мужественно и все обвинения отвергал. Так, например, он отверг обвинение в том, что является организатором группы церков-

ников в селе Быково и в том, что таковая существует. Не удалось следователю добиться признания и в том, что отец Иоанн якобы обсуждал вопрос о совершении террористического акта по отношению к председателю колхоза. Отец Иоанн настаивал: «О контрреволюционной деятельности церковников села Быково мне неизвестно и участников данной группы я не знаю». Во время следствия И.Н.Кесарийский содержался в московской Таганской тюрьме. 15 ноября он был осуждён «тройкой» Московского УНКВД по статье 58-10 УК РСФСР за «контрреволюционную деятельность и высказывание террористических настроений» и приговорён к высшей мере наказания – расстрелу.

На следующий же день, 16 ноября 1937 года, отец Иоан был расстрелян (на 60-м году жизни) вместе с проходившими по этому делу священниками Пётром и Симеоном. Происходило это на печально известном Бутовском полигоне (теперь это в черте города Москвы). Здесь с августа 1937 по октябрь 1938 года были расстреляны и похоронены 20765 человек, в том числе 739 священнослужителей Русской Православной Церкви, 255 из них ныне канонизированы. Нигде на земле нет больше такого места, где почивали бы мощи столь многочисленного Собора святых…

Гражданская реабилитация И.Н.Кесарийского объявлена 19 июня 1989 года, а 20 августа 2000 года, через 67 лет после казни, на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви священники Иоанн, Петр и Симеон причислены к лику новомучеников Российских.

Вечная память святому человеку, любившему и людей, и птиц!

Литература

Второе и третье заседание «Р.О.К-та» 1913 // *Птицеведение и птицеводство* **4**, 3: 269-277.

Кесарийская О.В. 1910а. Как я кормлю своих птичек // *Дневник Кружка любителей певчей и другой вольной птицы* **7**: 12-17.

Кесарийская О.В. 1910. Отзыв о книге З.Мостовенко «Из жизни птиц» // *Дневник Кружка любителей певчей и другой вольной птицы* **7**: 41-50.

Кесарийская О.В. 1910в. Реполов (коноплянка) // *Дневник Кружка любителей певчей и другой вольной птицы* **7**: 1-5.

Первое заседание Русского Орнитологического Комитета. 1913 // *Птицеведение и птицеводство* **4**, 1: 36-37.

Селезнева А. 2012. Четвертая жизнь // *Газ. Новгородские ведомости* 15.09.2012.

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/no_dbpath/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu8dS4Us8WdsOeceG06ce0h66qcee0hfi0iceXb**

http://sazonow.ru/svyatye-i-svyatyni/497-2014-06-25-12-42-48

http://novved.ru/obshchestvo/3712-chetvjortaya-zhizn.html

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1116**: 833-837*

К столетию со дня рождения Владимира Степановича Петрова (31 марта 1915 – 21 апреля 1991)

В.П.Белик, В.А.Конева

Виктор Павлович Белик. Кафедра ботаники и зоологии, факультет естествознания, Южный федеральный университет, ул. Большая Садовая, 105/42, Ростов-на-Дону, 344006, Россия. E-mail: vpbelik@mail.ru
Вера Александровна Конева.

Поступила в редакцию 5 марта 2015

31 марта 2015 года исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Степановича Петрова – орнитолога, хорошо известного на Украине и юге России, где он родился и проработал всю свою жизнь. Птицы этих регионов для Владимира Степановича всегда были основным объектом исследований, хотя судьба самого исследователя оказалась значительно переменчивее, под стать времени, в котором он жил.

Владимир Степанович Петров
(1915-1991).

Родился Владимир Степанович в крестьянской семье в селе Белое Славяносербского уезда Екатеринославской губернии (теперь Лутугинский район Луганской области). Закончив в 1931 году семилетнюю школу в городе Ворошиловске (Коммунарске, ныне вновь получившем

прежнее название – Алчевск), он начал свою трудовую биографию, одновременно готовясь к сдаче экзаменов в вуз. Но первая попытка оказалась неудачной: химический факультет Ворошиловградского (Луганского) института общественного питания, куда Владимир поступил в ноябре 1932 года, через полгода оказался упразднён. Однако в сентябре 1934 года В.С.Петров вновь поступает на учёбу – теперь на биофак Харьковского университета, где последующая встреча с И.Б.Волчанецким и определила всю дальнейшую жизнь Владимира Степановича. Химия была оставлена, и началось увлечение орнитологией, которой активно занимался Илья Борисович Волчанецкий, с 1935 года возглавивший кафедру зоологии позвоночных Харьковского государственного университета.

Дружба двух этих людей, разделённых возрастом в 20 лет, существенными различиями в характерах и значительными расстояниями, продолжалась до конца дней Ильи Борисовича. Что связывало их – осталось не совсем ясным. Возможно, их глубокая интеллигентность и порядочность, большой интерес к работе с птицами, преданность ученика учителю…

После окончания биофака в 1939 году В.С.Петров поступает к профессору И.Б.Волчанецкому в аспирантуру, избрав темой своей диссертации исследование способов привлечения насекомоядных птиц в искусственные степные леса южной Украины. Два года были отданы населению птиц первенца степного лесоразведения, расположенного на юге Донецкой области, – Велико-Анадольского лесничества, где Владимир Степанович изучал заселяемость искусственных гнездовий синицами, их экологию этих птиц и хозяйственное значение. Но 22 июня 1941 года неожиданно грянула война…

Владимир Степанович почти не рассказывал о ней. Иногда он вспоминал лишь первый день войны, когда молодым аспирантом, вернувшись в Харьков после очередной поездки в лесхоз, рано утром зашёл перекусить в небольшую рабочую столовую на окраине города. По гнетущей атмосфере, стоявшей в столовой, он сразу же понял, что случилось что-то неладное. Несколько раз В.С.Петров возвращался в воспоминаниях к тяжелейшим дням боев на Сталинградском фронте, где он служил в медсанбате.

Войну старший лейтенант В.С.Петров закончил 9 мая 1945 года в городе Буков на территории Германии. После демобилизации в августе 1946 года он вернулся ассистентом в свой Харьковский университет, но затем начался длительный период его бесконечных переездов из города в город, которые были вызваны, как писал Владимир Степанович в 1955 году в автобиографии, «упразднением и сокращением факультетов естествознания». Лишь в Запорожском педагогическом институте он задержался на три года (1947-1950), но этого хватило,

чтобы собрать весьма интересный материал, ставший основой для новой диссертации, посвящённой теперь орнитофауне Конских плавней Днепра.

После Запорожского пединститута В.С.Петров работал в Артёмовском учительском институте, в 1952 году был переведён в Славянский учительский институт, а в 1954 году – в Осипенковский (Бердянский) педагогический институт. Несмотря на все тяготы неустроенной кочевой жизни, Владимир Степанович в 1953 году представил в Харьковский университет свою кандидатскую диссертацию «Птицы Конских плавней и их значение для заселения искусственных лесонасаждений», которую успешно защитил 7 мая 1954 года.

В этот период, в середине 1950-х годов, в Ростове – в РГУ и РГПИ – собралось несколько молодых, позже ставших известными выпускников Харьковского университета: зоолог М.А.Бескровный, ботаник Г.М. Зозулин, биохимик З.Г.Броновицкая. Они-то и пригласили в Ростов В.С.Петрова, только что защитившего кандидатскую диссертацию. И в 1955 году состоялось его последнее переселение – в Ростов-на-Дону, где затем он 28 лет проработал доцентом на кафедре зоологии РГУ.

В Ростове-на-Дону В.С.Петров продолжал разрабатывать тему по орнитофауне искусственных степных лесонасаждений, которой занимался также и его руководитель И.Б.Волчанецкий. Пока позволяло здоровье, Владимир Степанович много ездил по степному Придонью, изучая птиц полезащитных лесополос, искусственных лесных массивов и источников их заселения в пойменных лесах Нижнего и Среднего Дона. Он собирал орнитологические коллекции, изучал питание птиц, но, к сожалению, оригинальные материалы публиковал мало. Отчасти это было связано с организационными проблемами того периода, а также с большой загруженностью в учебном процессе на кафедре зоологии Ростовского университета, но в основном – с необычайной требовательностью В.С.Петрова к качеству своей научной продукции. Владимир Степанович с великой дотошностью, пунктуальностью и щепетильностью собирал необходимые для работы сведения, подбирал специальную литературу. И в результате весь процесс написания научных статей растягивался на месяцы и годы.

Кроме того, в отличие от своего учителя И.Б.Волчанецкого, с которым В.С.Петров все эти годы поддерживал тесные дружеские контакты и который всё время пытался сподвигнуть своего незаурядного ученика на солидные научные обобщения докторского уровня, Владимир Степанович был весьма осторожен в выводах, гипотезах, открытиях, новой терминологии и т.п. Несмотря на это, в начале 1980-х годов в содружестве с большим коллективом зоологов Северного Кавказа – А.К.Темботовым, А.М.Гинеевым, Б.А.Казаковым, Н.Х.Ломадзе, Х.Х. Шхашамышевым и другими, В.С.Петров смог создать замечательную

сводку по фауне наземных позвоночных всего Северного Кавказа (Темботов и др. 1982), а затем – коллективную монографию о редких видах животных бассейна Дона (1983).

Северный Кавказ, кроме Нижнего Дона, постоянно находился в те годы в сфере внимания В.С.Петрова. Познакомившись с его фауной в 1954 году во время большой комплексной экспедиции И.Б.Волчанецкого по Предкавказью, позже, в 1956-1960 годах, Владимир Степанович неоднократно посещал Кавказ вместе со студентами в качестве преподавателя на летних полевых практиках по зоологии. Итогом этих исследований явилась небольшая, но насыщенная фактами работа по птицам района озера Абрау под Новороссийском, написанная В.С.Петровым совместно со своей первой ученицей – Л.Г.Курдовой, работавшей затем доцентом и заведующим кафедрой зоологи Донского сельскохозяйственного института. Собранные здесь и в других районах материалы В.С.Петрова позже вошли в большую обзорную работу И.Б. Волчанецкого, И.И.Пузанова и В.С.Петрова (1962) по птицам Северо-Западного Кавказа, которая до сих пор является основной фаунистической сводкой по этому региону.

Следует сказать, что учеников и последователей, кроме Л.Г.Курдовой, у Владимира Степановича было немного. Среди них можно назвать ещё Д.К.Дрягину, которая после университета все годы проработала орнитологом в Ростовском зоопарке, а также С.И.Смолинова, учительствующего сейчас в Каневе на Украине. В.А.Миноранский, работавший в студенческие годы под руководством В.С.Петрова и подготовивший ряд интересных публикаций по орнитофауне озера Маныч-Гудило, позже перешёл в энтомологию.

Дело, возможно, в том, что высокая требовательность, строгость и принципиальность В.С.Петрова останавливали многих студентов на пороге выбора ими руководителя своих будущих научных исследований. Да и работал Владимир Степанович в основном со студентами вечернего и заочного отделений РГУ, контингент которых по уровню подготовки был в целом значительно ниже, чем у студентов стационара, уходивших, как правило, к другим преподавателям. Кроме того, обладая великолепной памятью и эрудицией, Владимир Степанович читал свои лекции по зоологии, орнитологии и зоогеографии на удивление сухо и не умел увлечь аудиторию. И лишь в личном общении, перед друзьями раскрывалось всё его обаяние. Неудивительно поэтому, что у него было мало близких друзей как в Ростове-на-Дону, так и в других городах. Но с ними он регулярно встречался, переписывался. Всегда приятно было получать его трогательные поздравительные открытки, исписанные бисерным и изумительно чётким почерком.

Очень тёплая обстановка была в его уютной, заставленной книжными шкафами и полками квартире на Соборном переулке в центре

Ростова. Здесь Владимир Степанович мог часами вспоминать о своём учителе И.Б.Волчанецком и об его уникальной диссертации, об орнитологах-однокашниках, «разлетевшихся» из Харьковского университета по всему Советскому Союзу, об экспедициях по Кавказу, о своём босоногом детстве и т.д.

Хотелось, чтобы и о Владимире Степановиче знали и помнили нынешние и будущие орнитологи, интересующиеся птицами Украины и Северного Кавказа.

Литература

Берегите: их осталось мало. Редкие и исчезающие животные Донского бассейна, требующие охраны. 1983. Ростов-на-Дону: 1-128.

Волчанецкий И.Б., Пузанов И.И., Петров В.С. 1962. Материалы по орнитофауне северо-западного Кавказа // *Учён. зап. Харьков. ун-та* **130**: 7-72.

Темботов А.К., Петров В.С., Гинеев А.М., Казаков Б.А. (ред.). 1982. *Ресурсы живой фауны: Позвоночные животные суши*. Ростов-на-Дону: 1-320.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1116**: 837-841*

Результаты учёта численности савки *Oxyura leucocephala* на водоёмах Северо-Казахстанской области летом 2014 года

И.А.Зубань, В.С.Вилков, М.Н.Калашников

Иван Александрович Зубань, Владимир Семёнович Вилков, Михаил Николаевич Калашников. Кафедра общей биологии, Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева, ул. Пушкина, д. 86, Петропавловск, 150000, Казахстан. E-mail: zuban_ia@mail.ru; vsvilkov@mail.ru; janajmwjakamd@mail.ru

Поступила в редакцию 7 марта 2015

Савка *Oxyura leucocephala* – реликтовый вид и одна из самых малочисленных птиц в мире. По данным ряда авторов, Центральноазиатская популяция этого вида насчитывает всего 5-10 тыс. особей, а общая численность зимующей популяции составляет 8-13 тыс. (Hughes *et al*. 2006, Wetlands International 2006; BirdLife International 2009).

Казахстан входит в четвёрку стран, на территории которых гнездится наибольшее количество савок в мире. Поэтому работы по изучению указанного вида в Казахстане ведутся уже в течение многих лет. Благодаря этим исследованиям выявлены ключевые места обитания, а также места миграционных остановок на территории Акмолинской, Костанайской и ряда других областей Казахстана (Кошкин и др. 2008,

Ерохов и др. 2008, Розенфельд и др. 2012). На озёрах Северо-Казахстанской области в 1970-х годах кладки савки находил В.И.Дробовцев. В 1986 и 1987 годах на озере Поганое в южной части города Петропавловска обнаружено 1 гнездо и 2 выводка, а также 5 холостых особей (Вилков и др. 2006). В конце августа 2008 года самку савки и молодую птицу наблюдала В.А.Ковшарь (2008) на озере Казачье. Есть сведения о встречах савки в последующие годы и в других частях области (Зубань и др. 2010). Несмотря на вышесказанное, специальные исследования по поиску мест гнездования, а также определению мест предотлётных скоплений в Северо-Казахстанской области не проводились. Поэтому летом 2014 года на территории этой области проведены комплексные исследования, охватившие 15 озёр разного типа. Часть озёр, осмотренных в 2014 году, посещались нами весной и осенью начиная с 2011 года.

География и методы исследования

Учёты проводились 21-22 июля в Аккайынском районе, 23-26 июля – в Есильском, с 21 по 23 августа – на водоёмах района Шал Акына и Тимирязевского.

Основным методом сбора данных был учёт численности на контрольной точке, представляющий участок водоёма площадью 0.5-1.5 км^2. В зависимости от условий наблюдений и величины обследуемого озера закладывалось от 1 до 5 контрольных точек. Учёт проводился с суши с использованием биноклей «Yukon» и подзорной трубы «Viking». Для определения географических координат каждой учётной точки использовался навигатор «GPS». Одновременно описывались основные характеристики водоёмов и погодные условия. Для озёр, где была отмечена савка, оценивался уровень антропогенной нагрузки и статус водоёма.

Результаты

В ходе полевых наблюдений пребывание савки отмечено на 4 из 15 обследованных озёр: Балыкты, Сарыколь, Жалтыр и Аксуат. Список и характеристики водоёмов приведены в таблице.

Озеро Балыкты. Расположено в Смирновском заказнике в Аккайынском районе. Его площадь около 16 км^2, длина 4.5 км, ширина 3.6 км, глубина до 2.5 м. Берега большей частью пологие, низменные, вода солоноватая. Жёсткая надводная растительность представлена бордюром тростника вдоль западного и северо-западного берегов озера, а также куртинами тростника и рогоза – в южной мелководной части. Степень зарастания надводной растительностью – около 20%.

Комплексные учёты птиц на Балыкты проводились нами в весенне-осенний период с 2011 года. Савок, чаще всего самцов (от 1 до 5) регистрировали каждый сезон в южной части озера, где есть мозаичные заросли надводной растительности, чередующейся с небольшими плёсами и протоками. В мае 2014 года брачные игры самки и 5 самцов наблюдали у тростникового бордюра в южной части озера. 21 июля 2014 вдоль кромки бордюра из тростника учтено 7 самцов савки, кото-

рые чаще всего держались поодиночке, активно ныряли за пищей, но не отплывали дальше 20-35 м от надводных зарослей. При приближении наблюдателей к птицам ближе чем на 200 м они сразу же скрывались в куртинах тростника.

Характеристика озёр в Северо-Казахстанской области, обследованных летом 2014 года

№ п/п	Название озера	Координаты	Тип зарастания	Факторы беспокойства			
				Рыболовство	Выпас	Забор воды	Распашка водосборов
1	Балыкты (солоноватое)	54о 15'41,2" 68° 55'39,7"	Бордюрно-куртинный		+		+
2	Сарыколь (пресное)	54°08' 55,6" 68°31' 42,3"	Бордюрно-куртинный		+		+
3	Жалтыр (солоноватое)	53°59'32,3" 67°17'26,1"	Бордюрно-куртинный				+
4	Аксуат (пресное)	53°39'45,1" 66°27'45,6"	Бордюрно-куртинный	+			
5	Большой Тарангул (пресное)	54° 01' 45." 68° 25' 23,3"	Бордюрно-барьерный		+		
6	Альва (солоноватое)	54° 22' 59.5" 68° 17' 29,4"	Бордюрно-куртинный	+			+
7	Кишкенеколь (пресное)	54° 24' 37.6" 68° 25' 23,3"	Куртинный		+	+	
8	Перерванское (пресное)	54° 30' 57.8" 68° 19' 05,6"	Займище		+	+	
9	Камышное (пресное)	54° 31' 53.6" 68° 17' 59,5"	Займище		+		+
10	Камышное (пресное)	54°19'27.7" 68° 11' 12,6"	Бордюрно-куртинный				+
11	Кендыкты (солоноватое)	54° 19' 29.4" 68° 07' 44,1"	Бордюрно-барьерный	+			
12	Без названия (пресное)	54°14'49.3" 67° 58' 55,1"	Бордюрно-куртинный		+		
13	Шортанды (пресное)	54° 09' 23.7" 67° 36' 03,2"	Бордюрный				
14	Малый Косколь (солоноватое)	54° 00' 21.5" 67° 22' 24,7"	Куртинный		+		
15	Малый Как (солёное)	53° 40' 15.6" 66° 28' 18,6"	Редкий бордюр тростника вдоль берега				+

Озеро Сарыколь. Расположено в границах Есильского района на территории охотничьего хозяйства «Гусиное». Его площадь 1.5 км^2, длина 1.9 км, ширина 0.7 км, глубина в центре до 1.5-2 м. Вода в озере пресная, берега пологие заросшие бордюром тростника и рогоза. От центра к северу по всему водоёму разбросаны тростниково-рогозовые куртины. Степень зарастания надводной растительностью – около 70%. За 3 года наблюдений савка была отмечена только однажды: 23 мая

2014 в стае красноголовых нырков *Aythya ferina*, отдыхавших у тростника в центральной части водоёма, наблюдали одного самца савки.

Озеро Жалтыр. Расположено в районе Шал Акына, в 8 км севернее села Аканбарак. Площадь 13 км², длина 4.4 км, ширина 2.9 км, глубина – не более 1-1.5 м. Для озера характерны незначительные тростниковые заросли бордюрно-куртинного типа в восточной и юго-восточной частях, но их доля незначительная – около 2-3%. Основную часть акватории занимает открытый плёс. Вода в озере солоноватая и очень богата кормом для водоплавающих птиц, как растительного, так и животного происхождения.

Во время наших наблюдений 28 августа 2014 на отмелях вдоль береговой линии отдыхали и кормились более 42 тыс. речных уток, среди которых учтено 30 савок (28 самцов и 2 самки), которые чаще держались поодиночке, реже группами до 3 особей. Это было самое крупное скопление, обнаруженное нами на территории области. В предыдущие годы такого количества уток, в том числе рассматриваемого вида, на этом озере не отмечалось.

Озеро Аксуат. Расположено в Аксуатском зоологическом заказнике областного значения в Тимирязевском районе. Площадь 14.5 км², длина 7.13 км, ширина 2.5 км, глубина 2.5-3 м. Вода пресная. Озеро с бордюрно-куртинным типом зарастания с обширным плёсом в середине. Степень зарастания надводной растительностью, преимущественно тростником, не превышает 30%. 23 августа 2014 проведены учёты. Широкий бордюр тростника вдоль всей береговой линии закрывал обзор водной глади всего водоёма. Поэтому наблюдения проведены нами только с одной контрольной точки и охватывали не более 20% акватории. На этой площади нами обнаружено 2 самца савки.

Подводя итоги учётов савки на территории Северо-Казахстанской области можно констатировать, что ряд осмотренных озёр (Балыкты, Жалтыр, Аксуат) имеет важное значение для савки. В тоже время полученная информация ещё не отражает полную картину распространения савки и её статус на территории области. Поэтому мы считаем, что нужна обширная программа по выявлению и мониторингу потенциальных мест обитания, пространственно-биотопического распределения савки в этой области, в том числе и в гнездовой период.

Литература

Вилков В.С., Коломин Ю.М. 2006. *Животный мир Северо-Казахстанской области: учебно-методическое пособие для студентов биологических и экологических специальностей СКГУ*. Петропавловск: 1-21.

Ерохов С.Н., Кошкин А.В., Жулий В.А. 2008. Особенности размещения и численность водно-болотных птиц на водоёмах Тениз-Коргалжынской впадины в летний период 2007 г. // *Каз. орнитол. бюл.:* 88-105.

Зубань И.А., Красников А.В., Губин С.В., Гайдин С.Г. 2010. Авифаунистические наблюдения и находки в Северо-Казахстанской области // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 43-74.

Ковшарь В.А. 2008. Встреча савки в окрестностях Петропавловска // *Каз. орнитол. бюл.:* 159.

Кошкин А. В., Жулий В. А., Ерохов С.Н. 2008. Динамика численности савки на водоёмах Тенгиз-Коргалжынской впадины за последние 10 лет // *Каз. орнитол. бюл.:* 127-128.

Розенфельд С.Б., Тимошенко А.Ю., Бадмаев В.Б., Салемгареев А.Р. 2012. Основные результаты учётов численности савки на миграционных остановках в России и Казахстане в 2005-2010 гг. // *Казарка* **12** (2): 84-99.

Birdlife International. 2009. http://www.birdlife.org/ datazone/speciesfactsheet.php?id=359

Hughes B., Robinson J., Green A., Li D., Mundkur T. 2006. *International Single Species Action Plan for the Conservation of the White-headed Duck Oxyura leucocephala*. CMS Technical Series No. 13, AEWA Technical Series No. 8, June 2006: 1-67.

Wetlands International. 2006. Водно-болотные угодья Северного Кавказа // *Водно-болотные угодья России*. М., **6**: 1-59.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1116**: 841-843*

Формирование зимовки грачей *Corvus frugilegus* в Катон-Карагае на Южном Алтае

Н.Н.Березовиков, Ф.И.Шершнёв

Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Фёдор Иванович Шершнёв. Казселезащита, посёлок Катон-Карагай, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область, 070900, Казахстан

Поступила в редакцию 8 марта 2015

В XX столетии грач *Corvus frugilegus frugilegus* (Linnaeus, 1758) был обычной гнездящейся перелётной птицей на Алтае, но случаев его зимовок здесь не было известно (Сушкин 1938; Гаврин 1974; Кучин 1982; Цыбулин 1999). Лишь однажды, 9 декабря 1980, когда уже более месяца стояла многоснежная морозная зима, один грач был встречен нами на озере Маркаколь в горах Южного Алтая (Березовиков 1989). После непродолжительной остановки в деревне он в тот же день улетел в южном направлении вдоль горной дороги Урунхайка – Алексеевка. Несомненно, это была случайная задержка во время осенней миграции. В последующие годы грачей на Южном Алтае зимой не встречали, хотя в нескольких пунктах были проведены продолжительные орнитологические наблюдения (Березовиков 2002; Березовиков, Воробьёв 2001; Лухтанов, Березовиков 2003; Лухтанов 2004; Стариков 2006).

В соседней Зайсанской котловине грачи также нормально не зимовали. Как исключение, 12 декабря 1981 в селе Буран на Чёрном Иртыше наблюдали одного грача в сообществе восточных чёрных ворон *Corvus corone orientalis* (Березовиков, Самусев 2003).

В конце XX века область зимовки грачей во многих местах расширилась в пределы Северного и Восточного Казахстана. Так, в городе Усть-Каменогорске, расположенном в предгорьях Западного Алтая, с 1993/94 года стали оставаться на зиму небольшие группы грачей (Березовиков и др. 2007). В 2000-2005 годах здесь уже сформировался стабильный очаг зимовки этих птиц, численность которых была не менее 500 особей. Основная их ночёвка совместно с галками *Corvus monedula* располагалась в старом парке имени Джамбула в центральной части города. В первом десятилетии XXI века, характеризующемся серией суровых многоснежных зим, грачи успешно перезимовывали здесь даже когда морозы опускались до минус 50°С (см. рисунок).

Зимующий грач *Corvus frugilegus* во время 40-градусных морозов. Усть-Каменогорск. 20 декабря 2012. Фото Е.Мишановой.

В этот же период началось формирование очага зимовки грачей в Бухтарминской долине на Южном Алтае. В 2007/08 году в посёлке Катон-Карагай впервые осталась группа из 7 грачей, которые успешно перезимовали на помойке рабочей столовой около строящейся больницы. В последующие зимы с 2008 по 2015 годы в центре посёлка регулярно зимовали 5-10 грачей, державшиеся около помоек и мусорных баков больницы и детского сада, служивших им основным источником пропитания. В оттепельные дни они вместе с чёрными воронами вылетают кормиться на центральные улицы около магазинов, кафе и базара. Иногда, привлечённые криками *сорок Pica pica* и ворóн, появляются у мест забоя и разделки домашнего скота. Местом их ночёвок является поселковый тополевый парк.

Таким образом, в последние два десятилетия в предгорной части Алтая началось формирование первых очагов зимовки грачей, приуроченных пока к городам и крупным посёлкам.

Литература

Березовиков Н.Н. 1989. *Птицы Маркакольской котловины (Южный Алтай).* Алма-Ата: 1-200.

Березовиков Н.Н. 2002. Материалы к авифауне Курчумских гор и южных предгорий Азутау (Южный Алтай) // *Рус. орнитол. журн.* **11** (202): 983-1009.

Березовиков Н.Н., Воробьёв И.С. 2001. Птицы западных отрогов Нарымского хребта (Южный Алтай) // *Рус. орнитол. журн.* **10** (170): 1067-1086.

Березовиков Н.Н., Самусев И.Ф. 2003. Птицы Зайсанской котловины. VI. Passeriformes // *Рус. орнитол. журн.* **12** (220): 431-465.

Березовиков Н.Н., Самусев И.Ф., Хроков В.В., Егоров В.А. 2007. Воробьиные птицы поймы Иртыша и предгорий Алтая. Часть 2 // *Рус. орнитол. журн.* **16** (372): 1063-1094.

Гаврин В.Ф. 1974. Семейство Вороновые – Corvidae // *Птицы Казахстана.* Алма-Ата, **5**: 41-121.

Кучин А.П. 1982. *Птицы Алтая. Воробьиные.* Барнаул: 1-208.

Лухтанов А.Г.2004. Птицы города Зыряновска (юго-западный Алтай) // *Selevinia:* 154-162.

Лухтанов А.Г., Березовиков Н.Н. 2003. Материалы к орнитофауне Бухтарминской долины (Юго-Западный Алтай) // *Рус. орнитол. журн.* **12** (239): 1130-1146.

Стариков С.В. 2006. Аннотированный список птиц Катон-Карагайского национального парка и прилегающих территорий Алтая // *Тр. Катон-Карагайского национального парка.* Усть-Каменогорск, **1**: 147-241.

Сушкин П.П. 1938. *Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо-Западной Монголии.* М.; Л.:, **2**: 1-436.

Цыбулин С.М. 1999. *Птицы Северного Алтая.* Новосибирск: 1-519.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1116**: 843-845*

Морянка *Clangula hyemalis* в Таймырском заповеднике

А.А.Гаврилов

*Второе издание. Первая публикация в 2005**

Морянка *Clangula hyemalis* – самая многочисленная утка Таймырского заповедника, гнездится на всех его участках. Прилетевшие птицы объединяются в достаточно большие стаи. Например, 25 июня 1987 на реке Логата под ярами на участке открытой воды кормились 125 особей. Здесь же плавало 22 самки и 19 самцов гребенушек *Somateria*

* Гаврилов А.А. 2005. Морянка *(Clangula hyemalis)* в Таймырском заповеднике // *Гусеобразные птицы Северной Евразии: Тез. докл. 3-го международ. симп.* СПб.: 74-75.

spectabilis, 10 чернозобых гагар *Gavia arctica*, пара краснозобых казарок *Branta ruficollis* и пара белолобых гусей *Anser albifrons*. К 30 июня морянки разбились на пары. После 10 июля в тундре остались только самки. 26 июня 1989 в устье реки Малая Логата наблюдались 88 птиц в стаях и отдельными парами. В урочище Ары-Мас в этот же год в связи с холодной и поздней весной морянки прилетели позже. Крупные пролётные стаи сохранялись до третьей декады июня. Только на одном из участков реки Новая было 300 морянок (две трети – самки). К 23 июня птицы встречались парами, а к 10 июля самцы покинули район. Встречен только один выводок из 3 птенцов. В то же время очень часто встречались холостые и, видимо, потерявшие кладки самки, которые держались группами по 4-13 особей.

Обилие морянок в болотно-тундровых комплексах, по нашим данным и данным отчётов ГПЗ, в т.ч. И.И.Чупина (1984), студентов Т.П. Петровой (Томский университет) и П.В.Коннова (Алтайский университет) (1985-1987 и 1989 годов по Малой Логате и Логате), составило (первая/вторая половина лета, ос./км^2): 8.7-29.1/13.2 – на Малой Логате (1984, 1985, 1987, 1989); 3-10.7/нет данных – на Логате (1990 и 1985); 6.9-18.2/11 – на Верхней Таймыре (1986, 1987, 1991, 1997, 2000); 3.7-155/0.1-17 – у Ары-Масе (1989, 1993, 1997-1999); 0.7-2/0.8 – на Лукунском участке (1988-1992), 10.5/9.5 – на реке Бикада (1999); 4.3/нет данных – в устье реки Оленьей (2000).

В 1990 году в районе реки Логата морянки были многочисленны. На следующий год в среднем течении реки Верхняя Таймыра (устье реки Большая Боотанкага) пролёт был выражен слабо. Обнаруженное 12 июля 1990 гнездо содержало 3 яйца, которые 20 июля были проклюнуты. Встреченные выводки состояли из 3-7, в среднем 5.2 птенца (n = 5). В 1992 году на Лукунском участке из-за погодных условий прилёт был позднее, а численность ниже, чем в 1988 году. Ни гнёзд, ни выводков не отмечено. В 1993 году на Ары-Маса морянок было много. В 2 стаях в первой декаде июля было 28 и 44 особей при примерно равном соотношении полов. Вплоть до 10 июля, наряду с семейными парами, встречались и кочующие стайки. На озере Сырута-Турку в 1994 году статус морянки не был выяснен. Они встречались на термокаростовых и мореных озёрах. Гнездовое поведение проявляла самка 11 июля у озера Узкое (Поспелов 1994). В 1995 году на реке Верхняя Таймыра 11-16 июня птицы держались стайками по 3-20 особей на озерках вместе с гребенушками. На сопредельной с Ары-Масом территории в следующем году на небольшом острове озера Ыаргылах обнаружена колония из 12 гнёзд. Расстояние между гнёздами составляло 5-10 м. Кладки содержали 2-9, в среднем 5.4 яйца. В связи с низкой численностью леммингов чайки и поморники нападали на сидящих птиц, пытаясь завладеть яйцами. На озере Левинсон-Лессинга в этот

год морянка была многочисленна. Гнездование установлено для депрессии реки Угольной. В 1997 году в бассейне реки Фадью-Куда морянка была многочисленна на гнездовании в заозёрных ландшафтах.

В 1998 году морянка отмечена как обычный гнездящийся вид на Бикаде. На следующий год она встречалась реже обычного. В 2000 году – спорадически встречающийся на пролёте вид в устье реки Оленьей. Очень малочисленны, обычны только на пролёте. Случаев гнездования не отмечено (Поспелов 1996-2000). На реке Верхняя Таймыра в этот год численность морянок оказалось очень низкой.

Наиболее ранние первые встречи морянок отмечены в посёлке Хатанга 18-21 мая (1986, 1989, 2000); наиболее поздние встречи первых птиц – 16-17 июня (1993, 1997) во внутренних районах Таймыра – на реке Малая Логата и озере Левинсона-Лессинга. В сообщении приводятся подробные данные по датам прилёта в разные пункты заповедника за период 1985-2000 годов.

Полностью отлёт морянок из тундр к местам зимовок происходит в течение сентября. Последняя поздняя встреча этих птиц – 2 октября 2001 на Лукунском участке.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1116**: 845-847*

Весенний пролёт пластинчатоклювых в среднем течении реки Олёкмы

Д.И.Тирский

*Второе издание. Первая публикация в 2005**

Стационарные наблюдения за весенней миграцией пластинчатоклювых проводились в двух районах. В 1989-1993 и 1996-1998 годах постоянный наблюдательный пункт находился в охранной зоне заповедника «Олёкминский» в районе озера Сордонох, рядом находилось также два крупных и значительное количество мелких заливных озёр. В последующие годы (2000-2004) работы проводили на базе кордонов заповедника Тас-Хайко и Бедердях, расположенных в пойме Олёкмы. Наблюдения за пролётом велись на самой реке.

В местности Сордонох учёты велись с 28-30 апреля по 20-25 мая, на кордонах – с 25 апреля до окончания пролёта. Мигранты учитывались визуально (иногда с помощью бинокля) с наблюдательного пункта в

* Тирский Д.И. 2005. Весенний пролёт пластинчатоклювых в среднем течении реки Олёкма // *Гусеобразные птицы Северной Евразии: Тез. докл. 3-го международ. симп.* СПб.: 259-261.

фиксированное время: 5-7, 11-13 и 21-23 ч. По мере возможности учёты старались проводить ежедневно, в указанное время в течение всего периода пролёта. Отмечались: первое появление вида, начало пролёта, массовый пролёт, окончание пролёта, учитывалось общее количество птиц каждого вида. Возможно, полученные данные по количеству пролетевших птиц неполные, так как наблюдение велись только в светлое время суток.

Характеристика видового состава. Пластинчатоклювые птицы в районе исследования на весеннем пролёте представлены 24 видами. Только во время миграции встречаются: лебедь-кликун *Cygnus cygnus*, малый лебедь *Cygnus bewickii*, белолобый гусь *Anser albifrons*, пискулька *Anser erythropus*, чёрная казарка *Branta bernicla*, касатка *Anas falcata*, клоктун *Anas formosa*, горбоносый турпан *Melanitta deglandi*.

Залётные виды (за весь период наблюдений отмечались всего по 2-3 раза): серая утка *Anas strepera*, чёрная кряква *Anas poecilorhyncha*, морская чернеть *Aythya marila*.

В долине реки Олёкмы установлено гнездование 13 видов: гуменник *Anser fabalis*, свиязь *Anas penelope*, кряква *Anas platyrhynchos*, чирки свистунок *Anas crecca* и трескунок *Anas querquedula*, шилохвость *Anas acuta*, широконоска *Anas clypeata*, хохлатая чернеть *Aythya fuligula*, каменушка *Histrionicus histrionicus*, гоголь *Bucephala clangula*, луток *Mergellus albellus*, большой *Mergus merganser* и длинноносый *Mergus serrator* крохали. Все перечисленные размножающиеся виды являются наиболее характерными водоплавающими и составляют основную массу пролётных пластинчатоклювых.

Сроки миграций. Прослеживаются три довольно хорошо выраженных периода пролёта, с характерной интенсивностью и специфичным видовым составом.

В первый период (в среднем 25 апреля – 5 мая) пролетает небольшое число видов: кряква, гоголь, гуменник, лебедь-кликун; в конце периода появляются первые шилохвости и крохали. В это время появляются лишь первыепроталины, Олёкма вскрывается на перекатах, на заливных лугах днём появляется вода.

Во второй период (6-15 мая) повышается число пролётных крякв и гуменников, появляются первые небольшие (10-15 особей) табунки чирков и свиязей, в середине периода начинается массовый пролёт шилохвостей и белолобых гусей. В это время обычно вскрывается река Олёкма и многочисленные мелководные озёра.

В третий период (16-28 мая) пролетает основная масса чирков, свиязей, гоголей, широконосок, хохлатых чернетей. В середине периода заканчивается массовый пролёт шилохвости, в самом конце появляются каменушки и начинается пролёт горбоносого турпана. В целом заканчивается основной массовый пролёт водоплавающих птиц.

Таким образом, весенняя миграция пластинчатоклювых в районе исследования охватывает конец апреля, май и начало июня. В ходе миграции прослеживается изменение видового состава и численности пролётных птиц.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1116**: 847-849*

Гусеобразные птицы Anseriformes техногенных водоёмов Мордовии

С.Н.Спиридонов

*Второе издание. Первая публикация в 2005**

Регулярные круглогодичные исследования проводились в 1996-2005 годах на различных по площади, возрасту, технологическому назначению, зарастанию техногенных водоёмах Республики Мордовия. Были обследованы иловые площадки, водоёмы механической очистки и биологической доочистки, отстойники сахарного завода и птицефабрики.

Серый гусь *Anser anser*. Единственная встреча 26 особей зарегистрирована на осеннем пролёте в 1996 году в пойме реки Инсар близ иловых площадок Саранска.

Белолобый гусь *Anser albifrons*. Отмечен в апреле 1999 и 2000 годов во время весеннего пролёта над водоёмами доочистки Саранска.

Свиязь *Anas penelope*. На весеннем пролёте встречается ежегодно стаями по 10-30 птиц на техногенных водоёмах, где есть не заросшие растительностью участки воды. Отдельные птицы на водоёмах биологической доочистки задерживаются до конца мая. Осенью предпочитает те же стации, что и весной, но численность значительно ниже.

Серая утка *Anas strepera*. Одна особь была встречена в августе 1982 года на водоёмах биологической доочистки Саранска (Е.В.Лысенков, устн. сообщ.).

Чирок-свистунок *Anas crecca*. Встречается не ежегодно и только на техногенных водоёмах Саранска и на отстойниках сахарного завода. Одиночные самцы регистрировались здесь в 1999 и 2001 годах на весеннем пролёте. На водоёмах Саранска одиночные чирки-свистунки встречались в гнездовой период в 1999 и 2001, на весеннем пролёте в 1996-2000 годах.

---

* Спиридонов С.Н. 2005. Гусеобразные птицы техногенных водоёмов Мордовии // *Гусеобразные птицы Северной Евразии: Тез. докл. 3-го международ. симп.* СПб.: 248-250.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Самая обычная утка техногенных водоёмов на гнездовании и во время миграций. Первые пролётные особи появляются в середине марта – начале апреля стаями в 10-50 птиц. Гнездится на всех обследованных техногенных водоёмах. В последние годы регулярно остаётся на зимовку на техногенных водоёмах.

Шилохвость *Anas acuta*. Встречена в 1997 и 1999 годах во время весеннего пролёта. Стаи в 50-100 особей держались на водоёмах биологической доочистки, где кормились вместе с другими видами уток.

Чирок-трескунок *Anas querquedula*. На весеннем пролёте ежегодно встречается практически на всех водоёмах, придерживаясь заросших участков. На гнездовании зарегистрирован практически на всех водоёмах, особенно с зарослями трав и кустиками ив. Осенью пролёт выражен слабо, встречаются в основном одиночные птицы.

Широконоска *Anas clypeata*. В гнездовой период отмечена на водоёмах, где имеются густые заросли трав. Установлено гнездование на иловых площадках Саранска, отстойниках сахарного завода (Спиридонов 2003). Вероятно, гнездится на иловых площадках города Рузаевки и посёлка Торбеево. Во время миграций широконоска практически везде обычна.

Красноносый нырок *Netta rufina*. В Мордовии первая встреча вида (самца) зарегистрирована в гнездовой период 1980 года на отстойниках сахарного завода около посёлка Ромоданово (А.Е.Луговой, устн. сообщ.). Нами самец красноносого нырка отмечен 6 июня 1999 на прудах биологической доочистки, где он кормился вместе с хохлатыми и красноголовыми чернетями (Лапшин и др. 2003).

Красноголовый нырок *Aythya ferina*. В гнездовой период чаще встречается на водоёмах доочистки и отстойниках сахарного завода. Придерживается мелководных участков с водной и надводной растительностью. Во время миграций встречается ежегодно, более обычен весной.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. Гнездится на водоёмах биологической доочистки и иловых площадках Саранска, отстойниках сахарного завода посёлка Ромоданово (Лысенков и др. 2004). Во время сезонных миграций обычна. В некоторые зимы хохлатая чернеть остаётся на зимовку (Константинов, Спиридонов 2002).

Морская чернеть *Aythya marila*. Отмечалась на осеннем пролёте в 1997 и 1998 годах на водоёмах биологической доочистки. Одна птица была встречена на зимовке в 2002 году на водоёме доочистки.

Гоголь *Bucephala clangula*. Встречается только на водоёмах биологической доочистки. Наиболее обычен весной, в отдельные годы (1997) регистрируются стаи до 42 птиц. Осенью не ежегодно отмечаются одиночные птицы и небольшие стайки.

Луток *Mergellus albellus*. На обследованных водоёмах луток был

встречен на весеннем пролёте на водоёмах доочистки в 1999 и 2005 годах. Зимой 2000/01 года там же зарегистрировано 7 лутков.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1116**: 849*

Скалистый голубь *Columba rupestris* в Приморье

В.К.Рахилин

*Второе издание. Первая публикация в 1986**

В Приморье скалистый голубь *Columba rupestris* обитает постоянно в одних и тех же местах. В поисках корма иногда летает на расстояние до 25 км (то же характерно и для сизого голубя *Columba livia).* Гнездится на скалах морского побережья и нижнего течения рек. Колонии состоят из 15-20 пар.

С конца февраля голуби держатся парами. Добытая в марте самка имела функционирующую «молочную железу», что позволяет предположить наличие у неё птенцов; её гроздевидный яичник достигал больших размеров – 17×8 мм (4 наиболее крупных фолликула были по 3.5 мм). Птицы, добытые в мае, также имели хорошо развитые половые железы. Можно предположить, что в условиях Центрального Сихотэ-Алиня у скалистого голубя бывает не менее трёх выводков.

Птицы, добытые с марта по май, были в хорошем, не обношенном оперении и более чем нормальной упитанности. У половозрелых голубей, добытых в сентябре, происходила интенсивная линька всего мелкого оперения, начинающаяся с шеи, боков, ног и крыльев.

В желудках добытых скалистых голубей нами обнаружены семена горца, чины Давида, астрагала (в одном желудке более 150 шт.), злаков и бобовых, а также камешки, размером до 3 мм, от 36 до 55 штук.

* Рахилин В.К. 1986. Скалистый голубь (краткие сообщения) // *Редкие, исчезающие и малочисленные птицы СССР*. М.: 28-29.