ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2015
XXIV



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1175
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXIV

Экспресс-выпуск • Express-issue

2015 № 1175

СОДЕРЖАНИЕ

2801-2816 Регистрация новых и редких видов птиц на южных Курильских островах в 2008-2015 годах. М.А.АНТИПИН, И.Г.БОБЫРЬ, А.А.ЯКОВЛЕВ

2817-2820 К кормовому поведению белохвостого песочника *Calidris temminckii*. В.В.ХРОКОВ

2820-2821 Встреча гаршнепа *Lymnocryptes minimus* в Мордовии. О.В.ЕРЁМИН, С.Н.СПИРИДОНОВ

2822-2825 Материалы по новым и малоизученным видам птиц Ханкайского заповедника. Е.А.ВОЛКОВСКАЯ-КУРДЮКОВА

2825-2826 Первая регистрация сирийского дятла *Dendrocopos syriacus* на востоке Тамбовской области. А.Н.ГУДИНА

2826-2833 Фауна куликов окрестностей Анадыря в период весенних миграций. Д.В.НАУМКИН, Е.В.ГОЛУБЬ

2833 Первая находка длиннохвостой неясыти *Strix uralensis* на гнездовании в ленточных борах Казахстана. Ф.Ф.КАРПОВ, А.С.ЛЕВИН

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2015
Дата опубликования: 13 августа 2015

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992
Volume XXIV
Express-issue
2015 № 1175

CONTENTS

2801-2816 Registrations of new and rare species of birds in the southern Kuril Islands in 2008-2015. M.A.ANTIPIN, I.G.BOBYR, A.A.YAKOVLEV

2817-2820 By the feeding behavior of the Temminck's stint *Calidris temminckii*. V.V.KHROKOV

2820-2821 The record of the jack snipe *Lymnocryptes minimus* in Mordovia. O.V.EREMIN, S.N.SPIRIDONOV

2822-2825 Materials on new and little known species of birds of the Khanka Reserve. E.A.VOLKOVSKAYA-KURDYUKOVA

2825-2826 The first registration of the Syrian woodpecker *Dendrocopos syriacus* in the east of the Tambov Oblast. A.N.GUDINA

2826-2833 Fauna of waders in neighborhoods of Anadyr during spring migration. D.V.NAUMKIN, E.V.GOLUB

2833 The first finding of the Ural owl *Strix uralensis* nesting in pine forest belts of Kazakhstan. F.F.KARPOV, A.S.LEVIN

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2015

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1175**: 2801-2816*

Регистрация новых и редких видов птиц на южных Курильских островах в 2008-2015 годах

М.А.Антипин, И.Г.Бобырь, А.А.Яковлев

Максим Александрович Антипин. Национальный парк «Берингия», Набережная Дежнева д.10, пгт.Провидения, Чукотский АО, Россия, 689251. E-mail: merops@mail.ru
Игорь Германович Бобырь. Заповедник «Курильский», ул. Заречная, 5, пгт. Южно-Курильск, Сахалинская область, 694500. E-mail: ostrova.bobyr@gmail.com
Александр Алексеевич Яковлев. Чувашское отделение СОПР, ул. Новая, 21, с. Синьялы, Чебоксарский район, Чувашская Республика, 428014. E-mail: Ekoasio@yandex.ru

Поступила в редакцию 11 августа 2015

В статье приводится информация о встречах 7 новых для Южных Курил и 25 редких и залётных видов птиц, отмечавшихся в 2008-2015 годах на островах Кунашир и Шикотан. Информация собрана во время плановых, а также кратковременных орнитологических учётов, проводимых в рамках среднесрочной программы работ в сфере научных исследований и экологического мониторинга заповедника «Курильский».

Малая поганка *Tachybaptus ruficollis poggei* Reichenow, 1902. Редкий гнездящийся вид. Две птицы регистрировались на озере Весловское 24 сентября 2009, на пруду в посёлке Головнино – с 22 апреля 2011 по 26 октября 2011 (одновременно до 7 птиц: 2 взрослые, 5 молодых), на озере Песчаное 19 ноября 2010 – 1 птица, на мысе Весло 8 мая 2012 – 2 птицы. Ранее малая поганка отмечалась и на островах Малой Курильской гряды: Юрий и Танфильева (Нечаев 1969).

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis* C.L.Brehm, 1831. Редкий вид, отмечающийся в период сезонных миграций. Впервые достоверно отмечен на южных Курильских островах 19 ноября 2011 на озере Песчаное (остров Кунашир). В 2009-2010 годах инспекторы по охране территории заповедника «Курильский» сообщали о встречах птиц, по описанию похожих на черношейную поганку – осенью на озере Горячее. За весь период наблюдений вид регистрировался только осенью (рис. 1). Самая ранняя встреча – 21 сентября 2013 в устье реки Серноводки. Предположительно, птицы могут держаться на озере Песчаное до конца первой декады декабря. Наибольшее число – 220 особей отмечено на Песчаном 6 ноября 2012.

Кваква *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758). Впервые птица этого вида встречена на южных Курильских островах 31 июля 2014 (рис. 2). Кваква сидела на берегу реки Серебрянки (посёлок Южно-Курильск) около автомобильной дороги.



Рис. 1. Черношейная поганка *Podiceps nigricollis* на озере Песчаное (Кунашир). 18 ноября 2013. Фото М.А.Антипина.



Рис.2. Кваква *Nycticorax nycticorax* над рекой Серебрянкой в Южно-Курильске, 31 июля 2014. Фото М.А.Антипина.

Египетская цапля *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758). Редкий залётный вид. Пара египетских цапель отмечалась 9 июня 2011 в районе посёлка Отрадное (рис. 3). Одна ослабленная птица была подобрана пограничниками в Южно-Курильском проливе 12 мая 2014, 17 июня 2015 две особи встречены в устье реки Филатова на Кунашире. До 1992 года египетская цапля регулярно регистрировалась на Кунашире и Шикотане с апреля по октябрь, в августе-сентябре 2002 одна особь держалась в районе села Лагунное на Кунашире (Ушакова 2004).

Восточная белая цапля *Casmerodius (albus) modestus* (J.E. Gray, 1831). Залётный, регулярно встречающийся вид. За период наблюдений регистрировалась на Кунашире (рис. 4) и Шикотане (рис. 5) каждый год. Крайние даты встреч: 2 апреля 2013 на реке Серебрянке в Южно-Курильске, 23 ноября 2012 – там же. Больше всего встреч заре-

гистрировано в 2012 (всего 17 встреч: в июне, июле, сентябре, ноябре), а также в 2013 году (всего 16 встреч: в апреле, мае, июне, августе). Чаще всего восточных белых цапель отмечали на Кунашире в районе среднего течения русла реки Серебрянки, на Шикотане – в бухтах Анама и Отрадная. Самое больше число одновременно встреченных птиц – пять – зарегистрировано 18 апреля 2013 в районе реки Серебрянки (Кунашир). Значительная часть информации о встречах вида, собираемых инспекторами на Шикотане и островах Малой Курильской гряды, не поступает в базы данных.



Рис. 3. Египетские цапли *Bubulcus ibis* в районе посёлка Отрадное на Кунашире. 9 июня 2011. Фото М.А.Антипина.



Рис. 4. Восточные белые цапли *Casmerodius modestus* в среднем течении реки Серебрянка на окраине Южно-Курильска. 13 ноября 2012. Фото М.А.Антипина.



Рис. 5. Восточная белая цапля *Casmerodius modestus* в селе Крабозаводское (остров Шикотан). 31 мая 2013. Фото А.А.Яковлева

Чёрная казарка *Branta (bernicla) nigricans* (Lawrence, 1846). Встречается на Кунашире регулярно в период сезонных миграций. Отмечены первые случаи пребывания чёрных казарок зимой в заливе Измены и на озере Весловское: 25 января 2014 (Антипин 2014), 7 февраля 2015. В летний период одна птица отмечалась единственный раз – 18 июня 2015 на озере Весловское. Крайние даты наблюдений на Кунашире, Шикотане и островах Малой Курильской гряды с 1987 по 2015 год: с 25 марта – 12 мая, с 7 сентября – 24 декабря. Наибольшая численность в акватории полуострова Весловский (594 особи) отмечены 11 апреля 2015, 522 особи зарегистрированы там же 3 мая 2014.

Касатка *Anas falcata* Georgi, 1775. Редкий вид, встречающийся в период сезонных миграций. Впервые на территории России отмечена в зимний период 7 февраля 2015 в районе озера Весловское – всего 5 особей (рис. 6). Одиночные птицы ранее отмечались на этом озере 6 мая 2012, в районе устья реки Ночки – 9 мая 2013. Группа из 3 самцов и 4 самок кормилась в бухте Отрадная на острове Шикотан 5 июня 2013. Ранее касатка отмечалась: на озере Горячее – 20 июня 1988, вблизи устья реки Саратовской – 16 июля 1988 (Годовой отчёт 2002).

Луток *Mergellus albellus* Linnaeus, 1758. Редкий вид, встречающийся в период сезонных миграций. Регистрировался только на Кунашире. Крайние даты встреч лутка за весь период исследований: 7 апреля 2012, 22 апреля 2011, 2 октября 2011, 1 декабря 2010. Основные места встреч: озёра Глухое и Песчаное, река Серноводка, озеро Весловское (Кунашир). Наибольшее число одновременно встреченных птиц (до 8

особей) отмечено 18 ноября 2011 и 18 ноября 2013 на озере Песчаное. До этого последняя встреча лутка на Кунашире описывается только Нечаевым (1969).



Рис. 6. Касатки *Anas falcata* над озером Весловское (остров Кунашир). 7 февраля 2015. Фото М.А.Антипина.

Малый перепелятник *Accipiter gularis* (Temminck et Schlegel, 1844). Редкий гнездящийся вид. 17 июня 2013 беспокоящаяся пара встречена в ельнике в окрестностях села Крабозаводское на Шикотане (рис. 7). Ранее этот вид на этом острове не регистрировался (Нечаев 1969). Одиночные птицы наблюдались на Кунашире 26 сентября 1984 в устье реки Лесной, 30 сентября 1984 в долине реки Илюшина (Годовой отчёт 2002).



Рис. 7. Беспокоящийся малый перепелятник *Accipiter gularis* 17 июня 2013. Фото А.А.Яковлева.

Немой перепел *Coturnix japonica* Temminck et Schlegel, 1849. Редкий залётный вид. 1 июня 2013 одна птица отмечена на полуострове Димитрова (остров Шикотан), 4 мая 2015 встречены 2 особи (рис. 8) в основании полуострова Весловский на Кунашире.



Рис.8. Немой перепел *Coturnix japonica*, встреченный на полуострове Весловский (Кунашир) 4 мая 2015. Фото И.Г.Бобыря.

Водяной пастушок *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758. Впервые отмечен на острове Полонский (Малая Курильская гряда) 10 мая 2002 (Ушакова 2003). На Шикотане 3 июня 2013 одиночная особь вспугнута с заболоченного луга на окраине села Крабозаводское, токующий ночью самец встречен на окраине посёлка Малокурильское 16 июня 2013.

Лысуха *Fulica atra* Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся вид. Крайние даты встреч на Кунашире за период исследований: 12 апреля 2010, 29 ноября 2014. Молодых нелетающих птиц встречали на пруду в посёлке Головнино, а также на пресных озёрах в районе мыса Весло. По сообщению охотников, лысухи периодически отмечались и на Шикотане около села Крабозаводское. Скопления лысух (до 50 особей) ежегодно отмечается на озере Песчаное (Кунашир) в первой и второй декадах ноября (рис. 9). Первый факт встречи и гнездования лысухи на южных Курильских островах зарегистрирован в августе 1997 года в посёлке Головнино (Годовой отчёт 2002). Позже, 5 октября 2000, одну птицу отмечали в устье реки Серноводки (Годовой отчёт 2002).

Малый зуёк *Charadrius dubius* Scopoli, 1786. Редкий пролётный вид (Нечаев, Фудзимаки 1994). 3 и 4 июля 2013 пара зуйков (рис. 10) встречена в кальдере Головнина на берегу озера Кипящее (Кунашир). При приближении птицы беспокоились, наблюдалось отвлекающее поведение, что свидетельствует о возможном гнездовании. 5 июня 2014 одна птица отмечалась на морском побережье в районе дачного посёлка

Третьяково (Кунашир). Ранее одна птица регистрировалась 25 апреля 2002 в нижней части посёлка Южно-Курильск, 25 мая 2002 у устья реки Песчанки кормились 4 птицы (Ушакова 2004).



Рис. 9. Лысухи *Fulica atra* 18 ноября 2013 на озере Песчаное (Кунашир). Фото М.А.Антипина.



Рис. 10. Малый зуёк *Charadrius dubius* на берегу озера Кипящее (Кунашир). 4 июля 2013. Фото А.А. Яковлева.

Ходулочник *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный вид, отмечающийся в весенний и летний периоды. Самая ранняя весенняя дата встречи за время исследований – 26 апреля 2014 в среднем течении реки Серебрянки, самая поздняя летняя – 21 августа 2011 в устье этой реки. Ходулочник отмечался на Кунашире в 2010-

2012 и 2014 годах. В указанный период регистрировались только одиночные особи. Места встреч на острове Кунашир – как правило, приустьевые участки рек: Серебрянка (рис. 11), Серноводка, Саратовская, Белкина. Ранее на Кунашире ходулочника отмечали: 26 апреля 2002 в районе мыса Алехинский (Ушакова 2004), 4 мая 2005 на полуострове Весловский (2 особи), 20 мая 2006 в устье Серноводки (Летопись 2005, 2006).



Рис. 11. Ходулочник *Himantopus himantopus* в устье реки Серебрянки. 10 мая 2014. Фото М.А.Антипина

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus osculans* Swinhoe, 1871. Предположительно, кулик-сорока (2 особи) встречен 5 мая 2012 в устье реки Саратовской (по сообщению инспектора В.Е.Карпова). 18 июня 2015 на полуострове Весловский встречена 1 особь. Ранее вид регистрировался на Кунашире 8-24 июня 1982 (Нечаев, Фудзимаки 1994).

Турухтан *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758). Редкий вид, встречающийся в период сезонных миграций. За период наших исследований наблюдался дважды: 8 сентября 2011 одна птица отмечена на озере Весловское, 21 августа 2012 группа из 6 птиц кормилась на мысе Весло на Кунашире. Ранее (17 сентября 1986) один турухтан был добыт на острове Шикотан (Дыхан 1990).

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* (Linnaeus, 1758). Редкий вид, встречающийся в период сезонных миграций. Отмечен за период исследований один раз – 20 сентября 2013 в районе мыса Весло наблюдались 2 особи.

Восточная тиркушка *Glareola maldivarum* J.R. Forster, 1795. Вид, ранее не отмечавшийся на Кунашире и Шикотане, но периодически встречающийся на северном Хоккайдо (Brazil 1991). 26 мая 1934 отмечался на Итурупе (Yamashina 1941). Одна молодая птица регистрировалась с 16 по 19 августа 2009 на песчаном пляже в районе устья реки Тятина. Взрослая птица встречена 7 июля 2010 (Летопись 2010) недалеко от устья реки Филатова. Птица определена по фотографии (фотоархив В.Д.Медыниной).

Серокрылая чайка *Larus glaucescens* J.F. Naumann, 1840. Редкий вид, встречающийся в период сезонных миграций. Зимует в акватории Южных Курил. За время наблюдений одиночные чайки регистрировались нами 14 февраля 2013 в порту Южно-Курильска, 26 мая 2013 (рис. 12) на побережье в окрестностях Южно-Курильска, 5 октября 2013 на мысе Четверикова (Кунашир), 6 декабря 2014 на береговой полосе Тофицкого рейда (Кунашир). 8 января 2014 в проливе между островами Зелёный и Полонского отмечено 4 птицы. Ранее серокрылая чайка регистрировалась 14 апреля 1991 на полуострове Весловский, 12 мая 1991 в устье реки Головнина на острове Кунашир. 10 птиц отмечено в бухте Головнина 25 марта 1992 (Годовой отчёт 2002), там же одна птица отмечена 11 марта 2002.



Рис. 12. Серокрылая чайка *Larus glaucescens* отдыхает на морском побережье в окрестности Южно-Курильска (Кунашир) среди тихоокеанских чаек *L. schistisagus* и молодых бургомистров *L. hyperboreus*. 26 мая 2013. Фото А.А.Яковлева.

Белощёкая крачка *Chlidonias hybridus javanicus* (Horsfield, 1822). На южных Курильских островах отмечена впервые 23 июня 2014 (рис. 13). Птица вылавливала водных беспозвоночных в луже около посёлка Отрадное на Кунашире. Одна птица встречена 26 августа 2014 (рис. 14) на пресных озёрах в районе мыса Весло на Кунашире.



Рис. 13. Белощёкая крачка *Chlidonias hybridus javanicus* вылавливает беспозвоночных в луже около посёлка Отрадное на Кунашире. 23 июня 2014. Фото М.А.Антипина.



Рис.14. Белощёкая крачка *Chlidonias hybridus javanicus* на мысе Весло. 26 августа 2014. Фото М.А.Антипина.

Ошейниковая совка *Otus bakkamoena semitorques* Temminck et Schlegel, 1844. Редкий гнездящийся, частично оседлый вид. Подтвер-

ждено гнездование вида на острове Шикотан 23 апреля 2013 (Антипин 2014а). Токующую совку отмечали в районе мыса Алехина 23 апреля 2010. В осенне-зимний период одиночные птицы отмечались в Южно-Курильске: 3 февраля 2012, 28 ноября 2014. Ранее на Кунашире ошейниковая совка отмечалась в районе мыса Четверикова (май-июнь 1986), около мыса Алехина (в первой декада июля 1986, в июне 1991 года), в кальдере вулкана Головнина (30 мая 1991, в августе 1992, 27 сентября 2000) (Годовой отчёт 2002).

Удод *Upupa epops* Linnaeus, 1758. Редкий залётный вид. Одна особь регистрировалась 12 апреля 2010 на полуострове Весловский, 22 ноября 2011 и 12 апреля 2012 в районе Южно-Курильска. Ранее удод отмечался единожды на острове Шикотан 4 апреля 1987 (Дыхан 1990).



Рис.15. Вертишейка *Jynx torquilla* в селе Крабозаводское.
1 июня 2013. Фото А.А.Яковлева.

Вертишейка *Jynx torquilla japonica* (Bonaparte, 1850). Редкий гнездящийся вид, встречающийся на островах Кунашир и Шикотан (Нечаев, Фудзимаки 1994). За период наших исследований вертишейка встречена на Кунашире только в 2013 и 2014 годах. С 28 мая по 6 июня 2013 токующего самца наблюдали в нижней части Южно-Курильска. 5 июня 2013 токующего самца видели в районе кордона «Тятинский» недалеко от устья реки Тятина. 13 сентября 2013 одна вертишейка отмечена в районе кордона «Ивановский» (43°50'23.36" с.ш., 145°24'40.81" в.д.), 14 июля 2014 одна птица держалась в районе кордона «Саратовский», недалеко от устья Саратовской, 17 августа 2014 одна птица отмечена в районе озера Глухое. На Шикотане в июне 2013 года вертишейка была относительно обычна (рис. 15), кочующие птицы встречались в различных частях острова. Первая встреча 29 мая 2013 в долине реки Горобец, 1 июня 2013 токующие 2 самца встречены в Крабозаводском на опушках ольховников. Большинство встреченных

вертишеек держались среди ольховника в долинах речек и в одиночных елях в горной части. 21 июня 2013 птица токовала на мысе Анама среди скал и зарослей можжевельника Саржента. В более ранних орнитологических отчётах заповедника «Курильский» есть информация о встрече нескольких токующих самцов в районе Южно-Курильска в июне-июле 1983 года (Годовой отчёт 2002).

Рыжепоясничная ласточка *Cecropis daurica* (Laxmann, 1769). На южных Курильских островах отмечена впервые. Всего зарегистрировано три встречи, вероятно, одной и той же птицы: 5, 25 и 27 июня 2013 (рис. 16) в селе Кравозаводское на Шикотане. Птица кормилась в стае с деревенскими ласточками *Hirundo rustica*.



Рис.16. Рыжепоясничная ласточка *Cecropis daurica* в селе Крабозаводское. 27 июня 2013. Фото А.А.Яковлева.

Серый сорокопут *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758. Редкий вид, встречающийся в период сезонных миграций. Одна особь отмечена 1 декабря 2010 недалеко от посёлка Третьяково на Кунашире. Ранее, зимой 1990/91 года, указывается встреча серого сорокопута в районе кордона «Тятинский», недалеко от устья Тятины (Годовой отчёт 2002).

Краснощёкий скворец *Sturnia philippensis* (J.R.Forster, 1781). Малочисленный гнездящийся вид (Нечаев, Фудзимаки 1994). 26 мая 2014 одна птица наблюдалась на окраине Южно-Курильска. 5 июня 2013 (рис. 17) в Крабозаводском (Шикотан) 4 краснощёких скворца обследовали деревянные строения и столбы. Ранее, в 1991, эти скворцы

регистрировались в посёлке Головнино: 17 мая – 2 птицы, 20 мая – 3 птицы, 21 мая – 1 птица. 4 июня 1991 отмечено гнездование пары краснощёких скворцов в Головнино, где 4 июля отмечены птенцы (Годовой отчёт 2002).



Рис.17. Краснощёкие скворцы *Sturnia philippensis* в поисках мест гнездования в селе Крабозаводское (Шикотан). 5 июня 2013. Фото А.А.Яковлева.



Рис. 18. Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris* в группе серых скворцов *Sturnus cineraceus* на окраине посёлка Отрадное. 24 апреля 2014. Фото М.А.Антипина.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758. Впервые отмечен на южных Курильских островах 24 апреля 2014 (рис. 18) недалеко от посёлка Отрадное на Кунашире. Птица держалась в стае серых скворцов *Sturnus cineraceus*.

Грач *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758. Редкий случайно залётный вид. Три кормящиеся птицы были встречены на проталинах в центре

Южно-Курильска 13 марта 2014 (рис. 19). Впервые грачи (всего 150 особей) на Кунашире были отмечены 26 марта 2002 (Ушакова 2004).

Короткопалый бюльбюль *Microscelis amaurotis* (Temminck, 1830). Редкий залётный вид. Одиночная птица встречена инспектором заповедника В.М.Ольшевским 28 января 2008 в районе рыборазводного ручья (южный берег озера Песчаное). Птица определена по фотографии. Ранее, 8 июля 1991, две птицы регистрировались в том же районе (Годовой отчёт 2002). С января по апрель 2003 года короткопалые бюльбюли регулярно регистрировались в окрестностях рек Саратовская и Андреевка, а также на мысе Ивановский (Ушакова 2004).



Рис.19. Грач *Corvus frugilegus* кормится на первых проталинах 13 марта 2014 в центре Южно-Курильска. Фото М.А.Антипина.

Сибирская горихвостка *Phoenicurus auroreus* (Pallas, 1776). Редкий залётный вид. Один токующий самец отмечен 2 июля 2014 на прибрежном участке экологической тропы «Столбовской» (44°00'45" с.ш., 145°40'42" в.д.). Ранее горихвостка регистрировалась 7 августа 2002 в окрестностях фумарольного поля вулкана Менделеева и 9 октября 2002 в окрестностях 13-го км автомобильной дороги «Южно-Курильск – Головнино» (Ушакова 2004).

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнездящийся вид (Нечаев, Фудзимаки 1994). За период исследований одна птица отмечалась в районе посёлка Головнино (Кунашир)12 мая 2010. Высокая численность дубоносов (до 50 особей в группе) наблюдалась в Южно-Курильске весной 2013 года с 26 марта по 28

мая (рис. 20). На Шикотане одиночная птица кормилась в Крабозаводском 29 мая 2013. До этого на Кунашире два дубоноса наблюдались 4 июля 1983 на сопке Вишневой, 9 октября 1984 отмечена группа из 4 особей у озера Серебряное (Годовой отчёт 2002).



Рис. 20. Группа дубоносов *Coccothraustes coccothraustes* кормится около жилых домов в Южно-Курильске. 29 марта 2013. Фото А.Гриценко.



Рис. 21. Лапландский подорожник *Calcarius lapponicus* на мысе Весло (Кунашир). 6 ноября 2013. Фото М.А.Антипина.

Лапландский подорожник *Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758). На Кунашире зарегистрирован впервые. Две особи встречены на мысе Весло 6 ноября 2013 (рис. 21). Ранее лапландский подорожник отме-

чался только на Итурупе (Yamashina 1939). На северном Хоккайдо подорожник регистрируется регулярно, преимущественно осенью (Brazil 1991).

Авторы выражают благодарность сотрудникам заповедника «Курильский», помогавшим в сборе материала: В.М.Ольшевскому, В.Е.Карпову., С.Е.Карпенко, а также В.Д.Медыниной, А.И.Лунеговой, В.А.Тихоновой и Е.А.Лаврушко за помощь в обработке материала и заполнении баз данных.

Литература

Антипин М.А. 2014. Встречи чёрной казарки на южных Курильских островах // *Казарка* **17**: 63-67.

Антипин М.А. 2014а. Гнездование ошейниковой совки (*Otus bakkamoena semitorques* Temminck et Shlegel, 1844: Strigiformes, Aves) на острове Шикотан, Южные Курильские острова // *Амур. зоол. журн.* **6**, 2: 211.

Дыхан М.Б. 1990. Новые сведения о птицах острова Шикотан (Малая Курильская гряда) // *Экология и распространение птиц юга Дальнего Востока*. Владивосток: 83-86.

Годовой отчёт Курильского заповедника «Летопись природы». 2002. Том о птицах на русском и японском языках (1984-1999 гг.). Южно-Курильск: 297.

Летопись природы. 2005. Фауна и животное население. Годовой отчёт Курильского заповедника. Т. 21. Южно-Курильск: 390.

Летопись природы. 2006. Фауна и животное население. Годовой отчёт Курильского заповедника. Т. 22. Южно-Курильск: 433.

Летопись природы. 2009. Фауна и животное население. Годовой отчёт Курильского заповедника. Т. 25. Южно-Курильск: 504.

Летопись природы. 2010. Фауна и животное население. Годовой отчёт Курильского заповедника. Т. 26. Южно-Курильск: 456.

Нечаев В.А. 1969. *Птицы Южных Курильских островов*. Л.: 1-246.

Нечаев В. А., Фудзимаки Ю. 1994. *Птицы Южных Курильских островов (Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи)*. Саппоро: 1-126.

Ушакова М.В. 2004. Новые сведения об авифауне южных Курильских островов // *Орнитология* **31**: 66-75

Ушакова М.В. 2003. К авифауне Малой Курильской гряды // *Биология и охрана птиц Камчатки* **5**: 106-109.

Brazil M. 1991. *Birds of Japan*. London: 1-466.

Yamashina Y. 1931. Die Vögel der Kurilen // *J. Ornithol*. **79**: 491-541

Yamashina Y. 1941. 22 new records of birds from the Japanese Islands // *Tori* 11 (51/52): 46-52.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1175**: 2817-2820*

К кормовому поведению белохвостого песочника *Calidris temminckii*

В.В.Хроков

Валерий Васильевич Хроков. Общество любителей птиц «Ремез», Аксай-2, 25-21, Алматы, 050031, Казахстан. E-mail: vkh.remez@mail.ru

Поступила в редакцию 10 августа 2015

В июле-сентябре 1979 и 1982 годов на водоёме-накопителе Сорбулак (Алматинская область) мной был собран небольшой материал по кормодобывательному поведению белохвостого песочника *Calidris temminckii*. Суммарное время проведённых наблюдений составило около 180 мин, в течение 37 мин прослежена интенсивность кормодобывания куликов. Наблюдения проводились с расстояния в 10-15 м от кормящихся птиц с использованием 8-кратного бинокля и секундомера.

Кормовыми биотопами белохвостым песочникам служат травянистые и грязевые мелководья, где они бродят на глубинах до середины цевки – середины голени, урез воды, толстый слой плавающих водорослей, реже – сухой берег среди невысокой травы в 1-2 м от воды.

Сходные места кормёжки белохвостых песочников отмечены мной и на Кургальджинских озёрах в 1969-1972 годах. По литературным данным, эти песочники предпочитают солончаковые и илистые, реже песчаные берега озёр и рек, сырые луговины (Шнитников 1949; Долгушин 1962; Козлова 1962).

Пищу добывают зондированием грязи или слоя водорослей, с поверхности водорослей и склёвывая с растений, а также с поверхности и из толщи воды, погружая клюв на треть, наполовину и даже полностью (табл. 1). Наблюдались песочники, собирающие корм в ямках от копыт коров и на луже у дороги. Зондирование осуществляется как разовое, так и многократное, путём погружения клюва по 2-4 раза в одно место, вибрируя им как отбойным молотком. При этом клюв втыкается в субстрат наполовину, целиком и до уровня глаз, как прямо перед собой, так и под разными углами – вперёд, вбок, под себя. По Е.В.Козловой (1962), белохвостые песочники часто схватывают открыто держащуюся добычу, реже извлекают её из грунта, а также ловят её в поверхностных слоях воды, нередко погружаясь по брюшко. Ф.Ф.Карпов (1995) однажды наблюдал кормовой приём «кошение воды», характерный для шилоклювок *Recurvirostra avosetta*.

Интенсивность кормодобывания в среднем составляет 71.4 (от 21 до 130) клевков в минуту. В июле и августе она составляла 69.3, в сентябре – 79.1 кл./мин. Наибольшую активность кулики проявляют в вечер-

ние и утренние часы (86.3 и 77.4 кл./мин, соответственно). Днём интенсивность кормодобывания не превышала 60.6 кл./мин. В штиль и сильный ветер кормовая активность мало различалась (табл. 2), хотя при ветре кулики более суетливы и пробегают иногда от 3 до 10 м без остановки. Обычно между клевками птицы делают от 1 до 3-4 шагов, проходя в минуту 0.5-1 м. Одна особь кормилась в течение 2 мин на участке в 1 м^2. По Ф.Ф.Карпову (1995), интенсивность кормодобывания в среднем составляет 64.3 кл./мин.

Таблица 1. Места добывания корма белохвостыми песочниками *Calidris temminckii*

Место кормёжки	Число клевков	%
С поверхности грязи и водорослей	1372	51.9
Зондирование грязи и водорослей	620	23.5
С поверхности воды	514	19.4
Из толщи воды	137	5.2
Итого:	2643	100

Таблица 2. Интенсивность кормодобывания у белохвостых песочников *Calidris temminckii*

Параметры	Количество		Клевков/мин	
	Минут	Клевков	min-max	Среднее
1. Июль	11	762	47-93	69.3
Август	18	1248	21-130	69.3
Сентябрь	8	633	38-109	79.1
2. Утро (7-10 ч)	7	542	57-93	77.4
День (12-16 ч)	19	1152	21-93	60.6
Вечер (17-20 ч)	11	949	40-130	86.3
3. Штиль, слабый ветер	25	1754	21-130	70.2
Сильный ветер	12	889	38-93	74.1
Итого:	37	2643	21-130	71.4

Эффективность кормодобывания белохвостых песочников не прослежена из-за мелких размеров кормовых объектов. Наблюдался один песочник, который вытянул из грязи червя длиной 1 см и сразу же проглотил его, не ополаскивая в воде.

На Кургальджине мною исследовано содержимое 8 желудков белохвостых песочников, в которых найдены остатки насекомых, в основном жесткокрылых Coleoptera. В одном желудке присутствовали жуки-водолюбы *Hydrous* sp., в другом – 29 личинок водолюбов Hydrophilidae, в третьем – остатки моллюска-катушки Planorbidae. В двух желудках обнаружены семена околоводных растений: осоки *Carex* sp. и рдеста *Potamogeton* sp. Во всех пробах были гастролиты – от 6 до 50 шт.

По литературным данным (Долгушин 1962; Козлова 1962; Cramp, Simmons 1983), белохвостые песочники едят насекомых и их личинок,

мелких моллюсков, червей и ракообразных. На озере Эльтон основу их рациона составляют личинки и куколки комаров-звонцов (Околелов и др. 2008). На юго-востоке Казахстана песочники кормились личинками и имаго солоноводных мух, хирономидами и клопами-гребляками, а также семенами горца и мари (Карпов 1995).

Кормятся белохвостые песочники поодиночке или разрозненными группами по 2-5 особей, часто в смешанных стайках с краснозобиками *Calidris ferruginea*, куликами-воробьями *Calidris minuta*, песчанками *Calidris alba*, грязовиками *Limicola falcinellus*, малыми *Charadrius dubius* и морскими *Ch. alexandrinus* зуйками, фифи *Tringa glareola*, круглоносыми плавунчиками *Phalaropus lobatus*.



Белохвостый песочник *Calidris temminckii*.
Озеро Сорбулак. Фото В.Федоренко.

Иногда наблюдались конфликты между конспецифичными особями при приближении их на 1-3 м друг к другу. Так, один песочник прогнал другого, кормившегося от него в 3 м, пробежав в его направлении около 2 м, после чего преследуемый перелетел через «хозяина участка» и сел на его место. В нескольких случаях только что подлетевшие кулики сразу прогоняли уже кормившуюся там особь. В начале августа наблюдалась драка двух взрослых птиц: стоя друг против друга, они с писком делали наскоки, раскрыв поднятые вверх крылья. Агрессивное поведение белохвостых песочников друг к другу неоднократно наблюдал Ф.Ф.Карпов (1995). В то же время С.Н.Ерохов (устн. сообщ.) однажды в августе видел, как один белохвостый песочник выпрашивал корм у другого, как птенец у родителя.

Межвидовые конфликты с участием белохвостых песочников наблюдались редко. Однажды кулик-воробей отогнал белохвостого песочника, приблизившегося к нему на 1 м. В середине сентября двух песочников поочерёдно изгонял со своего кормового участка агрессивный красношейка *Calidris ruficollis*, не давая одному приблизиться на 0.5-7 м, а другому даже приземлиться (Хроков и др. 1980). Подчинённое

положение белохвостых песочников во время межвидовых конфликтов отмечает и Ф.Ф.Карпов (1995). С другими видами куликов конфликтных ситуаций не возникало, птицы кормились порой бок о бок, в 5-10 см друг от друга. Отмечена реакция белохвостого песочника на внезапное появление пролетающего болотного луня *Circus aeruginosus:* кулик втянул голову, переднюю часть тела прижал к земле, а заднюю поднял вверх. Эта особь кормилась в течение 20 мин, затем 3 мин у неё ушло на отдых и чистку оперения.

Литература

Долгушин И.А. 1962. Отряд Кулики // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **2**: 40-245.

Карпов Ф.Ф. 1995. Кормовое поведение белохвостого песочника в период осенней миграции на юго-востоке Казахстана // *Selevinia* **1**: 66-68.

Козлова Е.В. 1962. *Ржанкообразные. Подотряд Кулики*. М.; Л.: 1-434 (Фауна СССР. Птицы. Т. 2. Вып. 1. Ч. 3).

Околелов А.Ю., Шубин А.О., Иванов А.П., Митина Г.Н., Сухарев Е.А., Кузнецова Е.М., Черев С.М. 2008. Влияние обилия корма на распределение пролётных куликов на озере Эльтон // *Достижения в изучении куликов Северной Евразии*. Мичуринск: 108-121.

Хроков В.В., Гаврилов Э.И., Ерохов С.Н. 1980. Песочник-красношейка – новый вид в фауне птиц Казахстана // *Изв. АН КазССР*. Сер. биол. 3: 82-83.

Шнитников В.Н. 1949. *Птицы Семиречья*. М.; Л.: 1-665.

Cramp S., Simmons K.E.L. (eds) 1983. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic*. Oxford Univ. Press, **3**: 1-913.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1175**: 2820-2821*

Встреча гаршнепа *Lymnocryptes minimus* в Мордовии

О.В.Ерёмин, С.Н.Спиридонов

*Второе издание. Первая публикация в 2011**

В Мордовии гаршнеп *Lymnocryptes minimus* – редкий пролётный, занесённый в Красную книгу вид. В конце XIX – начале XX веков у северных границ Мордовии гнездился и был обычен на пролёте (Житков, Бутурлин 1906). В середине XX века южная граница ареала, вероятно, сместилась к северу (Морозов 2003). За последние 100 лет в Мордовии достоверно отмечался дважды на осеннем пролёте. В 1968 году одна птица разбилась о провода ЛЭП около Мордовского запо-

* Ерёмин О.В., Спиридонов С.Н. 2011. Встреча гаршнепа *(Lymnocryptes minimus)* в Мордовии // *Тр. Мордовского заповедника им. П.Г.Смидовича* **9**: 282-283.

ведника (Гришуткин 2001) и в 1990-х годах гаршнеп добывался в Дубенском районе (Лысенков и др. 2005).

21 апреля 2010 гаршнеп впервые в Мордовии достоверно отмечен на весеннем пролёте. Во время охоты на бекасов *Gallinago gallinago* подняли на крыло пару гаршнепов, сидевших в 10-15 м друг от друга. Один из них случайно застрелен. Птица резко отличалась от бекасов своим прямолинейным полётом и размерами, человека подпустила на 2-3 м. В тот же день на этом лугу поднимали ещё двух гаршнепов.

Гаршнепы придерживалась заболоченного луга (около 3 га) с множеством осоковых кочек в 0.5 км к западу от села Нагорное Шенино Краснослободского района (54°19' с.ш., 43°51' в.д.). Луг расположен в пойме реки Мокши в 6 км от русла реки. С северной, западной и южной сторон он ограничен мелиоративными каналами с системой шлюзов, с восточной стороны примыкает к возвышенности. В марте-апреле луговина частично заливается талыми водами, но к маю уже полностью высыхает. На момент добычи гаршнепа луг был на 1/3 залит водой. Из воды торчали кочки с болотной и луговой растительностью. 22 апреля 2010 там же держалось ещё три гаршнепа.

Видовой состав птиц на лугу, где отмечены гаршнепы, был весьма разнообразен. Из утиных отмечены крупные скопления крякв *Anas platyrhynchos* и чирков-трескунков *Anas querquedula*. Из куликов доминировали бекасы *Gallinago gallinago*, которые отмечались постоянно в разных частях луговины, а также большой улит *Tringa nebularia*, черныш *Tringa ochropus*, чибис *Vanellus vanellus*. Регулярно отмечалась озёрная чайка *Larus ridibundus*. Из хищных птиц отмечены коршун *Milvus migrans*, перепелятник *Accipiter nisus*, канюк *Buteo buteo*. Из воробьиных встречены полевой жаворонок *Alauda arvensis*, желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola*, сорока *Pica pica*, серая ворона *Corvus cornix*, чёрный дрозд *Turdus merula*, деряба *Turdus viscivorus*, варакушка *Luscinia svecica*, ремез *Remiz pendulinus*, щегол *Carduelis carduelis*, камышовая овсянка *Schoeniclus schoeniclus*.

Литература

Житков Б.М., Бутурлин С.А. 1906. Материалы для орнитофауны Симбирской губернии // *Зап. Рус. геогр. общ-ва по общ. геогр*. **41**: 1-275.

Гришуткин Г.Ф. 2001. Птицы Мордовского заповедника // *Тр. Окского заповедника* **21**: 72-101.

Лысенков Е.В., Мещеряков В.В., Грико А.В. 2005. Гаршнеп // *Красная книга Республики Мордовия. Животные*. Саранск, **2**: 233.

Морозов В.В. 2003. Гнездовой ареал гаршнепа *(Lymnocryptes minimus)* в Европейской части России: состояние изученности и вероятная динамика // *Бюл. МОИП*. Отд. биол. **108**, 3: 17-24.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1175**: 2822-2825*

Материалы по новым и малоизученным видам птиц Ханкайского заповедника

Е.А.Волковская-Курдюкова

*Второе издание. Первая публикация в 2004**

Материал собран в 2002-2003 годах на многочисленных учётных маршрутах на территории и в буферной зоне государственного заповедника «Ханкайский», в восточной, южной и северно-восточной частях Приханкайской низменности (Спасский, Хорольский, Ханкайский и Кировский районы края). В результате этой работы нами были обнаружены два новых вида птиц для Ханкайского заповедника (Глущенко 1997): красноногий погоныш и японская зарянка; изменён статус ещё трёх: пятнистого сверчка, толстоклювой пеночки и индийской кукушки; расширены границы гнездового ареала в пределах Приханкайской низменности и, в частности, заповедника у сибирского конька и индийской камышевки; получены новые данные о пролёте чёрного журавля.

Красноногий погоныш *Porzana fusca*. Ранее достоверно на территории заповедника не отмечался (Глущенко 1997). Одна птица отмечена нами 18 сентября 2002 поздним вечером (в сумерках, около 19 ч) по характерному крику в окрестностях озера Корейское (Кировский район). Вид внесён в Красную книгу России.

Японская зарянка *Luscinia akahige*. В Приморском крае единственная встреча с этим видом известна для Сихотэ-Алинского заповедника (Волошина и др. 1999). Самец в необношенном оперении с остатками чешуйчатого рисунка на груди и боках тела встречен нами 10 мая 2003 в зарослях ивы на ирригационном канале (недалеко от военного авиационного полигона) между сёлами Сосновка и Лебединое (Спасский район).

Сибирский конёк *Anthus gustavi menzbieri* Shulpin, 1928. Границу гнездового ареала вида проводят вдоль восточного побережья озера Ханка до устья реки Сунгача (Глущенко 1981; Назаров 1981). По-видимому, этот же подвид (конёк Мензбира) обитает в Среднем Приамурье (Смиренский 1979 – цит. по: Назаров 1989). В Китае известно гнездование *A. g. menzbieri* на северном побережье озера Ханка (Cheng 1976). Сибирский конёк отмечен нами 10 июня 2003 по плавневым болотам вдоль русла реки Белой, притока Сунгачи (Кировский район).

* Волковская-Курдюкова Е.А. 2004. Материалы по новым и малоизученным видам птиц государствен-ного Ханкайского заповедника // *Научные исследования в заповедниках Дальнего Востока: Материалы 6-й Дальневост. конф. по заповедному делу*. Хабаровск: 67-70.

На маршруте по краю плавневых болот здесь было учтено 3 поющих самца на 2.84 км.

В восточной части Приханкайской низменности в настоящее время отмечена тенденция расселения сибирского конька на соседствующие с болотами многолетние залежи (брошенные уже около 12 лет), расположенные на рисовых системах, заросших преимущественно вейниками и напоминающие сырые вейниково-разнотравные луга. Найденное здесь 4 июня 2003 гнездо с 5 голыми птенцами располагалось под навесом полёгшего прошлогоднего вейника на участке выгоревшего пятнами травостоя. Численность *A. g. menzbieri* здесь в мае 2003 года составила 13 поющих самцов на 4 км маршрута. В северо-восточной части низменности в таких же по структуре и положению биотопах этот конёк не наблюдался, вероятно, в виду того, что здесь сплошные массивы полёгшего вейника не были затронуты пожарами.

Индийская камышевка *Acrocephalus agricola tangorum* La Touche, 1912. Известный район обитания этого вида: восточное и южное побережье озера Ханка (Глущенко 1981). В последние годы отмечается тенденция экспансии в северном направлении у трёх разных подвидов индийской камышевки от Северо-Запада России до Дальнего Востока (Антонов и др. 2003; Фефелов 2003). В северо-восточной части озера Ханка, в охранной зоне заповедника, поющий самец отмечен нами 11 июня 2003 в небольшом участке тростника на затянутых преимущественно дальневосточным вейником чеках давно недействующей рисовой системы, под плавневыми болотам вдоль русла реки Белой, притока Сунгачи (Кировский район).

В восточной части Приханкайской низменности также заметна тенденция заселения индийской камышевкой не только густых массивов тростника, но и относительно разреженных заболоченных вейниково-тростниковых зарослей. Так, 2 июня 2003 в подобной обстановке под селом Лебединное (охранная зона заповедника, Спасский район), примерно на 1 км маршрута было встречено 4 поющих самца.

Индийская кукушка *Cuculus micropterus*. Редкий пролётный и летующий вид Ханкайского заповедника (Глущенко 1997), возможно, размножается здесь. Поющий самец отмечался нами 10-11 июня 2003 в окрестностях села Павло-Федоровка (Кировский район) в подходящих для гнездования стациях, где отмечена высокая численность сибирского жулана *Lanius cristatus* – вида-воспитателя индийской кукушки (Нейфельдт 1959, 1963; Neufeldt 1966). Численность жулана здесь составляла 27/2-61/8 пар/км^2, или 4-9/1 пар/1 км маршрута.

Пятнистый сверчок *Locustella lanceolata*. В Южном Приморье распространён крайне неравномерно – в виде изолированных популяций и мелких поселений в горных заболоченных лиственничных лесах и прилежащих к ним заболоченных вейниковых редколесьях (Наза-

ренко 1971). В заповеднике рассматривается как летующий вид (Глущенко 1997). Нами получены серьёзные основания предполагать возможность гнездования пятнистого сверчка на некоторых, локальных участках Приханкайской низменности. Так, 18 июня 2003 при обследовании пойменных осоково-вейниковых и вейниково-разнотравных лугов среднего течения реки Мельгуновки (Ханкайский район) обнаружено довольно многочисленное поселение этого вида, где в подходящих местообитаниях в среднем учтено 2.6 поющих самца на 1 км маршрута (в общей сложности, найдено 18 разных самцов). В пользу возможного гнездования говорит встреча беспокоившейся на ограниченном участке пары сверчков. Кроме того, при повторном посещении этого района 6-8 июля 2003 мы нашли сверчков на тех же самых индивидуальных участках. Все три дня наших работ поющие самцы отмечались на одних и тех же территориях и у них была хорошо выражена суточная ритмика пения. Пятнистые сверчки в этом районе населяли довольно своеобразные биотопы – участки сырого вейниково-разнотравного с осокой луга, где вейник узколистный формировал не сплошные травостои, а был представлен в виде отдельных куртин, чередующихся с такими же по площади участками разнотравья, в отличие от певчего сверчка *Locustella certhiola*, который более тяготел к сплошным вейниковым зарослям у реки. Наличие разреженной древесно-кустарниковой растительности на участках пятнистых сверчков не играло определяющей роли, местами она была представлена лишь отдельными низкорослыми кустиками спиреи.

Толстоклювая пеночка *Phylloscopus schwarzi*. В бассейне озера Ханка известна как немногочисленный гнездящийся вид лишь для долины верхнего течения реки Комиссаровки (Глущенко и др. 1995). Толстоклювая пеночка найдена нами довольно обычной летом в среднем течении реки Мельгуновки (Ханкайский район) (1.5 поющих самца на 1 км маршрута), где населяет опушки ивовых и прочих древесно-кустарниковых зарослей вдоль водотоков в типичном агроландшафте. Эти местообитания более характерны для бурой пеночки *Ph. fuscatus*, которая в действительности здесь и преобладает (5.4 поющих самца на 1 км маршрута).

Чёрный журавль *Grus monacha*. Для территории Ханкайского заповедника рассматривается как случайных пролётный вид (Глущенко 1997), известны единичные встречи. 20 мая 2002 один чёрный журавль в стае из 32 даурских *Grus vipio* и стая из 7 чёрных журавлей наблюдались нами (совместно с Ю.Н.Глущенко) кормящимися на рисовых чеках под селом Лебединое (буферная зона заповедника, Спасский район). 23 мая 2002 летящая стая из 4 чёрных журавлей отмечена под селом Новосельское (Спасский район). 2 и 3 июня 2003 один чёрный журавль в стае из 34 даурских наблюдались на кормёжке на

брошенных рисовых полях под селом Сосновка (Спасский район). Ещё три чёрных журавля встречены 2 июня 2003 кормящимися на залитых рисовых чеках под селом Лебединое.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1175**: 2825-2826*

Первая регистрация сирийского дятла *Dendrocopos syriacus* на востоке Тамбовской области

А.Н.Гудина

*Второе издание. Первая публикация в 2010**

В Центральном Черноземье расселяющийся на восток сирийский дятел стал более или менее обычным, в том числе на гнездовании, только в Воронежской области (Белик 1999; Барышников 2001; Венгеров, Смирнов 2002; и др.). Вместе с тем, в Воронежском заповеднике этот вид зарегистрирован только 15 июня 2005 (Венгеров, Лихацкий 2008). В Курской области сирийский дятел впервые отмечен 23 августа 2005 в Обоянском районе (Власов 2005), в Центрально-Чернозёмном заповеднике – 14 апреля 2007 (Власов, Миронов 2008). В Липецкой области эта птица впервые обнаружена 5 февраля 2005 в городе Грязи (Сарычев 2009). Этот город находится всего в 10 км от границы с Тамбовской областью. Однако на территории Тамбовщины сирийский дятел пока ни разу встречен не был (Лада, Соколов 2007).

30 января 2010 пара сирийских дятлов встречена нами в районном посёлке Инжавино. В первый после сильных крещенских морозов тёплый день птицы в течение нескольких часов (примерно с 13 до 16 ч) держались в одном из приусадебных садов на Ленинградской улице. Самец периодически вылетал из сада с сохранившимися плодами фруктовых деревьев (яблоки или сливы) и долбил их, усаживаясь на уличном столбе. До 8 февраля 2010 (включительно) эти дятлы почти ежедневно наблюдались в радиусе 150 м от места первой встречи.

Литература

Барышников Н.Д. 2001. Сирийский дятел – новый гнездящийся вид Воронежской области // *Орнитология* **29**: 292.

* Гудина А.Н. 2010. Первая регистрация сирийского дятла *Dendrocopos syriacus* (Hemprich et Ehrenberg, 1833) на востоке Тамбовской области // *Науч. вед. Белгород ун-та*. Сер. естеств. науки **10**, 3: 45-46.

Белик В.П. 1999. Заметки о летней авифауне Воронежской области и прилежащих районов // *Редкие виды птиц и ценные орнитологические территории Центрального Черноземья*. Липецк: 66-69.

Венгеров П.Д., Лихацкий Ю.П. 2008. Птицы // *Позвоночные животные Воронежского заповедника*. Воронеж: 19-61.

Венгеров П.Д., Смирнов С.В. 2002. О гнездовании сирийского дятла в городе Воронеже и Воронежской области // *Роль особо охраняемых природных территорий Центрального Черноземья в сохранении и изучении биоразнообразия лесостепи: Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Воронежского заповедника*. Воронеж: 25-26.

Власов А.А. 2005. Сирийский дятел – новый вид птиц Курской области // *Соколья Дубрава: Альманах Центрально-Чернозёмного заповедника о природе Курской области* **3**: 15.

Власов А.А., Миронов В.И. 2008. *Редкие птицы Курской области*. Курск: 1-126.

Лада Г.А., Соколов А.С. 2007. Отряд Дятлообразные Piciformes // *Позвоночные Тамбовской области: Кадастр*. Тамбов: 145-150.

Сарычев В.С. 2009. Сирийский дятел – *Dendrocopos syriacus* Hemprich et Ehrenberg, 1833 // *Позвоночные Липецкой области: Кадастр*. Воронеж: 265.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1175**: 2826-2833*

Фауна куликов окрестностей Анадыря в период весенних миграций

Д.В.Наумкин, Е.В.Голубь

*Второе издание. Первая публикация в 2012**

Окрестности Анадыря в настоящее время остаются недостаточно изученными в орнитологическом отношении, особенно по сравнению с другими регионами крайнего Северо-Востока России: Чукотским полуостровом и северным побережьем Чукотки в районе Колючинской губы. Наиболее детальные и продолжительные орнитологические исследования этой территории связаны с именем Л.А.Портенко (1939), они относятся к 1930-м годам. В дальнейшем окрестности Анадыря посещались орнитологами в основном эпизодически, информация о куликах, встреченных здесь, представлена в ряде работ (Кирющенко 1973; Колонин 1980; Кищинский, Томкович, Флинт 1983; Кречмар, Андреев, Кондратьев 1991; Дорогой 1993, 1994, 1997; Сыроечковский-мл. и др. 2004). Наши наблюдения в какой-то степени дополняют имеющуюся информацию и характеризуют фауну куликов в миграционный период на рубеже веков – они проводились в мае-июне 1996-2001 годов.

* Наумкин Д.В., Голубь Е.В. 2012. Фауна куликов окрестностей г. Анадыря в период весенних миграций // *Вестн. Перм. ун-та*. Биол. 1: 13-17.

Материал и методы исследований

Район наблюдений – ближайшие окрестности города Анадыря, административного центра Чукотки. Он включает нижнее течение реки Казачки от устья до водохранилища, побережье Анадырского лимана, близлежащие сопки Михаила и Дионисия. Основной тип растительности здесь – заболоченные кочкарные осоково-пушицевые тундры с фрагментами сухих мохово-лишайниковых и щебнистых тундр по возвышенным местам и зарослями ольхи и ив на склонах сопок и на побережье лимана. Широко распространены ягодные кустарнички (голубика, морошка, шикша, арктоус). В пойме Казачки многочисленны термокарстовые озёра с арктофилой и водяной сосенкой. В целом пригородные тундры подвержены заметной антропогенной трансформации (Наумкин, Голубь 2009).

Кулики составляют значительную часть местного населения птиц как в миграционные, так и в репродуктивный периоды. В весеннее время некоторые многочисленные стайные виды – камнешарка, турухтан, чернозобик – становятся особенно заметным элементом природной среды пригородных ландшафтов. За время наблюдений нами были отмечены встречи 20 видов. Для 11 из них в районе исследований установлено или предполагается гнездование.

Птиц учитывали визуально, с помощью 7-10-кратных биноклей, в оптимальных для этого погодных условиях. Некоторые виды отмечены по голосам. Оценки численности в большинстве случаев абсолютные – приводится количество одновременно наблюдаемых особей. Пересчёт численности на единицу площади мы не производили. Наблюдения вели с первой декады мая до конца июня. Наиболее ранние учёты выполнены 9 мая 1997, наиболее поздние – 30 июня 1996. Большинство учётов проведены в последние числа мая и в самом начале июня. Гнездование в большинстве случаев лишь предполагается по косвенным признакам, либо подтверждено литературными данными; гнездовой сезон наблюдениями почти не охвачен по независящим от нас причинам (поэтому данная работа отнюдь не претендует на исчерпывающую полноту информации). Общее время наблюдений составило около 100 ч. Русские и латинские названия, порядок перечисления видов даны по: Коблик, Редькин, Архипов 2006.

Результаты исследований

Тулес *Pluvialis squatarola*. По наблюдениям Л.А.Портенко (1939), тулес в окрестностях Анадыря был редок, единично встречался в прибрежных тундрах. То же значительно позднее отмечал С.П.Кирющенко (1973). Мы видели тулеса лишь однажды – 1 июня 2000 одиночная птица пролетела над окружной дорогой на окраине города (совместные наблюдения с П.С.Томковичем).

Бурокрылая ржанка *Pluvialis fulva*. Обычный на пролёте, немногочисленный гнездящийся вид. Статус пребывания на описываемой территории не изменился с 1930-х годов (Портенко 1939). Гнездится в окрестностях посёлка Шахтёрский (Кирющенко 1973), у сопки Дионисия, ежегодно встречается на окраинах Анадыря. Наиболее ранняя встреча – токующая птица отмечена 18 мая 1997, а уже 25 мая 1997 на правобережье реки Казачки (между рекой и морским берегом) наблюдали стайки до 10 птиц. В 1998 году ржанки впервые отмечены лишь 31 мая в количестве 4-5 пар, в 2000 – только 1 пара 1 июня.

Галстучник *Charadrius hiaticula*. Немногочисленный гнездящийся вид (Кречмар, Андреев, Кондратьев 1991). Обычно наблюдали пары. Как правило, они появляются в последних числах мая: в 1998 году – 27 мая, в 1999 – 23 мая, в 2000 – 23-24 мая. Гнездится у подножия сопки Дионисия – 28 июня 1997 встретили активно отводящую птицу.

Монгольский зуёк *Charadrius mongolus*. Малочисленный, вероятно, гнездящийся вид. Встречается не ежегодно. 30 июня 1996 пара зуйков активно отводила от гнезда, расположенного где-то на склоне насыпи окружной дороги на окраине города. Здесь же в последующие годы держались отдельные птицы и пары (наблюдения 23 мая 1998, 24 мая 2000 и 1 июня 2000).

Камнешарка *Arenaria interpres*. Обычный гнездящийся, в отдельные годы многочисленный вид. Первое появление камнешарок у Анадыря отмечено 28 мая 1997, 26 мая 1998, 27 мая 1999, 1 июня 2000. В 1997 году мы наблюдали лишь единичных птиц, держащихся в стайках турухтанов. В 1998-1999 годах камнешарки были самыми многочисленными из пролётных куликов. Кормящихся птиц ежедневно можно было видеть возле бывших ферм, в пойме реки Казачки, в селе Тавайваам по замусоренным местам. Способность этого вида кормиться на свалках отмечена в литературе (Рябицев 2001). Они держались стайками до 30-40 особей, общее число встреченных за часовую экскурсию достигало 150. Как и турухтаны, камнешарки использовали в качестве укрытий от непогоды территории складов металлолома и ГСМ.

Фифи *Tringa glareola*. Немногочисленный гнездящийся вид. Л.А. Портенко (1939) не встречал его у Анадыря, С.П.Кирющенко (1973) изредка отмечал единичных птиц в окрестностях посёлка Шахтёрский. Мы наблюдали токующих самцов в 1999-2000 годах непосредственно в городе. 8 июня 2000 в пойме реки Казачки отмечено токование сразу 12 птиц. Выводок с пуховыми птенцами встречен на берегу водохранилища 5 июля 2001.

Сибирский пепельный улит *Heteroscelus brevipes*. Редок на весеннем пролёте. Единичные особи встречены у посёлка Шахтёрский (Кирющенко 1973). Мы видели одну птицу на реке Казачке в черте города (в районе сброса сточных вод) 7 июня 1997, ещё пару птиц – там же 31 мая 1998.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Литературных данных об этом виде нет. Единственная встреча – 1 июня 2000 на окраине города, на мелких озерках у Анадырской ТЭЦ (совместные наблюдения с П.С.Томковичем). В 2000 году отмечен в Беринговском районе Чукотки в окрестностях посёлка Мейныпильгыно (Голубь, Голубь 2001).

Мородунка *Xenus cinereus*. Редкий пролётный вид. Пару мородунок наблюдали только один раз – 6 июня 1998. Мородунки кормились возле заброшенных ферм на окраине города.

Плосконосый плавунчик *Phalaropus fulicarius*. Л.А.Портенко (1939) отмечал, что у Анадыря этот вид значительно превосходит по численности круглоносого плавунчика (!). В 1970-х годах С.П.Кирющенко (1973) счёл его обычным на гнездовании у посёлка Шахтёрский. Гнездовой статус для этого кулика в районе наших наблюдений предполагали А.В.Кречмар, А.В.Андреев и А.Я.Кондратьев (1991), они подчёркивали, что его численность намного ниже, чем у круглоносого плавунчика. Мы видели плосконосого плавунчика вообще лишь однажды – 6 июня 1998. Одиночная самка держалась в стае круглоносых плавунчиков. Гнездование не отмечено.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. Обычный многочисленный гнездящийся вид. Прилёт отмечен 1 июня 1997, 22 мая 1998, 27 мая 1999, 1 июня 2000. Первыми появляются самки, они держатся небольшими стайками, токуют, дерутся между собой. Спаривание наблюдали 8 июня 1997, две самки старались отогнать друг друга от выбранного ими самца. К 20-м числам июня самки объединяются в стайки (до 20-25 особей) и кочуют по пригородным озёрам. Встреченные в это время самцы проявляли беспокойство и активно отводили.

Турухтан *Philomachus pugnax*. По данным Л.А.Портенко (1939), под Анадырем турухтан не гнездится. Позднее С.П.Кирющенко (1973) нашёл его вполне обычным на гнездовании на северном берегу Анадырского лимана (окрестности посёлка Шахтёрский). Мы наблюдали, главным образом, пролётных птиц, но во второй декаде и в конце июня встречались, очевидно, местные, загнездившиеся особи. В целом на весеннем пролёте у Анадыря турухтан – один из самых обычных, многочисленных и заметных куликов.

Первые птицы появляются в окрестностях города в последней декаде мая (28 мая 1997, 23 мая 1998, 25 мая 1999, 23 мая 2000). Как правило, в смешанных стайках резко преобладают самки; самцы обычно держатся отдельными группами или одиночно. Активный ток начинается, по наблюдениям 1997-1998 годов, в конце первой декады июня, в это время на сухих возвышенных участках тундры можно видеть до 10-15 токующих самцов.

Турухтаны хорошо адаптировались к антропогенным изменениям пригородных ландшафтов. Сразу после прилёта они держатся на окраинах и в черте города, используя в качестве кормовых угодий заброшенные фермы, развалины бараков, свалки, район сброса в реку Казачку городских стоков. Во время непогоды птицы прячутся в развалинах, гаражах, на территории складов металлолома и ГСМ. Как следствие этого, изменилось и отношение куликов к людям и собакам – по сравнению с другими видами, турухтаны значительно менее осторожны и пугливы.

Песочник-красношейка *Calidris ruficollis*. Л.А.Портенко (1939)

отмечал гнездование этого вида у Анадыря и считал его, наряду с чернозобиком, самым многочисленным из куликов. В настоящее время красношейка в районе исследований встречается редко. Мы видели единичных особей только 9 мая 1997, 29 мая 1997 и 31 мая 1998. (24 мая 2000 встречались стайки по 8-10 особей, предположительно этого вида). Обычно кулички держались в стаях чернозобиков. Гнездование не установлено.

Длиннопалый песочник *Calidris subminuta*. В окрестностях Анадыря один экземпляр был добыт в 1930 году (Белопольский 1934). По данным И.В.Дорогого (1993, 1994), этот вид гнездился в 1991-1993 годах в окрестностях анадырского аэропорта, что является наиболее северной точкой современного репродуктивного ареала. Одну птицу мы видели на окраине Анадыря 1 июня 2000 (совместные наблюдения с П.С.Томковичем).

Белохвостый песочник *Calidris temminckii*. Обычный многочисленный гнездящийся вид, предпочитающий урбанизированные территории природным биотопам. Гнездование белохвостых песочников в черте Анадыря отмечал ещё Л.А.Портенко (1939), с тех пор этот вид занял прочные позиции в составе городской орнитофауны. По нашим наблюдениям, в гАнадыре белохвостые песочники появляются в конце мая (29 мая 1997, 27 мая 1998, 25 мая 1999, 23 мая 2000). Практически сразу по прилёту начитается ток, разгар которого приходится на первую декаду июня. Во время тока кулики очень активны, поющих самцов можно видеть в любое время суток в воздухе, на столбах или на крышах зданий. К 22-25 июня ток затухает. Гнездование белохвостых песочников в городе локально, приурочено к пустырям на месте снесённых старых домов, среди завалов строительного мусора и постоянных или временных луж и водотоков. В таких местах образуются повышенные концентрации птиц – до 10-15 пар.

Чернозобик *Calidris alpina*. Обычный гнездящийся вид (Портенко 1939; Кирющенко 1973; Дорогой 1997). Ежегодно встречается в ближайших окрестностях города. Птицы держатся стайками до 30-40 особей. Первые встречи – 7 июня 1997, 26 мая 1998, 27 мая 1999, 1 июня 2000. В июне наблюдали уже активно токующих птиц, после 10 июня стайки распадаются на отдельные пары.

Дутыш *Calidris melanotos*. Л.А.Портенко (1939) не отмечал этот вид, С.П.Кирющенко (1973) нашёл его многочисленным на гнездовании в окрестностях посёлка Шахтёрский, а Г.В.Колонин (1980) – в окрестностях Анадыря. 1 июня 2000 на окраине города мы слышали голоса этих куликов и видели одну пару.

Бекас *Gallinago gallinago*. Немногочисленный гнездящийся вид. Л.А.Портенко (1939) обращал внимание на его отсутствие в приморских тундрах низовий реки Анадырь, однако уже с 1970-х годов бекас

был здесь обычен на гнездовании (Кирющенко 1973; Колонин 1980; Дорогой 1997). В окрестностях города мы отмечали токующих самцов ежегодно, но всегда в очень небольшом количестве. Так, в 1997 году были отмечены только две особи – 29 мая и 1 июня, в 1998 – первая встреча 23 мая, затем 31 мая, в 2000 – также 23 мая, 1 и 8 июня. Подобно белохвостым песочникам, бекасы могут токовать прямо в городе, среди многоэтажной застройки, рядом с дорогами, но, по сравнению с песочниками, они очень малочисленны.

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*. Немногочисленный гнездящийся вид. Гнездовая колония существует в районе сопки Дионисия (данные Е.В.Голубь, 1996 год). На окраинах и в черте города этих куликов мы не видели.

Американский бекасовидный веретенник *Limnodromus scolopaceus*. Л.А.Портенко (1939) отмечал гнездование этого вида у Анадыря. С.П.Кирющенко (1973) нашёл его обычным в окрестностях посёлка Шахтёрский. По нашим наблюдениям, американский бекасовидный веретенник встречается на окраинах Анадыря нерегулярно, а численность птиц значительно колеблется. В 1997 году были отмечены всего три особи, а в 1998 году веретенники встречались стайками по 10-15 птиц в период с 27 мая по 10 июня. В 1999-2000 годах отмечены лишь единичные кулики. Гнездования мы не наблюдали.

В литературе содержатся сведения ещё о некоторых видах куликов, встреченных в окрестностях Анадыря в разные годы (см. таблицу).

Видовой состав куликов, отмеченных в окрестностях Анадыря (по литературным данным)

Вид	Статус пребывания	Источник информации
Pluvialis dominica	Гнездящийся	Сыроечковский-мл. и др., 2004
Eudromias morinellus	Гнездящийся	Портенко, 1939; Кирющенко, 1973
Tringa erythropus	Не определён	Портенко, 1939; Кирющенко, 1973
Heteroscelus incanus	Не определён	Белопольский, 1934
Eurynorhynchus pygmeus	Гнездящийся	Портенко, 1939; Дорогой, 1993; Андреев, 2008
Calidris minuta	Не определён	Дорогой, 1993
Calidris bairdii	Пролётный	Кирющенко, 1973
Calidris acuminata	Пролётный	Портенко, 1939
Calidris tenuirostris	Гнездящийся (косвенные данные)	Портенко, 1939; Тархова, Тархов, 1962
Calidris canutus	Гнездящийся	Портенко, 1939; Дорогой, 1993
Calidris mauri	Пролётный, гнездящийся (!)	Дорогой, 1993; Лаппо и др., 2003
Gallinago stenura	Не определён	Кирющенко, 1973
Limosa lapponica	Гнездящийся	Портенко, 1972; Тархова, Тархов, 1962

Таким образом, общий список куликов, встречающихся под Анадырем, с учётом литературных данных, включает 33 вида. Среди них преобладают пролётные виды и те, статус пребывания которых в районе

исследований пока не определён. Некоторые: хрустан *Eudromias morinellus*, американский пепельный улит *Heteroscelus incanus*, лопатень *Eurynorhynchus pygmeus*, бэрдов песочник *Calidris bairdii*, острохвостый песочник *C. acuminata*, перепончатопалый песочник *C. mauri*, – внесены в Красную книгу Чукотского автономного округа (2009). Из них в окрестностях города гнездятся лишь хрустан (Портенко 1939; Кирющенко 1973) и лопатень. Последний, возможно, исчез, поскольку сейчас наблюдается резкое сокращение численности и области гнездования этого уникального вида (Сыроечковский-мл., Лаппо 2010).

Мы благодарны сотрудникам Чукотского филиала ФГУП «ТИНРО-центр» Г.П. Смирнову – за предоставленные сведения о наблюдениях куликов, и А.П.Голубю – за просмотр рукописи и критические замечания. Особая благодарность П.С.Томковичу (Зоомузей Московского университета), который любезно поделился своим опытом определения куликов в полевых условиях.

Литература

Андреев А.В. 2008. Кулик-лопатень // *Красная Книга Чукотского автономного округа. Т. 1. Животные*. Магадан: 118-119.

Белопольский Л.О. (1934) 2005. К орнитофауне Анадырского края // *Рус. орнитол. журн.* **14** (280): 147-163.

Голубь Е.В., Голубь А.П. 2001. Орнитофауна Мейныпильгынской озёрно-речной системы и бассейна озера Кайпыльгин // *Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России*. М., **3**: 47-52.

Дорогой И.В. 1993. Орнитологические находки на Восточной Чукотке // *Бюл. МОИП*. Отд. биол. 98, 6: 16-18.

Дорогой И.В. (1994) 2013. Новый район размножения длиннопалого песочника *Calidris subminuta* // *Рус. орнитол. журн.* **22** (835): 51.

Дорогой И.В. 1997. Фауна и распространение куликов на Северо-Востоке Сибири // *Видовое разнообразие и состояние популяций околоводных птиц северо-востока Азии*. Магадан: 53-86.

Кирющенко С.П. 1973. О биологии и численности куликов Чукотского полуострова // *Фауна и экология куликов*. М., **2**: 37-41.

Кищинский А.А., Томкович П.С., Флинт В.Е. 1983. Птицы бассейна Канчалана (Чукотский национальный округ) // *Тр. Зоол. музея Моск. ун-та* **21**: 3-76.

Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-256.

Колонин Г.В. 1980. Орнитологические наблюдения на Чукотке и острове Врангеля // *Орнитология* **15**: 197-200.

Кречмар А.В., Андреев А.В., Кондратьев А.Я. 1991. *Птицы северных равнин*. Л.: 1-228.

Лаппо Е.Г., Сыроечковский Е.Е., мл., Цоклер К., Айхорн Г. 2003. Новые данные о гнездовом ареале перепончатопалого песочника в Азии // *Орнитология* **30**: 176-177.

Наумкин Д.В., Голубь Е.В. 2009. О весеннем пролёте гусеобразных в окрестностях города Анадыря // *Казарка* **12**, 2: 161-169.

Портенко Л.А. 1939. Фауна Анадырского края. Птицы. Ч. 1 // *Тр. НИИ полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства* **5**: 1-211.

Портенко Л.А. 1972. *Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля*. Л., **1**: 1-424.

Рябицев В.К. 2001. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-608.

Сыроечковский Е.Е., мл. и др. 2004.Новости в фауне куликов Чукотского полуострова // *Кулики Вост. Европы и Сев. Азии: изучение и охрана*. Екатеринбург: 190-194.

Сыроечковский Е.Е., мл., Лаппо Е.Г. 2010. Кулик-лопатень на грани вымирания: некоторые итоги десяти лет исследований // *Орнитология в Северной Евразии*. Оренбург: 299-300.

Тархова В.Н., Тархов В.С. 1962. Каталог коллекции фауны Чукотского национального округа в Чукотском краеведческом музее // *Зап. Чукот. краевед. музея*. Магадан, **3**: 27-29.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1175**: 2833*

Первая находка длиннохвостой неясыти *Strix uralensis* на гнездовании в ленточных борах Казахстана

Ф.Ф.Карпов, А.С.Левин

Второе издангие. Первая публикация в 2006[*]

В Казахстане гнездование длиннохвостой неясыти *Strix uralensis* было известно только для Юго-Западного Алтая (Хроков, Березовиков 1990; Березовиков и др. 1992) и в Калбе (Егоров, Борисов 1979). В Восточно-Казахстанской области (50°45.39' с.ш., 80° 50.73' в.д.) 24 мая 2005 в старом сосновом бору недалеко от опушки мы нашли гнездо *S. uralensis*. Оно располагалось в сосновой «метле» на высоте 6-7 м. Из гнезда выпал (и разбился) 2-нед. совёнок. Взрослая сова пыталась его кормить, рядом с птенцом лежала мёртвая полёвка. При первой попытке поднять совёнка незамеченная до этого взрослая птица внезапно атаковала, нанеся весьма ощутимый удар по голове. Длиннохвостая неясыть считается одной из самых агрессивных птиц, поэтому при работе у гнезда этой совы следует принимать меры предосторожности.

Литература

Березовиков Н.Н., Лухтанов А.Г., Стариков С.В. 1992. Птицы Бухтарминской долины (Южный Алтай) // *Современная орнитология 1991:* 160-179.

Гаврилов Э.И. 1999. *Фауна и распространение птиц Казахстана*. Алматы.: 1-198.

Гаврин В.Ф. 1962. Отряд совы – Striges // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **2**: 708-779.

Егоров В.А., Борисов А.И. 1979. Новые данные о гнездовании птиц в Калбе // *Природа и хозяйство Восточного Казахстана*. Алма-Ата6: 131-139.

Хроков В.В., Березовиков Н.Н. (1990) 2011. К фауне сов Верхнего Прииртышья // *Рус. орнитол. журн*. **20** (712): 2472-2474.

[*] Карпов Ф.Ф., Левин А.С. 2006. Первая находка длиннохвостой неясыти на гнездовании в ленточных борах Казахстана // *Каз. орнитол. бюл. 2005:* 205.