ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2015
XXIV

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1191

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XXIV

Экспресс-выпуск • Express-issue

2015 № 1191

СОДЕРЖАНИЕ

3353-3358 О существенном увеличении числа встреч летующих больших белых цапель *Casmerodius albus* на западном побережье Кургальского полуострова в 2014 и 2015 годах. С.А.КОУЗОВ

3359-3361 Рыжая цапля *Ardea purpurea* – новый вид птиц Мордовии. Н.П.КАРАНОВ, С.Н.СПИРИДОНОВ

3362 Гибель бледного дрозда *Turdus pallidus* от заглатывания сеголетка дальневосточной лягушки *Rana dybowskii*. В.А.ХАРЧЕНКО

3362-3364 О гнездовании зимняка *Buteo lagopus* на острове Беринга (Командорские острова). Д.В.ПИЛИПЕНКО, Е.Г.МАМАЕВ

3364-3365 Залёты пеликанов в Сумскую область. Н.П.КНЫШ

3366-3383 Материалы к зимней орнитофауне северных районов Ростовской области. С.А.ЛОМАКИН, В.П.БЕЛИК

Редактор и издатель А.В.Бардин

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2015
Дата опубликования: 26 сентября 2015

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXIV
Express-issue

2015 № 1191

CONTENTS

3353-3358 A significant increase in the number of great egrets *Casmerodius albus* on the west coast of the peninsula Kurgalsky in the summer in 2014 and 2015.
S.A.KOUZOV

3359-3361 The purple heron *Ardea purpurea* – a new bird for Mordovia.
N.P.KARANOV, S.N.SPIRIDONOV

3362 The death of pale thrush *Turdus pallidus* by ingestion of underyearling Far Eastern frog *Rana dybowskii*.
V.A.KHARCHENKO

3362-3364 About breeding of the rough-legged buzzard *Buteo lagopus* on Bering Island (Commander Islands).
D.V.PILIPENKO, E.G.MAMAEV

3364-3365 Vagrant pelicans in the Sumy Oblast.
N.P.KNYSH

3366-3383 Materials for the winter avifauna of the northern districts of the Rostov Oblast. S.A.LOMAKIN, V.P.BELIK

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St.-Petersburg University
St.-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2015

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1191**: 3353-3358*

О существенном увеличении числа встреч летующих больших белых цапель *Casmerodius albus* на западном побережье Кургальского полуострова в 2014 и 2015 годах

С.А.Коузов

Сергей Александрович Коузов. Биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия.
E-mail: skouzov@mail.ru

Поступила в редакцию 23 сентября 2015

К моменту выхода сводки «Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий» для области были известны всего две регистрации большой белой цапли *Casmerodius albus* (Brandt 1880; Ризнич 1962; Мальчевский, Пукинский 1983). На рубеже XX и XXI веков частота встреч этого вида заметно возросла (Ковалев 2001; Богуславский 2010; Головань 2011). В 2009-2013 годах районом наиболее частых встреч больших белых цапель стал Кургальский полуостров (Коузов 2015а). Так, в 2013 году в течение августа здесь регулярно держалось до 5 птиц (Коузов 2015а).

Рис. 1. Группа больших белых цапель *Casmerodius albus*, отдыхающих на сухой сосне у колонии больших бакланов на северо-западном мысу острова Реймосар. 7 августа 2014. Фото автора.

7 августа 2014 при обследовании острова Реймосар у западного берега Кургальского полуострова было встречено 16 больших белых цапель; 8 из них отдыхали на старой сухой сосне у края колонии больших бакланов *Phalacrocorax carbo* на северо-западном мысу (рис. 1), остальные охотились, рассредоточившись на внутреннем озере посередине острова (рис. 2) и в бухточках на северном и юго-восточном берегах острова. Вечером, между 19 и 20 ч, с побережья на остров поодиночке прилетели ещё 4 белые цапли. При повторных учётах 16 и 26 августа 2014 на Реймосаре и западном побережье Кургальского полуострова от посёлка Тисколово до угодья Кирьямо было учтено 19 и 16 больших белых цапель соответственно. Большинство (28 из 35 птиц) было встречено на Реймосаре и бухте в посёлке Гакково.

Рис. 2. Большая белая цапля *Casmerodius albus*, охотящаяся на внутреннем озере острова Реймосар. 7 августа 2014. Фото автора.

11 июля 2015 при обследовании острова Реймосар с 14 ч до18 ч 45 мин отмечена только одна большая белая цапля, кормящаяся на внутреннем озере (рис. 3). Однако в течение вечера, с 18 ч 45 мин до 21 ч 30 мин, наблюдался подлёт на остров со стороны берега нескольких групп из 2-5 цапель общей численностью 18 птиц. Все птицы со-

брались на ночёвку на выступающие из воды валуны в большой бухте на юго-восточном берегу острова. При повторном учёте 21 июля на Реймосаре и западном побережье Кургальского полуострова от Тисколово до Кирьямо было встречено 16 больших белых цапель.

Рис. 3. Большая белая цапля *Casmerodius albus*, охотящаяся на внутреннем озере острова Реймосар. 11 июля 2015. Фото автора.

Таким образом, в последние два года частота встреч больших белых цапель на Кургальском полуострове многократно увеличилась. Этот процесс характерен и для более восточной части Финского залива (Головань, Резвый, Савинич 2015) и некоторых других районов Ленинградской области. Так, 28 августа 2013 одиночная белая цапля наблюдалась на озере Лахта в нижнем течении Свири (Ковалев 2013). С 15 сентября по 2 ноября 2014 пара белых цапель держалась у деревни Замошье в Плюсском районе Псковской области у самой границы с Ленинградской областью (Горчаков 2014).

Особенно показателен в этом отношении 2015 год, когда в весенний период группы из 2-7 больших белых цапель и одиночные птицы были встречены не только рядом с Кургальским полуостровом в нижнем течении Луги у посёлка Струппово 21 и 23 мая (Домбровский 2015), но и в верховьях реки Оредеж в Волосовском районе 23 мая (Поляков 2015) и на Раковых озёрах на севере Карельского перешейка в конце апреля и в середине мая (Барабанова и др. 2015). Самыми северными

встречами этого вида в регионе являются наблюдения пары больших белых цапель в нижнем течении реки Гороховки в районе Выборгского залива 9 и16 июля 2015 (Коузов 2015б).

Многократное увеличение частоты и расширение географии встреч вида в регионе, несомненно, связаны с процессом расселения вида в Балтийском регионе, вызванным развитием тёплой фазы климата и улучшением мер охраны (Кривенко 1991; Коузов 2015а). С 2004 года отмечается быстрый рост колонии этого вида в Латвии (Celmiņš 2004; Ławicki 2014), в 2008 году большие белые цапли начали размножаться в Эстонии под Тарту (Ławicki 2014; Linnuharulduste 2015), в 2012 году отмечено гнездование вида на острове Готланд (Ławicki 2014).

Примечательно, что в последние годы в Ленинградской области идёт увеличение частоты встреч больших белых цапель не только во второй половине лета на послегнездовых кочёвках, но и на весенней миграции. При этом появляются не только одиночные птицы и пары, но и группы из 5-7 птиц. Это может быть связано с поиском птицами новых мест гнездования.

Наибольшее число встреч именно в районе Кургальского полуострова весьма закономерно. Это связано не только с близостью колоний вида в Эстонии и Латвии, но и с большим разнообразием местообитаний (Бубырева и др. 1993), а также с относительно низким антропогенным прессом на западном побережье полуострова (Коузов 2013, 2015а). Кроме того, для полуострова характерен самый мягкий климат в нашей области (Коузов 2012а). Благодаря всему этому Кургальский полуостров является единственным местом на южном берегу Финского залива, где отмечено размножение целого ряда редких и новых для Ленинградской области видов. Это – большой баклан *Phalacrocorax carbo* (Коузов 2007), лебедь-шипун *Cygnus olor* (Бузун, Храбрый 1991, Бубырева и др. 1993; Леоке 1998; Коузов 2010а; Коузов, Кравчук 2014), серый гусь *Anser anser* (Бубырева и др. 1993; Коузов 2010а; Коузов, Кравчук 2013), белощёкая казарка *Branta leucopsis* (Коузов, Кравчук 2008а), серая утка *Anas strepera* (Коузов, Кравчук 2010а, 2012), морская чернеть *Aythya marila* (Коузов, 2010б), турпан *Melanitta fusca* и гага *Somateria mollissima* (Бубырева и др. 1993; Бузун, Мераускас 1993), малый чернозобик *Calidris alpina schinzii* (Бубырева и др. 1993; Коузов 2012а, б; Фёдоров 2009), камнешарка *Arenaria interpres* (Бубырева и др. 1993; Бузун, Мераускас 1993), галстучник *Charadrius hiaticula* (Коузов, Кравчук 2010б), кулик-сорока *Haematopus ostralegus* (Бубырева и др. 1993; Бузун, Мераускас 1993; Коузов 2014), малая крачка *Sterna albifrons* (Коузов, Кравчук 2010в), пестроносая крачка *Thalasseus sandvicensis* (Коузов 1995), полярная крачка *Sterna paradisaea* (Бубырева и др. 1993; Бузун, Мераускас 1993), водяной пастушок *Rallus aquaticus* (Коузов, Кравчук 2008б). В свете вышесказанного в

ближайшие годы представляется весьма вероятным появление большой белой цапли на гнездовании в этом районе, особенно если учитывать экологическую пластичность вида. Большая белая цапля гнездится не только на деревьях, но и на кустарниках, заломах тростника и на земле среди тростниковых зарослей, охотно селится отдельными парами и небольшими группами в колониях других видов, в том числе и совместно с большим бакланом (Грищенко 2011).

Литература

Барабанова Е.Н., Шатенёв К.Г., Машкова Е.В. 2015. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на Раковых озёрах на Карельском перешейке // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1152): 2018-2021.

Богуславский А.В. 2010. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на южном берегу Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **19** (542): 31.

Бубырева В.А., Бузун В.А., Волкович Н.М., Коузов С.А., Шаповалова О.В., Щукин А.К. 1993. Отчёт Кургальской экспедиции Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей в полевой сезон 1992 г. // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3) 10: 111-117.

Бузун В.А., Мераускас П. 1993. Орнитологические находки в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **2**, 2: 253-259.

Бузун В.А., Храбрый В.М. 1990. О гнездовании лебедя-шипуна в Ленинградской области // *Экология и охрана лебедей в СССР*. Мелитополь, **1**: 83-84.

Головань В.И. 2011. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на южном берегу Лужской губы // *Рус. орнитол. журн.* **20** (663): 1143-1144.

Головань В.И., Резвый С.П., Савинич И.Б. 2015. О встречах больших белых цапель *Casmerodius albus* на востоке Финского залива в 2013-2015 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1190): 3339.

Грищенко В.Н. 2011. Большая белая цапля *Casmerodius albus* (Linnaeus 1758) // *Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные*. М.: 304-329.

Домбровский К.Ю. 2015. Наблюдение большой белой цапли *Casmerodius albus* в деревне Струпово (низовья реки Луги) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1153): 2059-2060.

Ковалев В.А. 2001. Орнитологические находки в Лодейнопольском районе Ленинградской области в 1998-2000 годах // *Рус. орнитол. журн.* **10** (137): 248-251.

Ковалев В.А. 2013. Новый залёт большой белой цапли *Casmerodius albus* на восток Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **22** (946): 3291.

Коузов С.А. 1995. Первая регистрация гнездования пестроносой крачки *Thalasseus sandvicensis* в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **4**, 1/2: 66-67.

Коузов С.А. 2007. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на Кургальском полуострове: история вселения и особенности биологии // *Рус. орнитол. журн.* **16** (349): 339-365.

Коузов С.А. 2010а. Особенности биологии лебедя-шипуна и серого гуся на Кургальском полуострове // *Казарка* **12**, 2: 85-113.

Коузов С.А. 2010б. Случай размножения морской чернети *Aythya marila* на Кургальском полуострове (восточная часть Финского залива) // *Рус. орнитол. журн.* **19** (573): 937-942.

Коузов С.А. 2012а. Случаи гнездования и встречи малого чернозобика *Calidris alpina schinzii* на Кургальском полуострове в 1990-2010 годах // *Рус. орнитол. журн.* **21** (743): 707-724.

Коузов С.А. 2012б. Малый чернозобик *(Calidris alpina schinzii)* на Кургальском полуострове: особенности биологии, годового цикла и факторы среды, лимитирующие его распространение в восточной части Финского залива // *Тр. Зоол. ин-та РАН* **316**: 1-17.

Коузов С.А. 2014. Новые данные о местах гнездования и встречах территоральных пар кулика-сороки *(Haematopus ostralegus)* в восточной части Финского залива // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3) 3: 31-39.

Коузов С.А. 2015а. О характере пребывания большой белой цапли (*Casmerodius albus* L.) на Кургальском полуострове и сопредельных участках восточной части Финского залива в последнем десятилетии // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3) 1: 41-50.

Коузов С.А. 2015. О встречах большой белой цапли *Casmerodius albus* в долине реки Гороховки (Карельский перешеек) в июле 2015 года // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1189): 3299-3300.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2008а. Первый случай гнездования белощёкой казарки *Branta leucopsis* на Кургальском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* **17** (423): 908-910.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2008б. Размножение водяного пастушка *Rallus aquaticus* на Кургальском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* **17** (410): 515-517.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2010а. Размножение серой утки (*Anas strepera* L.) в Ленинградской области // *Вестн. охотовед.* **7**, 2: 254-259.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2010б. О гнездовании галстучника *Charadrius hiaticula* на Кургальском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* **19** (613): 2075-2078.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2010в. Малая крачка *Sterna albifrons* на Кургальском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* **19** (618): 2213-2222.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2012. Серая утка в восточной части Финского залива: история заселения, биология и миграции // *Казарка* **15**, 2: 106-139.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2013. Серый гусь (*Anser anser* L.) в Ленинградской области: основные тенденции многолетних изменений численности, экология, миграции и перспективы реинтродукции // *Вестн. охотовед.* **10**, 1: 5-16.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2014. Особенности биологии лебедя-шипуна *(Cygnus olor)* в восточной части Финского залива // *Вестн. охотовед.* **11**, 2: 119-204.

Кривенко В.Г. 1991. *Водоплавающие птицы и их охрана.* М.: 1-270.

Леоке Д.Ю. 1998. Лебедь-шипун *Cygnus olor* — обычная гнездящаяся птица Кургальского рифа (восточная часть Финского залива) // *Рус. орнитол. журн.* **7** (46): 19-21.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана.* Л., **1**: 1-480.

Поляков В.М. 2015. Встреча двух больших белых цапель *Casmerodius albus* в верховьях Оредежа // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1145): 1799.

Ризнич И.И. 1962. Интересные встречи // *Наша охота* **3**.

Фёдоров В.А. 2009. О гнездовании малого чернозобика *Calidris alpina schinzii* в Кургальском заказнике (Ленинградская область) // *Рус. орнитол. журн.* **18** (468): 351-354.

Brandt J.F. 1880. Avium Provinciae Petropolitane Enumeratio. Aufzählung der in der Provinz Peterburg beobachteten Vögel // *J. Ornithol.* **28**.

Celmiņš A. 2004. Lielā baltā gārņa *Ardea alba* invāzija Latvijā 2004 gadā vasarā // *Putni dabā* **14**, 4: 12-16.

Ławicki Ł. 2014. The Great White Egret in Europe: population increase and range expansion since 1980 // *Brit. Birds* **107**, 1: 8-25.

Linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused seisuga 18.02.2015: http://www.eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.pdf.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск ***1191****: 3359-3361*

Рыжая цапля *Ardea purpurea* – новый вид птиц Мордовии

Н.П.Каранов, С.Н.Спиридонов

Николай Петрович Каранов. Союз охраны птиц России, Мордовское отделение. Республика Мордовия. Россия. E-mail: nickol.caranov@yandex.ru
Сергей Николаевич Спиридонов. Национальный парк «Смольный». ул. Тополей, д. 11а, посёлок Смольный, Ичалковский район, Республика Мордовия, 431660, Россия. E-mail: alcedo@rambler.ru

Поступила в редакцию 23 сентября 2015

Рыжая цапля *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766 – южный вид. В европейской части России её ареал охватывает, в частности, низовья Волги, Кубани, Урала, северная граница проводится примерно по 52° с.ш. (Приклонский 2011). Редкие залёты отмечались и значительно севернее, вплоть до Пермской, Ленинградской, Новгородской областей (Казаков и др. 2008; Мальчевский, Пукинский 1983; Приклонский 2011).

С конца 1970-х годов встречи рыжих цапель номинативного подвида, а также случаи их гнездования стали значительно чаще регистрироваться севернее основной части ареала. Так, размножение рыжей цапли установлено для Воронежской (Ачкасова, Сарычев 1981), Липецкой (Позвоночные… 2009), Саратовской (Завьялов и др. 2005) областей. С 2000 года вид стал регистрироваться на сопредельных с Мордовией территориях. В 2000 году одна птица встречена в Ульяновской области, с 2003 года взрослые рыжие цапли стали регулярно встречаться в гнездовой период в Пензенской области, а в 2013 году найдены первые гнездящиеся пары (Фролов 2015). В 2013 году гнездование рыжей цапли обнаружено в смешанной колонии голенастых птиц на окраине города Тамбова (Родимцев 2014).

В Мордовии встречи рыжей цапли нам не известны, в литературе об этом никаких сведений нет. Правда, в списке регионов России, где в XX веке отмечались залёты рыжей цапли, С.Г.Приклонский (2011) указал Мордовию, но это, скорее всего, ошибочно.

В 2015 году мы провели обследование Лямбирского водохранилища (Саранское «море») (54°15′ с.ш., 45°08′ в.д.), созданного в 1973 году в 0.8 км восточнее посёлка Берсеневские Выселки Лямбирского района и в 2 км севернее Саранска около автотрассы Саранск – Нижний Новгород. Площадь его акватории около 140 га. В последнее время участились случаи залповых сбросов в водохранилище загрязнённых сточных вод, оно стало заиливаться, южная и западная часть заросли рогозом, тростником и другими водно-болотными растениями.

12 августа 2015 на правом берегу мы встретили молодую рыжую цаплю (см. рисунок). Она кормилась возле тростниковых зарослей (до

Рыжая цапля *Ardea purpurea*. Лямбирское водохранилище, окраина Саранска.
12 и 21 августа 2015. Фото Н.П.Каранова.

2 м высотой), стоя на заломах прошлогодней растительности. Глубина воды в месте кормёжки составляла от 0.2 до 1 м. Птица подпустила на 10 м, после чего улетела. В 80-150 м от рыжей цапли держались две серых цапли *Ardea cinerea*, которые кормились, однако потревоженные

человеком, улетели. При обследовании этого участка водоёма 21 августа, рыжая цапля была отмечена повторно, практически в том же месте, что и 12 августа. Удалось наблюдать её охоту на рыбу. Она поймала предположительно плотву *Rutilus rutilus,* проглотила, затем взлетела над местом охоты и села в нескольких метрах в заросли тростника. Как и в прошлый раз, здесь же кормились серые цапли. При дальнейших неоднократных посещениях этого места в августе и начале сентября 2015 года рыжая цапля больше не наблюдалась, сократилось также число серых цапель на водоёме. Одной из причин этого мы считаем частое посещение Лямбирского водохранилища рыбаками, а также случаи браконьерской охоты.

Описанная встреча – первая и пока единственная находка рыжей цапли в Мордовии. Появление молодой птицы в августе можно рассматривать как случай залёта в ходе промежуточной миграции, когда птицы разлетаются от мест гнездования в разных, в том числе и в северном, направлениях на расстояние до 300 км (Приклонский 2011). Не стоит исключать и возможность гнездования рыжей цапли на Саранском «море», где для этого есть подходящие условия.

Литература

Ачкасова Г.Е., Сарычев В.С. 1981. Смешанная колония серых и рыжих цапель на Воронежском водохранилище // *Размещение и состояние гнездовий околоводных птиц на территории СССР*. М.: 62-63.

Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Якушев Н.Н., Хрустов И.А. 2005. *Птицы севера Нижного Поволжья. Кн. 1. История изучения, общая характеристика и состав орнитофауны*. Саратов: 1-296.

Казаков В.П., Шепель А.И., Фишер С.В., Лапушкин В.А. 2008. Гагарообразные, поганкообразные, пеликанообразные, аистообразные и фламингообразные Пермского края // *Волжско-Камский орнитол. вестн.* **1**: 38-43.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 1-480.

Позвоночные Липецкой области. Кадастр. 2009. Воронеж: 1-494.

Приклонский С.Г. 2011. Рыжая цапля // *Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные*. М.: 355-368.

Родимцев А.С. 2014. Расширение гнездовых ареалов птиц: смешанная колония цаплевых (Ardeidae) в окрестностях города Тамбова // *Изв. Самар. НЦ РАН* **16**, 5 (1): 494-498.

Фролов В.В. 2015. Рыжая цапля [Электронный ресурс]: http://пензовед.рф/viewtopic.php?f=238&t=1082 (дата обращения: 15.09.2015).

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1191**: 3362*

Гибель бледного дрозда *Turdus pallidus* от заглатывания сеголетка дальневосточной лягушки *Rana dybowskii*

В.А.Харченко

Виктория Анатольевна Харченко. Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, ул. Некрасова, д. 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692519, Россия. E-mail: bax_3468@list.ru

Поступила в редакцию 20 сентября 2015

4 мая 2015 инспектор охраны Уссурийского заповедника В.М.Косухин нашёл на обочине дороги мёртвого самца бледного дрозда *Turdus pallidus*. Он был в хорошем состоянии, достаточно упитан, внешних (и внутренних, как показало дальнейшее вскрытие) повреждений у него не было. Клюв дрозда был приоткрыт. Заметив, что из зева что-то торчит, мы извлекли из пищевода дрозда достаточно крупного лягушонка-сеголетка дальневосточной лягушки *Rana dybowskii*. Видимо, дрозд пытался заглотить лягушонка с головы (т.к. во рту торчали задние лапки сеголетка), но неудачно, что привело к гибели птицы.

По нашим наблюдениям, в рационе бледных дроздов в заповеднике из животной пищи представлены только некрупные беспозвоночные (различные насекомые, мелкие наземные моллюски и т.п.).

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1191**: 3362-3364*

О гнездовании зимняка *Buteo lagopus* на острове Беринга (Командорские острова)

Д.В.Пилипенко, Е.Г.Мамаев

Дмитрий Владимирович Пилипенко, *Евгений Георгиевич Мамаев*. ФГБУ Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» им. С.В.Маракова, село Никольское, Алеутский район, Камчатский край, Россия. E-mail: pilipenko.dv@mail.ru

Поступила в редакцию 23 сентября 2015

Мохноногий канюк, или зимняк *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763) на Командорских островах отмечался сравнительно редко (Артюхин 1994; Мараков 2002) и, как правило, в зимне-весенний период. Впервые его гнездование было установлено на острове Беринга в 1990 году (Артюхин 1994), когда было обнаружено гнездо на горе Наковальня на широком задернованном карнизе на высоте 16 м. В гнезде было три

птенца, которые, судя по всему, успешно покинули гнездо. В последующие годы информация о гнездовании этого вида на острове Беринга отсутствовала.

Гнездо зимняка *Buteo lagopus*. Долина реки Лоцалая.
Остров Беринга, Командорские острова. 16 июня 2015.

16 июня 2015 в долине реки Лощалая местным натуралистом А.М. Опришко было обнаружено гнездо хищной птицы, которое, как оказалось, принадлежало зимняку. Располагалось оно на земле на склоне речной долины (см. рисунок). На момент обнаружения гнезда в нём находились 3 яйца (56.61×43.34, 59.55×43.93 и 58.38×43.69 мм), а само гнездо имело следующие размеры, мм: диаметр гнезда 220×210, диаметр лотка 900× 600, высота гнезда 180 мм, глубина лотка 80. Следует указать, что при проявлении беспокойства этой пары сюда подлетел ещё один зимняк, с южной стороны острова.

К сожалению, гнездование птиц было неудачным, гнездо было разорено песцом *Alopex lagopus*. Через несколько дней после обнаружения гнезда мы установили рядом фотоловушку, которая и сняла момент разорения последнего. Около 2 ч ночи 27 июня к гнезду подобрался песец, спугнул насиживающую птицу и поочерёдно унёс все яйца. После этого птицы покинули гнездовой участок.

Литература

Артюхин Ю.Б. 1994. К авифауне Командорских островов // *Орнитология* **26**: 85-91.

Мараков С.В. 2002. Материалы по фауне птиц Командорских островов // *Биология и охрана птиц Камчатки* **4**: 31- 33.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1191**: 3364-3365*

Залёты пеликанов в Сумскую область

Н.П.Кныш

*Второе издание. Первая публикация в 2004**

В последние полтора десятилетия стали накапливаться сведения о эпизодических встречах пеликанов на территории Сумской области, о чём ранее в литературе не сообщалось. Первое известие поступило от М.И.Тельпухова: 19 марта 1990 на озеро возле города Лебедин сел табун пеликанов. Одна из птиц погибла, якобы попав в трубу земснаряда (?) – наблюдатель видел её изуродованный труп. По сообщениям других респондентов, в июне 2000 года пеликан пролетал вдоль реки Псёл возле села Каменное Лебединского района, а летом 2001 года взрослый пеликан около недели держался на мелководном болоте на реке Ворсклица в селе Солдатское Великописаревского района. Был не пуглив, подпускал людей к себе на расстояние до 30 м, поэтому пред-

* Кныш Н.П. 2004. Залёты пеликанов на Сумщину // *Беркут* **13**, 2: 297-298.

положили, что птица сбежала из какого-то зоопарка. К сожалению, во всех этих случаях видовая принадлежность пеликанов не была определена из-за неопытности наблюдателей.

Более конкретные сведения предоставил орнитолог-любитель И.В. Бугаев: 7 марта 2002 он наблюдал стаю из 7 розовых пеликанов *Pelecanus onocrotalus*, державшихся на луже в пойме реки Сейм возле села Петуховка Буринского района. Шёл мокрый снег. Вспугнутые птицы улетели в сторону реки. По информации, собранной Н.М.Кобозевым и другими лицами, летом того же года одиночный пеликан (буроватого цвета – молодая особь) больше месяца обитал на пруду в селе Чернеча Слобода Буринского района. Кормился карасями, отдыхал на мостках и т.д. Возможно, это была птица из стаи, наблюдавшейся в марте – расстояние между пунктами встреч пеликанов всего 15 км.

Более давний залёт розового пеликана на север региона произошёл в конце 1960-х годов. Птица была добыта на Десне возле села Роговка (граница Черниговской и Сумской областей), её сильно выцветшее чучело хранится в Новгород-Северском краеведческом музее (Ю.В.Кузьменко, устн. сообщ.).

Итак, в установленных случаях, речь идёт о весенних залётах пеликанов, во время которых отдельные особи остаются на летовку на некоторых водоёмах Сумщины. Стоит заметить, что в июне 1990 года и 12 октября 2002 – то есть в годы наших наблюдений пеликанов – одиночные птицы были зарегистрированы и в Харьковской области (Надточий 2003). В целом же следует констатировать учащение залётов пеликанов вглубь Украины, что, несомненно, связано с известным ростом их численности в Северо-Западном Причерноморье (Русев 2003). Можно предполагать, что со временем часть особей осядет на гнездование в подходящих для них местах, если вспомнить, что в относительно недавнем историческом прошлом (XVI-XVIII века) пеликаны гнездились колониями на ряде водоёмов степной зоны и лесостепи (Кириков 1959).

Литература

Кириков С.В. 1959. *Изменения животного мира в природных зонах СССР (XIII-XIX вв.). Степная зона и лесостепь*. М: 1-175.

Надточий А.С. (2003) 2014. Залёт розового пеликана *Pelecanus onocrotalus* в Харьковскую область // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1033): 2463.

Русев І.Т. 2003. Пелікани в гирлі Дніпра // *Пріоритети орнітологічних досліджень*. Львів; Кам'янець-Подільський: 165-166.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1191**: 3366-3383*

Материалы к зимней орнитофауне северных районов Ростовской области

С.А.Ломакин, В.П.Белик

*Второе издание. Первая публикация в 2008**

Север Ростовской области в авифаунистическом отношении долгое время оставался на зоогеографической карте белым пятном. Сделанный нами недавно обзор фауны птиц Среднего Дона (Белик 2004, 2005) в какой-то мере прояснил ситуацию в этом регионе с летним, гнездовым комплексом. В то же время зимние аспекты орнитофауны севера Ростовской области до сих пор были практически не изучены в связи с отсутствием там каких бы то ни было регулярных фаунистических исследований в холодный период года.

Отмеченный пробел частично восполняют результаты специальных наблюдений опытного орнитолога-любителя С.А.Ломакина, живущего с 1979 года в станице Боковская в верховьях реки Чир – в равнинном степном районе на севере Ростовской области. Перед ним была поставлена цель: выяснить состав зимней орнитофауны, численность отдельных видов птиц и фенологию их пребывания в данном регионе. В итоге был собран достаточно полный материал по фауне Боковского и, частично, смежных с ним Шолоховского (Вёшенского) и Обливского районов, охватывающий период с 28 августа 2005 по 14 ноября 2006.

Для анализа использованы материалы наблюдений, проведённых в зимний период – с 1 декабря 2005 по 28 февраля 2006, частично также осенние (2005 и 2006) и весенние (2006) регистрации птиц, позволившие установить сроки прилёта и отлёта зимующих видов. Всего за 3 месяца С.А.Ломакиным сделано 70 дневниковых записей (24 – в декабре, 24 – в январе, 22 – в феврале), т.е. наблюдениями был равномерно охвачен весь зимний сезон. В дневнике регистрировались встречи птиц и учёты их численности в станице Боковской, на экскурсиях в её окрестностях и во время поездок в станицу Вёшенскую (13-14 декабря, 18 января, 1 февраля; 14-15 февраля) и Обливскую (20 февраля 2006). Некоторые данные были собраны также зимой 2006/07 и 2007/08 годов. На экскурсиях отмечалось обычно от 10 до 21 вида птиц, т.е. почти весь основной зимний аспект фауны этих степных районов. Фоновые синантропные виды (кольчатая горлица, домовый воробей и др.) в зимних дневниках практически не упоминались. Особое же внимание уделялось редким, необычным видам; они зарисовывались и описывались в дневнике и определялись затем по справочникам (Второв, Дроздов 1980; Бёме, Кузнецов 1981, 1983; Храбрый 1988). Работы в поле велись с использованием 7-20-кратных биноклей.

При подготовке статьи в дополнение к наблюдениям С.А.Ломакина были использованы некоторые материалы, собранные В.П.Беликом 1-4 февраля 1989 и

* Ломакин С.А., Белик В.П. 2008. Материалы к зимней орнитофауне северных районов Ростовской области // *Стрепет* **6**, 1: 35-54.

12-19 ноября 1992 в Чертковском, 21-29 ноября 1992 в Боковском, 1-3 декабря 1992 в Обливском районах, 21-23 февраля 1991 в Городищенском лесхозе на реке Калитве на границе Тарасовского и Миллеровского районов, а также 24-25 января 1996 в Каменском районе на Северском Донце.

Зима 2005/06 года на севере Ростовской области выдалась морозная и снежная. Снежный покров (до 5 см) лёг 5 декабря. В середине декабря установились морозы, а в начале января температура по ночам опускалась до минус 20°С. В середине января ночные морозы достигли уже минус 31°С, а в конце января поднялась метель и к 1 февраля землю укрыл снежный покров до 20-30 см глубиной.

В феврале 1989 года в Чертковском районе стояли морозы и лежал очень глубокий снег. В феврале 1991 года в Тарасовском районе тоже было морозно, а слой снега в лесу достигал 15 см. В ноябре 1992 года погода была относительно тёплая и дождливая, но с 1 декабря ударили морозы до минус 10-15°С, сковавшие пруды и другие стоячие водоёмы. Снежный же покров в степи в это время ещё практически отсутствовал. В январе 1996 года на Северском Донце стояла морозная погода, а глубина снега достигала 30 см. Но на реке оставалось несколько довольно больших полыней.

Следует заметить, что зима на севере Ростовской области обычно значительно более суровая, чем в её южной половине. В районах, расположенных к югу от Новочеркасска и Цимлянска, снежный покров крайне неустойчив и в среднем не превышает 8 см. Севернее же, в бассейне Северского Донца и среднего Дона, за счёт широтного градиента, гипсометрических эффектов и удалённости от крупных водоёмов, снег лежит примерно на месяц дольше и имеет в 2 раза большую мощность (Нагайцев 1971).

Всего в зимние месяцы на севере Ростовской области встречено 77 видов птиц, в том числе 1 залётный вид *(Gyps fulvus)*, 13 регулярно зимующих *(Circus cyaneus*, *Buteo lagopus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Eremophila alpestris*, *Lanius excubitor*, *Troglodytes troglodytes*, *Regulus regulus*, *Fringilla montifringilla*, *Spinus spinus*, *Acanthis flammea*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Plectrophenax nivalis)*, 5 инвазионных *(Melanocorypha yeltoniensis*, *M. leucoptera*, *Nucifraga caryocatactes*, *Bombycilla garrulus*, *Parus ater)* и 13 случайно зимующих (гнездящихся или пролётных) видов: *Botaurus stellaris*, *Bucephala clangula*, *Mergellus albellus*, *Mergus merganser*, *Falco tinnunculus*, *Rallus aquaticus*, *Otis tarda*, *Vanellus vanellus*, *Larus canus*, *Columba palumbus*, *Melanocorypha calandra*, *Erithacus rubecula*, *Turdus iliacus*. Остальные виды – оседлые и условно оседлые, регулярно встречающиеся на севере Ростовской области в течение всего года. Ниже приводится краткий видовой обзор отмеченных нами на зимовке птиц.

Botaurus stellaris. Обычный гнездящийся, случайно зимующий вид. Выпь наблюдалась в течение января-февраля 2006 года на почти полностью замёрзшем рыборазводном пруду близ станицы Боковская (Ломакин 2006а).

Anas platyrhynchos. Обычный гнездящийся, регулярно зимующий вид. В окрестностях станицы Вёшенская у мощных родников и на полыньях Дона кряква обычна (1 февраля 2006 – около 100 особей и стая из 22 птиц, в том числе 13 самцов). На Северском Донце, на полыньях ниже города Каменска, 24 января 1996 учтено около 120 птиц, самцы и самки примерно в равном соотношении. Кормятся эти птицы зимой на убранных полях подсолнечника или на посевах озимых культур, а в многоснежные зимы – за счёт бытовых стоков. На реке Чир кряквы зимуют на незамерзающих быстринах или по ручьям под дамбами прудов, в течение зимы постепенно сокращаясь в числе. Так, 21 декабря 2005 у станицы Боковская держалось около 50 крякв, в течение января 2006 года учитывалось от 3 до 8 птиц, 7 февраля остался 1 самец, а 9 февраля и он был убит тетеревятником.

Bucephala clangula. Обычный пролётный, случайно зимующий вид. Два гоголя (самец и самка) отмечены 3 декабря 1992 на реке Чир в Обливском районе. На Северском Донце на полыньях у Каменска 24 января 1996 кормились 2 группы: 3 молодых самца, а также 1 старый самец, 3 молодых самца и 1 самка. Кроме того, стайки гоголей дважды наблюдались на степных прудах в Боковском районе в конце ноября 1992, задержавшись здесь до наступления морозов в обществе с другими водоплавающими: чомгами *Podiceps cristatus* (23 ноября – 10 птиц, но 29 ноября их уже нет); лебедями-шипунами *Cygnus olor* (23 ноября – 2 взрослых и 5 молодых; 26 ноября – 2 молодых); лутками (29 ноября – 1 самка); большими крохалями (26 ноября – 1 самец и 2 самки).

Mergellus albellus. Обычный пролётный, случайно зимующий вид. На Северском Донце на полыньях ниже Каменска 24 января 1996 отмечена 1 самка лутка, державшаяся среди гоголей.

Mergus merganser. Обычный пролётный, спорадично зимующий вид. На Северском Донце на большой полынье держалось несколько групп общим числом 17 птиц, все – самки.

Circus cyaneus. Регулярно зимующий вид. В Чертковском районе в 1992 году первые самец и самка встречены 18 ноября. В Боковском районе осенью 2005 года первая самка отмечена 28 ноября, а самец – 5 декабря. В 2006 году первые самец и самка встречены 7 ноября. В течение зимы полевой лунь регулярно регистрируется в декабре (6 самцов и 11 самок), январе (2 самца и 9 самок) и феврале (2 самца и 5 самок). Затем 3 самца отмечены в конце марта (23, 27 и 28-го числа), когда уже появились первые самцы степного луня *Circus macrourus* (24 марта 2006), а в конце апреля шёл выраженный пролёт полевых луней на север (26 апреля – 2 самца и 2 самки в группе, 27 апреля – 1 самец), когда у своей колонии собрались уже первые 3 пары луговых луней *Circus pygargus* (30 апреля 2006).

Accipiter gentilis. Немногочисленный оседлый вид, заселивший

Боковский район в 1980-е годы. В 1990-х годах в окрестностях станицы Боковской гнездилось не менее 3 пар тетеревятников. Сейчас же, в связи с сокращением численности гнездящихся врановых и исчезновением их зимних скоплений, здесь осталось не более 1-2 пар ястребов. Осенью 2005 года, в сентябре-ноябре, зарегистрировано 17 встреч с одиночными птицами (по месяцам: 2+8+7), в декабре – 6 встреч, в январе – 3, в феврале – 5, в том числе молодая самка, державшаяся с 22 февраля 2006 на гнездовом участке старого самца. В Городищенском лесхозе на реке Калитве 22-23 февраля 1991 тетеревятники держались уже у своих гнёзд, и самки активно кричали по утрам. Кормятся эти ястреба грачами (2 случая), кольчатыми горлицами (1 случай), кряквами (1 случай) и др.

Accipiter nisus. Немногочисленный условно оседлый вид. Гнездование выявлено в пойме среднего Дона (Белик 2004, 2005), возможно также в долине реки Чир. Осенью 2005 года, в сентябре-ноябре, зарегистрировано 20 одиночных птиц (по месяцам: 9+6+5). Зимой учтены всего 4 перепелятника: 24 декабря 2005, 4 февраля 2006; 7 февраля 2006, 20 февраля 2006.

Buteo lagopus. Регулярно зимующий вид. В Чертковском районе в 1992 году первые 5 птиц встречены 12 ноября, а 18 ноября учтены 22 зимняка, концентрировавшиеся у люцерновых полей. В Боковском районе осенью 2005 года первые птицы отмечены 16 октября, почти через месяц после массовой миграции обыкновенных канюков *Buteo buteo* (20 сентября – 300 особей; 21 сентября – 600). Затем 21 октября наблюдались ещё 2 зимняка, а в ноябре учтены 4 особи. В 2006 году первые зимняки зарегистрированы 7 ноября (1 птица) и 8 ноября (2 птицы) – тоже через месяц после отлёта *B. buteo* (2 октября). В декабре 2005 года зарегистрированы 24 зимняка, в том числе 13 птиц (из них 6 в парах) пролетели на юго-запад 28 декабря. В январе 2006 года учтены 23 птицы, а в феврале – 11. В марте начинается миграция, направленная на север – северо-восток. За этот месяц было учтено 88 зимняков, в том числе 23 марта в 11 ч – 13 ч 45 мин на северо-восток вдоль долины небольшой степной речки пролетело 50 особей в одиночку (n = 18), парами (n = 12) и группами по 4 птицы, а 25 и 30 марта много зимняков наблюдалось по лесополосам среди полей. Закончился пролёт 10 апреля 2006. Всего в апреле учтено 11 птиц, в том числе 1 апреля отмечены 6 особей, летевших на север. Зимой зимняки держатся в основном в одиночку (n = 23) или парами (n = 10), иногда собираясь на кормных полях небольшими скоплениями до 5-7 особей.

Aquila chrysaetos. Редкий зимующий вид. Молодой беркут встречен 12 ноября 1992 в Чертковском районе. А 12 января и 18 февраля 2006 у свалки близ станицы Боковской наблюдалась, вероятно, одна и та же неполовозрелая птица с черно-белым хвостом и золотистой ша-

почкой. Возможно она же отмечалась поблизости также 10 и 27 января 2006.

Haliaeetus albicilla. Редкий оседлый вид, расселившийся по среднему Дону в 1970-1980-е годы, а на реке Чир близ станицы Боковской загнездившийся с 1986-1987 годов. Пара обитала здесь вплоть до 2006 года. На среднем Дону взрослые орланы зимой наблюдаются регулярно (14 декабря, 18 января, 1 и 15 февраля), но на реке Чир они встречаются реже (28 декабря – 1 птица; 4 февраля – 2; 8 февраля – 1 птица). Изредка поблизости регистрируются также молодые орланы (11, 14 января; 4-5 февраля). Держатся они обычно у свалки, питаясь на тушах павших домашних животных.

Gyps fulvus. Очень редкий залётный вид. По опросным данным, в осенне-зимний период 1991 года одиночный белоголовый сип несколько раз наблюдался лесниками и егерями в Тацинском районе – над хутором Фоминка, а затем в лесном массиве у хутора Качалин, где он кормился на туше погибшего оленя *Cervus elaphus*. Позже, возможно, та же особь была найдена там мёртвой, но без следов ранений.

Falco columbarius. Регулярно зимующий вид. Зимой 2005/06 года дербники появились лишь в середине февраля – вслед за налётом в заснеженные степи многочисленных белокрылых жаворонков (Ломакин 2006б). Первый дербник встречен 13 февраля 2006 у станицы Боковской. Затем с 20 февраля по 21 марта, в период, когда численность белокрылых жаворонков была максимальной, в Боковском и Обливском районах учтено ещё 5 одиночных дербников, после чего они вслед за жаворонками исчезли. И лишь через месяц, 27 апреля 2006, когда уже прилетели чеглоки *Falco subbuteo* (первая встреча 23 апреля 2006), близ станицы Боковской вновь наблюдался одиночный дербник. Это была птица, появившаяся, по-видимому, на пролёте из более южных районов Предкавказья.

Falco tinnunculus. Немногочисленный гнездящийся, случайно зимующий вид. Охотившийся в полях самец наблюдался 2 февраля 1989 в Чертковском районе. В ноябре 1992 года пустельги там не были найдены. Не регистрировались зимние встречи с ними и в других северных районах Ростовской области.

Perdix perdix. Довольно обычный оседлый вид, для которого характерны резкие колебания численности, связанные с флуктуациями метеоусловий в зимний период. Зимой 2005/06 года серые куропатки были немногочисленны. Зарегистрировано всего 7 встреч: 5 января – 7, 7 и 2 птицы; 8 января – 9; 14 января – 5 и 2; 2 февраля – 3 птицы. Держатся куропатки зимой обычно по левадам, в степных балках и лесополосах.

Phasianus colchicus. Немногочисленный оседлый вид, заселивший север Ростовской области в результате акклиматизационных ра-

бот (Тютькин 1975). Но сейчас здесь в большинстве районов преобладает самостоятельно расселившийся «гибридный» охотничий фазан, более приспособленный к глубокоснежным зимам (Белик 2004, 2005). В окрестностях станицы Боковской зимой 2005/06 года одиночные фазаны встречены всего 3 раза: 21 декабря – самец, собиравший плоды лоха, оброненные дроздами; 3 января – самец; 11 января – самка. Держатся фазаны обычно в поймах рек среди кустарников или в рогозах и тростниках у прудов.

Rallus aquaticus. Обычный гнездящийся, нерегулярно зимующий вид. В январе-феврале 2006 года пастушок изредка отмечался по берегам незамерзающих водоёмов (родники и т.п.). Несколько раз встречался и в предыдущие зимы (Ломакин 2006а).

Otis tarda. Редкий гнездящийся и нерегулярно зимующий вид. Осенью 2005 года пролётные дрофы регистрировались 20 ноября (17 особей летели на юг) и 27 ноября (1 птица летела на запад), а в 2006 году – 1 ноября (9 птиц летели на юго-запад). Зимой 2005/06 года дрофы встречены 4 раза: 28 декабря (2 птицы летели на юг); 31 декабря (7 птиц летели на юго-запад); 3 и 31 января (3 и 18 птиц на озимых полях). Миграции идут обычно в полуденные часы (12 ч – 14 ч 15 мин).

Vanellus vanellus. Обычный гнездящийся, случайно зимующий вид. Одиночный, внешне здоровый чибис встречен 28 декабря 2005 на берегу незамёрзшей реки близ станицы Боковской.

Larus canus. Немногочисленная пролётная, случайно зимующая птица. Останавливающиеся на больших прудах осенне-пролётные сизые чайки отмечались 25 сентября – 1 октября 2005 (5-6 особей) и 26 ноября 1992 (10 особей). Зимой одиночная птица встречена 23 февраля 2006 у станицы Боковской. Возможно, это была чайка, начавшая весеннюю миграцию на север с нижнего Дона.

Columba palumbus. Обычный гнездящийся, случайно зимующий вид. Вяхирь был встречен 23 декабря 1990 в Каменском районе П.И. Кореневым (устн. сообщ.). Добытая птица отличалась очень низкой упитанностью.

Columba livia. Многочисленный, местами обычный оседлый вид всех населённых пунктов. В начале сентября 2005 года на зернохранилище у станице Боковской учтено до 195 сизых голубей.

Streptopelia decaocto. Обычный, местами многочисленный оседлый вид, в станице Вёшенской появившийся в 1974 году, а к концу 1970-х годов заселивший все населённые пункты среднего Дона (Тютькин 1975; Белик 2004, 2005). На подсолнечном поле у станице Боковской 22 октября 2005 было учтено до 96 особей. Зимой кольчатых горлиц нередко добывают тетеревятник и перепелятник.

Bubo bubo. Редкий оседлый вид, гнездящийся по овражистым балкам в степи. В окрестностях Городищенского лесхоза на реке Ка-

литве ночью 22 февраля 1991 активно токовало не менее 3 самцов. В Каменском районе на Северском Донце один филин токовал вечером 24 января 1996 на обрывах коренного берега у хутора Богданов. В окрестностях станицы Боковской в радиусе до 10 км известно 3 места постоянного обитания филина. На одном из них 7 октября 2005 обнаружены поеди и ощипы сизых голубей, серой куропатки, ежа, а в лесополосе недалеко от этого места 5 января 2006 встречен 1 филин.

Asio otus. Обычный гнездящийся, спорадически зимующий вид. Численность резко колеблется по годам в зависимости от состояния кормовой базы. Стайка примерно из 10 ушастых сов встречена 21 февраля 1991 на месте днёвки в старом сосняке Городищенского лесхоза в Тарасовском районе. Вечером отмечено уже их токование. Погибшая сова найдена также 23 февраля 1991 в сосняках того же лесхоза в Миллеровском районе. В Каменском районе 24 января 1996 встречена стая до 12 птиц, дневавших на опушке леса у Северского Донца. Зимой 2005/06 года ушастая сова не наблюдалась, но в следующую зиму 5 птиц дневало на ели в центре станицы Боковской. Летом 2007 года недалеко был найден выводок слётков, а зимой 2007/08 года на той же ели держались 2 совы.

Asio flammeus. Немногочисленный гнездящийся, кочующий зимой вид. Численность тоже очень сильно флуктуирует по годам. Токование одной болотной совы отмечено вечером 21 февраля 1991 в долине реки Калитвы в Тарасовском районе.

Aegolius funereus. Редкий оседлый вид. В Ростовской области мохноногий сыч найден лишь в сосняках Городищенского лесхоза на реке Калитве (Белик 1992а), хотя эти совы, судя по нашим встречам в Воронежской области в 2001 году, могут гнездиться и в других сосновых лесах на севере Ростовской области, в частности – по среднему Дону. В Городищенском лесхозе 21-22 февраля 1991 по ночам активно токовали 2-3 самца.

Athene noctua. Редкий оседлый вид, гнездящийся в постройках населённых пунктов. Домовый сыч наблюдался 18 февраля 2006 в станице Боковской.

Strix aluco. Довольно обычный оседлый вид пойменных лесов Дона, Северского Донца, Калитвы. Возможно гнездование также на реке Чир. На среднем Дону серые неясыти отмечались в ноябре 2005 года. На Калитве в окрестностях Городищенского лесхоза ночью 21 февраля 1991 токовали 2-3 самца.

Picus canus. Довольно обычный оседлый вид, гнездящийся в пойменных лесах по Дону, Северскому Донцу, Чиру и их более мелким притокам. На реке Чир у станицы Боковской впервые был найден в январе 1990 года. Зимой седой дятел скрытен и регистрируется крайне редко, случайно. В ноябре 2005 года на постоянном участке у станицы

Боковской отмечены 3 встречи одиночных птиц, а в первой половине ноября 2006 года там же наблюдались 2 птицы – самец и самка. Однако за зиму 2005/06 года эта же пара встречена там лишь однажды – 15 декабря. Вокальная активизация отмечена в середине марта (17 марта 2006). Но в Городищенском лесхозе на реке Калитве барабанивший и кричавший седой дятел наблюдался уже 22 февраля 1991.

Dryocopus martius. Редкий оседлый вид, появившийся на гнездовье в долине среднего Дона лишь в самые последние годы (Белик 2004, 2005). Желна встречена 27 сентября 2006 в низовьях Хопра (Волгоградская область), а в ноябре 2006 года одиночные чёрные дятлы 4 раза отмечены в черноольшаниках урочища Черня в низовьях Елани на востоке Шолоховского района. Зимние наблюдения отсутствуют.

Dendrocopos major. Обычный оседлый вид. В слабо облесённой долине верховий Чира большой пёстрый дятел немногочислен. Здесь в январе 2006 года зарегистрированы всего 3 встречи одиночных самок.

Dendrocopos syriacus. Немногочисленный оседлый вид, заселивший города и сёла Ростовской области в 1980-1990-е годы (Белик 1990, 2004, 2005). В станице Боковской впервые обнаружен 27 ноября 2005 в результате целенаправленных поисков. Затем в декабре здесь было отмечено 6 встреч с одиночными самцами и самками, а 11 января и 1 февраля в станице наблюдались барабанившие птицы. Кроме того, 3 одиночных сирийских дятла встречены 20 февраля 2006 в станице Обливской. Дятлы кормились обычно орехами лещины, которые собирали на земле и разбивали в «кузницах» на деревьях, но однажды наблюдали птицу, вскрывавшая в кузнице сухие яблоки, сорванные в кроне.

Dendrocopos medius. Немногочисленный оседлый вид, заселивший средний Дон, вероятно, в 1980-е годы (Белик 1990). С.А.Ломакиным средний пёстрый дятел был впервые встречен там 3 ноября 1986. На Северском Донце у Каменска, куда птицы расселились, вероятно, из Луганской области, первая встреча отмечена 24 января 1996. В 1990-е годы этот дятел появился на реке Чир, расселяясь вдоль пойменных лесов из его низовий. За зиму 2005/06 года в окрестностях станицы Боковской зарегистрированы 4 встречи с одиночными птицами.

Dendrocopos minor. Немногочисленный оседлый вид, заселивший средний Дон, вероятно, в 1950-1960-е годы (Петров 1965). В окрестностях станицы Боковской впервые отмечен в 1980 году, а в 1983 году оказался нередок на реке Чир в Обливском районе. За зиму 2005/06 года было зарегистрировано 7 встреч малых пёстрых дятлов, в том числе 1 пара.

Galerida cristata. Обычный оседлый вид, обитающий на пустырях – вдоль дорог, у селений, ферм и т.п. Зимой держится стаями от 3 до 20 особей, распадающимися к началу марта. На постоянном пешеходном маршруте (Боковская – Земцовский) протяжённостью 4 км в

окрестностях станицы Боковской в течение зимы учитывалось от 11 (13 февраля) до 51 (3 февраля) особи, в среднем (n = 6) 33 особи. А на автотрассе Боковская – Обливская 20 февраля 2006 на 100 км учтено 7 стай общим числом 69 особей. В местах концентрации хохлатых жаворонков (фермы у села Криворожье Миллеровского района) 23 февраля 1991 было учтено даже 20 птиц на 0.5 км маршрута. В этот день отмечено уже их пение.

Melanocorypha calandra. Немногочисленный гнездящийся, случайно зимующий вид. Одиночная птица вспугнута 23февраля 1991 на дороге среди полей в Миллеровском районе. До глубокой депрессии численности, охватившей в начале 1990-х годов южноевропейские популяции степного жаворонка, это вид был повсеместно обычен и даже многочислен (Белик 2000а,б), а на юге Ростовской области регулярно наблюдался на зимовке.

Melanocorypha leucoptera. Эпизодически зимующий массовый вид. В конце января 2006 года на севере Ростовской области появились большие стаи белокрылых жаворонков, вытолкнутые, вероятно, из восточных степей мощными снегопадами и продержавшиеся здесь до середины марта. Характеристика этой инвазии более детально описана в отдельной работе (Ломакин 2006б).

Melanocorypha yeltoniensis. Редкий, эпизодически зимующий вид. На севере Ростовской области в небольшом числе чёрный жаворонок появился в конце февраля 2006 года вместе с белокрылым. Всего здесь зарегистрировано 5 стай численностью от 4 до 100 особей. Первые птицы замечены 24 февраля 2006, а последняя стая – 3 марта 2006 (Ломакин 2006б). В прошлом встречался здесь зимой более часто. Представление о прежней численности чёрного жаворонка дают материалы Л.А.Смогоржевского (1953), который для изучения питания птиц в январе-феврале 1950 года добыл близ посёлка Чертково 75 особей. В их желудках абсолютно доминировали семена спорыша *Polygonum aviculare*, часто встречались семена лебеды *Atriplex patulum*, реже семена культурных злаков.

Eremophila alpestris. Немногочисленный зимующий вид. Одиночные птицы встречены 26 ноября 1992 в окрестностях станицы Боковской и 3 декабря 1992 – в Обливском районе. Стая до 40 птиц наблюдалась 2 февраля 1989 на жнивье в Чертковском районе. Зимой 2005/06 года рогатый жаворонок не регистрировался. В прошлом встречался чаще. Так, зимой 1950 года в окрестностях Чертково Л.А.Смогоржевский (1953) добыл 30 рогатых жаворонков, в желудках которых абсолютно доминировали семена спорыша и щирицы *Amaranthus* sp.

Lanius excubitor. Обычный зимующий вид. Первые одиночные серые сорокопуты регистрировались 14 ноября 1992 в Чертковском районе, 1 ноября 2005 в Боковском районе и 4 ноября 2005 в Шолохов-

ском районе. В декабре 2005 года встречены 2 птицы (14 и 21 декабря), в январе 2006 года зарегистрировано 12 птиц, в том числе 3 раза по 2-3 птицы в день, а в феврале – тоже 12 птиц, в том числе 3 раза по 2-3 птицы в день. Весенний пролёт начался в середине марта (18 марта 2006), в третьей декаде этого месяца было учтено 7 особей, а последние 2 птицы отмечены 2 и 3 апреля 2006. Осенью 2006 года первые серые сорокопуты появились 21 октября, но затем до середины ноября их не было видно. Держатся они, как правило, в одиночку вдали от дорог и жилья. Лишь однажды наблюдались в хуторе. На юге Ростовской области серый сорокопут встречается значительно реже (Белик 1992а).

Garrulus glandarius. Немногочисленный оседлый вид. В январе учтены 4 пары и группа из 3 особей, державшиеся в редколесьях, в лесополосах и хуторах. А 20 февраля 2006 вдоль автотрассы Боковская – Обливская на 100 км учтены 32 сойки, державшиеся в одиночку (n = 4) и группами до 5-8 особей.

Pica pica. Немногочисленный оседлый вид. В январе учтено лишь 40 сорок, в том числе концентрация на свалке (19 особей) и в пойменном редколесье у гнезда орлана (10 особей). А 20 февраля 2006 вдоль автотрассы Боковская – Обливская на 100 км учтено всего 37 птиц, державшихся в одиночку (n = 8) и группами до 5-6 особей. Численность сороки в окрестностях станицы Боковской в последние десятилетия резко сократилась. Так, в начале 1990-х годов к югу от Боковской были известны два зимних ночёвочных скопления сорок, на которых собиралось до 100 и 900 особей. Ещё две ночёвки поменьше располагались к северу от станицы. Южные ночёвки были приурочены к местообитаниям филинов, которые, вероятно, косвенно защищали сорок от тетеревятника. После исчезновения же филина на одном из них, ночёвка сорок там к январю распалась.

По наблюдениям С.А.Ломакина, причинами, вызвавшими сокращение численности сорок и других врановых, стал, во-первых, кризис в сельском хозяйстве России, прежде всего в животноводстве, вызвавший в 1990-е годы прекращение заготовок кукурузного силоса, обеспечивавшего зимнее питание сорок, а также исчезновение скотомогильников, где врановые кормились в течение всего года. Второй причиной явилось усиление пресса хищников, особенно ястреба-тетеревятника. Сейчас, с исчезновением сорок и зимних ночёвок грачей, т.е. с сокращением кормовой базы тетеревятника, началось падение и его численности (см. выше). Кроме того, в последние десятилетия наблюдалось увеличение численности лесной *Martes martes* и каменной *M. foina* куниц, наносящих большой урон сорочьим гнёздам. Так, в 1980 году в Боковском и Вёшенском районах отмечено 14 гнёзд сорок, разорённых куницами, причём у некоторых пар – по 2 раза. Следует заметить, однако, что в 1980-е годы, несмотря на усиление хищнической

деятельности куниц, сокращения численности врановых ещё не было заметно. Наоборот, она продолжала увеличиваться (см.: Белик 1989; Белик, Сидельников 1989; и др.). Кроме того, не исключено, что повышение хищничества куниц провоцировалось самими исследователями, посещавшими и проверявшими гнёзда врановых птиц и тем самым привлекавшими к ним внимание наземных хищников.

Nucifraga caryocatactes. Залётный инвазионный вид, эпизодически появляющийся на юге России в ходе нерегулярных осенне-зимних кочёвок (Хохлов, Белик и др. 1992). В окрестностях станицы Вёшенской 2 кедровки наблюдались 18 октября 1988. Вероятно, та же инвазия 1988 года была отмечена и вёшенским охотоведом С.И.Гавринёвым (Белик 2004, 2005).

Corvus monedula. Обычный гнездящийся, немногочисленный зимующий вид, более характерный в местах зимних скоплений грачей (см. ниже). Последние галки у гнёзд в бетонных опорах высоковольтных ЛЭП среди полей отмечены 19 октября 2005, а 14 февраля 2006 они вновь появились у своих гнездовий. 21 февраля 1991 галки наблюдались у гнёзд в опорах ЛЭП также в Каменском районе. Скопление до 60 птиц встречено 20 февраля 2005 на свалке близ станицы Обливской, а в конце февраля галки несколько раз наблюдались в окрестностях станицы Боковской.

Corvus frugilegus. Обычный гнездящийся, немногочисленный зимующий вид. Отлёт основной массы грачей происходит во второй половине октября. Так, заметное сокращение их численности на ночёвке в станице Боковской отмечено 13 октября 2005, а затем 20 октября 2005. Днём 22 октября 2005 наблюдались 6 стай, пролетевших над степью на юг – юго- запад, а вечером туда же отлетела бóльшая часть грачей из станицы Боковской. На ночёвку же в станице осталось всего около 300 особей из 7 тысяч, собиравшихся здесь в начале сентября. В конце октября, 27-го, здесь ночевало лишь 150-200 птиц, а 31 октября – около 10 особей. В ноябре на ночёвке в станице Боковской учитывалось от 42 до 87 птиц, часть из которых была, вероятно, пролётными или прилетевшими на зимовку из более северных районов, а 25 января 2006 здесь ночевало всего 22 грача. Большие зимовочные скопления грачей на севере Ростовской области формируются только в городах или на крупных железнодорожных станциях (Чертково, Миллерово, Тарасовский, Каменск, Белая Калитва, Морозовск и т.п.). Например, в Чертково в начале февраля 1989 года на ночёвку собиралось до 10-20 тыс. грачей. В остальных районных центрах зимуют лишь десятки-сотни особей (Белик 1992б). У своих гнёзд в станице Боковской местные птицы впервые отмечены 2-3 марта 2006.

Corvus cornix. Обычная оседлая птица. Зимой часто встречается небольшими стаями до 10-25 особей. Территориальные пары серых во-

рон держатся обычно в районе своих гнездовий. На автотрассе Боковская – Обливская 20 февраля 2006 на 100 км учтены 23 птицы, в том числе 4 пары и 2 одиночки.

Corvus corax. Немногочисленный оседлый вид. В сентябре зарегистрированы 12 встреч с одиночками и парами, в октябре – 10 встреч, в том числе 2 раза наблюдались стаи из 39 и 19 воронов, в ноябре зафиксировано 9 встреч, в основном с парами. В декабре во́роны отмечены 2 раза (2 и 5 птиц), в январе – тоже 2 раза (2 и 4 птицы), а в феврале – 4 раза, в том числе 9 птиц 18 февраля 2006 на свалке у станицы Боковской и 2 одиночные птицы 20 февраля 2006 на автомаршруте Боковская – Обливская.

Bombycilla garrulus. Зимующий инвазионный вид, в отдельные годы появляющийся в очень большом количестве, а в другие – не встречающийся вовсе (Белик 1997). Зимой 2005/06 года отмечена очередная мощная инвазия свиристелей. Первые 5 птиц замечены 9 ноября 2005. Затем в ноябре (15-29-го) зарегистрированы ещё 6 стай по 2-9 птиц, 30 ноября в станице Боковской появилась стая из 21 птицы, а в декабре численность свиристелей стала быстро увеличиваться. В Боковской 2-7 декабря держалось 50-80 птиц, а 12 декабря появилась стая из 400-500 особей. На автомаршруте Боковская – Вёшенская 13 декабря на 60 км учтено более 700 свиристелей, в том числе 3 стаи по 100-300 особей, а 14 декабря на обратном пути учтено 1800-1900 птиц, в том числе 3 стаи по 300-400 особей. После этого численность свиристелей начала снижаться, и в третьей декаде декабря в станице Боковской учитывалось обычно до 80-100 птиц в день, а в январе 2006 года они встречены всего 2 раза: 1 января – 30 особей и 10 января – 6. В феврале численность свиристелей несколько увеличилась, возможно, в связи с началом их обратной откочёвки на север, и за этот месяц в Боковской отмечено 8 стай по 3-100 особей (всего 325 птиц), а в марте – 5 стай по 3-26 особей (всего 66 птиц). Последние свиристели встречены 22 марта (13 птиц) и 28 марта (26 птиц). В зиму 2006/07 года вновь наблюдался небольшой налёт свиристелей, появившихся 11 ноября 2006 (80 птиц), а затем встреченных ещё 2 раза – 13 ноября (86 птиц) и 14 ноября (67). Зимой же 2007/08 года свиристелей на севере Ростовской области не было и лишь весной отмечены 2 стайки на обратной миграции: 31 марта 2008 (16 птиц) и 2 апреля 2008 (9 особей).

Кормятся зимующие свиристели различными плодами, явно предпочитая неубранный виноград, на котором они регистрировались 9 раз. После винограда они «убирают» рябину, на которой отмечены 5 раз, а также калину (5 раз). В голодное время птицы клевали гнилые яблоки, оставшиеся на деревьях (6 раз), шиповник (1 раз). Однажды они отмечены на лохе, но его мучнистые плоды, вероятно, мало привлекают свиристелей.

Troglodytes troglodytes. Немногочисленный зимующий вид. Возможно, крапивник гнездится в заболоченных ольшаниках на среднем Дону (Белик 1992а, 2004, 2005), а в Боковском районе появляется лишь на зимовке. Осенью первые птицы зарегистрированы 14 октября 2005. В октябре крапивник встречен ещё 1 раз, в ноябре – 6, в декабре – 6, в январе – 5 раз. В феврале крапивники не отмечались, что было связано с выпадением глубокого снега, засыпавшего осоку, ежевичники и др. Не был прослежен в 2006 году и их весенний пролёт. Держатся крапивники, как правило, в одиночку, кормясь в зарослях осоки по берегам ручьёв, прудов, болот (12 встреч), иногда отмечаются в кустарниках среди селений (4 встречи).

Regulus regulus. Немногочисленный зимующий вид. Осенью первый желтоголовый королёк встречен 19 октября 2005. В ноябре 1 королёк отмечен на среднем Дону (3 ноября). Стайка из 5 птиц наблюдалась на Дону также 18 января, а ещё 1 птица встречена 26 февраля в Боковском районе. В ноябре 1992 года в Чертковском районе корольки регистрировались 3 раза, в Боковском – 9 раз и ещё 1-2 раза они были отмечены в Обливском районе.

Erithacus rubecula. Обычный гнездящийся, случайно зимующий вид. Две зарянки наблюдались 3 декабря 1992 в терновниках среди заболоченного леса по днищу балки в Обливском районе на границе с Волгоградской областью.

Turdus pilaris. Немногочисленный гнездящийся, обычный зимующий вид. Осенью 2005 года рябинник появился 19 октября (11 птиц), а в 2006 – 31 октября (9 птиц). В ноябре 2005 года встречен лишь однажды, а в первой половине ноября 2006 – 5 раз. В декабре 2005 года зарегистрировано 16 встреч, в том числе 6 стай по 20-40 птиц, в январе 2006 – 8 встреч, причём самая крупная стая не превышала 10 особей, а в феврале отмечено 7 встреч, в основном – одиночки. В марте 2006 года наблюдалась выраженная миграция (7 стай численностью до 50-100 особей), закончившаяся к 7 апреля (12 птиц). Кормятся рябинники зимой, в основном, на рябине, калине, лохе, нередко клюют гнилые яблоки на деревьях, иногда наблюдаются на бирючине, облепихе.

Turdus iliacus. Редкий гнездящийся, случайно зимующий вид. Единственная наша зимняя встреча одного белобровика произошла 24 января 1996 на окраине города Каменска в посадках лоха.

Panurus biarmicus. Немногочисленный оседлый вид, гнездящийся в зарослях тростника и рогоза на прудах. Зимой стаи усатых синиц численностью до 40-60 птиц отмечались в гнездовых биотопах 21 декабря 2005; 3 и 8 января 2006; 17 февраля 2006 у станицы Боковской.

Aegithalos caudatus. Немногочисленный гнездящийся, кочующий зимой вид. В зимний период ополовник отмечался 14 января 2006 (8 птиц), 27 января 2006 (10 птиц), 1 февраля 2006 (9 птиц).

Parus palustris. Немногочисленный оседлый вид, гнездящийся лишь в пойменных лесах по Северскому Донцу (Белик 1992а). Здесь у города Каменска 24 января 1996 наблюдалась кочевавшая стайка болотных гаичек из 3-5 особей, а также 1 пара, долго кормившаяся крылатками клёна татарского.

Parus montanus. Немногочисленный оседлый вид лесов среднего Дона (Белик 1992а, 2004, 2005). За их пределами пухляк не встречается. Стайка до 5 птиц наблюдалась 3 ноября 2005 в пойменном лесу в Шолоховском районе, а 8-10 ноября 2006 пухляки несколько раз отмечались в ольшаниках урочища Черня на востоке Шолоховского района. Зимние наблюдения отсутствуют.

Parus ater. Зимующий инвазионный вид, в небольшом числе появляющийся в Ростовской области в отдельные годы. В декабре 1990 года московка наблюдалась Б.А.Казаковым в сосняках у Боковской (Белик 1992а). Стайка из 8 птиц замечена 21 октября 2006 в этой станице. Здесь они держались до 31 октября, а последняя птица была учтена 6 ноября 2006. В сосняках Каменского района на Северском Донце, по наблюдениям П.И.Коренева (устн. сообщ.), инвазия московок отмечена в начале января 1996 года, после чего стайка из 2-7 птиц держалась на кормушке с семечками подсолнечника до 20 февраля 1996.

Parus caeruleus. Довольно обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. В январе 2006 года отмечено 5 встреч (по 1-5 птиц), в феврале – 1 встреча (26 февраля 15-20 особей). Зимой лазоревка часто держится у тростниковых зарослей.

Parus major. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. В январе 2006 года зарегистрировано 9 встреч, в том числе 7 стай по 10-20 особей. В станице Вёшенской 1 февраля 2006 отмечено первое весеннее пение большой синицы.

Sitta europaea. Довольно обычный оседлый вид пойменных лесов среднего Дона и Северского Донца (Белик 1992а, 2004, 2005). На среднем Дону в Шолоховском районе впервые поползни были отмечены С.А.Ломакиным ещё осенью 1967 года. За пределами гнездовых биотопов кочующие птицы регистрируются крайне редко. На Дону у станицы Вёшенской зимой 2005/06 года дважды встречены одиночки: 14 декабря и 15 февраля. На Северском Донце у Каменска одиночный поползень, кочевавший в стае синиц, наблюдался 24 января 1996.

Certhia familiaris. Довольно обычный гнездящийся, широко кочующий зимой вид. Гнездится в пойменных лесах среднего Дона и Северского Донца (Белик 1992а, 2004, 2005). В последнее время пищуха начала осваивать байрачные леса и искусственные лесные массивы, но в долине реки Чир её гнездовья и летние встречи пока неизвестны. Осенью 2005 года птицы появились здесь в конце сентября (24 сентября – 1 птица). В октябре отмечена ещё 1 особь, а в ноябре на Чире пи-

щуха не регистрировалась. В декабре наблюдалась в кочующих синичьих стаях 6 декабря 2005 (2 раза) и 12 декабря (1 раз), а в январе отмечено 5 встреч, в том числе 3 птицы 10 января кормились рядом со средним дятлом. На Северском Донце у Каменска 24 января 1996 наблюдалось не менее 4-5 пищух, молча кормившихся в стае синиц.

Passer domesticus. Многочисленный оседлый вид, гнездящийся в постройках во всех селениях. Местами в сёлах домовый воробей устраивает колонии на ветвях в кронах деревьев.

Passer montanus. Обычный оседлый вид, гнездящийся во всех селениях. Нередко заселяет дупла деревьев в пойменных редколесьях. Зимой полевой воробей кормится обычно семенами сорняков на придорожных пустырях, держась стаями до 50-150 особей, нередко вместе с овсянками и вьюрковыми птицами.

Fringilla coelebs. Обычный гнездящийся, немногочисленный зимующий вид. Зимой держится обычно в смешанных стаях с воробьями, овсянками и другими вьюрковыми птицами на пустырях вдоль дорог, на свалках, у ферм, зернохранилищ и т.п. В отдельных стаях зимой учитывается иногда до 20-50 зябликов.

Fringilla montifringilla. Немногочисленный зимующий вид. Первые птицы отмечены 28 декабря 2005. В январе 2006 года зарегистрированы 3 встречи, в феврале – 2 одиночные птицы. Последние юрки наблюдались 13 марта 2006. У станицы Вёшенской стайка встречена 19 апреля 1989 (Белик 2004, 2005). Кормятся юрки обычно семенами ясеня в лесопосадках, где наблюдались стаи численностью до 10-40 особей. Иногда встречаются в стаях зябликов на придорожных пустырях.

Chloris chloris. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. В зимний период зеленушки весьма малозаметны и отмечаются обычно стайками лишь у мест ночёвок, устраиваемых в тростниках по берегам прудов, в густых сосняках или на елях в деревенских скверах. В ночёвочных стаях 3 января 2006 и 13 февраля 2006 учитывалось до 20-30 птиц. Кормятся зеленушки зимой, в основном, плодами лоха, растущего у ручьёв по балкам.

Carduelis carduelis. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. В ноябре 2005 года щеглы не регистрировались, в декабре они отмечены 2 раза (4 особи), в январе – 11 (224 особи), в феврале – 5 (380 особей). Численность птиц к концу зимы возрастает, в основном, за счёт увеличения величины стай. В марте их стаи, вероятно, распадаются, и щеглы становятся менее заметны. Кормятся они зимой почти исключительно на пастбищах и полях семенами сорняков (дурнишник, лопух, цикорий и др.).

Spinus spinus. Обычный зимующий вид. Первые чижи отмечались 22 октября 2005 и 8 октября 2006. В ноябре 2005 года зарегистрированы 2 встречи, в декабре – 8, в январе – 6 и в феврале – 5 встреч.

Последний самец наблюдался 25 марта 2006. Иногда весенне-пролётные птицы задерживаются на среднем Дону до апреля и даже до мая (Белик 2004, 2005). Держатся чижи обычно стаями в 5-50 особей, в среднем (n = 18) по 23 птицы. Изредка отмечаются одиночки и пары. Кормятся чижи, в основном, на ольхе (6 стай, 140 особей), иногда на берёзе (2 стаи, 30 особей). Нередко они наблюдаются на хмеле (6 стай, 60 особей). При отсутствии кормовых деревьев чижи встречаются вместе с другими вьюрковыми на бурьянах – циклахене (3 стаи, 70 особей), полыни горькой (1 стая, 12 особей) и др.

Acanthis cannabina. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. Держится обычно крупными скоплениями в смешанных стаях вьюрковых птиц, овсянок и воробьёв, доминируя в них по численности. Средняя величина стай составляла 107 особей в декабре (n = 7), 146 – в январе (n = 11) и 57 – в феврале (n = 6). На постоянном маршруте в окрестностях станицы Боковской (протяжённостью около 4 км) в декабре 2005 года учитывалось от 90 до 200 птиц (n = 2), в январе 2006 – по 15-300 птиц (n = 8), а в феврале – по 10-100 (n = 5), в среднем, соответственно, 145, 190 и 54 птицы. В марте стаи, вероятно, распадаются, и коноплянки становятся малозаметны. Кормятся они зимой, как правило, семенами сорняков (спорыш, марь, циклахена и др.) на обочинах дорог, пустырях, залежах.

Acanthis flammea. Немногочисленный зимующий вид. В Чертковском районе 2 февраля 1989 отмечены одиночная птица и стайка из 5 особей, кормившихся в балке на сорняках. В Тарасовском районе 22 февраля 1991 встречена стайка из 11 птиц, пролетевших на север. В Каменском районе 24 января 1996 наблюдалась 1 птица, пролетевшая над Северским Донцом. В Боковском районе зимой 2005/06 года чечётка могла быть пропущена среди многочисленных других вьюрковых птиц.

Pyrrhula pyrrhula. Довольно обычный зимующий вид. Осенью 2005 года снегирь впервые отмечен 1 ноября в Шолоховском районе, где птицы были уже обычны, а в 2006 году они были замечены там же 9 ноября, но их численность оказалась ниже. В Боковском районе первые снегири наблюдались 28 декабря 2005. В январе 2006 года они регистрировались 6 раз, а в феврале – 2 раза. Последние 4 группы по 2-4 особи отмечены на реке Чир 18 марта 2006. Держатся снегири зимой обычно обособленными стайками по 5-20 особей, в среднем (n = 9) по 10 птиц, изредка встречаются в одиночку. Кормятся они, в основном, семенами полевого клёна (n = 7) и ясеня (n = 6).

Coccothraustes coccothraustes. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. В течение января 2006 года зарегистрировано 7 встреч со стайками по 3-30 особей (в среднем 9 птиц). Изредка встречается в одиночку (n = 3). Кормятся дубоносы зимой в основном семенами ясеня

(n = 3) и клёна полевого (n = 1), а также костянками лоха (n = 2).

Emberiza citrinella. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. В течение января 2006 года зарегистрировано 8 встреч со стаями по 10-200 птиц, в среднем – по 50 особей. В феврале величина стай заметно уменьшилась (в среднем до 30 особей). Кормятся обыкновенные овсянки обычно семенами сорняков по обочинам дорог и пустырям, у свалок, ферм и т.п., держась в смешанных стаях с воробьями и вьюрковыми птицами.

Emberiza schoeniclus. Обычный гнездящийся, кочующий зимой вид. В течение января 2006 года зарегистрировано 5 встреч со стайками по 3-16 птиц, в среднем по 9 особей в стае. В феврале величина стаек сократились до 2-10 особей. Кормятся камышовые овсянки в основном на придорожных выдувах, обычно поблизости от заросших тростником водоёмов, куда прячутся при тревоге. Предпочтение отдают семенам злаков, в том числе семянкам ковыля-тырсы.

Plectrophenax nivalis. Редкий зимующий вид. Две пуночки встречены 1 декабря 1992 на полевой дороге в Обливском районе. На заснеженных дорогах в Чертковском районе 2 февраля 1989 встречены 1 и 4 птицы и два скопления из 50 и 150 пуночек.

★ ★ ★

Таким образом, за один зимний сезон 2005/06 года удалось почти полностью выявить видовой состав птиц, зимующих на севере Ростовской области (58 видов из 77). В этот период не были обнаружены только ушастая сова, для которой характерны очень сильные флуктуации численности в связи с обилием мышевидных грызунов (то же можно сказать и о болотной сове), и рогатый жаворонок, численность которого на южных зимовках в последние десятилетия значительно снизилась (Белик 1995). Зимой 2005/06 года не были зарегистрированы также пуночка и чечётка, появляющиеся в Ростовской области лишь изредка (Белик 2000в). Но последний вид мог быть пропущен в скоплениях многочисленных вьюрковых птиц, среди которых несколько раз отмечались не определённые мелкие птицы.

Вовсе не регистрировался на севере Ростовской области лапландский подорожник *Calcarius lapponicus*, однако этот малозаметный зимой вид тоже мог быть нами пропущен. Остальные виды, нерегулярно появляющиеся на юге России в осенне-зимний период (белая сова *Nyctea scandiaca*, клёст-еловик *Loxia curvirostra*, кедровка и др.), в 2005/06 году не попали в поле зрения, вероятно, из-за асинхронности их инвазий. В то же время зимой 2005/06 года удалось детально проследить инвазии белокрылого и чёрного жаворонков и свиристеля, а зимой 2006/07 года – также московки.

Литература

Белик В.П. 1989. Размещение и численность врановых птиц в Ростовской области // *Врановые птицы в естественных и антропогенных ландшафтах*. Липецк, **2**: 41-43.

Белик В.П. 1990. Дятловые птицы Ростовской области // *Малоизученные птицы Северного Кавказа*. Ставрополь: 6-29.

Белик В.П. 1992а. Новые и редкие виды птиц Ростовской области // *Кавказ. орнитол. вестн.* **3**: 53-74.

Белик В.П. 1992б. Сезонные миграции и зимовки грача на Нижнем Дону // *Экологические проблемы врановых птиц*. Ставрополь: 90-94.

Белик В.П. 1995. Зимовки рогатого жаворонка в степном Подонье // *Кавказ. орнитол. вестн.* **7**: 3-6.

Белик В.П. 1997. Зимовки свиристеля на юге России // *Научное наследие Н.Я.Динника и его роль в развитии современного естествознания*. Ставрополь: 26-28.

Белик В.П. 2000а. Некоторые особенности формирования летнего населения жаворонков в лугово-степных ландшафтах юго-восточной Европы // *Беркут* **9**, 1/2: 86-101.

Белик В.П. 2000б. Основные особенности и закономерности формирования летнего населения жаворонков в лугово-степных ландшафтах Юго-Восточной Европы // *Чтения памяти проф. В.В.Станчинского*. Смоленск, **3**: 110-114.

Белик В.П. 2000в. *Птицы степного Придонья: Формирование фауны, её антропогенная трансформация и вопросы охраны*. Ростов-на-Дону: 1-376.

Белик В.П. 2004. Птицы // *Флора, фауна и микобиота Музея-заповедника М.А.Шолохова*. Вёшенская: 194-216.

Белик В.П. 2005. Материалы к орнитофауне Среднего Дона // *Орнитология* **32**: 23-56.

Белик В.П., Сидельников В.В. 1989. Опыт оценки численности грача в Ростовской области на основе анкетных данных // *Врановые птицы в естественных и антропогенных ландшафтах*. Липецк, **2**: 68-70.

Бёме Р.Л., Кузнецов А.А. 1981. *Птицы лесов и гор СССР*. М.: 1-223.

Бёме Р.Л., Кузнецов А.А. 1983. *Птицы открытых и околоводных пространств СССР*. М.: 1-176.

Второв П.П., Дроздов Н.Н. 1980. *Определитель птиц фауны СССР*. М.: 1-256.

Ломакин С.А. 2006а. Зимовка большой выпи и пастушка на севере Ростовской области // *Стрепет* **4**, 1: 117-118.

Ломакин С.А. (2006б) 2011. Зимняя инвазия белокрылого *Melanocorypha leucoptera* и чёрного *M. yeltoniensis* жаворонков в Ростовскую область // *Рус. орнитол. журн.* **20** (684): 1721-1724.

Нагайцев А.А. 1971. Климат // *Физическая география Нижнего Дона*. Ростов-на-Дону: 25-39.

Петров В.С. 1965. Новые виды в летней орнитофауне Ростовской области // *Орнитология* **7**: 484-485.

Смогоржевский Л.А. 1953. Некоторые данные по питанию чёрного (*Melanocorypha yeltoniensis* Forster, 1767) и рогатого (*Eremophila alpestris* L., 1758) жаворонков // *Наук. зап. Київ. ун-та* **12**, 3: 87-89.

Тютькин А.А. 1975. Чтобы богаче была донская степь // *Охрана природы в Вёшенском районе*. Ростов-на-Дону: 66-68.

Хохлов А.Н., Белик В.П., Ветров В.В., Казаков Б.А., Заболотный Н.Л. (1992) 2011. О залётах кедровки *Nucifraga caryocatactes* на юг России и Украину // *Рус. орнитол. журн.* **20** (684): 1719-1721.

Храбрый В.М. 1988. *Школьный атлас-определитель птиц*. М.: 1-224.