ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2015
XXIV



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1199
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XXIV

Экспресс-выпуск • Express-issue

2015 № 1199

СОДЕРЖАНИЕ

3613-3622 О гнездовании лебедя-шипуна *Cygnus olor* на островах Малый Тютерс и Большой Тютерс в Финском заливе. С. А. КОУЗОВ

3622-3624 Статус большой белой цапли *Casmerodius albus* в Новгородской области. В. Ю. АРХИПОВ

3624-3625 Зимняя встреча теньковки *Phylloscopus collybita* в Закарпатской области. В. Н. ГЛЕБА

3626-3633 К авифауне верховий рек Большой и Малый Анюй (Чукотский автономный округ). И. В. ДОРОГОЙ

3633-3634 Случай прижизненного травматизма маскированной трясогузки *Motacilla personata*. Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ

3635 Новый залёт чёрного аиста *Ciconia nigra* в окрестности Нижне-Свирского заповедника. В. А. КОВАЛЕВ, А. П. СМИРНОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2015
Дата опубликования: 17 октября 2015

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXIV
Express-issue

2015 № 1199

CONTENTS

3613-3622 On the nesting of the mute swan *Cygnus olor* on the islands Maly and Bolshoy Tyuters in the Gulf of Finland. S.A.KOUZOV

3622-3624 The status of the great egret *Casmerodius albus* in the Novgorod Oblast. V.Yu.ARKHIPOV

3624-3625 Winter record of the chiffchaff *Phylloscopus collybita* in the Transcarpathian region. V.N.GLEBA

3626-3633 By avifauna of headwaters of the rivers Bolshoy and Maly Anuy (Chukotka Autonomous Okrug). I.V.DOROGOY

3633-3634 The case of lifetime injury in masked wagtail *Motacilla personata*. N.N.BEREZOVIKOV

3635 New record of the black stork *Ciconia nigra* in the neighborhood of Nizhne-Svirsky reserve. V.A.KOVALEV, A.P.SMIRNOV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St.-Petersburg University
St.-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2015

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1199**: 3613-3622*

О гнездовании лебедя-шипуна *Cygnus olor* на островах Малый Тютерс и Большой Тютерс в Финском заливе

С.А.Коузов

Сергей Александрович Коузов. Кафедра прикладной экологии, лаборатория экологии и охраны птиц, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: skouzov@mail.ru

Поступила в редакцию 7 октября 2015

Благодаря улучшению мер по охране природы и развитию тёплой фазы климата лебедь-шипун *Cygnus olor* в конце XX века широко расселился по островам и частично по побережьям Восточной части Финского залива (Бузун, Храбрый 1990; Бузун, Мераускас 1993; Бубырева и др. 1993; Леоке 1999; Иовченко и др. 2002; Коузов 2005; Коузов 2010; Коузов, Кравчук 2014). Наиболее восточной точкой на Финском заливе, где вид загнездился в последние годы, является угодье Чёрная Лахта (Коузов 2015). Вместе с тем, в пределах уже известных границ распространения шипуна на гнездовье в регионе до последнего времени почти не существовало какой-либо информации по островам Малый и Большой Тютерс. Это связано со строгим режимом пограничной зоны, существовавшей на данных островах до последнего времени. В данной работе приводятся результаты следующих научных экспедиций: экспедиции по программе «CorMan» Аархусского университета (Дания) – 26-30 июня 2012 и 11-14 октября 2013, экспедиции Балтийского фонда природы – 22 июня – 2 июля 2014 и экспедиции Русского географического общества – 27 мая – 7 июня 2015, а также данные из опубликованных отчётов экспедиций Балтийского фонда природы СПбОЕ (Vysotskiy *et al*. 2010, 2011).

Краткая ландшафтно-биотопическая характеристика островов Малый и Большой Тютерс

Оба острова являются крупными участками суши площадью 142 и 100 га, лежащими в самой западной, глубоководной части российской акватории Финского залива. Малый Тютерс представляет собой обширную песчаную гряду высотой до 5-8 м, набитую морем на моренной валунной банке. Отложения моренных валунов на прибрежных мелководьях наиболее развиты в северной и южной бухтах острова. Восточный берег представляет собой обширный песчаный пляж, переходящий в широкую мелководную зону. В юго-западной части острова есть небольшое округлое озерцо длиной до 35 м. Большая часть острова

занята молодым сосновым лесом. В северо-западной части находится небольшая котловина с тростниковым болотом, окаймлённым осиново-берёзовым лесом. Заросли полупогруженной растительности у побережья отсутствуют. В мелководной прибрежной зоне обширные зарастания нитчатых водорослей и высшей водной растительности, преимущественно рдестов, достигают наибольшего развития под прикрытием моренных гряд в южной и северной бухтах. Постоянно обитающих на острове крупных наземных хищников нет, в отдельные годы отмечаются заходы зимой по льду лисиц *Vulpes vulpes*, остающихся там на всё лето. Такая ситуация наблюдалась нами в 2012 году, в последующие годы лисиц здесь не отмечалось.



Рис. 1. Восточное побережье острова Большой Тютерс. 30 мая 2015. Фото автора.

Основная часть острова Большой Тютерс – высокая сглаженная гранитная сельговая скала высотой до 60 м, с юго-восточной стороны которой при регрессии моря образовались обширные песчаные отложения высотой до 25 м. Отложения моренных валунов развиты с восточной, южной и юго-западной сторон острова. Благодаря этому на юго-западном и восточном берегах острова имеется несколько небольших мелководных бухточек с мысами и островками, зарастающими тростником и луговой растительностью (рис. 1). Островки расположены не далее 20-50 м от берега и легко доступны для крупных млекопитающих. В этих местах на мелководьях развиваются водорослевые обрастания и куртины высшей водной растительности. Из наземных

хищников на острове многочисленна енотовидная собака *Nyctereutes procyonoides*. Лисица в годы наших обследований (2013 и 2015) на Большом Тютерсе не обнаружена.

Результаты

Остров Малый Тютерс. В опубликованных данных за 1991-1992 и 1994-1995 годы (Носков и др. 1993; Иовченко и др. 2002) среди гнездящихся на острове птиц лебедь-шипун не указывается. В дальнейшем остров долгое время не посещался орнитологами. При обследованиях экспедициями Балтийского фонда природы 2010-2011 годов гнездование одной пары шипунов отмечено только в 2011 году (Vysotskiy *et al*. 2010, 2011). При обследовании острова 28 июня 2012 нам не удалось выявить следов присутствия шипунов. Остров практически не был заселён гнездящимися водоплавающими птицами, что связано с деятельностью лисиц, проникавших на остров по льду в морозные зимы 2010/11 и 2011/12 годов. При посещении острова 12 октября 2013 нами встречен нелётный выводок из 4 молодых птиц.



Рис. 2. Покинутое выводком гнездо лебедя-шипуна *Cygnus olor* в северной бухте острова Малый Тютерс. 23 июня 2014. Фото автора.

23 июня 2014 на открытом галечном берегу северной бухты острова мы нашли покинутое гнездо лебедя-шипуна (рис. 2), построенное из фукуса. В лотке находилось 2 яйца с погибшими эмбрионами и один

птенец, погибший сразу после вылупления. В небольшом озерце у юго-западного мыса обнаружена пара шипунов с одним птенцом приблизительно 10-дневного возраста.

Остров Большой Тютерс. Среди опубликованных данных упоминается только о встрече в 1994 году около этого острова двух неразмножающихся пар (Носков и др. 1993; Иовченко и др. 2002). В дальнейшем остров орнитологами не посещался до 2013 года. При обследовании острова 11-12 октября 2013 у острова нами постоянно отмечалась пара без молодых птиц. 27 мая – 6 июня 2015 здесь обнаружены одна неразмножающаяся и две гнездящихся пары. Неразмножающаяся пара держалась у юго-западного берега острова в районе старой гавани с причалами заброшенной деревни. Гнёзда с кладками были найдены 28 мая 2015 при маршрутном учёте вдоль восточного берега острова. По сведениям работников маячной службы, ранее лебеди на этом острове не размножались.

Одно из найденных гнёзд располагалось в мелководной бухточке в средней части восточного берега на небольшом каменистом островке, зарастающем низкими дерновинными злаками и куртинками низкого тростника, в 100 м от берега (рис. 3). Гнездо построено из прошлогоднего тростника. Кладка содержала 7 яиц и, судя по результатам водного теста, была начата в начале третьей пятидневки мая. Здесь же гнездились 3 пары полярных крачек *Sterna paradisaea* и 1 пара сизых чаек *Larus canus*. Расстояние до двух ближайших гнёзд крачек 3.5 и 4.9 м.



Рис. 3. Гнездо лебедя-шипуна *Cygnus olor* на небольшом островке у восточного берега острова Большой Тютерс. 30 мая 2015. Фото автора.




Рис. 4. Гнездо лебедя-шипуна *Cygnus olor* на небольшом мысу в 20 м от опушки леса в северной части восточного берега острова Большой Тютерс. 30 мая 2015. Фото автора.



Рис. 5. Самка лебедя-шипуна *Cygnus olor*, охраняющая гнездо при подходе исследователей. Северная часть восточного берега острова Большой Тютерс. 30 мая 2015. Фото автора.

Второе гнездо находилось в 500 м к северу от первого и располагалось на небольшом каменистом мысу, также покрытом низкой злаковой растительностью в 20 м от опушки прибрежного леса (рис. 4). Ма-

териал гнезда состоял преимущественно из фукуса. В кладке было 6 яиц. Судя по «водному тесту», кладка была начата во второй пятидневке мая. Рядом на том же мыске гнездились 2 пары полярных крачек, 2 пары сизых чаек и 1 пара серебристых чаек *Larus argentatus*. Ближайшие к гнезду лебедя-шипуна гнёзда полярных крачек находились в 5.5 и 7.1 м.

При подходе исследователей к гнёздам шипунов обе самки вели себя чрезвычайно агрессивно, не покидали кладок при подходе к ним людей на 3-4 м, шипели, принимали угрожающие позы (рис. 5) и бросались в сторону человека.



Рис. 6. Пара лебедей-шипунов *Cygnus olor* во время шторма у гнезда на островке у восточного берега острова Большой Тютерс. 4 июня 2015. Фото автора.

После находки гнёзд в течение нескольких дней отмечалась штормовая погода с сильными западными ветрами и подъёмом воды на 40-50 см, высота волн в открытом море достигала 2.0-2.5 м. При повторном посещении этой части острова 4 июня 2015 обнаружено, что за это время оба гнезда достраивались сухим тростниковым плавником и молодыми стеблями тростника. Первое гнездо, располагавшееся на островке, при нашем посещении периодически оказывалось в зоне подтопления волнами (рис. 6). Обе птицы находились у гнезда и активно

надстраивали бортик тростниковым плавником и подсовывали его в дно лотка. При этом самка большую часть времени находилась на гнезде, прикрывая его от волн и ветра, и собирала только те стебли, до которых могла дотянуться (рис. 7). Самец собирал строительный материал в радиусе 2-6 м от гнезда и приносил его в клюве (рис. 8). Второе гнездо на небольшом мысу находилось дальше от моря, вне зоны подтопления. И тем не менее в его бортиках найдено большое количество свежих стеблей тростника. На гнезде находилась только самка, самец плавал и кормился в 200 м от гнезда, не проявляя какого-либо видимого беспокойства.



Рис. 7. Самка лебедя-шипуна *Cygnus olor* за достройкой гнезда во время шторма. 4 июня 2015. Фото автора.

Заключение

К сожалению, большие временны́е лакуны в исследованиях не позволяют точно определить время начала гнездования лебедя-шипуна на рассматриваемых островах. Опыт показывает, что сведения местных жителей не всегда являются точными и нуждаются в проверке. Можно только утверждать, что появление гнездящихся шипунов здесь произошло после 1995 года, то есть заметно позднее вселения этого лебедя на Кургальский полуостров и архипелаг Сескар, отмеченного в конце 1980-х годов (Бузун, Храбрый 1990; Бубырева и др. 1993; Носков и др. 1993; Васильева 2002; Коузов 2010; Коузов, Кравчук 2014). Скорее всего, это обусловлено несколько нехарактерным для гнездования вида стациями на этих островах – узкая полоса пляжа или небольшие луговые мысочки на крупном острове с лесом, подходящим близко к воде.

Такой ландшафт редко заселяется лебедями и в других частях Балтики, например, в финских шхерах (Numers 1995).

Обращают внимание поздние сроки откладки яиц шипунами на острове Большой Тютерс в 2015 году – вторая-третья пятидневки мая, что очень поздно по сравнению со сроками откладки яиц на Кургальском полуострове, где в 2015 году первые кладки у шипунов начинались в первой декаде апреля. Столь же позднее начало кладки наблюдалась нами на острове Мощный в 2013-2014 годах (Коузов 2015б). По всей видимости, это связано с задержкой на островах фенологического хода весны. Так, 27 мая 2015 при нашем прибытии на Большой Тютерс листья на большинстве берёз, ив, осин и клёнов только начинали распускаться.



Рис. 8. Пара лебедей-шипунов *Cygnus olor* достраивает гнездо во время шторма. Самец (справа) собирает и подносит гнезду сухие стебли тростника. 4 июня 2015. Фото автора.

Наши данные могут служить свидетельством того, что в отличие от лисицы, препятствовавшей до 2013 года гнездованию шипунов на острове Малый Тютерс, наличие енотовидных собак не стало препятствием для гнездования лебедей на острове Большой Тютерс в 2015 году. Это объясняется тем, что енотовидная собака, будучи в большей степени собирателем мелкой живой добычи и птичьих кладок, в отличие от лисиц, физиологически не приспособлена к борьбе с крупными водоплавающими птицами и легко отгоняется лебедем-шипуном от гнезда.

Успешности размножения в таких условиях способствовала высокая агрессивность самок шипунов, описанная нами. В качестве одной из адаптаций этого лебедя к гнездованию в условиях морского залива с частыми изменениями уровня воды и сильной штормовой деятельностью можно отметить достройку гнёзд уже в процессе инкубации, происходившую при сильных нагонах воды. Сходное поведение отмечалось нами ранее у хохлатой чернети *Aythya fuligula*, также гнездящейся на Финском заливе в периодически подтапливаемых зонах (Коузов, Кравчук 2011). Достройка гнезда происходила как в случае угрозы подтопления (первое гнездо на Большом Тютерсе, рис. 3), так и в ситуации, когда вода к гнезду непосредственно не подступала (второе гнездо, рис. 4). Во втором случае можно предполагать способность птиц к экстраполяции и частичному прогнозированию ситуации.

Автор выражает благодарность Балтийскому фонду природы за возможность участия в комплексной экспедиции на острова Финского залива 22 июня –1 июля 2014, Русскому географическому обществу за возможность участия в экспедиции на Большой Тютерс 27 мая – 6 июня 2015 и университету города Аархус (Дания) за возможность организации экспедиции 26-30 июня 2012.

Литература

Бубырева В.А., Бузун В.А., Волкович Н.М., Коузов С.А., Шаповалова О.В., Щукин А.К. 1993. Отчёт Кургальской экспедиции Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* 10: 111-117.

Бузун В. А., Храбрый В.М. 1990. О гнездовании лебедя-шипуна в Ленинградской области // *Экология и охрана лебедей в СССР*. Мелитополь: 83-84.

Бузун В.А., Мераускас П. 1993. Орнитологические находки в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн*. **2**, 2: 253-259.

Васильева Н.А. 2002. Материалы по летней орнитофауне архипелага Сескар в восточной части Финского залива // *Беркут* **11**, 1: 18-26.

Иовченко Н.П., Гагинская А.Р., Носков Г.А., Резвый С.П. 2004. Результаты орнитологического обследования островов Финского залива в 1994-1995 гг. // *Птицы и млекопитающие Северо-Запада России (эколого-фаунистические исследования).* СПб.: 100-120.

Коузов С.А. 2005. Адаптации к открытым морским мелководьям у лебедей-шипунов, гнездящихся на Кургальском полуострове (восточная часть Финского залива) // *Гусеобразные Северной Евразии: Материалы 3-го Международ. симп*. СПб: 124.

Коузов С.А. 2010. Особенности биологии лебедя-шипуна и серого гуся на Кургальском полуострове // *Казарка* **12**, 2: 85-113.

Коузов С.А. 2015а. О находке нового места размножения лебедя-шипуна *Cygnus olor* на южном берегу Финского залива у посёлка Чёрная Лахта // *Рус. орнитол. журн*. **24** (1190): 3332-3338.

Коузов С.А. 2015б. Гнездование лебедя-шипуна *Cygnus olor* на острове Мощный в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн*. **24** (1196): 3513-3517.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2011. Постройка хохлатой чернетью *Aythya fuligula* высоких гнёзд в подтапливаемой зоне островов у Кургальского полуострова и в плавнях Невской губы как адаптация к колебаниям уровня воды // *Рус. орнитол. журн*. **20** (625): 101-109.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2014. Особенности биологии лебедя-шипуна *(Cygnus olor)* в восточной части Финского залива // *Вестн. охотовед*. **11**, 2: 119-204.

Леоке Д.Ю. 1998. Лебедь-шипун *Cygnus olor* — обычная гнездящаяся птица Кургальского рифа (восточная часть Финского залива) // *Рус. орнитол. журн.* **7** (46): 19-21.

Носков Г.А., Фёдоров В.А., Гагинская А.Р., Сагитов Р.А., Бузун В.А. 1993. Об орнитофауне островов восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **2**, 2: 163-173.

Numers M., von. 1995. Distribution, numbers and ecological gradients of birds breeding in smal islets in the Archipelago sea. SW Finland // *Acta zool. fenn.* 1**97**: 1-127.

Vysotskiy V., Kondratiev A., Buzun V., Fedorov V., Ovcharenko V. 2010. *Ornithological investigations on the islands of the Russian part of the Gulf of Finland included into the area of «Ingermanlandskiy» State Nature Reserve*. Project report. The project is supported by Nord Stream AG: 1-35.

Vysotskiy V., Fedorov V., Zaynagutdinova E., Ovcharenko V. 2011. *Ornithological monitoring on the islands of the Russian part of the Gulf of Finland included into the area of «Ingermanlandskiy» State Nature Reserve*. Project report. The project is supported by Nord Stream AG: 1-27.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1199**: 3622-3624*

Статус большой белой цапли *Casmerodius albus* в Новгородской области

В.Ю.Архипов

Владимир Юрьевич Архипов. Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Московская область, 142290. Государственный природный заповедник «Рдейский», ул. Челпанова, 27, г. Холм, Новгородская область, 175270, Россия. E-mail: arkhivov@gmail.com

Поступила в редакцию 15 октября 2015

Впервые в Новгородской области большие белые цапли *Casmerodius albus* были встречены в Холмском районе в августе-сентябре 2008 года (Александров 2008; Зуева 2008). Птиц отмечали на реках Кунья, Ловать, большой Тудёр. Было отмечено сразу несколько цапель, и некоторые из них держались в одном и том же месте по крайней мере несколько дней. До описанных случаев большая белая цапля в списках птиц Новгородской области не значилась (Коткин 2002) или значилась под вопросом (Пантелеев 2001). Дело в том, что имелись непроверенные сведения от В.А.Хлебникова (1889), который в списке птиц Боровичского уезда со слов местных старожилов сообщал о встречах большой белой цапли на Коборском озере в некоторые годы XIX века. В статье о птицах Новгородской губернии В.Л.Бианки (1910) подверг эту информацию сомнению, настолько невероятной казалась встреча этого «южного» и редкого тогда вида на Северо-Западе России.

Удивительно синхронно с Новгородской областью большая белая цапля появилась в начале XXI века в соседней Тверской области. В 2008 году – первая регистрация здесь этого вида (Николаев, Шмитов

2008). В дальнейшем – ежегодные встречи одиночных птиц и даже регистрация скоплений от 4 до 8 особей (Комарова и др. 2015). В других сопредельных областях – Ленинградской и Псковской – большая белая цапля уже несколько лет как стала обычным летующим видом, и возможность гнездования на территории этих областей нельзя исключить (Фетисов 1998, 2007; Шемякина, Яблоков 2013; Бардин 2015; Коузов 2015а,б; и др.). Автор сам наблюдал на озере Кучане в Пушкинском музее-заповеднике (Псковская область) стаю из 8 больших белых цапель 26 сентября 2013.

В Новгородской же области после встреч в 2008 году несколько лет больших белых цапель не встречали вовсе. В картотеке Рдейского заповедника есть только одна регистрация в 2014 году – с 15 июня одиночная цапля примерно неделю держалась на пруду в деревне Морхово в Холмском районе, устраиваясь на ночь на дереве неподалёку (сообщение Г.Колосовой).

В 2015 году белые цапли начали массово встречаться по всему Северо-Западу России (Бардин 2015; Головань и др. 2015; Коузов 2015а,б; и др.). На юго-западе Новгородской области это не носило такой массовый характер, как, например, в Ленинградской области. Однако характер встреч во второй половине лета позволял по крайней мере некоторых особей признать летующими на территории области.

Летом 2015 года большие белые цапли подолгу держались сразу в нескольких местах Холмского района. Весь август одиночная большая белая цапля держалась на затопленных песчаных карьерах в окрестностях посёлка Красный Бор; другую особь неоднократно наблюдали первую декаду августа на пруду в деревне Тогодь. Несколько больших белых цапель конец июля, август и сентябрь держались на реке Ловати и в устье Куньи в окрестностях Холма, птицы отмечались практически ежедневно с 7 по 24 августа. В сентябре наблюдений было меньше, но последний раз большая белая цапля на реке Ловати отмечена 24 сентября. В некоторые дни мы видели двух птицы одновременно, 22 августа одна белая цапля кормилась на Ловати в черте города, а другая была встречена в 5 км южнее Холма на реке Большой Тудёр, 10 сентября наблюдали сразу трёх птиц в одном месте.

Таким образом, учитывая встречи больших белых цапель в августе-сентябре 2008 и 2015 годов в Новгородской области, а также статус вида на сопредельной территории, *Casmerodius albus* следует признать редким, нерегулярно летующим видом Новгородской области.

В сообщении использованы наблюдения Л.Ф.Завьяловой, Г.Колосовой, Ю.Иванова, Ю. Фёдорова, автор выражает всем наблюдателям искреннюю благодарность.

Литература

Александров А.А. 2008. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* в Холмском районе Новгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (439): 1356-1357.

Бардин А.В. 2015. Наблюдение большой белой цапли *Casmerodius albus* на Мальском озере (Псковская область) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1147): 1866-1871.
Бианки В. 1910. Наши сведения о птицах Новгородской губернии // *Ежегодник Зоол. музея Импер. Акад. наук* **15**, 1: 75-166.
Зуева Н.В. 2008. Встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* в Холмском районе Новгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (439): 1355-1356.
Комарова В.Н., Палкова Т.С., Шмитов А.Ю. 2015. Новые флористические и фаунистические находки редких и охраняемых видов в Тверской области // *Изучение и охрана природного и исторического наследия Валдайской возвышенности и сопредельных регионов: Материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящённой 25-летию национального парка «Валдайский».* Вышний Волочёк: 191-197.
Коузов С.А. 2015а. О характере пребывания большой белой цапли (*Casmerodius albus* L.) на Кургальском полуострове и сопредельных участках восточной части Финского залива в последнем десятилетии // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3) 1: 41-50.
Коузов С.А. 2015б. О существенном увеличении числа встреч летующих больших белых цапель *Casmerodius albus* на западном побережье Кургальского полуострова в 2014 и 2015 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1191): 3353-3358.
Николаев В.И., Шмитов А.Ю. 2008. О новых находках редких видов птиц Тверской области // *Вестн. Твер. ун-та* (сер. биол. и экол.) **7** (67): 105-108.
Шемякина О.А., Яблоков М.С. 2013. Птицы заповедника «Полистовский» и сопредельных территорий // *Вестн. Псков. ун-та.* Сер. Естеств. и физ.-мат. науки 2: 81-104.
Коткин А.В. 2002. Систематический список птиц Новгородской области // *География и геология Новгородской области*. Великий Новгород: 275-290.
Пантелеев А.В. 2001. Список птиц Новгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **10** (141): 331-343.
Фетисов С.А. 1998. Залёт большой белой цапли *Egretta alba* в Псковскую область // *Рус. орнитол. журн.* **7** (31): 8-10.
Фетисов С.А. 2007. Встречи большой белой цапли *Egretta alba* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **16** (369): 986-988.
Хлебников В.А. 1889. Материалы к фауне позвоночных Боровичского уезда Новгородской губернии // *Тр. С.-Петерб. общ-ва естествоиспыт.* **20**, 1: 21-58.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1199**: 3624-3625*

Зимняя встреча теньковки *Phylloscopus collybita* в Закарпатской области

В.Н.Глеба

Василий Николаевич Глеба. Украинское общество охраны птиц, ул. Красноармейская, д. 148, пгт. Королево, Виноградовский район, Закарпатская область, 90332, Украина.
E-mail: glebasileus@mail.ru

Поступила в редакцию 8 октября 2015

5 января 2015 года, проводя учёты водно-болотных птиц вдоль реки Тисы возле посёлка Королёво Виноградовского района Закарпатской области мы обнаружили пеночку, которую определили как теньковку

Phylloscopus collybita. Она перемещалась вдоль берега одного из рукавов реки, заросших камышом и лозой (см. рисунок). В связи с мягкой зимой вода в реке и рукавах не замёрзла. Ища корм, теньковка перемещалась среди растительности, была активной и без признаков травм или болезни.

Просматривая орнитологические сайты Венгрии (birding.hu) и Румынии (rombird.ro) обнаружилось, что теньковка была встречена там соответственно 3 января и 29 декабря 2014, на расстоянии 250-300 км от точки, где эта пеночка наблюдалась нами.



Теньковка *Phylloscopus collybita*. Берег реки Тисы у посёлка Королёво. Виноградовский район Закарпатской области. 5 января 2015. Фото автора.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1199**: 3626-3633*

К авифауне верховий рек Большой и Малый Анюй (Чукотский автономный округ)

И.В.Дорогой

Игорь Викторович Дорогой. Институт биологических проблем Севера ДВО РАН. Магадан, Россия. E-mail: dor_1955@ibpn.ru

Поступила в редакцию 16 октября 2015

Фауна птиц центральной части Чукотского автономного округа исследована крайне фрагментарно. Для горных районов центральной части округа до недавнего времени были известны лишь материалы А.И.Артюхова (1990), касающиеся куликов среднего и верхнего течений рек Большой Анюй и Малый Анюй, и работы по птицам окрестностей озера Эльгыгытгын и верховьев реки Энмываам (Дорогой 1993). Кроме того, некоторые сведения о птицах данной территории имеются в сводке Л.А.Портенко (1972, 1973). В последние годы были опубликованы материалы по фауне птиц водораздела рек Малый Анюй и Анадырь (Дорогой 2008, 2012а), а также верхнего течения Малого Анюя (Дорогой 2012б) и Анадыря (Томкович 2008).

Материал для настоящего сообщения собран в ходе кратковременных визитов в верховья реки Малый Анюй, главным образом в окрестности золоторудного месторождения «Купол» (66°48' с.ш., 169°34' в.д.), а также в ряд пунктов вдоль дороги «Купол» – «Двойное» (67°63' с.ш., 169°23' в.д.), имевших место с 27 по 30 июня 2015, и в окрестности меднорудного месторождения «Песчанка» в бассейне реки Большой Анюй (66°33' с.ш., 164°27' в.д.) с 29 июля по 4 августа 2015.

Серощёкая поганка *Podiceps grisegena*. До настоящего времени для данного вида в пределах изучаемого района известны лишь два случая встреч одиночных птиц без признаков гнездования (Дорогой 2008, 2012б). Пару, строящую гнездо (рис. 1), мы наблюдали 29 июня 2015 на одном из тундровых озёр в среднем течении Малого Анюя (67°06' с.ш., 169°24' в.д.). Само гнездо (рис. 2) диаметром около 30 см и глубиной 1.5 см располагалось на краю болотины и состояло из корневищ осоки и арктофилы; в 1 м от него находилась другая гнездовая ямка. Одиночную птицу без признаков гнездования мы видели в этот же день на одном из озёр в низовьях реки Старичной.

Белолобый гусь *Anser albifrons*. Для верховий Анадыря этот гусь на гнездовье не известен (Томкович 2008). Имеются лишь косвенные свидетельства его возможного гнездования на водоразделе Анадыря и Малого Анюя (Дорогой 2008, 2012б). Группу из 7линных белолобиков, кормящихся на берегу небольшого озерка, мы наблюдали 29 июня 2015 в районе моста через Малый Анюй (рис. 3).



Рис. 1. Пара серощёких поганок *Podiceps grisegena* в верхнем течении реки Малый Анюй. 29 июня 2015. Фото автора.



Рис. 2. Гнездо серощёкой поганки *Podiceps grisegena* в верхнем течении реки Малый Анюй. 29 июня 2015. Фото автора.

Каменушка *Histrionicus histrionicus*. В бассейне верхнего течения Анадыря – редкий гнездящийся вид (Дорогой 2008; Томкович 2008). Самка с 6 птенцами в возрасте около недели встречена М.Б.Скопецом 1 августа в среднем течении реки Песчанки – притока реки Баимка (система Большого Анюя).

Зимняк *Buteo lagopus*. Не представляет редкости в годы с высокой численностью мышевидных грызунов в верховьях Анадыря (Дорогой 2008; Томкович 2008), однако не отмечен на гнездовье в верховьях Малого Анюя (Дорогой 2012б). Гнездо с 4 готовыми к вылету птенцами (рис. 4) найдено 31 июля в верховьях реки Правая Песчанка, система



Рис. 3. Группа белолобых гусей *Anser albifrons* в верхнем течении реки Малый Анюй. 29 июня 2015. Фото автора.

Большого Анюя (66°32' с.ш., 164°28' в.д). Оно было устроено в верхней части сухой лиственницы, росшей на дне глубокого ущелья, на высоте около 20 м от земли (рис. 5) и представляло собой внушительное сооружение диаметром около метра и толщиной 70-80 см, сделанное из сухих веток лиственницы и кедрового стланика. Около гнезда кружила самка, периодически издававшая тревожные крики. Местность представляла собой лиственничное редколесье с примесью стланика, карликовой берёзки, багульника, брусники и ягеля. Во время следующего визита к гнезду (4 августа) птенцы покинули его.



Рис. 4. Птенцы зимняка *Buteo lagopus* в гнезде. Верховья реки Большой Анюй. 31 июля 2015. Фото автора.



Рис. 5. Гнездо зимняка *Buteo lagopus* на вершине лиственницы в верховьях реки Большой Анюй. 31 июля 2015. Фото автора.

Канадский журавль *Grus canadensis*. В верховьях Анадыря и Малого Анюя – редкий гнездящийся вид (Дорогой 2008, 2012б). Беспокоящаяся птица (возможно, от выводка) наблюдалась на берегу лесного озера в нижнем течении Песчанки (66°44' с.ш., 164°14' в.д.) 30 июля и в месте впадения этой реки в Баимку 1 августа (М.Б.Скопец, устн. сообщ.).

Большой улит *Tringa nebularia*. Для бассейнов Большого и Малого Анюев этот кулик известен лишь в качестве редкого пролётного вида (Артюхов 1990). Редок на гнездовье в верховьях Анадыря (Томкович 2008). Мы видели двух самцов при выводках в среднем течении реки Баимка 2 августа 2015. Птицы сидели на вершинах сухих лиственниц, издавая отрывистые тревожные крики.

Щёголь *Tringa erythropus*. В исследуемом районе редок в районе Илирнейских озер и более обычен в низовьях обоих Анюев (Артюхов 1990). Самец, беспокоящийся у выводка (рис. 6), встречен 30 июня 2015 в низовьях ручья Ледяной, верхнее течение реки Малый Анюй (67°06' с.ш., 169°24' в.д.).

Азиатский бекас *Gallinago stenura*. Известен единственный случай добычи азиатского бекаса в верховьях реки Яракваам в бассейне Малого Анюя (Артюхов 1990). В верховьях Анадыря он также редок (Томкович 2008). Мы наблюдали одиночную птицу в окрестностях месторождения «Песчанка» 1 августа 2015.

Длиннохвостый поморник *Stercorarius longicaudus*. В верховьях Малого Анюя редок (Дорогой 2008). В верхнем течении Анадыря предположительно гнездится и наблюдается, как правило, в период сезонных кочёвок (Томкович 2008). Не менее 4 пар наблюдались 29 июня в

тундре вдоль дороги «Купол» – «Двойное» на отрезке протяжённостью около 60 км. Два выводка этих заметных птиц мы встретили 30 июля в среднем течении Песчанки, при этом у одной пары был уже хорошо летавший слёток. Кроме того, группу из 9 птиц, пролетавших над горным перевалом в районе месторождения «Песчанка», мы наблюдали 1 августа 2015.



Рис. 6. Самец щёголя *Tringa erythropus* у выводка в верхнем течении реки Малый Анюй. 30 июня 2015. Фото автора.



Рис. 7. Полярная крачка *Sterna paradisaea* на гнезде. Верхнее течение Малого Анюя. 30 июня 2015. Фото автора.



Рис. 8. Гнездо полярной крачки *Sterna paradisaea* на участке дриадовой тундры в верхнем течении Малого Анюя. 30 июня 2015. Фото автора.



Рис. 9. Гнездо полярной крачки *Sterna paradisaea* с проклюнутыми яйцами в верхнем течении Малого Анюя. 30 июня 2015. Фото автора.

Полярная крачка *Sterna paradisaea*. Данный вид для верховьев Малого Анюя не отмечен (Дорогой 2008, 2012б). Полярная крачка не известна и для верховьев Анадыря (Томкович 2008). Пара с гнездом (рис. 7) встречена 29 июня на берегу одного из термокарстовых озёр в системе ручья Ледяной (67°06' с.ш., 169°24' в.д.). Гнездо было устроено на участке сухой дриадовой тундры (рис. 8) – в биотопе, не характерном для данного вида, предпочитающего галечники или островки посреди тундровых водоёмов. На следующий день на яйцах в этом гнезде

появились проклёвки (рис. 9). Кроме того, в первый день наблюдений здесь держалась и стайка холостых полярных крачек численностью не менее 10 особей. Это новый вид для изучаемой территории.

Городская ласточка, или воронок *Delichon urbica*. Не представляет редкости в верховьях реки Средний Кайемраваам (Дорогой 2008). В бассейне верхнего течения Малого Анюя данный вид редок (Дорогой 2012б). Колонии воронков, насчитывавшие, соответственно, около 20 и 10 пар (рис. 10), мы обнаружили в бассейне Большого Анюя: 31 июля на территории ныне ликвидированного посёлка Весенний (66°27' с.ш., 164°34' в.д.) и 2 августа 2015 – на территории метеостанции Баимка (66°32' с.ш., 164°17' в.д.).



Рис. 10. Воронок *Delichon urbica* у гнезда. Посёлок Весенний. 31 июля 2015. Фото автора.

Гольцовый конёк *Anthus rubescens*. Птицу, носившую корм (комаров-долгоножек Tipulidae) птенцам, мы видели 29 июня 2015 на берегу озера Тытыль, бассейн Малого Анюя (67°20' с.ш., 169°26' в.д.). Ранее на исследуемой территории гольцовый конёк не отмечен.

Выражаю признательность М.Б.Скопецу за предоставленные сведения.

Литература

Артюхов А.И. 1990. Кулики бассейнов рек Малого и Большого Анюя // *Орнитология* **24**: 137-139.

Дорогой И.В. 1993. Птицы окрестностей озера Эльгыгытгын и верховьев реки Энмываам // *Природа впадины озера Эльгыгытгын (проблемы изучения и охраны)*. Магадан: 178-189.

Дорогой И.В. 2008. К фауне и распространению птиц водораздела рр. Малый Анюй и Анадырь (Чукотский автономный округ) // *Вестн. СВНЦ РАН* 2: 60-67.

Дорогой И.В. 2012а. Дополнительные сведения о птицах верховий Анадыря // *Рус. орнитол. журн.* **21** (822): 3025-3030.
Дорогой И.В. 2012б. Фауна птиц верховий реки Малый Анюй (Чукотский АО) // *Вестн. СВНЦ ДВО РАН* 3: 111-117.
Портенко Л.А. 1972. *Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля*. Л., **1**: 1-423.
Портенко Л.А. 1973. *Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля*. Л., **2**: 1-323.
Томкович П.С. 2008. Птицы верхнего течения реки Анадырь // *Сб. тр. Зоол. музея Моск. ун-та* **49**: 101-158.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1199**: 3633-3634*

Случай прижизненного травматизма маскированной трясогузки *Motacilla personata*

Н.Н.Березовиков

Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.
E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 5 сентября 2015

Встречи в природе с травмированными птицами – явление нередкое. Чаще всего регистрируются особи с различными механическими повреждениями крыла, ног, клюва и лишённые хвоста. Реже встречаются одноногие и одноглазые особи. Подобные травмы серьёзным образом ограничивают жизнедеятельность особи, но часть покалеченных птиц продолжает существовать с увечьями, демонстрируя примеры удивительной жизнестойкости. В конечном счёте, все они обречены на неизбежную гибель от истощения и хищников.

Во время поездки по межгорной долине реки Кеген в северной части Тянь-Шаня на обочине асфальтового шоссе между посёлками Болексаз и Кеген (42° 58' с.ш., 79° 08' в.д.) 11 августа 2015 была замечена взрослая маскированная трясогузка *Motacilla personata*, обратившая на себя внимание тем, что она одноногая. Птица кормилась, прыгая лишь на одной правой ножке, успешно сохраняя при этом равновесие (см. рисунок). Последующие наблюдения за ней показали, что иногда из под контурного оперения брюшка у неё показывается левая ножка. Судя по всему, она была покалечена, срослась в согнутом положении и совершенно не разгибалась, оставаясь постоянно прижатой к нижней стороне тела (нижнее фото на рисунке). Всё это создавало трясогузке неудобства при перемещениях по земле, о чём свидетельствовали необычные позы и неловкие движения. Тем не менее, она продолжала вести активный поиск корма и вполне хорошо летала.



Травмированная маскированная трясогузка *Motacilla personata*, передвигающаяся на одной ноге. Повреждённая левая нога иногда показывалась из-под оперения брюшка. Кегенская долина. Северный Тянь-Шань. 11 августа 2015. Фото автора.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1199**: 3635*

Новый залёт чёрного аиста *Ciconia nigra* в окрестности Нижне-Свирского заповедника

В.А.Ковалев, А.П.Смирнов

Виктор Алексеевич Ковалев, *Анатолий Петрович Смирнов*. Нижне-Свирский государственный природный заповедник, Лодейное Поле, Ленинградская область, 187700, Россия.
E-mail: v.kovalev2@yandex.ru

Поступила в редакцию 14 октября 2015

В начале июня 2014 года впервые за почти 35 лет орнитологических наблюдений в Нижне-Свирском заповеднике зарегистрирован залёт чёрного аиста *Ciconia nigra* в ближайшие окрестности особо охраняемой природной территории (Ковалев, Смирнов 2014). При проведении наблюдений за миграцией птиц в 2015 году в Лодейнопольском районе Ленинградской области к месту встречи чёрного аиста – мелководному речному заливу Гатрома в окрестностях деревни Ковкиницы – было приковано особое внимание. Результаты не заставили себя ждать. 24 апреля рано утром одиночный чёрный аист прилетел на залив со стороны реки Сегежи и провёл на мелководьях Гатромы около часа, разыскивая корм. Повторно чёрного аиста встретили в Гатроме 14 мая. Одинокая птица с 5 ч 10 мин немногим более получаса кормилась, расхаживая по заливу и запрокидывая голову, чтобы проглотить крупную добычу. После кормёжки около часа аист неподвижно стоял на заболоченном берегу залива и, вероятно, спал, а затем начал перебирать клювом оперение на груди и правом крыле. К сожалению, наблюдение за ним было прервано, и куда он улетел проследить не удалось. Неясно также, залив Гатрому дважды посещал один и тот же аист или это были разные особи.

Литература

Ковалев В.А., Смирнов А.П. 2014. Залёт чёрного аиста *Ciconia nigra* в окрестности Нижне-Свирского заповедника // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1030): 2360-2361.