ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2015
XXIV



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1223

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXIV

Экспресс-выпуск • Express-issue

2015 № 1223

СОДЕРЖАНИЕ

4383-4395 Дополнения к фауне и новые наблюдения редких для Лазовского заповедника видов птиц. В.П.ШОХРИН

4395-4398 Новый случай гнездования черношейной поганки *Podiceps nigricollis* в Санкт-Петербурге. В.А.ФЁДОРОВ

4398-4400 Встречи сухоноса *Anser cygnoides* на Алтае в 2014 году. В.Ю.АРХИПОВ, А.Л.ЭБЕЛЬ, И.А.МУРАШЕВ, С.В.ПИСАРЕВСКИЙ

4400-4401 Раннезимняя встреча большого баклана *Phalacrocorax carbo* на Иртыше в Восточно-Казахстанской области. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ, А.С.ФЕЛЬДМАН

4402-4404 Одноцветный дрозд *Turdus unicolor* – новый вид фауны Таджикистана. П.В.КВАРТАЛЬНОВ, А.Г.АБДУЛНАЗАРОВ, В.Ю.АРХИПОВ, А.В.ГРАБОВСКИЙ, Е.А.КОБЛИК, Ф.А.КОНДРАШОВ

4405-4406 Гнездовая находка индийской камышевки *Acrocephalus agricola* в Московской области. Я.А.РЕДЬКИН, И.А.МУРАШЕВ

4406-4407 Гнездование тугайного соловья *Erythropygia galactotes* в Грузии. З.Д.СИХАРУЛИДЗЕ

4407 Кроншнеп-малютка *Numenius minutus* на полуострове Де-Фриза в Амурском заливе. М.А.ОМЕЛЬКО

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2015
Дата опубликования: 9 декабря 2015

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXIV
Express-issue

2015 № 1223

CONTENTS

4383-4395 Additions to the fauna and the new observation of rare bird species in Lazovsky reserve. V. P. SHOKHRIN

4395-4398 A new case of nesting of the black-necked grebe *Podiceps nigricollis* in St. Petersburg. V. A. FEDOROV

4398-4400 The records of the swan goose *Anser cygnoides* in Altai in 2014. V. Yu. ARKHIPOV, A. L. EBEL, I. A. MURASHOV, S. V. PISAREVSKY

4400-4401 Early winter record of the great cormorant *Phalacrocorax carbo* on the Irtysh in East Kazakhstan Oblast. N. N. BEREZOVIKOV, A. S. FELDMAN

4402-4404 The Tickell's thrush *Turdus unicolor* – a new bird species for Tajikistan. P. V. KVARTALNOV, A. G. ABDULNAZAROV, V. YU. ARKHIPOV, A. V. GRABOVSKY, E. A. KOBLIK, F. A. KONDRASHOV

4405-4406 Nest finding the paddyfield warbler *Acrocephalus agricola* in the Moscow Oblast. Ya. A. RED'KIN, I. A. MURASHEV

4406-4407 Nesting of the rufous-tailed scrub robin *Erythropygia galactotes* in Georgia. Z. D. SIKHARULIDZE

4407 The little curlew *Numenius minutus* on the peninsula De Vries in the Amur Bay. M. A. OMELKO

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2015

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1223**: 4383-4395*

Дополнения к фауне и новые наблюдения редких для Лазовского заповедника видов птиц

В.П.Шохрин

Шохрин Валерий Павлинович. ФГБУ Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра». Ул. Центральная, 56, село Лазо, райцентр, Приморский край, 692980, Россия. E-mail: shokhrin@mail.ru

Поступила в редакцию 7 декабря 2015

Основой настоящей публикации послужили материалы, полученные в 2014-2015 годах на территории Лазовского заповедника и прилежащей территории Лазовского района Приморского края. Русские и латинские названия птиц приведены в соответствии со сводкой: Е.А.Коблик и др. 2006., с некоторыми уточнениями по: Коблик, Архипов 2014.

Белоклювая гагара *Gavia adamsii*. Редкий пролётный вид. По две птицы наблюдались 22 октября 2014 и 23 мая 2015 в бухте Петрова.

Малая поганка *Tachybaptus ruficollis*. В окрестностях заповедника малочисленный пролётный и редкий гнездящийся вид. Весной первая встреча относится к 12 апреля 2014, когда наблюдалась одиночная птица на реке в бухте Петрова. В период пролёта, 21-23 апреля 2015, на озере Латвия можно было одновременно видеть 5-12 кормящихся малых поганок. На небольшом озере в окрестностях села Глазковка пару птиц встретили 6 мая. В мае 2015 эта поганка оказалась довольно обычной в нижнем течении реки Киевка и на озёрах её правого берега: в устье реки отмечено 6 птиц, на озере Латвия – 5 пар, на озере Селюшино – 3 пары, причём птицы явно были привязаны к гнездовым территориям. На озере Латвия 20 мая наблюдали строительство гнезда в узкой полосе осоки на мелководном участке в 35 м от берега. Самка собирала строительный материал и укладывала его на плавающую платформу, утаптывала, приглаживала. Самец сопровождал её, но в строительстве участия не принимал. Осенью одиночки отмечены в бухте Петрова 29-30 октября и 5, 7 ноября 2014, 29 сентября; 6, 21, 22, 30 октября и 10 ноября 2015. Ещё по одной особи встречено 1 сентября и 27 октября 2015 на озере в окрестностях села Лазо. В 2015 году малая поганка впервые зарегистрирована в зимний период: одиночная птица наблюдалась 20 января на незамерзающем участке реки Лазовка, в окрестностях одноименного села.

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis*. Редкий пролётный вид. Весной редка: одиночная птица встречена 22 мая 2015 в устье ручья в бухте Петрова. Одиночные птицы наблюдалась в сентябре 2014 года в бухте Петрова почти ежедневно. По три особи учтено здесь 20

сентября 2014 и 21 октября 2014. В сентябре 2015 года фиксировались только редкие одиночки. 15 птиц отмечено 5 октября, 1-6 октября, 6-7 октября, 5, 7 и 8 октября. Позднее поганки не наблюдались.

Красношейная поганка *Podiceps auritus*. Редкий пролётный вид, регистрируется не каждый год. В бухте Петрова в первой декаде октября 2015 года была обычна, учтено 20 особей 7 октября, 30-35 птиц в двух группах 8 октября. Позднее не наблюдались.

Чомга *Podiceps cristatus*. В последние годы обычный пролётный вид. В окрестностях заповедника регистрируется с 2002 года (Шохрин 2002; 2005). В устье реки Киевка 2 апреля 2014 встречено 8 особей. В 2015 году, с 20 апреля по 22 мая, чомги были обычны в морских бухтах, в устье реки Киевка и на озере Латвия, где регистрировалось от 2 до 18 птиц. Одна птица, погибшая из-за загрязнения мазутом, найдена 23 мая в устье реки Киевка, её размеры, мм: длина крыла 192.0, хвоста 40.0, цевки 64.2, клюва 51.0; вес 680.0 г.

Амурский волчок *Ixobrychus eurhythmus*. Редкий пролётный и гнездящийся вид. Одиночные птицы отмечены на заболоченной протоке в устье реки Киевка 5 июля 2014 и 19 июля 2015.

Кваква *Nycticorax nycticorax*. Редкий пролётный вид. Молодую квакву встретили 4 декабря 2015 в устье реки Лагунная, бухта Кит (В.Н.Медведев, устн. сообщ.).

Белокрылая цапля *Ardeola bacchus*. Редкий пролётный вид, регистрируется в последние годы регулярно. Одиночные птицы наблюдались 7 мая 2015 в устье реки Лагунная (окрестности села Глазковка), 14 мая 2015 в долине реки Соколовка и 21 мая 2015 на озере Латвия. Здесь же 22 мая отметили 3 цапли.

Египетская цапля *Bubulcus ibis*. Редкий пролётный и летующий вид. Одиночная птица больше недели, начиная с 18 мая 2015, держалась на заболоченном лугу в окрестностях села Лазо, где ходила вместе с лошадьми. Две египетские цапли наблюдались 23 мая 2015 в устье реки Киевка.

Большая белая цапля *Casmerodius albus*. Обычный пролётный, редкий летующий и зимующий вид. В 2014 году максимально в одном месте регистрировалось 8 (22 октября, бухта Камбальная) и 9 птиц (6 июня, окрестности посёлка Преображение). По две птицы наблюдались в долине реки Киевка 23 марта (окрестности села Старая Каменка) и 28 ноября (ниже села Свободное). Одиночные цапли отмечались 16 мая в посёлке Преображение, 16 ноября в бухте Петрова, 19 ноября на берегу реки Осиновая и 4 декабря в окрестностях села Лазо. В 2015 году по 17 цапель было встречено на озёрах Латвия (20 мая) и Селюшино (21 мая). На последнем озере 22 апреля наблюдалось 10 особей. Весной от 1 до 6 птиц регистрировалось с 8 марта по 23 мая в разных точках заповедника и его окрестностей. Осенью отмечалась реже, по-

следние встречи одиночных птиц – 9-14 ноября (долина реки Кривая) и 9-25 ноября (окрестности села Лазо).

Восточная белая цапля *Casmerodius (albus) modestus*. Редкий пролётный вид. Две птицы наблюдались 6 июня 2014 на берегу мелководного морского залива в посёлке Преображение. В 2015 отмечалась 4 раза: на озере Селюшино 22 апреля (2 птицы) и 21 мая (3), в нижнем течении реки Киевка 24 апреля (3) и на озере Латвия 20 мая (4). Как правило, держались вместе с большими белыми цаплями.

Средняя белая цапля *Egretta intermedia*. Редкий пролётный вид, регистрируется не каждый год. Четыре птицы наблюдались 6 и 7 мая 2015 на озере в окрестностях села Глазковка (рис. 1), а одиночные здесь же 30 апреля и 15-17 мая 2015. Ещё одна цапля отмечена в устье реки Киевка 28 апреля 2015. В окрестностях села Глазковка 17 мая 2015 найдена погибшая молодая птица, её размеры, мм: длина крыла 308.0, хвоста 155.0, цевки 106.8, клюва (от оперения) 74.6; вес 400.0 г.



Рис. 1. Средняя белая цапля *Egretta intermedia*. Окрестности села Глазковка, 7 мая 2015. Фото В.П.Шохрина.

Малая белая цапля *Egretta garzetta*. Редкий залётный вид. Одиночная птица кормилась 20 мая 2015 на мелководье озера Латвия.

Чёрный аист *Ciconia nigra*. Редкий пролётный и гнездящийся вид, последние 20 лет встречи единичны. Одиночная птица пролетела над долиной реки Лазовка 18 мая 2015.

Пискулька *Anser erythropus*. Редкий пролётный вид. Две стаи, со-

стоящие из 3 и 7 особей, отмечены в бухте Петрова, соответственно, 21 сентября и 22 октября 2014.

Белый гусь *Anser caerulescens*. Вид впервые регистрируется в пределах Лазовского заповедника. Одиночная птица отмечена 16 октября 2015 в бухте Петрова вместе с малыми лебедями. Птицы составляли одну стаю и летели в таком порядке: лебедь-гусь-лебедь. Удалось хорошо разглядеть белую окраску гуся и тёмные концы крыльев.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Редкий пролётный вид. Одиночная птица встречена 16 мая 2014 в бухте Оленевод. По два лебедя отмечено 17 ноября 2014 у острова Опасный и 9 октября 2015 в бухте Петрова. Три лебедя (два взрослых и молодой) отмечены 2 декабря 2015 на озере в окрестностях посёлка Преображение.

Малый лебедь *Cygnus bewickii*. Редкий пролётный вид. Две птицы, летевшие вместе с белым гусём, наблюдались 16 октября 2015 в бухте Петрова.

Клоктун *Anas formosa*. Редкий пролётный вид. В 2014 регистрировался трижды в бухте Петрова: 22 марта (7 особей), 20 (3) и 22 сентября (6). На озере Латвия 22 мая 2015 встречено 5 клоктунов (2 самца и 3 самки).

Мандаринка *Aix galericulata*. Обычный пролётный и гнездящийся вид. Регулярно отмечались пары и отдельные особи на всей территории района и заповедника, как весной, так летом и осенью. В период осеннего пролёта в бухте Петрова наблюдались стаи, состоящие из 4-27 особей. На территории заповедника по нашей оценке в 2014 гнездилось 22-25 пар мандаринок, а в 2015 – 24-27. Самки с выводками отмечены 19 июня 2014 в урочище Звёздочка (3 пуховичка) и 24 августа 2014 в окрестностях села Лазо (3 молодых).

Чешуйчатый крохаль *Mergus squamatus*. Редкий пролётный и гнездящийся вид. В 2014 году по реке Перекатная (15 км) 18 июля учтено два выводка крохалей из 4 и 8 пуховичков, а на верхнем участке реки Киевка (село Старая Каменка – село Лазо, 16 км) – 1 выводок из 10 пуховичков. На реке Лазовка 22 июля (15 км) найдено 2 выводка из 5 и 9 молодых. В долине реки Кривая 20 июля отмечено 3 выводка, содержащих 4, 6 и 9 особей. В 2015 году получены учётные данные по долинам следующих рек: Киевка (5-7 августа, 85 км) 15 выводков из 3-11 молодых; Беневка (25 июля, 10 км) 1 выводок из 6 птиц; Лазовка (26 июля, 15 км) 1 выводок из 7 молодых и Кривая (19 июля, 10 км) 2 выводка из 5 и 4 особей.

Скопа *Pandion haliaetus*. Обычный пролётный и редкий гнездящийся вид. В 2014 году во время пролёта и в гнездовой период зарегистрировано 11 встреч 14 особей, в 2015 – 10 встреч 12 птиц. По две скопы наблюдали 25 мая 2014, 22 мая 2015 (бухта Петрова) и 23 июля 2015, три – 30 мая 2014 (устье реки Киевка). Первая регистрация скопы

6 апреля 2014 (река Киевка), последняя – 4 ноября 2015 (река Лазовка). Большая часть встреч в период пролёта приурочена к морскому побережью.

Малый перепелятник *Accipiter gularis*. Редкий гнездящийся и пролётный вид. В 2014 году найдена только одна гнездящаяся пара – в долине реки Мараловая. Всего за год 7 встреч 9 особей. В 2015 гнездование не зафиксировано и отмечено 11 встреч одиночных птиц.

Ястребиный сарыч *Butastur indicus*. Редкий пролётный и гнездящийся вид. В 2014 году было 5, а в 2015 – 8 встреч одиночных птиц; выводков не найдено.

Беркут *Aquila chrysaetos*. Редкий пролётный и зимующий вид. В течение 2014 года одиночные орлы регистрировались 3 раза, а в 2015 – 4 раза.

Белоплечий орлан *Haliaeetus pelagicus*. Редкий пролётный и зимующий вид. В зимний период 2014 года – 12 встреч 28 особей, 2015 – 11 встреч 42 птиц. Основная концентрация белоплечих орланов, до 13 особей, отмечена на свалке села Валентин и в его окрестностях в январе-феврале, после забоя норок в звероводческом хозяйстве.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Редкий гнездящийся, обычный пролётный и зимующий вид. В 2014 году орланы вывели 3 птенцов в бухте Камбальная. На острове Бельцова орланы гнездилась неудачно, гнездо было разорено воронами на стадии насиживания. Аналогичная картина наблюдалась в 2015 году. Всего в течение 2014 года 51 встреча 111 особей (от 1 до 57 особей). Массовое скопление в 57 особей разного возраста отмечено 22 января 2014 на свалке села Валентин, где птицы кормились тушками норок со зверофермы. Здесь же 8 февраля 2015 было 42 птицы разного возраста. В устье реки Киевка в зимний период регистрировалось от 1 до 17 орланов. В целом, в 2015 году зафиксировано 44 встречи 169 особей.

Чёрный гриф *Aegypius monachus*. Редкий пролётный и зимующий вид. В 2014 году одна птица наблюдалась 12 февраля в окрестностях села Глазковка.

Балобан *Falco cherrug*. Редкий залётный вид. Одиночная птица с характерной окраской балобана отмечена 5 октября 2015 в бухте Петрова. Ранее в заповеднике регистрировался в 2003, 2005, 2006 и 2007 годах (Шохрин 2005; 2007; Шохрин и др. 2012).

Сапсан *Falco peregrinus*. Редкий пролётный вид. Всего за 2014 год 8 встреч 10 особей в период миграций. По две птицы наблюдали 5 мая в окрестностях села Глазковка и 23 сентября в бухте Петрова. В 2015 году встречались только одиночные сапсаны, всего 13; из них 10 регистраций приходится на осень, с 15 сентября по 9 ноября.

Пятнистая трёхперстка *Turnix tanki*. Редкий пролётный и гнездящийся вид. Две токующих самки трёхперстки отмечены по голосу 18

июля 2015 на лугах в окрестностях бывшего аэродрома в селе Лазо.

Красавка *Anthropoides virgo*. Впервые регистрируется в окрестностях заповедника. В Приморье отмечался неоднократно (Нечаев, Гамова 2009). Одиночный журавль-красавка наблюдался 23 мая 2015 в устье реки Киевка (окрестности посёлка Заповедный), в 300 м от границ заповедника (рис. 2).



Рис. 2. Красавка *Anthropoides virgo*. Устье реки Киевка, 23 мая 2015. Фото В.П.Шохрина.

Восточный пастушок *Rallus (aquaticus) indicus*. Редкий пролётный и гнездящийся вид. Одна птица встречена 14 октября 2015 в разреженных зарослях тростника в бухте Петрова.

Большой погоныш *Porzana paykullii*. Малочисленный гнездящийся и пролётный вид. В бухте Петрова в начале июня 2014 года учтён один токующий самец. В окрестностях села Лазо в этот же период токовали 5 (заправка) и 3 (чеки) самца. Токующие самцы в июне отмечены на влажных лугах в долине реки Пасечная (4 особи), на болотах у села Беневское (9) и посёлка Преображение (13). В 2015 году в окрестностях села Лазо 2 июня учтено 9 (заправка), 2 (река Пасечная) и 3 (чеки) токующих самца.

Уссурийский зуёк *Charadrius placidus*. Малочисленный пролётный и гнездящийся вид. В 2014 году в первой декаде июня на галечниках реки Киевка, между сёлами Старая Каменка и Кишинёвка (30 км), учтено 8 пар и 2 одиночных птицы, а в 2015 (23-24 мая) на этом же маршруте – 15 пар и 5 одиночных птиц. В долине реки Кривая (10 км нижнего течения) отмечено 5 пар уссурийских зуйков.

Хрустан *Eudromias morinellus*. Очень редкий залётный вид. Взрослый самец наблюдался 23 мая 2015 в устье ручья в бухте Петрова. Это вторая встреча вида в заповеднике, ранее он отмечался здесь же 6 сентября 2003 (Шохрин 2005).

Серый чибис *Microsarcops cinereus*. Редкий залётный вид. На влажном лугу в устье реки Киевка 20 мая 2014 кормились две птицы. Здесь же 23 мая 2015 наблюдалась одиночная особь. Ещё три серых чибиса отмечены 30 апреля 2015 в бухте Заря (Л.Керли, устн. сообщ.).

Ходулочник *Himantopus himantopus*. Редкий пролётный вид. Две птицы встречены 19 мая 2014 на берегу реки в бухте Петрова и 3 – 20 мая 2014 в устье реки Киевка.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Редкий пролётный вид. Одиночная птица наблюдалась 23 сентября 2015 в бухте Петрова (рис. 3). Стая, состоящая из 25 особей, отмечена 27 сентября 2015 в бухте Кит.



Рис. 3. Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Бухта Петрова, 23 сентября 2015. Фото В.П.Шохрина.

Лопатень *Eurynorhynchus pygmeus*. Очень редкий пролётный вид. Одиночную молодую птицу наблюдали 1 сентября 2014 в бухте Петрова, где она кормилась в полосе прибоя вместе с песчанками *Calidris alba*.

Краснозобик *Calidris ferruginea*. Редкий пролётный вид. Одиночная птица держалась 1 и 2 сентября 2014 в бухте Петрова. Две особи кормились в устье реки Киевка 22 мая 2015 в большой стае куликов разных видов.

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis*. Редкий

пролётный вид. В устье реки Киевка 21 мая 2014 отмечено 5 птиц в большой стае средних кроншнепов *Numenius phaeopus*. В 2015 году одиночные птицы регистрировались 22 апреля (река Киевка) и 26 мая (озеро Заря).

Японский бекас *Gallinago hardwickii*. Редкий гнездящийся и пролётный вид. В 2014 году отмечено 3 токующих самца в бухте Кит и 1 – в бухте Петрова. В мае 2015 года в окрестностях села Глазковка учтена 1 пара японских бекасов.

Горный дупель *Gallinago solitaria*. Обычный пролётный и зимующий вид. Одиночные птицы и группы (до 5 особей) неоднократно наблюдались на незамерзающих ключах в долинах рек Лазовка, Киевка, Беневка, Просёлочная, Свободинка, в ключах бухт Петрова, Оленевод, Кит. Последняя встреча весной – 31 марта 2014.

Восточная тиркушка *Glareola maldivarum*. Вид впервые отмечен в окрестностях заповедника. Одиночная тиркушка наблюдалась 22 мая 2015 в бухте Петрова и две – 23 мая 2015 в устье реки Киевка.

Серокрылая чайка *Larus glaucescens*. Редкий пролётный и зимующий вид. Одиночных птиц встретили 28 октября и 10 ноября 2015 в бухте Петрова.

Китайская чайка *Larus saundersi*. На территории заповедника регистрируется впервые. Одиночная китайская чайка наблюдалась 7 апреля 2015 в бухте Петрова. Вела себя очень осторожно, подпускала на 40-50 м (рис. 4).



Рис. 4. Китайская чайка *Larus saundersi*. Бухта Петрова, 7 апреля 2015. Фото В.П.Шохрина

Белощёкая крачка *Chlidonias hybridus*. Редкий пролётный вид. Одиночная птица 23 мая 2015 несколько раз в течение дня регистрировалась в низовьях реки Киевка.

Толстоклювая кайра *Uria lomvia*. Редкий пролётный и зимующий вид. Погибающая из-за отравления мазутом птица найдена 23 апреля 2015, её размеры, мм: длина крыла 222.0, хвоста 55.0, цевки 40.4, клюва 44.1; масса 750.0 г. Это третья регистрация толстоклювой кайры в окрестностях заповедника, предыдущие были в 2003 и 2004 годах (Шохрин 2005).

Японский зелёный голубь *Treron sieboldii*. Редкий залётный вид. В предыдущие годы неоднократно отмечался в заповеднике и его окрестностях. Очередная встреча с двумя птицами произошла 30 сентября 2015 в бухте Петрова.

Филин *Bubo bubo*. Редкий оседлый вид. На побережье филин неоднократно регистрировался в бухте Петрова в октябре и ноябре 2014-2015 годов, как визуально, так и по голосу. В материковой части заповедника один филин отмечен 26 октября 2015 в долине реки Перекатная (урочище «Америка»). Погибшая на ЛЭП птица найдена в конце марта 2015 года в долине нижнего течения реки Киевка, в окрестностях озера Селюшино.

Восточный широкорот *Eurystomus orientalis*. Малочисленный пролётный и гнездящийся вид. В 2014-2015 годах отмечался редко. Пары широкоротов встречались в долинах рек Киевка, Лазовка, Кривая, Перекатная, Просёлочная, Беневка.



Рис. 5. Ошейниковй зимородок *Halcyon pileata*. Село Глазковка, 17 мая 2015. Фото В.П.Шохрина

Ошейниковый зимородок *Halcyon pileata*. Редкий залётный вид, регистрировался неоднократно. Одиночная птица наблюдалась 17 мая 2015 на озере в окрестностях села Глазковка (рис. 5).

Северный сорокопут *Lanius (excubitor) borealis* Vieillot,1807. Редкий пролётный и зимующий вид. Одиночные северные сорокопуты неоднократно встречались в ноябре-марте 2014-2015 годов в бухтах Кит, Заря и Петрова, в окрестностях сел Беневское, Сокольчи и Лазо.

Японский сорокопут *Lanius bucephalus*. Редкий гнездящийся и пролётный вид. Территориальные пары наблюдались 30 мая 2014 и 26 мая 2015 в окрестностях бывшего аэродрома села Лазо. Три молодые птицы пойманы 16 (2 особи) и 18 сентября 2015 в бухте Петрова.

Тигровый сорокопут *Lanius tigrinus*. Редкий пролётный и гнездящийся вид. Пара тигровых сорокопутов держалась 27 июня – 3 июля 2014 в окрестностях бывшего аэродрома в селе Лазо.

Краснощёкий скворец *Sturnia philippensis*. Редкий пролётный и гнездящийся вид, численность низкая. По одной гнездящейся паре в 2014 году отмечено в бухте Мелководная, в окрестностях сёл Киевка, Заповедное, Соколовка и Глазковка. Три пары краснощёких скворцов гнездилось в окрестностях посёлка Преображение. Пара отмечена 23 апреля 2015 на базе отдыха в бухте Мелководная. Птицы, кормившие выводки, наблюдались в середине июля в устье реки Киевка и в посёлке Преображение.

Шелковистый скворец *Sturnus sericeus*. Редкий залётный вид. Самка отмечена 20 апреля 2015 у бухты Мелководная, где держалась около недели на базе отдыха. Это вторая регистрация вида в окрестностях Лазовского заповедника, первая была в 2014 году (Шохрин 2014б).

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. Редкий залётный вид. Одиночная птица наблюдалась 10-11 апреля 2014 в бухте Петрова, где летала вместе с серыми скворцами *Sturnus cineraceus*.

Даурская галка *Corvus dauuricus*. Редкий залётный вид. Одиночную галку встретили 29 марта 2014 в бухте Просёлочная (В.Н.Медведев, устн. сообщ.) и более 20 галок наблюдали 21 октября 2014 в бухте Петрова в общей стае с грачами. В 2015 году не отмечалась.

Грач *Corvus frugilegus*. Редкий залётный вид. В 2014 году наблюдался несколько раз: в селе Лазо – 1 апреля, около 60 особей и 2 апреля, 10 птиц; в бухте Петрова – 10 апреля, 2 грача; 21 октября, более 90 особей; 28 октября, более 40 птиц. В 2015 не регистрировался.

Амурский свиристель *Bombycilla japonica*. Обычный пролётный и малочисленный зимующий вид. Стаи, кормившиеся на омеле и состоящие из двух видов свиристелей (амурских и обыкновенных *Bombycilla garrulus)*, отмечены в окрестностях села Лазо 5, 13, 17, 20, 21 и 29 января 2014, 18 февраля 2014, 11 ноября 2014 и 04 декабря 2014. Кроме этого, моновидовые стаи амурских свиристелей наблюдались 20 (6

особей) и 29 (2) января, 13 (1) и 17 (5) марта 2014, 13 (4), 23 (6) января и 19 ноября 2015.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*. Редкий пролётный вид. Две молодые веснички пойманы в паутинные сети 21 и 25 сентября 2015. Ранее птицы этого вида отлавливались в 2005, 2009 и 2013 годах (Шохрин 2007; 2014а; Шохрин и др. 2012).

Чёрный дронго *Dicrurus macrocercus*. Очень редкий залётный вид. Молодая птица наблюдалась 22 октября 2015 в бухте Петрова (рис. 6). Дронго вылетел в 8 ч 30 мин утра со стороны ключа, сел на берёзу и почти сразу же улетел в лес. Птица дважды подала голос – флейтовый свист, размер – крупнее дрозда. Это вторая регистрация чёрного дронго в окрестностях заповедника, первая сделана 26 мая 1944 (Белопольский 1950).



Рис. 6. Чёрный дронго *Dicrurus macrocercus*. Бухта Петрова, 22 октября 2015. Фото В.П.Шохрина/

Гибрид подвидов ополовника *Aegithalos caudatus caudatus* (Linnaeus, 1758) × *A. c. magnus* (Clark, 1907). В бухте Петрова 14 октября 2015 года паутинной сетью отловлены три ополовника необычной окраски. Признаки, указывающие на их возможное гибридное происхождение: полосы по бокам головы не чёрные, как у *magnus*, а тёмно-серые и отсутствуют пестрины на груди. Птицы очень похожи на особей, которые были добыты здесь же в 2012 году (Шохрин 2014а).

Каменка-плешанка *Oenanthe pleschanka*. Редкий залётный вид. Вносится в список птиц заповедника впервые. Взрослый самец этой каменки наблюдался 20 мая 2014 на остепнённом лугу бухты Петрова. Контрастная черно-белая окраска птицы и характерное для каменки поведение бросалось в глаза, и спутать этот вид с каким-либо другим было довольно сложно. Птица была очень осторожна, при попытке подойти к ней улетела. Ранее, возможно, самку этого вида встретили в бухте Петрова в апреле 2002, но, так как у нас не было полной уверенности в правильности определения птицы, она была включена в список орнитофауны условно, без номера (Шохрин 2002).

Щур *Pinicola enucleator*. Редкий пролётный и зимующий вид. Одиночная молодая птица наблюдалась 2 февраля 2015 в верховьях ключа Каменный, где она кормилась почками рододендрона. Это первая встреча щура после массового налёта зимой 2012/13 (Шохрин 2013).

Камышовая овсянка *Schoeniclus schoeniclus*. Малочисленный пролётный вид. В 2014 году было установлено гнездование камышовой овсянки в устье реки Киевка, где на площади 0.25 км^2 гнездилось 3 пары птиц. Одна пара 4 июля 2014 интенсивно кормила 5 птенцов. Здесь же в мае 2015 года зарегистрированы 4 территориальные пары. В бухте Петрова в паутинные сети с 17 сентября по 5 ноября 2014 отловлено 9, а с 13 по 28 октября 2015 – 8 птиц разного пола и возраста.

Рыжешейная овсянка *Schoeniclus yessoensis*. Редкий пролётный и зимующий вид. В 2014 году одна взрослая птица (самец, 23 октября), а в 2015 – 7 молодых овсянок (4 самца и 3 самки, 15 (3), 19 ,21 ,27 и 29 октября) пойманы в паутинные сети в бухте Петрова. Здесь же 3 взрослых самца и 4 самки наблюдались 18-22 марта 2014. Явно территориальная пара птиц отмечена 30 апреля 2015 в устье реки Киевка.

Маскированная овсянка *Ocyris (spodocephalus) personatus* (Temminck, 1836). Редкий пролётный вид. В бухте Петрова в последние годы прослеживается незначительный пролёт маскированных овсянок. Так, с 19 по 25 сентября 2014 здесь в паутинные сети поймано 5 молодых самцов и 10 молодых самок, а в 2015 – 16 и 22 сентября, 5, 6 и 21 октября отловлено 2 молодых самца и 3 молодых самки, соответственно.

Дубровник *Ocyris aureolus*. Редкий гнездящийся и пролётный вид. На гнездовании не регистрировался около 10 лет. В паутинные сети в бухте Петрова 19 сентября 2014 пойман молодой самец, а 23 сентября 2014 – взрослая самка. В устье реки Киевка 15 мая 2014 наблюдалась взрослая самка, а 23 мая 2015 – взрослый самец.

В заключение, следует отметить, что, с учётом 5 новых видов, список птиц заповедника в настоящее время включает 392 вида.

Литература

Белопольский Л.О. 1950. Птицы Судзухинского заповедника (воробьиные и ракшеобразные) // *Памяти академика П.П.Сушкина*. М.; Л.: 360-406.

Коблик Е.А., Архипов В.Ю. 2014. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: списки видов // *Зоологические исследования* **14**: 1-171.
Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1- 256.
Нечаев В.А., Гамова Т.В. 2009. *Птицы Дальнего Востока России (аннотированный каталог)*. Владивосток: 1-564.
Шохрин В.П. 2002. Птицы // *Земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие Лазовского заповедника (Приморский край, Россия). Аннотированный список видов*. Лазо: 17-50.
Шохрин В.П. 2005. Новые и редкие виды птиц Лазовского заповедника и сопредельных территорий // *Тр. Лазовского заповедника* **3**: 203-214.
Шохрин В.П. 2007. Дополнения к орнитофауне Лазовского заповедника // *8-я Дальневост. конф. по заповедному делу*. Благовещенск, **2**: 85-89.
Шохрин В.П. 2013. Массовый залёт щуров *Pinicola enucleator* в юго-восточное Приморье // *Рус. орнитол. журн.* **22** (852): 563-566.
Шохрин В.П. 2014а. Редкие птицы Лазовского заповедника: встречи и новые виды // *Рус. орнитол. журн.* **23** (960): 215-223.
Шохрин В.П. 2014б. Встреча шелковистого скворца *Sturnus sericeus* в окрестностях Лазовского заповедника // *Рус. орнитол. журн.* **23** (961): 263-264.
Шохрин В.П., Вайссенштайнер М., Маттес Г. 2012. Находки новых и встречи редких видов птиц в Лазовском заповеднике // *Дальневосточный орнитол. журн.* **3**: 15-22.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1223**: 4395-4398*

Новый случай гнездования черношейной поганки *Podiceps nigricollis* в Санкт-Петербурге

В.А.Фёдоров

Владимир Аркадьевич Фёдоров. Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 198904, Россия. E-mail: va_fedorov@mail.ru

Поступила в редакцию 8 декабря 2015

До недавнего времени черношейная поганка *Podiceps nigricollis* в Ленинградской области считалась крайне редким залётным видом. Было известно лишь о нескольких встречах этих птиц в нашем регионе. Первый случай гнездования черношейных поганок зарегистрирован в 2012 году на юго-западной окраине Санкт-Петербурга в районе Сосновой Поляны (Фёдоров, Попова 2013; Иовченко 2013). Местом выведения потомства для этих птиц послужил комплекс бывших прудов-отстойников Юго-Западных очистных сооружений.

В последующие годы эти пруды в Сосновой Поляне оставались под нашим наблюдением. В 2013 году черношейные поганки здесь не отмечены, но в следующем, 2014 году вновь появились на отстойниках.

При первом посещении этого объекта, которое состоялось 17 мая, удалось зарегистрировать сразу 2 пары черношейных поганок! Причём это были именно пары: птицы держались попарно, наблюдались элементы токования. Но на следующий день (18 мая) на прудах была отмечена лишь одна птица. Позднее отстойники посещались 20 мая, 4 и 11 июня. Каждый раз картина была неизменной: на одном из прудов держалась одиночная черношейная поганка. Причём 4 июня, чтобы исключить возможность пропуска предполагаемого размножения (вторая поганка могла быть на гнезде), были предприняты длительные наблюдения, которые продолжались несколько часов. Однако желаемого результата добиться не удалось. Птица, которая держалась на прудах, несомненно, была одиночной летующей особью. К очередному посещению отстойников 28 июня она исчезла.

В 2015 году черношейные поганки вновь загнездились на этом объекте. Как и в 2012 году (Фёдоров, Попова 2013), для размножения они выбрали самый западный участок комплекса отстойников (в 2014 году поганки наблюдались здесь же). При первом посещении (18 мая) на одном из прудов отмечена лишь одиночная особь. В следующий раз, 31 мая, обнаружена размножающаяся пара. Удалось заметить гнездо, где одна из птиц насиживала кладку. Для гнездования черношейные поганки выбрали крайний пруд, вдоль которого проходила довольно активно используемая тропа. На соседнем пруду, как и при первом визите, наблюдалась одиночная птица.

Гнездо черношейных поганок располагалось в самом центре водоёма, на небольшой естественной кочке. Она находилась рядом с маленьким островком, на котором гнездились озёрные чайки *Larus ridibundus*. При этом листья и стебли растущего на островке злака (очевидно, двукисточника тростникового *Phalaroides arundinacea)* прикрывали гнездо поганок, делая его заметным только с одной стороны (рис. 1).

Следующий визит на этот водоём пришёлся на 12 июня. Пара черношейных поганок была уже с выводком: три птенца находились на спине одного из родителей, а вторая птицы регулярно кормила птенцов (рис. 2). Птицы держались на том же пруду, где располагалось гнездо. В бинокль было видно, что в нём осталось по крайней мере одно неразвившееся яйцо. На соседнем водоёме, как и в предыдущие дни, держалась одиночная взрослая черношейная поганка.

К очередному визиту на отстойники (27 июня) эта одиночная птица исчезла, а размножавшиеся поганки с выводком перебрались на соседний водоём. Птенцов было только два, они уже почти сравнялись размерами с родителями. Последний раз в сезоне пруды посещались 13 июля. Две молодые черношейные поганки держались вместе, они активно кормились. Взрослые птицы при этом отсутствовали.



Рис. 1. Гнездо черношейной поганки *Podiceps nigricollis* рядом с гнёздами озёрных чаек *Larus ridibundus* на пруду в Сосновой Поляне. 31 мая 2015 года. Фото С.Г.Клочева.



Рис. 2. Пара черношейных поганок *Podiceps nigricollis* с выводком в Сосновой Поляне. 12 июня 2015 года. Фото С.Г.Клочева.

Описанный случай размножения черношейных поганок на окраине Санкт-Петербурга – уже второй за последние годы. Учитывая участившиеся встречи этих птиц в репродуктивный период, вряд ли можно трактовать установленные факты их гнездования как случайные. Очевидно, необходимо более тщательно обследовать мелкие зарастающие водоёмы на окраинах и в окрестностях города в расчёте на новые находки этих птиц, которые представляются весьма вероятными.

Автор выражает искреннюю благодарность С.Г.Клочеву за фотографии.

Литература

Иовченко Н.П. 2013. Первый факт гнездования и два выводка за сезон у черношейной поганки *Podiceps nigricollis* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **22** (861): 798-801.

Фёдоров В.А., Попова Т.М. 2013. Случай гнездования черношейной поганки *Podiceps nigricollis* на окраине Санкт-Петербурга // *Рус. орнитол. журн.* **22** (860): 762-767.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1223**: 4398-4400*

Встречи сухоноса *Anser cygnoides* на Алтае в 2014 году

В.Ю.Архипов, А.Л.Эбель, И.А.Мурашев, С.В.Писаревский

Владимир Юрьевич Архипов. Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Московская область, 142290, Россия. Государственный природный заповедник «Рдейский», ул. Челпанова, д. 27, г. Холм, Новгородская область, 175270. Россия. E-mail: arkhivov@gmail.com

Алексей Леонович Эбель. Алтайское отд. Союза охраны птиц России. E-mail: alexey_ebel@mail.ru

Илья Аркадьевич Мурашев. Научно-исследовательский Зоологический музей Московского государственного университета, ул. Большая Никитская, д. 6, Москва, 125009, Россия. E-mail: ilyamurashev@gmail.com

Писаревский Сергей Владимирович E-mail: bluesrock@yandex.ru

Поступила в редакцию 8 декабря 2015

Сухонос *Anser cygnoides* – редкий вид гусеобразных, занесён в Красную книгу России в категорию «1» – находящийся под угрозой исчезновения вид (Поярков 2001). Мировая численность оценивается в 60-90 тыс. особей и в настоящее время продолжает сокращаться (BirdLife International 2014).

Во время орнитологической поездки по Юго-Восточному Алтаю в мае-июне 2014 года мы наблюдали и фотографировали одиночного сухоноса. Первый раз мы встретили его 31 мая. Он держался в группе с одним малым лебедем *Cygnus bewickii* и одним лебедем-кликуном *Cygnus cygnus* на степном озере в Чуйской степи в 2 км юго-западнее Кош-Агача (рис. 1). Затем, 8 июня, примерно в тех же местах, сухонос был сфотографирован С.В.Писаревским. И последний раз одиночный сухонос встречен нами 15 июня в 5 км от места первой находки (рис. 2). Все разы птица либо отдыхала, либо кормилась на небольших степных озёрах. Учитывая редкость встреч этого вида в регионе, мы полагаем, что все указанные регистрации относятся к одной особи.

Данная находка является первой регистрацией вида на Алтае за последние 30 лет. Предыдущая встреча произошла в сентябре 1978 года



Рис. 1. Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*, малый лебедь *Cygnus bewickii* и сухонос *Anser cygnoides* в полёте, юго-западнее села Кош-Агач, 31 мая 2014. Фото И.А.Мурашева.



Рис. 2. Сухонос *Anser cygnoides*, озёра южнее села Кош-Агач, 15 июня 2014. Фото А.Л.Эбеля.

на Восточном Алтае на Телецком озере, где была отмечена одиночная птица (Стахеев 2000). В конце XIX – начале XX столетия сухонос был обычным гнездящимся видом на Юго-Восточном Алтае, гнездился в Чуйской и Курайской степях, а также на плато Укок (Сушкин 1938). Однако затем полностью исчез, и в этих местах более 80 лет не регистрировались даже залёты (Кучин 2004). В настоящее время в России ареал сухоноса сдвинулся на тысячи километров на восток, и ближайшие точки гнездования находятся в Забайкалье в районе Торейских озёр (Поярков 2001). В Монголии ближайшие точки регистраций гнездования вида в настоящее время находятся всего в нескольких сотнях

километров от Чуйской степи на озёрах в Котловине Больших Озёр (BirdLife International 2001, Gombobaatar, Monks 2012). По-видимому, залёт сухоноса на Алтай произошёл как раз из западномонгольской части ареала этого вида.

Литература

Кучин А.П. 2004. *Птицы Алтая*. Горно-Алтайск: 1-777.

Стахеев В.А. 2000. Птицы Алтайского заповедника. Итоги инвентаризации орнитофауны в 1970-1979 годы // *Науч. тр. Ассоциации енисейских заповедников и национальных парков*. Шушенское: 1-192.

Сушкин П.П. 1938. *Птицы Советского Алтая и прилежащих частей северо-западной Монголии*. М.; Л., **1**: 1-320, **2**: 1-436.

Поярков Н.Д. 2001. Сухонос *Cygnopsis cygnoides* // *Красная книга Российской Федерации. Животные*. М.: 405-406.

BirdLife International 2001. *Threatened birds of Asia: the BirdLife International Red Data Book*. Cambridge, UK.

BirdLife International 2014. *Anser cygnoides*. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T22679869A62708673. Downloaded on 07 December 2015.

Gombobaatar S., Monks E.M. 2012. *Mongolian Red List of Birds*. Regional Red List Series 7: 1-1039. http://www.nationalredlist.org/mongolian-red-list-of-birds/

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1223**: 4400-4401*

Раннезимняя встреча большого баклана *Phalacrocorax carbo* на Иртыше в Восточно-Казахстанской области

Н.Н.Березовиков, А.С.Фельдман

Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Александр Сергеевич Фельдман. Средняя школа № 28, г. Семей, Восточно-Казахстанская область, 071400, Казахстан. E-mail: papafe@mail.ru

Поступила в редакцию 8 декабря 2015

Осенние миграции большого баклана *Phalacrocorax carbo* на Иртыше на востоке Казахстана наблюдаются в сентябре-октябре, позднее он никогда не регистрировался (Самусев 1959; Долгушин 1960). Ближайшие место, где отмечались его случайные зимние встречи – это Алаколь-Сасыккольская система озёр, лежащая в 500 км южнее (Березовиков, Левинский 2008).

В связи с этим интересен первый случай наблюдения большого баклана в ранних зимних условиях на Иртыше в пределах города Семей (Семипалатинск) спустя 20 дней после установления снежного покро-

ва. В иртышском заливе Затон, где прежде располагался судоремонтный завод, 29 ноября 2015 встречен взрослый большой баклан, отдыхавший на широкой ледяной забереге в сообществе крякв *Anas platyrhynchos* (см. рисунок). В этот день стояла холодная ветреная погода с температурой около 0°С и непрерывно идущим снегом. В следующую неделю на Иртыше бакланов больше ни разу не встречали.



Большой баклан *Phalacrocorax carbo*, отдыхающий среди крякв *Anas platyrhynchos*.
Река Иртыш. Город Семей. 29 ноября 2015. Фото А.С.Фельдмана.

Эта встреча дополняет серию раннезимних наблюдений на Иртыше в последнем десятилетии целого ряда перелётных птиц: белолобого гуся *Anser albifrons*, серого журавля *Grus grus*, вальдшнепа *Scolopax rusticola*, хохотуньи *Larus cachinnans* (Березовиков 2013; Стариков 2014а,б; Фельдман, Березовиков 2015).

Литература

Березовиков Н.Н. 2013. Зимняя встреча белолобого гуся *Anser albifrons* на Иртыше в Усть-Каменогорске // *Рус. орнитол. журн.* **22** (853): 584-586.

Березовиков Н.Н., Левинский Ю.П. 2008. Зимняя встреча большого баклана *Phalacrocorax carbo* на Алаколь-Сасыккольской системе озёр // *Рус. орнитол. журн.* **17** (410): 513-514.

Долгушин И.А. 1960. *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **1**: 1-470.

Самусев И.Ф. 1958. Материалы по промысловым птицам оз. Зайсан // *Учён. зап. Усть-Каменогорск. пед. ин-та* **1**: 98-144.

Стариков С.В. 2014а. Декабрьская встреча серого журавля *Grus grus* на Западном Алтае около Усть-Каменогорска // *Рус. орнитол. журн.* **23** (961): 264-265.

Стариков С.В. 2014б. Зимняя встреча вальдшнепа *Scolopax rusticola* в предгорьях Алтая около Усть-Каменогорска // *Рус. орнитол. журн.* **23** (960): 224.

Фельдман А.С., Березовиков Н.Н. 2015. Задержка осеннего отлёта у некоторых птиц в окрестностях города Семей (Семипалатинск) в ноябре 2015 года // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1222): 4371-4373.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1223**: 4402-4404*

Одноцветный дрозд *Turdus unicolor* – новый вид фауны Таджикистана

П.В.Квартальнов, А.Г.Абдулназаров, В.Ю.Архипов, А.В.Грабовский, Е.А.Коблик, Ф.А.Кондрашов

*Второе издание. Первая публикация в 2012**

Одноцветный дрозд *Turdus unicolor* (Tickell, 1833) распространён по южным склонам Гималаев: гнездится на западе Пакистана и в Индии от округа Читрал и Кашмира к востоку до Сиккима, а также в Непале и Бутане (Deignan *et al.* 1964; Kazmierczak 2000; Rasmussen Anderton 2005). В Кашмире и на северо-западе Гималаев, где одноцветный дрозд особо многочислен, он населяет разнообразные заросли древесной растительности, в том числе рощи и сады по окраинам деревень (Baker 1924). В 2007 году несколько птиц этого вида впервые отмечены в Тибете, на территории Китая (Yangtung 2008). Одноцветный дрозд включён в перечень птиц Западной Палеарктики благодаря единственному дальнему залёту: взрослый самец добыт 15 октября 1932 на острове Гельголанд в Германии (Drost 1933). Из пределов бывшего Советского Союза этот вид не был известен (Степанян 2003; Коблик и др. 2006).

Одноцветный дрозд найден нами в 2012 году в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан в ходе экспедиции по изучению фауны речных долин Бадахшана. Днём 22 мая, во время посещения Ботанического сада Памирского биологического института АН РТ, расположенного на террасах над городом Хорогом, П.В.Квартальнов и А.В.Грабовский услышали звучное пение неизвестного дрозда, доносившееся снизу, из города. Вечером птицу нашли в центральном парке города Хорога, на берегу реки Гунт (недалеко от её слияния с рекой Шахдара; 37°29'24" с.ш. 71°31'50' в.д., 2100 м н.у.м.). В центре парка расположена роща высоких пирамидальных тополей; по краю, выходящему к реке Гунт, растут абрикосовые деревья. Одноцветный дрозд пел, перелетая по кронам тополей и абрикосов. Удалось сделать фотографию и короткую видеозапись, а также близко рассмотреть птицу, спустившуюся на землю. Она искала корм, спрыгивая на дно мелкого узкого арыка. Того же самца одноцветного дрозда наблюдали Е.А.Коблик, В.Ю.Архипов, Ф.А.Кондрашов и А.Г.Абдулназаров 30 и 31

* Квартальнов П.В., Абдулназаров А.Г., Архипов В.Ю., Грабовский А.В., Коблик Е.А., Кондрашов Ф.А. 2012. Одноцветный дрозд *(Turdus unicolor)* – новый вид фауны Таджикистана // *Беркут* **21**, 1/2: 20-22.

мая. Ф.А.Кондрашов сделал новые фотографии поющего и кормившегося на земле самца, В.Ю.Архиповым (Arkhipov 2012) получена запись голоса птицы. В последующие дни за одноцветным дроздом наблюдал А.Г.Абдулназаров. Самец продолжал петь до конца июня. С 22 июня в том же парке отмечали самку. 3 июля самец пел менее интенсивно, с некоторой задержкой следовал за самкой, перелетавшей по кронам. 10 июля в парке отмечены обе птицы, они держались по отдельности. Последний раз птиц видели 18 июля, гнездо не найдено.



Рис. 1. Самец одноцветного дрозда *Turdus unicolor* поёт в городском парке Хорога. 31 мая 2012. Фото Ф.А.Кондрашова




Рис. 2. Сонограмма фрагмента песни одноцветного дрозда *Turdus unicolor*. Хорог, 31 мая 2012 (Arkhipov, 2012).

П.В.Квартальнов и А.В.Грабовский приехали в город Хорог 24 июля в надежде получить новые данные о статусе пары одноцветных дроздов. Однако в тот день центр города был закрыт в связи с военными действиями и посетить парк не удалось. А.Г.Абдулназаров 2 августа,

по возвращении в Хорог, не смог найти птиц, возможно, покинувших парк после войсковой операции 24 июля. А.Г.Абдулназаров видел другую птицу 11 июня в кишлаке Гожак (37°24'20" с.ш., 71° 29'53" в.д., 2110 м н.у.м.). Самец перелетал, пел в кронах пирамидальных тополей, растущих в 200 м от берега реки Пяндж. Пение третьего самца одноцветного дрозда Е.А.Коблик и В.Ю.Архипов слышали 13 июня в «совхозном» саду на северо-западной окраине посёлка Ишкашим (36° 43'40" с.ш. 71°36'45" в.д., 2540 м н.у.м.), также в долине реки Пяндж. Кроме перечисленных пунктов, в июне и июле 2012 года авторы обследовали долину реки Пяндж от города Хорога до посёлка Лангар, долину реки Памир от посёлка Лангар до озера Зоркуль, долину реки Гунт от города Хорога до посёлк Аличур, а также окрестности посёлка Мургаб. Залёт нескольких одноцветных дроздов в долину реки Пяндж, очевидно, носил характер инвазии.

П.В.Квартальнов посещал те же места в июне и июле 2011 года, пения этого вида не слышал. Не был одноцветный дрозд отмечен ранее и А.Г.Абдулназаровым, проводившим многолетние исследования орнитофауны Бадахшана. В дальнейшем будет видно, были ли залёты случайными или связаны с расселением вида.

Исследования осуществлены при финансовой поддержке Rufford Small Grants Foundation и РФФИ (проект №10-04-00483). Авторы благодарны жителям Бадахшана за неоценимую поддержку на протяжении всего периода работ, а также руководству и сотрудникам Института зоологии и паразитологии АН Республики Таджикистан (Душанбе) за помощь в организации экспедиции.

Литература

Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-281.

Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области)*. М.: 1-808.

Arkhipov V.Yu. 2012. XC111137. Accessible at www. xeno-canto.org/111137.

Baker E.C.S. 1924. *The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Birds*. London, **2**: 1-561.

Deignan H.G., Paynter R.A. Jr., Ripley S.D. 1964. *Check-list of Birds of the World*. Cambrige (Mass.): 1-502.

Drost R. 1933. *Turdus unicolor* Tickell aus dem Himalaya auf Helgoland // *Ornithol. Monatsber*. **4**: 22-23.

Kazmierczak K. 2000. *A Field Guide to the Birds of the Indian Subcontinent*. London: 1-352.

Rasmussen P.C., Anderton J.C. 2005. *Birds of South Asia: The Ripley Guide*. Washington, DC; Barcelona, **1**: 1-378; **2**: 1-683.

Yang-tung Y. 2008. Tickell's Thrush *Turdus unicolor* at Zhangmu, Tibet Autonomous Region: a new record for China // *Forktail* **24**: 133-134.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1223**: 4405-4406*

Гнездовая находка индийской камышевки *Acrocephalus agricola* в Московской области

Я.А.Редькин, И.А.Мурашев

*Второе издание. Первая публикация в 2014**

Во время посещения рыбхоза «Нарские пруды» (Одинцовский район) 26 июня 2014 нами были обнаружены не менее 3-4 гнездовых пар индийской камышевки *Acrocephalus agricola*. На западном берегу северного пруда, примерно между посёлками Ерёмино и Асаково (55° 32' с.ш., 36°36' в.д.), в тростниковой крепи площадью примерно 100 м^2 среди многочисленных здесь тростниковых камышевок *Acrocephalus scirpaceus* были замечены птицы, обратившие на себя внимание длинной, резко выраженной беловатой бровью, контрастирующей с тёмной окраской шапочки. Двух взрослых птиц удалось отловить и убедиться в правильности нашего определения; одна из птиц оказалась самкой с наседным пятном. Здесь же было обнаружено гнездо, близ которого беспокоилась пара взрослых птиц, с 5 подросшими и полностью оперившимися птенцами, покинувшими гнездо в момент его обнаружения. Гнездо помещалось на стеблях тростника на высоте примерно 60 см над поверхностью сплавины. Численность этого вида в тростниковых крепях рыбхоза, вероятно, значительно выше. Проверить это мы не имели возможности, поскольку самцы и тростниковых, и индийских камышевок уже практически не пели и не реагировали на проигрывание соответствующих записей голоса.

От редакции журнала «Московка». Авторы скромно умалчивают о том, что данная находка представляет собой не только первую гнездовую находку, но и первую доказанную регистрацию индийской камышевки в Московской области. Находка эта ожидалась, сам Я.А.Редькин вместе с соавторами доклада о возможных дополнениях к списку видов московского региона несколько лет назад прогнозировал обнаружение этого вида на одном из семинаров программы «Птицы Москвы и Подмосковья». Индийская камышевка за последние полтора десятилетия была обнаружена заметно севернее известных до того границ ареала в Пермском крае (Калякин, Баумунг, Фладе 1998), в Кировской (Сотников 1996, 2006) и Нижегородской областях (Левашкин 2008). М.В.Калякин, хорошо знакомый с этой птицей, подозревал, что видел её в Лотошинском рыбхозе в июне 2011 года, но не был оконча-

* Редькин Я.А., Мурашев И.А. 2014. Гнездовая находка индийской камышевки в Московской области // *Московка. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья* **20**: 54-55.

тельно в этом уверен. Можно подозревать её присутствие и в ряде других мест Подмосковья, в которых имеются тростниковые крепи, не обязательно обширные, – в том числе, возможно, и севернее Москвы.

Литература

Калякин М.В., Баумунг С., Фладе М. 1998. Первая встреча индийской камышевки в Пермской области // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 116-117.

Левашкин А.П. 2008. Первая находка гнезда индийской камышевки *Acrocephalus agricola* в Нижегородской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (437): 1317.

Сотников В.Н. 1996. Индийская камышевка *Acrocephalus agricola* в Кировской области // *Рус. орнитол. журн.* **5** (3): 15-18.

Сотников В.Н. 2006. *Птицы Кировской области и сопредельных территорий*. Том 2. Воробьинообразные. Часть 1. Киров: 1-448.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1223**: 4406-4407*

Гнездование тугайного соловья *Erythropygia galactotes* в Грузии

З.Д.Сихарулидзе

*Второе издание. Первая публикация в 1974**

Для территории Грузии тугайный соловей (или рыжая или рыжехвостая славка) *Erythropygia galactotes* считалась возможно гнездящейся или редкой перелётной птицей. В 1971 году мы наблюдали гнездование тугайного соловья в Восточной Грузии в Вашлованском государственное заповеднике. Этот заповедник, организованный в 1935 году, находится в Цителцкаройском районе Грузии и расположен на восточном склоне Циви-Гамборского хребта во впадине на Ширконеском плато.

В 1971 году одиночные экземпляры тугайного соловья прилетели 11 мая. 16 мая они встречались в большом количестве. Самцы усиленно пели и перелетали с дерева на дерево, описывая дугу. Если дерево было выше 3 м, они садились на боковые ветви, а на низких кустах они пели на верхушках. 30 мая пары занимали гнездовые территории. 22 мая между расходившимися боковыми ветвями и главным стволом деревца на высоте 1.5 м от земли найдено гнездо, в котором было 2 насиженных яйца бледно-зелёного цвета. 24 мая в гнезде было 4 яйца

* Сихарулидзе З.Д. 1974. Гнездование рыжих славок в Грузии // *Материалы 6-й Всесоюз. орнитол. конф.* М., **1**: 260-261.

и самка плотно сидела на яйцах. Таким образом, к насиживанию самка приступила после завершения кладки. Мы не заметили, чтобы в начале насиживания самка покидала гнездо на длительное время, но она часто вылетала из гнезда (вероятно, для кормёжки) и возвращалась обратно через 40-60 мин. На 4-й день после начала насиживания самка постоянно сидела на кладке, а самец регулярно кормил её с интервалом 1.1-3.4 мин. К гнезду подпускает на расстояние до 3 шагов.

6 июня все 4 птенца вылупились. Первое время самец чаще кормит птенцов, чем самка. На второй день после вылупления родители с 8 до 11 ч принесли корм птенцам 54 раза, а на третий день в этот же промежуток времени – 63 раза. 18 июня после очередного осмотра гнезда все 4 птенца с шумом вылетели из гнезда.

По наблюдению за одним гнездом выяснилось, что насиживание длится 14 дней. Птенцы покидают гнездо на 14-й день.

Второе гнездо с 4 вылупившимися птенцами найдено 18 июля 1971 на земле. Вероятно, это была вторая кладка. 25 июля гнездо опустело.

Количественный учёт 23 мая 1971 показал, что на 10 км маршрута (ширина 25 м) встречаются 13 поющих самцов. В желудке добытого нами 21 мая 1971 тугайного соловья сказались муравьи и жужелицы.

В Восточной Грузии на границе с Азербайджаном (Вашлованский заповедник) тугайный соловей является обычной птицей.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1223**: 4407*

Кроншнеп-малютка *Numenius minutus* на полуострове Де-Фриза в Амурском заливе

М.А.Омелько

*Второе издание. Первая публикация в 1976**

На полуострове Де-Фриза в Амурском заливе за период 22-летних наблюдений кроншнеп-малютка *Numenius minutus* мною был встречен всего лишь единственный раз – 23 апреля 1969. Пара кроншнепов держалась на поле, где птицы собирали насекомых. Слетая, кулики подавали голос, напоминающий крик среднего кроншнепа *Numenius phaeopus*.

* Омелько М.А. 1976. Краткие сообщения в кроншнепе-малютке // *Тр. Окского заповедника* **13**: 148.