ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2015
XXIV



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1224

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXIV

Экспресс-выпуск • Express-issue

2015 № 1224

СОДЕРЖАНИЕ

4411-4419 К вопросу о статусе сизой чайки *Larus canus* в Белоруссии. В.В.ИВАНОВСКИЙ, Н.В.ТУРЛАЙ

4419-4423 Вероятный залёт большой ястребиной кукушки *Hierococcyx sparverioides* в Южное Приморье. А.А.ЛАСТУХИН

4423-4427 Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2015 году. К.Ю.ДОМБРОВСКИЙ

4427-4439 Материалы к орнитофауне Каркаралинского национального парка (Карагандинская область). С.М.РЕЗНИЧЕНКО

4439 Чёрный журавль *Grus monacha* в Читинской области. Е.И.ПАВЛОВ

4440 Чёрный журавль *Grus monacha* на Торейских озёрах. А.Н.ЛЕОНТЬЕВ

4440-4441 Новое место гнездования камчатской крачки *Sterna camtschatica*. В.В.ЛЕОНОВИЧ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2015
Дата опубликования: 11 декабря 2015

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXIV
Express-issue

2015 № 1224

CONTENTS

4411-4419 On the question of the status of the common gull *Larus canus* in Belarus. V.V.IVANOVSKY, N.V.TURLAY

4419-4423 Possible record of vagrant large hawk-cuckoo *Hierococcyx sparverioides* in Southern Primorye. A.A.LASTUKHIN

4423-4427 Data on the white stork *Ciconia ciconia* nests in the Leningrad Oblast for 2015. K.Yu.DOMBROVSKY

4427-4439 Materials for avifauna of Karkarala National Park (Karaganda Oblast). S.M.REZNICHENKO

4439 The hooded crane *Grus monacha* in the Chita Oblast. E.I.PAVLOV

4440 The hooded crane *Grus monacha* near Torey lakes. A.N.LEONTIEV

4440-4441 New nesting place of the Aleutian tern *Sterna camtschatica*. V.V.LEONOVICH

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2015

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1224**: 4411-4419*

К вопросу о статусе сизой чайки *Larus canus* в Белоруссии

В.В.Ивановский, Н.В.Турлай

Владимир Валентинович Ивановский, *Наталья Владиславовна Турлай*. Кафедра экологии и охраны природы, Витебский государственный университет имени П.М.Машерова, Московский проспект, д. 33, Витебск, 210038, Белоруссия. E-mail: ivanovski@tut.by

Поступила в редакцию 27 ноября 2015

В Белоруссии в XX столетии гнездование сизой чайки *Larus canus* предполагалось на озёрах Витебской области, но ни одной гнездовой находки в работах того времени не приводится (Долбик 1963; Федюшин, Долбик 1967; Дорофеев 1970). К началу XXI века статус сизой чайки был пересмотрен, и она уже считалась обычным гнездящимся по всей Белоруссии видом (Никифоров и др. 1997). К этому же периоду относятся и первые конкретные данные по гнездовой экологии сизой чайки (Козлов 2000; Ивановский и др. 2002). Вскоре статус сизой чайки вновь претерпел изменение – её включили в IV категорию Красной книги РБ (Красная книга… 2004). В соседней Латвии наблюдалось некоторое увеличение численности сизой чайки, в конце 1970-х годов она оценивалась в 450-550 пар (Виксне 1983, 1989). Например, на болоте Тейчу – самом крупном верховом болоте Латвии в 1982-2003 годах гнездилось от 30 до 45 пар сизых чаек (Avotiņš 2005).

В данной публикации проанализированы материалы, полученные нами в 2001-2015 годах в Витебской области Белоруссии.

В Белорусском Поозерье гнездовыми биотопами сизой чайке служат грядово-озёрный комплекс с небольшими торфяными островками (у нас встречается редко) и сильно обводнённый грядово-мочажинный комплекс, а также выработанные и заброшенные карьеры торфоразработок, где среди искусственных водоёмов имеются островки или чередуются торфяные бровки и собственно карьеры разной степени зарастания. Грядово-мочажинный комплекс обычно граничит с остаточными озёрами или крупными мочажинами, имеющими открытую воду, где птенцы сизых чаек держаться до подъёма на крыло.

В последние десятилетия в крупных городах Белоруссии появились городские группировки сизых чаек, в основном кормящихся на свалках и гнездящихся на крышах промышленных предприятий, чаще всего высотных заводских цехов (Красная книга… 2004; Ивановский 2011; Гончаров 2015). В отличие от других чайковых, гнездящихся на крышах, сизая чайка проявляет максимальные адаптационные возможности, занимая крыши с разным типом покрытия (Гончаров 2015).



Рис. 1. Озеро с островками – оптимальный гнездовой биотоп сизой чайки *Larus canus* на верховых болотах. Фото В.В.Ивановского.



Рис. 2. Самые крупные колонии сизой чайки *Larus canus* располагаются на затопленных выработанных торфяных карьерах. Фото В.В.Ивановского.

На верховых болотах и торфяных карьерах сизые чайки устраивают гнёзда на крупных моховых кочках, на вершинах невысоких болотных сосен, на сломах высоких сосновых пней, на старых гнёздах серых ворон *Corvus cornix* и воронов *Corvus corax*, на искусственных гнёздах типа «кочка» и «ведро», оборудуемых на болотных соснах для мелких соколов и ушастых сов (Ивановский 2012).

В городах сизые чайки занимают крыши высотных цехов заводов и других промышленных предприятий, имеющих боковые бордюры.



Рис. 3. Место одиночного гнездования сизых чаек *Larus canus* – сильно обводнённый грядово-мочажинный комплекс верховых болот. Фото В.В.Ивановского.



Рис. 4. Типичное гнездо сизой чайки *Larus canus* в грядово-мочажинном комплексе. Карачевский Мох. 7 мая 2006. Фото В.В. Ивановского.

На моховых кочках гнездо строится из сухих стеблей и листьев осок, пушицы и других болотных растений. Гнёзда на деревьях чайки сооружают из тонких сухих веточек деревьев вперемешку со мхом, лоток выстилается сухими стеблями, листьями, корешками осок и пушиц, а на торфяных карьерах сизые чайки используют для выстилки лотка также метёлки тростника и сухие листья рогоза. Гнёзда на деревьях очень рыхлые, неустойчивые и часто разрушаются во время сильных ветров и ливней. Интересно, что гнёзда, построенные сизыми чайками, никогда не занимались дербниками *Falco columbarius*. Размеры гнёзд,

построенных на моховых кочках на верховых болотах, имели следующие размеры, см: диаметр гнезда 24-33, диаметр лотка 14-18, глубина лотка 4-6 (n = 5). В гнёздах, уже покинутых птенцами, лотки утоптаны, по краям гнезда помёт, в лотке небольшие растоптанные погадки.



Рис. 5. Гнездо сизой чайки *Larus canus* на островке в колонии. Фото В.В.Ивановского.



Рис. 6. Кладка сизой чайки *Larus canus* в гнезде на земле. Городнянский Мох. 25 мая 2004. Фото В.В.Ивановского.

Величина кладки (включая повторные) у сизой чайки составляет 1-3, в среднем 2.3± 0.1 яйца (n = 29). Размеры яиц, мм: 53.1-63.4×39.2-44.7, в среднем 58.8±0.8×41.6±0.4 (n = 14). Вес яиц, г: 42.8-64.1, в среднем 51.80±1.98 (n = 9).

Охарактеризовать успешность размножения и продуктивность сизых чаек, гнездящихся в колониях, довольно сложно, так как после вылупления птенцы находятся в гнезде совсем недолго, а покинув его, часто сбиваются в группы с птенцами из других выводков. Мы можем

лишь сказать, что в осмотренных нами гнёздах (n = 5) с ещё не покинувшими гнездо пуховичками отмечено по 1-3 птенца на выводок.

Также не просто охарактеризовать фенологию размножения сизой чайки, поскольку после разорения гнезда эти птицы как правило делают повторную кладку. Не следует забывать и о погодных условиях конкретного года, которые также влияют на сроки размножения.



Рис. 7. Гнездо, построенное сизыми чайками *Larus canus* в верхней мутовке сосны. Верховое болото Оболь–II, 21 июня 2015. Фото В.В.Ивановского.



Рис. 8. Гнездо сизой чайки *Larus canus*, построенное на изогнутой макушке сосны. Торфяные карьеры, Дымовщина. Фото В.В. Ивановского.



Рис. 9. Гнездо сизой чайки *Larus canus*, построенное на изломе высокого пня. Краснопольский Мох. 4 июня 2006. Фото В.В.Ивановского.



Рис. 11. Кладка сизой чайки *Larus canus* в искусственном гнезде–ведре, установленном для дербника. Краснопольский Мох. 17 июня 2015. Фото В.В.Ивановского.

Тем не менее, сделаем попытку охарактеризовать фенологию размножения, опираясь на данные, полученные при обследовании тех гнёзд, которые мы посещали несколько раз за гнездовой сезон. Итак, 2 мая отмечено гнездо в стадии постройки; 15 мая большинство кладок завершено; 4 июня в гнёздах (без учёта повторных кладок) недавно вылупившиеся пуховые птенцы; 18 июня подросшие пуховые птенцы

держатся на озёрах и мочажинах; после 13 июля молодые сизые чайки уже летают. Нам известны две точные даты вылупления птенцов – 15 июня 2011 и 18 июня 2004. Исходя из того, что, по нашим данным, длительность насиживания у этого вида в Белорусском Поозерье составляет 25 сут, можно рассчитать, что яйца были отложены в период с 21 по 24 мая, а птенцы поднялись на крыло в период с 8 по 17 июля.



Рис. 12. Семейная пара сизых чаек *Larus canus* у гнезда. Городнянский Мох. 15 июня 2015. Фото В.В.Ивановского.



Рис. 13. Самец сизой чайки *Larus canus* в колонии. Чернецкий Мох. 7 июня 2007. Фото В.В.Ивановского.

В колониях сизых чаек, гнездящихся на крышах Витебска, 22 июня 2007 отмечены как полуоперённые, так и полностью оперённые, но ещё не лётные птенцы (Ивановский 2011).

Необходимо также отметить, что в пределах колоний встречаются и неполовозрелые особи прошлых лет рождения. Например, 1 июня 2013 поблизости от колонии сизых чаек на болоте Глоданский Мох держалась стая из 12 неполовозрелых птиц (с тёмной полосой по краю хвоста).

Основными врагами птенцов сизых чаек на торфяных карьерах являются болотный лунь *Circus aeruginosus* и енотовидная собака *Nyctereutes procyonoides*, а на нетронутых верховых болотах лисица *Vulpes vulpes*, енотовидная собака, беркут *Aquila chrysaetos*. Весной и осенью взрослых сизых чаек добывают пролётные сапсаны *Falco peregrinus*. Не исключено, что маленьких пуховых птенцов добывает и дербник, поскольку взрослые сизые чайки активно отгоняют этих соколов от гнёзд (Морозов и др. 2013).



Рис. 14. Поедь сапсана *Falco peregrinus* – останки сизой чайки *Larus canus*. Верховое болото Оболь-II. 18 марта 2010. Фото В.В.Ивановского.

Сравнение основных параметров экологии гнездования сизых чаек в 1982-2000 (Ивановский и др. 2002) и в 2001-2015 годах показывает, что они практически не изменились. Можно отметить только расширение набора мест, используемых для расположения гнезда, за счёт гнездования в городах на крышах промышленных зданий.

Численность населения сизых чаек на верховых болотах и карьерах выработанных торфоразработок за 2001–2015 годы оставалась стабильной. Количество колоний сизых чаек на крышах производственных предприятий Витебска, ежегодно увеличивалось. Поэтому общая численность сизых чаек в Белорусском Поозерье увеличилась (Ивановский и др. 2002; Ивановский 2011). Это ставит под вопрос правомерность включения сизой чайки – экологически очень пластичного вида с положительным трендом численности – в 4-е издание Красной книги Республики Беларусь.

Литература

Виксне Я. (ред.) 1983. *Птицы Латвии. Территориальное размещение и численность*. Рига: 1-224.

Виксне Я. (ред.) 1989. *Атлас гнездящихся птиц Латвии*. Рига: 1-352.

Гончаров Д.А. 2015. Специфика распределения синантропных колоний чайковых птиц в селитебных стациях города Минска и буферной зоны // *14-я Междунар. орнитол. конф. Сев. Евразии. I. Тезисы*. Алматы: 145-147.

Долбік М.С., Дучыц В.Н., Тарлецкая Р.Ю. 1963. Птушкі поуначы Беларусі. Ч. I: Курыныя, галубы, пастушкі, жураўліныя, кулікі, чайкі, гагары, паганкі, гусепадобныя, весланогія, галянастыя, драпежнікі // *Весці АН БССР*. Сер. біял. навук. 2: 84-89.

Дорофеев А.М. 1970. Гнездящиеся птицы Городокской гряды (эколого-фаунистический обзор) // *Животный мир Белорусского Поозерья*. Витебск, **1**: 37-79.

Ивановский В.В. 2011. Материалы по гнездовой пластичности сизой *(Larus canus)* и серебристой *(L. argentatus)* чаек в Белорусском Поозерье // *Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Тр. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Сомова (1861-1923)*. Харьков, **2**: 210-214.

Ивановский В.В., Кузьменко В.Я., Козлов В.П. 2002. Сизая чайка (*Larus canus* L.) на верховых болотах Беларуси // *Веснік Віцебскага дзярж. ун-та* 2 (24): 143-145.

Ивановский В.В. 2012. *Хищные птицы Белорусского Поозерья*. Витебск: 1-209.

Козлов В.П. 2000. Гнездование сизой чайки на трансформированном верховом болоте «Глоданский мох» // *Фауна и экология птиц бассейна реки Западная Двина: Материалы междунар. науч. конф*. Витебск: 47-49.

Красная книга Республики Беларусь. Животные. 2004. Минск: 1-320.

Морозов В.В., Брагин Е.А., Ивановский В.В. 2013. *Дербник*. Витебск: 1-256.

Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тишечкин А.К. 1997. *Птицы Беларуси на рубеже XXI века: статус, численность, распространение*. Минск: 1-186.

Федюшин А.В., Долбик М.С. 1967. *Птицы Белоруссии*. Минск: 1-520.

Avotiņš A. 2005. *Putni Teicu dabas rezervata*. Laudona: 1-160.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1224**: 4419-4423*

Вероятный залёт большой ястребиной кукушки *Hierococcyx sparverioides* в Южное Приморье

А.А.Ластухин

Альберт Аркадьевич Ластухин, Эколого-биологический центр «Караш», ул. Кооперативная, д. 4, Чебоксары, 428000, Чувашская республика, Россия. E-mail: Alast@mail.ru

Поступила в редакцию 9 ноября 2015

С 20 апреля по 29 мая 2015 мы проводили исследование весенней миграции птиц методом мониторинга аудио эфира голосов птиц на 7 участках Южного Приморья. На основе этого аудио мониторинга и фотографий была собрана и обработана база данных аудио треков, состоящая из 9544 файлов; 294 папок общим объёмом 38 ГБ (более 350 ч), которая хранится у автора. На данный момент выявлены 215 видов птиц. Их голоса опубликованы (740) во всемирной базе данных голосов птиц. Ещё около 220 фрагментов пока не идентифицированы.

При обработке голосов кукушек Южного Приморья были выделены 215 и детально изучены 168 фрагментов, принадлежащих 4 видам рода

Cuculus, в том числе: *C. canorus* – 98, *C. optatus* – 33, *C. micropterus* – 25 и *C. poliocephalus* – 5. Сверх этого материала выявлено 8 фрагментов токовой песни одного очень необычного голоса самца *Cuculus* sp. в окрестностях деревни Меркушовка 17 и 19 мая 2015, не подходящего ни к одному из перечисленных видов, о которых мы сообщали ранее (Ластухин 2015). Как нам стало недавно известно, аналогичное странное кукование также отмечено и 25 мая 2009 на острове Гагео в Корее [Gageo Island, запись Nial Moores (Moores, 2013)]. По нашему предположению, это голос гибрида: *C. canorus* × *C. optatus*.

Единственный представитель второго рода кукушек фауны России – ширококрылая кукушка *Hierococcyx hyperythrus*, также был выявлен и изучен по 35 выделенным фрагментам голосов, собранных: в долине реки Илистой на сопках хребта Пржевальского 29 апреля 2015 (Михайловский район, 43.7953° с.ш., 132.5283° в.д.) – вероятно, самая ранняя находка вида весной в Приморье (Пукинский, 2003); в окрестностях города Хасан 14-15 мая 2015 (Хасанский район, 42.5275° с.ш., 130.692° в.д.), в окрестностях деревни Меркушовка 17 мая 2015 (Черниговский район, 44.3602° с.ш., 132.7989° в.д.) и в 20 км юго-западнее города Уссурийска 19-20 июня 2015 (Уссурийский район, 43.7377° с.ш., 131.7847° в.д.). Голос самца ширококрылой кукушки весьма характерен. Несущие частоты находятся в диапазоне от 2600 до 5200 Гц. Фразы двух типов: 1) восходящие из хрипящих дуплетов около 1 с длиной и 2) стрёкота, состоящего из двух десятков элементов, длящихся около 2.5 с (рис. 1).




Рис. 1. Сонограмма песни самца *Hierococcyx hyperythrus* из Южного Приморья.

Через полгода, при повторном анализе некоторых записей, мы обнаружили пропущенный ранее фрагмент песни ещё одного вида кукушки. В результате его изучения выяснилось, что им оказался голос знакомой нам по Вьетнаму большой ястребиной кукушки *Hierococcyx sparverioides* (Vigors, 1832). Эти кукушки обитают в горных лесах, и их звонкий голос невозможно ни с кем спутать (Ластухин 2014). Наша запись песни *H. sparverioides* из Вьетнама доступна по адресу http://www.xeno-canto.org/210475. Как видно из сонограммы, полная песня состоит из двух фаз: сначала запевка, состоящей из серии жужжащих

рюмений *«рю-рю-рю…»*, затем основная часть – повторяющиеся с усилением крики *«тИ-ки-рю – тИ-ки-рю – тИ-ки-рю…»*, которые находятся в диапазоне ниже, чем у *H. hyperythrus* – от 2000 до 2450 Гц (рис. 2). Такую фразу из основной части песни *H. sparverioides* и удалось записать в южном Приморье (рис. 3). Наша запись песни этого вида из Южного Приморья доступна по адресу http://www.xeno-canto.org/288282.




Рис. 2. Сонограмма песни самца *Hierococcyx sparverioides*, 6 апреля 2009, северный Вьетнам, г. Сапа (22.3353° с.ш., 103.8514° в.д.). В овалах характерные для вида фразы: *«тИ-ки-рю»*.




Рис. 3. Сонограмма фразы песни самца *Hierococcyx sparverioides* из Южного Приморья. 15 мая 2015 (42.5275° с.ш., 130.692° в.д.). В овалах характерные для вида фразы: *«тИ-ки-рю»*.

Обстоятельства находки следующие. 15 мая 2015 ранним утром, когда ещё стоял утренний туман и шёл мелкий дождь, я отправился из полевого лагеря на озеро Птичье, чтобы снять работавший там весь вечер и всю ночь рекордер. По дороге, проходившей по заросшей двумя видами дубов сопке, записывал и фотографировал птиц (рис. 4).

На одной из таких записей, сделанной в 7 ч на фоне разнообразных голосов местных птиц: восточной синицы *Parus minor*, бледноногой пеночки *Phylloscopus tenellipes*, зарнички *Phylloscopus inornatus*, светлоголовой пеночки *Phylloscopus coronatus*, синего соловья *Luscinia cyane*, малого черноголового дубоноса *Eophona migratoria*, – были записаны 3 фразы песни *H. sparverioides*. Судя по слабым сигналам, кукушка находилась в 100 м или более от дороги. Фразы слышались по нарастающей, т.е. птица издавала их в полёте. Самая лучшая из них была всё же трудно различима из-за мелкого дождя, который барабанил по листьям дуба (вертикальные штрихи на сонограмме) создавая

заглушающий фоновый шум. Из-за этого фрагмент голоса и был пропущен при первом прослушивании.



Рис. 4. Туманное утро на сопках в окрестностях озера Птичье (Хасанский район Приморского края) – место записи голоса *Hierococcyx sparverioides*. 15 мая 2015. Фото автора.

Ареал *Hierococcyx sparverioides* охватывает Юго-Восточную Азию, Индию (зимует), Пакистан, Гималаи. На север в гнездовой период доходит в Китае до Пекина (восточный берег Жёлтого моря) (Burt *et al*. 1993; Erritzøe *et al*. 2002; Brazil 2009). Ближайшие к русскому Приморью места находок находятся в Корее, со статусом – редкий залётный вид (Lee 2000; birdskorea 2014). В России вид ранее никогда не отмечался и в авторитетных списках отсутствует (Коблик, Архипов 2014).

Выражаю искреннюю благодарность В.Н.Сотникову (Киров) – организатору экспедиции по Приморью, М.В.Погибе (Сибирцево) за большую всестороннюю помощь, А.Р.Лаптеву, С.А.Карпееву (Чебоксары), участникам экспедиции во Вьетнам, за всемерную поддержку в полевых исследованиях. M.Lastukhin, O.Lastukhin (Нью-Йорк) за обеспечение необходимой литературой, фото и аудио техникой.

Литература

Коблик Е.А., Архипов В.Ю. 2014. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: Списки видов // *Зоологические исследования* **14**: 1-171.

Ластухин А.А. 2014. *Краткие весенние орнитологические заметки в северном Вьетнаме* http://www.cloudbirders.com/tripreport/repository/LASTUKHIN_Vietnam_0304_2009.pdf

Ластухин А.А. 2015. Запись необычной песни кукушки из Южного Приморья // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1194): 3472-3473.

Пукинский Ю.Б. 2003. *Гнездовая жизнь птиц бассейна реки Бикин*. СПб.: 1-267 (Тр. С.-Петерб. общ-ва естествоиспыт. Сер. 4. Т. 86).

Brazil M. 2009. *Birds of East Asia: eastern China, Taiwan, Korea, Japan, eastern Russia*. London: 1-529.

Burt L. Monroe Jr., Sibley Ch.G. 1993. *A World Checklist of Birds*. Yale Univ. Press: 1-400.
Erritzøe J., Mann C. F., Brammer F., Fuller R. A. 2012. *Cuckoos of the world. Helm Identification Guides*. A&C Black: 1-544
Lee W., Koo T., Park J.-Y. 2000. *A Field Guide to the Birds of South Korea*. Evergreen Foundation.
Albert Lastukhin, XC210475. Accessible at www.xeno-canto.org/210475.
Albert Lastukhin, XC288282. Accessible at www.xeno-canto.org/288282.
Nial Moores. 2013. http://www.birdskorea.org/Birds/Identification/ID_Notes/BK-ID-Going-Cuckoo.shtml
http://www.birdskorea.org/Habitats/Yellow-Sea/YSBR/Downloads/Birds-Korea-Status-of-Birds-2014.pdf

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1224**: 4423-4427*

Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2015 году

К.Ю.Домбровский

Константин Юзефович Домбровский. Государственный Научно-исследовательский институт озёрного и речного рыбного хозяйства (ФГБНУ «ГосНИОРХ»), Набережная Макарова, д. 26, Санкт-Петербург, 199053, Россия. E-mail: k.dombrovsky@yandex.ru

Поступила в редакцию 14 ноября 2015

В 2015 году мною продолжены наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* на территории Ленинградской области. В дополнение к прежним сведениям (Домбровский 2008а,б, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014а,б) появились новые. В этом году, как и в прошлом, поездок по области было меньше, чем в предыдущие годы. Как следствие – число обнаруженных новых гнёзд невелико. Скорее всего, в действительности их больше. Как показывают прежние наблюдения, белый аист продолжает расселяться по Ленинградской области. В приведённом ниже списке населённые пункты перечислены в алфавитном порядке с указанием их положения в системе административного деления области (район и волость).

Большие Озертицы (59°30' с.ш., 29°01' в.д.). Волосовский р-н, Каложицкая вол. В гнезде, построенном в 2012 году на столбе линии электропередачи, в мае отмечены 2 птицы. В гнезде, построенном в 2014 году на столбе линии электропередачи (Домбровский 2014б) в мае отмечена 1 птица.

Большое Кузёмкино (59°35' с.ш., 28°12' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская вол. В гнезде на опиленной вершине большого лиственного дерева у дороги, построенном в 2011 году, в 2015 году с 10 мая

постоянно можно было наблюдать гнездящихся белых аистов.

Большое Руддилово (59°34' с.ш., 28°47' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская вол. Гнездо, отмеченное ещё в 2003 году, сейчас на месте, но птиц не видно.

Велькота (59°36' с.ш., 28°53' в.д.). Кингисеппский район, Котельская волость. На бетонном столбе линии электропередачи гнездо существует, как и ранее. 26 мая наблюдал 1 аиста.

Дятлицы (59°42' с.ш., 29°39' в.д.). Ломоносовский р-н, Гостилицкая вол. В гнезде, построенном на помосте на опиленном дереве рядом с церковью в 2014 году (Домбровский 2014б), в мае заметна 1 птица.

Заречье (59°23' с.ш., 28°17' в.д.). Кингисеппский район, Кошкинская волость. Гнездо на месте, 12 мая стоит 1 птица.

Извоз (59°26' с.ш., 28°18' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская вол. В гнезде, расположенном на столбе линии электропередачи, в апреле стоят 2 птицы.

Кейкино (59°28' с.ш., 28°16 'в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская вол. Гнездо, построенное на опиленной вершине большого лиственного дерева, 19 апреля на месте. Птиц не видно.

Керстово (59°29' с.ш., 28°47' в.д.). Кингисеппский р-н, Опольевская вол. В гнезде, отмеченном на столбе линии электропередачи в 2004 году, в течение мая 2015 наблюдал пару птиц. В гнезде, построенном поблизости также на столбе в 2013 году (Домбровский 2014а), в течение мая 2015 наблюдал одного аиста.

Котлы (59°36' с.ш, 28°45' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская вол. Гнездо, расположенное возле железнодорожной станции на водонапорной башне, известно с 1995 года (Пчелинцев, Ильинский 2002). В марте 2015 гнездо находится на прежнем месте. На другой водонапорной башне второе гнездо, обнаруженное в ноябре 2013 (Домбровский 2014а), тоже на месте.

Красницы (Новые Красницы) (59°20' с.ш., 29°10' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнездо, построенное в 2011 году на помосте, укреплённом на высоком шесте над крышей частного дома (Домбровский 2012), в мае находится на месте.

Красный Луч (59°17' с.ш., 29°08' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне в 2013 году (Домбровский 2014а), сильно покосилось. 19 марта 2015 в нём, конечно, птиц ещё нет.

Кряково (59°19'51" с.ш., 29°00'38" в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. На специально устроенном из досок помосте на вершине большой берёзы уже с 14 апреля стоят 2 птицы.

Курск (59°19' с.ш., 29°01' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнездо, построенное на столбе линии электропередачи, 19 марта находится на месте.

Летошицы (59°22' с.ш., 29°15' в.д.). Волосовский р-н, Врудская вол. В гнезде, построенном на водонапорной башне, с 14 апреля отмечены птицы.


Ломаха (59°40' с.ш., 29°02' в.д.). Ломоносовский р-н, Копорская вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне, жилое.

Мануйлово (59°22' с.ш., 28°51' в.д.). Кингисеппский р-н, Пустомержская вол. Гнездо, отмеченное 18 апреля 2013 на опиленном невысоком дереве без веток, стоящем в частном дворе (Домбровский 2014а), сильно покосилось. Птиц 19 апреля 2015 нет.

Маттия (59°37' с.ш., 28°39' в.д.). Кингисеппский р-н, Котельская вол. Гнездо, построенное на столбе линии электропередачи, на месте. Но птиц 5 и 12 мая нет.

Моровино (58°53' с.ш., 30°31' в.д.). Лужский р-н, Ям-Тесовская вол. В гнезде, устроенном на помосте на опиленном дереве, летом заметны молодые птицы (устн. сообщ. О.В. Апаликовой).

Морозово (59°19' с.ш., 29°02' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Обнаружено новое гнездо, построенное на опиленном лиственном дереве над дорогой. 19 марта в гнезде птиц нет (рисунок, точка 1).



Места расположения гнёзд белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области, не упоминавшиеся до 2015 года (обозначения в тексте).

Новопятницкое (59°23' с.ш., 28°33' в.д.). Кингисеппский р-н, Большелуцкая вол. В гнезде, обнаруженном в 2014 году (Домбровский 2014б), 19 апреля птиц не видно.

Пулково (59°25' с.ш., 28°20' в.д.). Кингисеппский р-н, Кошкинская вол. Гнездо, построенное в 2009 году на столбе линии электропередачи, является жилым.

Пустомержа (59°23' с.ш., 28°52' в.д.). Кингисеппский р-н, Пустомержская вол. Оба гнезда, построенные на столбах линии электропередачи в 2001 и 2012 годах, по-прежнему жилые.

Сумск (59°17' с.ш., 29°05' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне в 2012 году (Домбровский 2013), видел лишь 19 марта 2015: оно сильно покосилось и совсем плоское. Позднее не наблюдал. Известно, что в 2014 году аисты здесь успешно вывели потомство (Домбровский 2014а).

Сырковицы (59°20' с.ш., 29°09' в.д.). Волосовский р-н, Остроговицкая вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне и отмеченное нами в 1997, по-прежнему является жилым.

Торма (59°23' с.ш., 28°54' в.д.). Кингисеппский район, Пустомержская волость. Гнездо, построенное на столбе линии электропередачи в 2009 году, по-прежнему является жилым.

Фёдоровка (59°29' с.ш., 28°14' в.д.). Кингисеппский р-н, Кузёмкинская вол. Гнёздо, построенное на бетонном столбе линии электропередачи в 2008 году, по-прежнему жилое: уже 19 апреля на нём стоит аист. Гнездо постройки 2009 года, похоже, в этом сезоне разрушается. Гнездо постройки 2013 года вообще исчезло.

Шуговицы (59°22' с.ш., 28°58' в.д.). Волосовский р-н, Беседская вол. Гнездо, расположенное на опиленной вершине старого лиственного дерева и известное с 2001 года, по-прежнему является жилым.

Ямки (59°24' с.ш., 29°16' в.д.). Волосовский р-н, Врудская вол. Гнездо, построенное на водонапорной башне и известное с 1999 года, по-прежнему является жилым: 14 апреля на нём замечена птица.

Ямсковицы (59°25' с.ш., 28°49' в.д.). Кингисеппский р-н, Опольевская вол. Гнездо, восстановленное птицами весной 2011 на специально спиленных «короной» ветках большой берёзы (Домбровский 2012), находится на месте. Но птиц до 19 апреля около него не видно (позднее наблюдения не проводились).

Ястребино (59°22' с.ш., 28°57' в.д.). Волосовский р-н, Беседская вол. Гнездо, построенное в 2007 году на развалинах церкви и исчезнувшее в 2012 году, было заново отстроено на том же месте в 2013 году: здесь вывелись 3 молодые птицы (Домбровский 2014а). В 2014 гнездо снова исчезло – в храме при кладбище постоянно проводятся восстановительные работы. В апреле 2015 года замечено строящееся новое гнездо, на котором стоит 1 птица.

По итогам наблюдений 2015 года на обследованной территории отмечено всего 1 гнездо белого аиста (см. рисунок), не упоминавшееся ранее: на опиленном лиственном дереве. Достоверно исчезли 2 гнезда из известных ранее. Это гнездо в Комаровке, построенное в 2013, и в Федоровке – тоже построенное в 2013 году (Домбровский 2014а).

Литература

Домбровский К.Ю. 2008а. Гнёзда белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (428): 1027-1045.

Домбровский К.Ю. 2008б. Новые сведения о гнёздах белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (448): 1622-1626.
Домбровский К.Ю. 2009. Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2009 году // *Рус. орнитол. журн.* **18** (523): 1929-1933.
Домбровский К.Ю. 2010. Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2010 году // *Рус. орнитол. журн.* **19** (604): 1850-1854.
Домбровский К.Ю. 2012. Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2011 году // *Рус. орнитол. журн.* **21** (740): 631-640.
Домбровский К.Ю. 2013. Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2012 году // *Рус. орнитол. журн.* **22** (849): 470-476.
Домбровский К.Ю. 2014а. Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2013 году // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1024): 2167-2173.
Домбровский К.Ю. 2014б. Наблюдения за гнёздами белого аиста *Ciconia ciconia* в Ленинградской области в 2014 году // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1087): 4124-4126.
Пчелинцев В.Г., Ильинский И.В. 2002. Кадастр гнёзд белого аиста (*Ciconia ciconia* L.) в Ленинградской области // *Птицы и млекопитающие Северо-Запада России (эколого-фаунистические исследования)*. СПб.: 127-139.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1224**: 4427-4439*

Материалы к орнитофауне Каркаралинского национального парка (Карагандинская область)

С.М.Резниченко

*Второе издание. Первая публикация в 2013**

Орнитологические наблюдения велись мной с середины 2007 по октябрь 2010 года в Каркаралинском национальном парке и в окрестностях города Каркаралинска (Карагандинская область). За водяными птицами наблюдения проводились на водоёмах Пашино, Копа, Большое, Малое, Сасыкколь, Жартас, Комиссаровка и Сталинская плотина. В общей сложности за этот период отмечено 118 видов птиц, краткая информация о которых изложена ниже. Во всех случаях, когда из-за недостатка фактических данных мы затрудняемся оценить характер пребывания и относительную численность видов птиц, эти вопросы нами не обсуждаются.

Podiceps auritus. Редкий гнездящийся вид. На небольшом водоёме Сасыкколь, расположенном на окраине города Каркаралинска, 8 июня 2009 встречена одиночка, а 9 июня 2009 в центральной части озере Малое, заросшего по периметру тростником, наблюдали брачную

* Резниченко С.М. 2013. Материалы к орнитофауне Каркаралинского национального парка // *Орнитол. вестник Казахстана и Средней Азии* **2**: 177-185.

пару. В конце июня 2009 другая пара красношейных поганок загнездилась на водоёме у городской плотины Каркаралинска, но к 4 июля их гнездо исчезло – после того как, редкий тростник по берегам и мелководьям был съеден и вытоптан скотом.

Podiceps cristatus. Гнездящийся вид. Чомга, насиживающая кладку, отмечена 24 мая 2008 на небольшом озерке в урочище Комиссаровка. Взрослую птицу с 1 оперившимся птенцом и 2 птенцов в пуховом наряде наблюдали 11 августа 2009 на озере Пашино. Кроме того, на озере Копа 28 апреля 2010 видели пару, а на водоёме у Сталинской плотины 29 апреля 2010 учли 12, а 30 сентября 2008 – 17 чомг.

Phalacrocorax carbo. Редкий залётный вид. Егерь В.Плотников 18 апреля 2010 на поле у села Жананегиз видел двух больших бакланов среди серых гусей.

Botaurus stellaris. Редкий гнездящийся вид. Голос большой выпи 11 июня 2009 слышали в тростниковых зарослях на озере Малое.

Casmerodius albus. Редкий пролётный вид. На речке Каркаралинке близ конторы Каркаралинского национального парка 5 сентября 2009 держалась одиночка, кормившаяся мальками рыб.

Ardea cinerea. Встречается в летнее время на водоёмах в окрестностях Каркаралинска, однако гнездование не подтверждено. Скопление из 17 особей наблюдали 30 сентября 2008 на озере Жартас.

Ciconia nigra. Редкий гнездящийся вид в Каркаралинско-Кентском горно-лесном массиве. Известно гнездо в районе кордона «Болпан» в Кентском лесничестве, в котором 29 июня 2005 было 5 птенцов. В 2006-2007 годах одна пара чёрных аистов гнездилась в урочище Тонкирис в Горном лесничестве, но в 2008 году это гнездо заняли балобаны. Ещё одно гнездо с 4 оперёнными птенцами найдено 6 августа 2009 охотоведом национального парка М.Аукешевым к востоку от кордона «Болапан». На следующий год аисты у этого гнезда не появились. По сообщению инспектора Ж.Махмутова, в Каркаралинском лесничестве ему было известно гнездование двух пар чёрного аиста. В августе 2009 года в одном гнезде было 2 птенца, в другом весной 2008 года содержалось 3 яйца. Более подробные сведения о гнездовании этой птицы в Кенте приводятся нами в другой публикации (Резниченко 2010а).

Anser anser. Пролётный, возможно, гнездящийся вид на некоторых из каркаралинских озёр. На озере Большое 1 апреля 2008 в тростнике держались 4 птицы, а на берегу озера Малое 15 мая 2009 паслись 8 серых гусей.

Cygnus olor. Редкий пролётный вид. Одиночный лебедь-шипун отмечен 30 сентября 2008 в солёной части озере Жартас.

Tadorna ferruginea. Гнездящийся вид. На водоёме в урочище Комиссаровка 26 июня 2007 отмечена пара огарей с одним пуховым утёнком. На озере Копа и на водоёме около кордона «Бидаик» 28 апреля

2010 встречено по одной паре огарей. На следующий день третью пару видели на водоёме у Сталинской плотины.

Tadorna tadorna. Редка в районе Каркаралинских гор. На поле у села Жананегиз 18 апреля 2010 В.Плотников наблюдал 6 пар пеганок.

Anas platyrhynchos. Обычна на гнездовании. В урочище Комиссаровка 21 июля 2007 наблюдали самку кряквы с выводком из 5 утят, доросших до размеров взрослых птиц. На озере Сасыкколь на окраине города Каркаралинск 8 июня 2009 видели самку с 8 пуховичками, а 1 октября 2008 – 18 крякв, в том числе 6 взрослых и 12 молодых.

Anas crecca. Малочисленный пролётный вид, встречающийся реже трескунка. На озере Малое 1 октября 2008 держалось 4 самца.

Anas strepera. Пролётный вид. На озере Малое 15 мая 2009 встречен селезень серой утки.

Anas penelope. Пролётный вид. Одиночная свиязь отмечена 1 октября 2008 на озере Сасыкколь.

Anas acuta. Обычный пролётный, возможно, гнездящийся вид. На озере Копа 28 апреля 2010 наблюдалась пара, а на ручье в районе кордона «Бидаик» в этот же день видели селезня и пару. На озере близ села Жананегиз 18 апреля 2010 В.Плотников наблюдал пролётных шилохвостей, которые доминировали среди других уток.

Anas querquedula. Пролётный, возможно, гнездящийся вид. На озере Малое 15 мая 2010 держались 6 самцов и 1 самка трескунка.

Anas clypeata. Немногочисленна. На озере Копа 28 апреля 2010 отмечены две пары широконосок.

Aythya ferina. Гнездящийся вид. На озере Копа 28 апреля 2010 держался самец, а в урочище Комиссаровка 12 мая 2008 – 4 самца и 1 самка. Самку красноголового нырка с 6 пуховичками встретили 11 июня 2009 на озере Сасыкколь.

Aythya fuligula. Гнездящийся вид. На озере Копа 28 апреля 2010 отмечено 7 брачных пар хохлатой чернети, а на водоёме в урочище Комиссаровка 12 мая 2008 – 2 пары. Выводки с разновозрастными утятами встречены 11 августа 2009 на озере Пашино.

Oxyura leucocephala. Редкий пролётный вид. Одиночный самец савки наблюдался 7 мая 2009 на небольшом придорожном озерце, поросшем тростником, в 3 км восточнее бывшего совхоза «Киргизия».

Milvus migrans lineatus. Гнездящийся вид. Сотрудник национального парка М.Раимбеков 12 апреля 2010 наблюдал над городом Каркаралинском 16 кружащихся мигрантов. Летом черноухий коршун отмечен в следующих пунктах: 11 июля 2007 в урочище Актерек (1), 21 июля 2007 и 26 июля 2008 в районе озера Комиссаровка (1 и 1), 4 июля 2009 в окрестностях горы Бугулы (1) и в урочище Кызыл-Кенш около горы Кырыкколь (пара), 15 июля 2010 между урочищами Александровский ключ и Устье Кендары (1 особь).

Circus macrourus. Редкий гнездящийся вид. В районе кордона «Бидаик» 28 апреля 2010 наблюдался самец степного луня, совершавший токовой полёт, а в юго-западной части Горного лесничества 29 апреля 2010 держалась брачная пара.

Circus pygargus. Редкий гнездящийся вид. Один самец лугового луня токовал 28 апреля 2010 недалеко от кордона «Бидаик». Два самца наблюдались 29 апреля 2010 в юго-западной части Горного лесничества.

Circus aeruginosus. Один самец болотного луня 8 июня 2009 кружился над озером Малое.

Accipiter gentilis. В сосновом лесу за конторой Каркаралинского национального парка зимой 2009 располагался охотничий участок тетеревятника, где он охотился на белок *Sciurus vulgaris*. В начале апреля 2009 года я находил здесь остатки шерсти двух белок и перья серой вороны. Рядом с остатками были испражнения ястреба.

Accipiter nisus. Редкий гнездящийся вид. В горах Кент среди урёмы речки Карагаш в 200-250 м от кордона «Карагаш» 14 мая 2008 найдено гнездо перепелятника, в котором самец занимался постройкой, а самка держалась рядом. Строительным материалом служили тонкие ветки берёзы, которые он отрывал клювом и носил в гнездо. Около автодороги севернее озера Малое 15 мая 2009 я наблюдал, как самец перепелятника поймал самца жёлтой трясогузки, которую принялся ощипывать здесь же на дорожной насыпи.

Buteo rufinus. Редкий гнездящийся вид. На каменистых сопках, примыкающих с южной стороны к озеру Большое, 31 июля 2007 встречена молодая птица.

Buteo buteo. Обычный гнездящийся вид. На маршруте между кордонами «Кендара», «Александровский ключ» и «Устье Кендары» (протяженность 8.3 км) 15 июля 2010 встречена одна пара и две одиночки.

Circaetus gallicus. Редкий, возможно, гнездящийся вид. В южных окрестностях города Каркаралинска 27 мая 2009 одиночный змееяд пролетел в сторону соснового леса восточнее горы Каратобе.

Hieraaetus pennatus. Редкий гнездящийся вид. Жилое гнездо орла-карлика, устроенное в кроне сосны на высоте 15-17 м, обнаружено 20 июня 2009 в сосняках в районе горы Красный утёс, в 1-1.5 км восточнее дома отдыха «Сосновый бор». Под этим же гнездом 4 июля 2010 был найден фрагмент яичной скорлупы. Одна из птиц этой пары была тёмной морфы. В горах Бакты на участке «Обыз» 7 мая 2009 наблюдали токовой полёт самца, а в окрестностях горы Кырыкколь 8 июля 2009 в урочище Кызылкенш видели одиночку.

Aquila chrysaetos. Редкий гнездящийся вид. В урочище Каратока 7 апреля 2008 видели годовалую птицу, паривщую в районе посадок лесных культур. На небольшой скале у восточного склона горы Аюшат

29 июля 2010 обнаружены два гнезда, из них одно разрушенное. Во второй постройке лежало несколько принесённых орлами крупных веток, однако и оно было не жилым. В этом же районе держалось 2 беркута, из них один садился на юго-восточном склоне горы Аюшат, второй пролетал над северным склоном хребта.

Falco cherrug. Редкий гнездящийся вид. В 2008 году одна пара балобанов обитала в урочище Тонкирис, где они заняли гнездо чёрного аиста. В районе села Жарлы (РТС) 30 сентября 2008 пара успешно охотилась на голубей, кормившимися сотенной стаей на овсяном поле. Два балобана 3 июля 2009 встречены в скальниках к западу от дома отдыха «Кооператор», где они время от времени парили вдоль хребта, садились на камни и верхушки сосен.

Falco subbuteo. Гнездящийся вид. На водоёме у городской плотины Каркаралинска пара чеглоков 5 июня 2009 охотилась в воздухе за насекомыми. Трёх чеглоков видели 9 сентября 2009 на маршруте между Карагайлы и Кызылкент.

Falco tinnunculus. Гнездящийся вид. В районе горы Бугулы охотящуюся пустельгу наблюдали 5 апреля 2009. В 1 км юго-восточнее учебной базы Карагандинского университета 17 июня 2009 в скальниках держалась пара, проявлявшая территориальное беспокойство.

Lyrurus tetrix. Обычный оседлый вид. В Кентском лесничестве 14 апреля 2009 на участке протяжённостью 35 км выявлено 8 токов тетеревов, на которых присутствовало 39 самцов и 3 самки. На 4 токах было от 6 до 11 самцов, на остальных – от 1 до 3, в среднем по 4.9 самца. В урочище Каратока 6 мая 2008 на участке со злаковой растительностью найдено гнездо с 9 яйцами. Тетёрка уже насиживала кладку.

Perdix perdix. Обычный оседлый вид. В зарослях спиреи на краю сенокосного поля 29 апреля 2010 была вспугнута с гнезда самка, в котором было 2 свежих яйца. На этом же поле под кустом спиреи найдено гнездо с остатками скорлупы 20 яиц. На 15 км маршрута от урочища Каратока до автодороги на город Каркаралинск 5 сентября 2007 учтено 6 стай серых куропаток общей численностью до 120 особей.

Coturnix coturnix. Гнездящийся вид. Встречается по лугам.

Anthropoides virgo. Редкий гнездящийся вид. Между горами Кент и Сарыкульжа в августе 2007 трёх красавок наблюдали в окрестностях села Жалпак-Шилик.

Gallinula chloropus. Редкий гнездящийся вид. Обитание установлено на озере Пашино, где 11 августа 2009 наблюдали двух молодых.

Fulica atra. Гнездящийся вид. На водоёме в урочище Комиссаровка 21 июля 2007 отмечено 4 выводка по 4, 4, 3 и 6 особей. Взрослые лысухи держались вместе с птенцами. На озере Пашино 27 июля 2009 учтено 3 выводка по 5, 5, 4 молодых и 7 взрослых птиц. На озере Копа 3 октября 2008 насчитывалось 120-130 лысух.

Charadrius dubius. Гнездящийся вид. Две пары малых зуйков и выводок из двух пуховых птенцов 8 июня 2009 наблюдали в траве около небольших водоёмов между городом Каркаралинск и озером Малое. Двух зуйков 30 июля 2007 видели на озере Большое.

Vanellus vanellus. Гнездящийся вид. На озере Малое 9 июня 2009 держалась стая из 30-35, а на озере Большое 30 июля 2007 около 50 чибисов.

Tringa ochropus. Пролётный вид. На городской плотине Каркаралинска 4 июля 2009 учтено 3, а на ручье в городской черте 30 апреля 2008 – 2 птицы. На озере Большое 30 июля 2007 держался одиночный черныш.

Tringa glareola. Пролётный вид. На мелководьях озера Большое 30 июля 2007 кормилось 3 фифи.

Tringa totanus. Гнездящийся вид. На сыром лугу в 200 м севернее озера Малое 8 июня 2009 наблюдалось 7 травников.

Actitis hypoleucos. Гнездящийся вид. На водоёме в урочище Комиссаровка 21 июля 2007 найдена пара и 1 оперяющийся птенец, державшийся вместе с взрослой птицей около зарослей тростника и при опасности быстро убегавший в его гущу. На этом же водоёме 12 мая 2008 токовало не менее 6 перевозчиков

Gallinago gallinago. Гнездящийся вид. Токующий бекас наблюдался 11 мая 2008 на месте гари 10-летней давности юго-западнее урочища Комиссаровка. Эта местность представлена водоразделом с ручьём, впадающим в водоём, около которого после пожара 1997 года разрослись молодые осинники и березняки. Ещё два самца токовали 8 июня 2009 в районе озера Малое.

Scolopax rusticola. Редкий, судя по летним нахождениям, гнездящийся вид. Одного вальдшнепа во время тяги наблюдали 11 мая 2008 над лиственным молодняком между урочищами Комиссаровка и Каратока, там же, где встречен и бекас. На сфагновом болоте 10 апреля 2010 кормилась одиночка. В районе дома отдыха «Кооператор» 14 мая 2010 вальдшнеп совершал токовые полёты над урёмными березняками по направлению к дому отдыха «Сосновый бор». В этом же районе 26 июня 2010 из зарослей хвоща около ручья был выпугнут одиночный вальдшнеп. На заболоченном участке в районе озере Шайтанколь 23 июля 2009 В.Плотников встретил ещё одного вальдшнепа (Резниченко 2010а).

Limosa limosa. Немногочислен. В районе озера Копа (старая свиноферма) 11 июля 2007 держалась стайка больших веретенников численностью 20-25 особей, а на разливах около озера Малое 15 мая 2009 кормились два самца и самка. У одного из самцов большого веретенника отсутствовала правая нога, поэтому во время приземления он делал один или два скачка вперёд, чтобы принять устойчивое положе-

ние. На озере Копа 28 апреля 2010 держалось 10-12 веретенников.

Larus ichthyaetus. Редкий пролётный вид. На озёрах Малое и Большое 15 мая 2009 и 30 июля 2007 в восточном направлении пролетели два одиночных черноголовых хохотуна.

Larus ridibundus. На озере Копа 28 апреля 2010 держалась одна озёрная чайка.

Larus cachinnans. В районе горы Каратобе 16 марта 2009 отмечена одна чайка-хохотунья, а на озере Малое 9 июня 2009 – 3 особи. В окрестностях села имени К.Аманжолова в горах Кент 18 июня 2009 встречено около 20 хохотуний.

Rissa tridactyla. Редкий залётный вид. Погибшая молодая моёвка найдена 7 декабря 2007 в урочище Комиссаровка (Резниченко 2010а).

Chlidonias leucopterus. Редкий пролётный вид. Стая из 30-35 белокрылых крачек наблюдалась 19 мая 2009 на озере Большое.

Sterna hirundo. Гнездящийся вид. В урочище Комиссаровка 12 мая 2009 встречена пара, а на озере Пашино 11 августа 2009 – 3 речных крачки. Здесь же на небольшом островке среди коряг наблюдалась молодая птица.

Columba livia. Гнездящийся вид. В сосняке со скальниками 4 июня 2010 кормилось 5 сизых голубей.

Streptopelia orientalis. Гнездящийся вид. В сухом сосняке на невысокой одиночной берёзе в 3.5 м от земли 17 июня 2009 найдено гнездо большой горлицы с 2 птенцами в возрасте около 10 дней. Второе гнездо, обнаруженное 17 июня 2010, располагалось в раскидистом кусте кизильника, в котором несколько ветвей были пригнуты к земле, образовав гнездовую площадку на высоте 40 см. В гнезде находилось 2 птенца в пуховом наряде.

Cuculus canorus. Гнездящийся вид. В районе дома отдыха «Сосновый бор» 14 мая 2010 куковал один самец. Голос другого слышали 27 мая 2009 в городской черте Каркаралинска.

Bubo bubo. Редкий гнездящийся и зимующий вид. Научный сотрудник национального парка П.Чумаченко 21 сентября 2008 наблюдал в Каркаралинске филина, сидящего на верхушке старого тополя. Над ним с криками кружили несколько серых ворон. В начале декабря 2009 местный житель сбил филина на автомашине в окрестностях Каркаралинска.

Caprimulgus europaeus. Гнездящийся вид. Козодой наблюдался один раз – 14 мая 2008 около кордона «Карагаш».

Coracias garrulus. Гнездящийся вид. В 2009 году пара сизоворонок гнездилась в песчаном карьере в селе Актерек. В урочище Каратока 6 мая 2008 отмечена одиночка, сидевшая на одиноко стоящей сосне. На проводах около дома отдыха «Тасбулак» 30 и 31 августа 2009 охотовед М.Аукешев наблюдал 15 сизоворонок.

Alcedo atthis. Редкий гнездящийся вид. Один зимородок 30 июля 2007 охотился на мелководье озера Большое рядом с тростниковыми зарослями. В урочище Линда 19 августа 2009 поймана плохо летающая молодая птица. В урочище Шокпартас зимородков встречали 20 и 21 августа 2009. Ещё двух зимородков я наблюдал 20 сентября 2009 на речке Каркаралинка недалеко от конторы национального парка в городе Каркаралинске.

Upupa epops. Редкий гнездящийся вид. В Кентском лесничестве около кордона «Карагаш» 14 апреля 2008 кормился одиночный удод.

Jynx torquilla. Редкий гнездящийся вид. В черте города Каркаралинска 21 июня 2008 в полости бетонного столба обнаружено гнездо, в которое взрослые вертишейки носили птенцам корм. К 13 июля птенцы покинули гнездо. В 2010 году гнездо вертишеек обнаружено на тополе в городском парке. Располагалось оно в старом дупле большого пёстрого дятла на высоте 5.5 м от земли. Между 6 и 14 июля птенцы покинули гнездо (Резниченко 2010а).

Dendrocopos major. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Двух летающих слётков большого пёстрого дятла и докармливающую их взрослую птицу видели 4 июля 2010. На 3.6 км маршрута в этот же день в сосняках учтено 5 особей.

Riparia riparia. Над озером Малое 9 июня 2009 летали 7 береговушек.

Hirundo rustica. Редкий гнездящийся вид посёлков и кордонов Каркаралинского национального парка. На окраине Каркаралинска 26 июля 2009 отмечены 4 касатки.

Eremophila alpestris. Пролётный и зимующий вид. Между Каркаралинском и горой Бугулы 2 ноября 2008 отмечены 4 птицы. В вечернее время 15 марта 2010 во время снегопада трёх рюмов вспугнули из ночёвочных ямок в снегу в одном из переулков Каркаралинска. При этом двое рюмов вылетели из одной ямки.

Alauda arvensis. Обычный гнездящийся вид.

Anthus campestris. Обычный гнездящийся вид. В районе горы Бугулы на маршрутах длиной 13.7 км 5 и 7 июня 2009 учтено 8 поющих и токующих самцов полевого конька.

Anthus trivialis. Обычный гнездящийся вид. У горы Бугулы 10 и 11 июня 2010 в сосняках, чередующихся с открытыми пространствами, на 6.3 км маршрутов отмечено 3 поющих самца лесного конька.

Motacilla flava. Обычна на гнездовании по сырым травянистым местам возле озёр, ручьёв и небольших речек в степи. На берегу озера Малое 11 июня 2009 учтено 18 особей.

Motacilla cinerea. Редкая птица, встреченная только на пролёте. Пару горных трясогузок, кормившуюся на куче навоза, видели 12 мая 2010 у кордона в урочище Каратока.

Motacilla alba. Пролётный вид. На берегу водоёма в урочище Комиссаровка 12 сентября 2007 кормились 5-7 птиц, а в городе Каркаралинск 15 сентября 2010 наблюдалось 6 особей.

Motacilla personata. Гнездящийся вид. В северо-западной части города Каркаралинска у школы-интерната 5 марта 2010 отмечена одиночная маскированная трясогузка, а 9 апреля 2009 – 4 особи. На водоёме у городской платины 20 апреля 2010 держалось 4 птицы. Одиночку видели 12 сентября 2007 на берегу водоёма в урочище Комиссаровка.

Lanius collurio. В Каркаралинске 23 мая 2010 встречена самка.

Oriolus oriolus. Гнездящийся вид. В Кентском лесничестве в осиннике урочища Карагаш 15 мая 2008 отмечено 5 птиц. Три молодые иволги встречены 28 августа в лесном питомнике урочища Суыкбулак.

Sturnus vulgaris. Гнездящийся вид. В городе Каркаралинске пару скворцов отметили 7 апреля 2010, а в тростнике на озере Сасыкколь их видели 4 октября 2008.

Sturnus roseus. Пролётный вид. В Кентском лесничестве около кордона «Карагаш» 13 мая 2008 держалась одиночка, а 15 мая стайка численностью 10-15 особей пролетела в сторону соснового леса.

Pica pica. Обычный оседлый вид. Около кордона «Суыкбулак» в березняке 5 июня 2009 держалась пара сорок. На учётном маршруте 5 и 7 июня 2009 в районе горы Бугулы на 1 км^2 приходилось 2.6 особи.

Corvus monedula. Ежегодно 1-2 десятка пар галок гнездилось в центре Каркаралинска в вентиляционных отверстиях двух 5-этажных домов.

Corvus frugilegus. Обычный пролётный вид. Появляется в первой половине марта, нередко образуя смешанные стаи с галками и серыми воронами. Стаю около 100 особей наблюдали в городе Каркаралинске 13 марта 2008. Иногда отдельные грачи остаются зимовать. Так, 23 января 2010 в центре Каркаралинска молодой грач что-то расклёвывал около дороги.

Corvus cornix. Обычный гнездящийся и зимующий вид. На маршруте в районе горы Бугулы в июне 2009 учтено 7.5 особей на 1 км^2. На 19 км столбовой телеграфной линии вдоль автодороги Бакты – Каркаралинск 7 мая 2009 я насчитал 9 жилых гнёзд, устроенных на деревянных траверсах между изоляторам. В одном случае при попытке сфотографировать ворону на гнезде, которую не было видно, пришлось крикнуть, но птица сразу покинула гнездо, из которого доносился слабый писк, вероятно, недавно вылупившегося, птенца.

Bombycilla garrulus. В отдельные зимы свиристели бывают многочисленными в садах и парках Каркаралинска. Особенно много их было зимой 2007/08 года. В одном из частных подворий города 28 декабря 2007 наблюдали стаю до 50 свиристелей, кормившуюся мелкоплодными яблочками.

Locustella naevia. В Кентском лесничестве в зарослях шиповника и спиреи недалеко от кордона «Карагаш» вечером 15 мая 2008 отмечено несколько поющих самцов.

Acrocephalus arundinaceus. Голоса дроздовидной камышевки слышали 9 июня 2009 в зарослях тростника на озере Малое.

Sylvia communis. Гнездящийся вид. Поющего самца я наблюдал 7 июня 2009 на кусте жимолости в районе горы Бугулы. Здесь же в зарослях шиповника и жимолости на северном склоне горы две серые славки встречены 1 августа 2009.

Sylvia curruca. Гнездящийся вид. В зарослях шиповника недалеко от урочища Суыкбулак 5 июня 2009 отметили двух поющих самцов.

Muscicapa striata. Гнездящийся вид. В урёмном сосново-берёзовом лесу с примесью осины и с подлеском из жимолости, малины, шиповника 3 июля 2009 встречена территориальная пара серых мухоловок, проявлявшая беспокойство. В урочище Каратока 12 мая 2010 отмечено 6 явно пролётных мухоловок.

Saxicola torquata. Обычный гнездящийся вид. Наиболее заметен во второй половине лета. Так, на учётных маршрутах в июле 2009 года в районе горы Бугулы в биотопах с кустарниками насчитывали до 144 черноголовых чеканов на 1 км^2. На юго-восточной окраине Каркаралинска 11 июня 2009 самец и самка держались на кладбище. У чеканов, вероятно, были птенцы, так как самка была с кормом в клюве.

Oenanthe oenanthe. Обычный гнездящийся вид. На окраине Каркаралинска территориальную пару каменок наблюдали 27 мая 2009 у южного подножия горы Каратобе. Позже здесь нашли гнездо в пустоте под гранитным камнем. На маршрутах в степи 5 и 7 июня 2009 учтено 44 особи на 1 км^2.

Monticola saxatilis. Редкий гнездящийся вид. Один самец пёстрого каменного дрозда наблюдался 6 мая 2009 в скальниках у подножия горы Корыбай в заказнике Белдеутас.

Phoenicurus phoenicurus. Гнездящийся вид. В молодом осиннике 27 июля 2008 встречен слёток и взрослая птица. На 3.6 км маршрута 4 июня 2010 учтено 2 поющих самца. В мае и июне пение самцов можно слышать в кронах деревьев в городе Каркаралинске.

Luscinia svecica. Гнездящийся вид. Две молодые варакушки наблюдались в зарослях рогоза на небольшом водоёме у города Каркаралинска. Взрослую самку и молодую птицу видели 26 июля 2009 в кустах жимолости.

Turdus atrogularis. Пролётный вид. 11 апреля 2010 в Каркаралинске на сосне встречен самец чернозобого дрозда. Позже, 20 апреля, скопление до 10-15 птиц отмечено на сфагновом болоте в сосняках, где они перелетали, садились на деревья, опускались в поисках корма на освободившиеся от снега участки, иногда пели.

Turdus pilaris. Пролётный и зимующий вид. Одного рябинника, кормившегося на яблони, встретили 29 января 2008 в городе Каркаралинске. В районе урочища Суыкбулак 28 октября 2008 видели стайку из 10-15 рябинников, пролетевшую над сосновым лесом. В гнездовое время не наблюдался.

Turdus merula. Гнездящийся вид. В конце ноября 2007 группа из 4 чёрных дроздов появилась на окраине города Каркаралинска. Птицы держались во дворах жителей, где кормились плодами яблонь и рябины. В январе 2008 они стали появляться на соседних участках, где ещё оставался запас яблок. Лишь одна самка придерживалась старого места, где её подкармливали остатками пищи со стола. На сфагновом болоте в Горном лесничестве примерно в 100 м от ограды дома отдыха «Сосновый бор» 9 апреля 2009 был встречен поющий самец. Другой самец отмечен 5 июля 2010 на небольшом увлажнённом участке смешанного сосново-берёзового леса с примесью осин и ив между Кендаринской долиной и перевалом Таркезен. Набрав влажную землю в клюв, он скрылся в кронах деревьев. К сожалению, найти гнездо не удалось. На участке между кордонами «Александровский ключ» и «Устье Кендары» в урёмном ивняке 15 июля 2010 я встретил ещё одного поющего самца. Ещё одна птица с квохтаньем скрылась в зарослях ивняка (Резниченко 2010а). Исходя из приведённых наблюдений, есть все основания считать, что чёрный дрозд в настоящее время гнездится в Каркаралинских лесах, появившись здесь в результате расселения.

Turdus viscivorus. Гнездящийся вид. Около горы Бугулы в июне 2009 учитывалось до 5.1 особей на 1 км^2, а в сосновом лесу 4 июня 2010 на 3.6 км маршрута встречено 6 деряб. В сосновом лесу 31 мая 2010 наблюдался короткохвостый слёток.

Aegithalos caudatus. Гнездящийся вид. Выводок из 7 хорошо летающих птенцов встречен 17 июня 2010 в смешанном сосново-осиновом лесу с густым подлеском из кизильника и шиповника.

Parus montanus. Обычный гнездящийся и зимующий вид сосновых лесов. На маршруте протяжённостью 3.6 км 4 июня 2010 встречены 7 особей. Хорошо летающего птенца и кормящую его взрослую гаичку я наблюдал 3 августа 2009.

Parus ater. Редкий гнездящийся вид. Московка, собирающая корм в сосняке, впервые встречена 4 июня 2010, а 6 июня в сосново-берёзовом лесу найдено её гнездо, устроенное в дупле берёзы на высоте 2.8 м от земли. В этот же день в 300-400 м севернее встречены два слётка и кормящая их взрослая птица (Резниченко 2010б).

Parus cyanus. Редкий гнездящийся и зимующий вид. В урочище Кызылкент 8 июля 2009 в урёмных ивняках держалась одиночка. Стайку из 5-10 князьков я наблюдал 25 ноября 2007 в урочище Суыкбулак, где они кормились семенами берёз.

Parus major. Обычный гнездящийся и зимующий вид. Хорошо летающих птенцов и докарливающих их взрослых я встречал 22 июня 2008 в зарослях мелколистного вяза в городе Каркаралинске. В летнее время большая синица встречается в сосняках с примесью лиственных пород и в лиственных насаждениях. На маршруте протяжённостью 3 6 км 4 июня 2010 учтено 3 особи.

Certhia familiaris. Редкий кочующий вид. В сосновом лесу близ кордона «Суыкбулак» 19 октября 2009 я встретил одну пищуху, занимавшуюся поиском корма на стволах сосен (Резниченко 2010а). Для Каркаралинска приводится впервые.

Passer domesticus. Обычный оседлый вид Каркаралинска и населённых пунктов.

Passer montanus. Обычный оседлый вид Каркаралинского национального парка.

Fringilla coelebs. Гнездящийся вид. В районе горы Бугулы в берёзовом колке самец зяблика наблюдался 7 июля 2009.

Fringilla montifringilla. Пролётный и зимующий вид. В городской черте Каракаралинска 8 декабря 2007 до 10 юрков кормились мелкими плодами яблони.

Spinus spinus. Гнездящийся вид. В сосняке выше урочища Суыкбулак 2 августа 2008 встречен слёток и кормящая его взрослая птица. Здесь же 28 октября 2008 семенами берёзы кормилось 50-60 чижей.

Carduelis carduelis. Группа до 5 щеглов отмечена 25 ноября 2007 в урочище Суыкбулак, а 31 мая 2008 в Каркаралинске на клёне видели пару щеглов. Последняя встреча позволяет предполагать возможное гнездование.

Acanthis flammea. Пролётный и зимующий вид. Одна чечётка кормилась 4 февраля 2009 на земле около конторы Каркаралинского национального парка.

Carpodacus erythrinus. Гнездящийся вид. На маршрутах в районе горы Бугулы 5 и 7 июня 2009 на 6.3 км встречено 3 поющих самца.

Pyrrhula pyrrhula. Пролётный и зимующий вид. Несколько снегирей 25 ноября 2007 кормились почками ивы в урочище Суыкбулак.

Coccothraustes coccothraustes. Пролётный вид. Стайку из 5-7 дубоносов видели 7 мая 2008 в зарослях черёмухи в Каркаралинске.

Emberiza leucocephala. Гнездящийся вид. Встречается в разреженных сосняках, чередующихся с открытыми пространствами. На маршруте длиной 6.3 км в первой декаде июня 2009 отмечено 4 поющих самца белошапочной овсянки.

Emberiza cioides. Гнездящийся вид. Обитает в сходных с белошапочной овсянкой биотопах. На маршрутах протяжённостью 6.3 км 5 и 7 июня 2009 встречены 7 поющих самцов красноухой овсянки.

Emberiza hortulana. Самая многочисленная из овсянок, гнездя-

щихся в окрестностях Каркаралинска. На маршрутах общей протяжённостью 13.7 км в районе горы Бугулы 5-7 июня 2009 учтено 29 поющих самцов садовой овсянки.

Автор выражает благодарность сотрудникам Каркаралинского национального парка В.Плотникову, Ж.Махмутову и М.Аукешеву за помощь в сборе информации по птицам.

Литература

Резниченко С.М. 2010а. Новые сведения о птицах Каркаралинского национального природного парка // *Рус. орнитол. журн.* **19** (563): 643-646.

Резниченко С.М. 2010б. О гнездовании московки *Parus ater* в Каркаралинском национальном парке // *Рус. орнитол. журн.* **19** (579): 1121-122.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1224**: 4439*

Чёрный журавль *Grus monacha* в Читинской области

Е.И.Павлов

*Второе издание. Первая публикация в 1976**

В Читинской области большие стаи чёрных журавлей *Grus monacha* мы встречали на Торейских озёрах в конце июня 1925 года. Отлёт чёрных журавлей (стая в 18 особей) нам удалось видеть в долине реки Читы 10 сентября 1926. Весеннее появление чёрных журавлей в долине реки Шаргальджин (левый приток реки Читы) мы наблюдали 20 мая 1939 и 1 мая 1953 (стая из 4 особей). Ещё пару этих журавлей в устье реки Орочи (левый приток реки Читы) видели в первой декаде июня 1951 года. В отношении численности чёрных журавлей во время их пребывания на территории Читинской области можно сказать, что эти птицы сравнительно редки. В орнитологической коллекции Читинского музея имеется 2 экз. чёрных журавлей, добытых 23 мая 1939 (верховье реки Читы, самец) и 26 мая 1955 (долина реки Борзи, самец, длина тела 1000 мм, длина крыла 479 мм, размах крыльев 1800 мм), семенники у обеих птиц увеличены.

* Павлов Е.И. 1976. Краткие сообщения о чёрном журавле // *Тр. Окского заповедника* **13**: 130.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1224**: 4440*

Чёрный журавль *Grus monacha* на Торейских озёрах

А.Н.Леонтьев

Второе издание. Первая публикация в 1976[*]

На Торейских озёрах Читинской области и в ближайших окрестностях мною зарегистрированы следующие встречи чёрных журавлей *Grus monacha:* 28 апреля 1963 – 8 птиц в стае; 15 июня 1963 – 5 птиц в стае, 26 июня 1963 – 4 журавля в стае, август 1963 года – одиночка; 6 мая 1965 – 5 птиц в стае, 17 мая 1965 – одиночка; 4 мая 1967 – 10 птиц в стае, 6 мая 1967 – пара журавлей, 12 мая 1967 – три птицы вместе.

Гнёзд и птенцов чёрного журавля в Забайкалье встречать не приходилось.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1224**: 4440-4441*

Новое место гнездования камчатской крачки *Sterna camtschatica*

В.В.Леонович

Второе издание. Первая публикация в 1976[†]

Во время орнитологических исследовании в Магаданской области в 1972 году мною недалеко от Армана, по побережью Охотского моря, вблизи устья рек Ойры и Широкой, была обнаружена колония камчатских, или алеутских крачек *Sterna camtschatica (= S. aleutica).*

10 июня 1972 в этом месте были замечены крачки, криком напоминающие чириканье воробьёв. Птицы в количестве нескольких десятков летали над островком в устье реки Ойры недалеко от рыбачьего посёлка. Я посетил островок 14 июня, но гнёзд на нём не обнаружил. Птицы пролетали мимо, и только одна была вспугнута с земли.

30 июня я снова посетил эти места и на этот раз нашёл 16 гнёзд, располагавшихся как на самом острове, так и на прилегающем участке косы, отделяющей реку Ойру от моря. В 9 гнёздах находилось по 2

[*] Леонтьев А.Н. 1976. Краткие сообщения о чёрном журавле // *Тр. Окского заповедника* **13**: 130.
[†] Леонович В.В. 1976. Новое место гнездования алеутской крачки // *Тр. Окского заповедника* **13**: 181-182.

свежих или слегка насиженных яйца; в 7 гнёздах было по одному яйцу. Кроме этого, на острове я обнаружил остатки костра и скорлупки яиц, очевидно, собранных ребятишками из рыбачьего посёлка. Общая численность колонии должна была достигать 30 пар.

Около моста через реку Широкую, примерно в 1.5 км от основной колонии, 3 июля я нашёл ещё одно гнездо с 2 несколько насиженными яйцами. С десяток птиц летало вокруг. Снова посетив этот участок, 7 июля я нашёл ещё 6 гнёзд со свежими кладками из 2 яиц и 2 гнезда – с одним яйцом.

Гнёзда камчатских крачек, в отличие от речных *Sterna hirundo* или малых *S. albifrons*, всегда располагались на травянистых участках: на острове – среди невысокой травы, у реки Широкой – среди тундрово-луговой растительности, а на косе – на отдельных дерновниках и никогда на песке или галечнике. Одно гнездо от другого располагалось в 10-20 м. Диаметр ямок колебался в пределах 12-14 см, глубина – от 3 до 4.3 см. Подстилка, обычно довольно скудная, состояла из сухих остатков стеблей и другой растительной ветоши.

Вес и размер яиц из 10 кладок: 18.02 и 16.32 г (43.9×28.8 и 42.2×27.2 мм), 18.24 и 16.79 г (44.0×29.0 и 41.9×28.2 мм), 19.75 и 19.52 г (45.7×28.5 и 45.2×29.0 мм), 16.50 и 17.40 г (40.2×28.0 и 40.8×28.2 мм), 20.29 и 17.28 г (43.1×29.9 и 41.9×28.0 мм), 19.64 и 17.62 г (42.0×28.3 и 44.2×29.0 мм), 20.73 и 19.06 г (42.9×29.2 и 42.5×30.1 мм), 20.97 и 20.82 г (42.0×30.6 и 43.0×30.5 мм), 21.90 и 19.20 г (44.8×30.0 и 42.7×29.0 мм), 20.87 и 19.92 г (43.0×29.1 и 42.3×30.0 мм). Средний вес яиц – 19.41 г, при колебании от 16.32 до 21.90 г, а средний размер – 42.9×29.0 мм, при колебании 45.7-40.2×30.6-28.0 мм.

В начале насиживания около гнёзд крачки особой агрессивности не проявляли и покидали яйца при приближении на 20-30 м. С насиженных яиц птица снималась на расстоянии 5-10 м. При возвращении крачка садилась насиживать только после нескольких пробных налётов. У добытых А.В.Кречмаром птиц наседные пятна были обнаружены как у самки, так и у самца.

Крик камчатской крачки может быть передан как громкое *«чррр... чрррр»*. При большом возбуждении и беспокойстве у гнёзд птицы издают несколько визгливое *«тий-тий-ййй»*.

В полевых условиях от речных крачек этот вид на расстоянии хорошо может быть определён именно по голосу. Вблизи хорошо виден белый лоб и более тёмная окраска мантии.