ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2016
XXV

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1264

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXV

Экспресс-выпуск • Express-issue

2016 № 1264

СОДЕРЖАНИЕ

997-1012 Птицы бассейна реки Воркуты и среднего течения реки Усы (Большеземельская тундра). О.Ю.МИНЕЕВ, Ю.Н.МИНЕЕВ

1013-1021 Зимние наблюдения за куликами на юге Мадагаскара. А.А.ЛАСТУХИН

1021-1023 Встречи некоторых редких хищных птиц и сов в Закарпатской области. В.Н.ГЛЕБА

1023-1024 Случай гнездования филина *Bubo bubo* в Сумском Полесье. В.М.МАЛЫШОК, Н.П.КНЫШ

1024-1025 Новые данные по численности и распределению скопы *Pandion haliaetus* и орлана-белохвоста *Haliaeetus albicilla* на крупных водоёмах Северо-Запада России. М.В.БАБУШКИН, А.В.КУЗНЕЦОВ

1026-1027 Особенности осеннего пролёта горлиц *Streptopelia decaocto*, *S. turtur*, *S. orientalis* и *S. senegalensis* на перевале Чокпак в предгорьях Западного Тянь-Шаня. С.Х.ЗАРИПОВА, А.Э.ГАВРИЛОВ

1027 Встречи некоторых редких видов птиц в Среднем Приднепровье. А.А.МАТУС

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2016
Дата опубликования: 15 марта 2016

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXV
Express-issue

2016 № 1264

CONTENTS

997-1012 Birds of Vorkuta River and the middle reaches of the river Usa (Bolshezemelskaya Tundra). O.Yu.MINEEV, Yu.N.MINEEV

1013-1021 Winter observation of waders in southern Madagascar. A.A.LASTUKHIN

1021-1023 The records of some rare birds of prey and owls in the Transcarpathian Oblast. V.N.GLEBA

1023-1024 The case of the eagle owl *Bubo bubo* nesting in Sumy Polesie. V.M.MALYSHOK, N.P.KNYSH

1024-1025 New data on the number and distribution of the osprey *Pandion haliaetus*, and white-tailed eagle *Haliaeetus albicilla* on large lakes of the North-West Russia. M.V.BABUSHKIN, A.V.KUZNETSOV

1026-1027 Features of autumnal migration of *Streptopelia decaocto*, *S. turtur*, *S. orientalis* and *S. senegalensis* over the Chokpak pass in the foothills of the Western Tien-Shan. S.H.ZARIPOVA, A.E.GAVRILOV

1027 The records of some rare birds in the Middle Dnieper area. A.A.MATUS

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2016

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1264**: 997-1012*

Птицы бассейна реки Воркуты и среднего течения реки Усы (Большеземельская тундра)

О.Ю.Минеев, Ю.Н.Минеев

Олег Юрьевич Минеев, Юрий Николаевич Минеев. Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар. E-mail: mineev@ib.komisc.ru

Поступила в редакцию 20 февраля 2016

В целом бассейн реки Воркуты ранее не был обследован орнитологами. Имеющиеся работы описывают некоторые районы в пределах черты города Воркуты (Гладков 1962; Успенский 1965; Лобанов 1978, 1982; Костин, Шубин 1983; Минеев 1978, 1988; Морозов 1987а,б, 1988, 1991, 1997, 2003, 2005) и некоторых населённых пунктов Воркутинского района (Бутьев, Костин 1997; Галушин и др. 1981; Минеев, Минеев 2011).

Река Воркута протекает в воркутинском районе Республики Коми (восток Большеземельской тундры) и является одним из крупных (длина около 150 км) притоков реки Усы. Пойма Воркуты неширокая, с небольшим числом пойменных озёр и водоёмов в окружающей тундре. Течение реки быстрое, с множеством перекатов, в местах прохождения гряд – бурное. На реке имеются искусственные разливы, созданные для защиты от паводков железной дороги (проходит вдоль русла реки на большом протяжении) – здесь течение медленное. Ложе реки преимущественно каменисто-валунное, по берегам произрастают ивняки, осока и белокопытник холодный *Nardosmia frigida*. В верхнем и среднем течении преобладает крупноерниковая тундра, в низовьях появляются елово-берёзовые редколесья.

Исследования проведены нами 15 июня по 6 июля 2015 в пойме реки Воркуты и тундровых местообитаниях (от города Воркуты до устья реки Воркуты) и в среднем течении Усы (от устья Воркуты до железнодорожной станции Сейда). Лодочными учётами охвачено 110 км русла Воркуты и 40 км русла Усы, проведено 45 км наземных учётов в долинах этих рек. Ширина учётной полосы на пешеходных маршрутах была дифференцирована: водоплавающие птицы, белая куропатка, хищные, чайковые и врановые птицы учитывались в полосе 500 м; средние и крупные кулики, дрозды – 300 м; мелкие кулики и воробьиные – 100 м, на водных маршрутах ширина учётной полосы соответствовала ширине реки или её долины. В ходе исследований получены сведения о видовом составе, характере пребывания, распределении и численности птиц в бассейнах обследованных рек. Видовые названия и порядок перечисления видов приводятся по Л.С.Степаняну (2003).

Gavia stellata. На реке Воркуте краснозобая гагара встречена до нижнего течения: отмечены одиночки и пары совместно с одиночными *G. arctica*, а также группы по 3-4 птицы. На Усе *G. stellata* не наблю-

далась. Плотность населения краснозобой гагары в среднем составила 1.2 особи на 10 км водного маршрута. Наибольшая численность (3.6 особи на 10 км) отмечена в нижнем течении Воркуты. Предположительно гнездится. Ранее предполагалось гнездование *G. stellata* в районе города Воркуты (Лобанов 1978), хотя вид тогда не был отмечен.

Gavia arctica. В 1958 году прилёт первых чернозобых гагар в окрестностях города Воркуты зарегистрирован 24 июня (Успенский 1965). Летом 2015 года эта гагара встречена нами на протяжении всего маршрута по Воркуте и Усе. Обычный гнездящийся вид. Наблюдали одиночных, пары и группы до 6 особей; скопления были отмечены 1 июля на Усе. Плотность населения птиц в верхнем течении Воркуты была равна 0.8, в среднем течении 2.9, в низовьях – 0.3, в среднем составив 1.3 ос./10 км учётного маршрута. На Усе плотность населения чернозобой гагары составила 3.5 ос./10 км.

Anser erythropus. В районе города Воркуты пискулька отмечена на весеннем пролёте (Успенский 1965; Лобанов 1978).

Anser fabalis. В верхнем течении реки Воркуты гуменник не отмечен, в среднем течении численность была равна 1, в низовьях – 5.1, в среднем – 2.02 ос./10 км водного маршрута; на Усе – 0.6 ос./10 км. На пляжах с зарослями ивняка и водотоках встречены одиночные, пары и стаи (до 14 особей) гусей. Выводки встречены в низовьях Воркуты и на Усе. В выводках было от 3 до 5, в среднем (n = 4) 3.8 гусёнка. В отмеченном 25 июня выводке гусятам было 3-4 дня, на Усе в выводке, отмеченном 1 июля, гусята были примерно такого же возраста.

Cygnus cygnus. Одиночный кликун отмечен в среднем течении реки Усы. Ранним утром 30 июня 2015 птица летела вниз по течению.

Cygnus bewickii. Пара малых лебедей отмечена во второй половине дня 21 июня 2015 в верхнем течении Воркуты. Птицы летели на высоте 80-100 м на северо-восток.

Tadorna ferruginea. Пара огарей отмечена 31 мая 1988 на реке Воркуте близ устья реки Безымянки. В пойме Воркуты пара отмечена 2 июня 1988 напротив устья реки Аячьяха, а 5 июня 1988 одиночный огарь зарегистрирован у посёлка Октябрьский (Морозов 1991).

Anas platyrhynchos. В окрестностях города Воркуты ежегодные залёты крякв (по 1-7 особей) регистрировали летом и осенью (Лобанов 1982; Морозов 1987б). Гнездится. Выводки и небольшие стайки крякв отмечены на реке Воркуте в августе1973 года (Минеев 1987). Летом 2015 года одиночки и пары крякв встречались на Воркуте до самых низовьев. Плотность населения кряквы в верхнем течении Воркуты составила 0.8, в среднем – 0.4, в нижнем течении – 0.3 и в среднем составила 0.5 ос./10 км.

Anas crecca. Немногочисленный вид. Возможно, гнездится в пойме реки и на озерках лужах. Встречались одиночные, пары и стайки

(до 3 особей) птиц. В верховьях Воркуты численность свистунка 1.0, на Усе – 0.8 ос./10 км.

Anas penelope. Возможно, гнездится. Встречены одиночные особи, пары и стайки (4-7 особей) птиц. Плотность населения свиязи в верхнем течении Воркуты 0.1, в среднем течении – 3.8, в нижнем – 1.1, в среднем составила 1.7 ос./10 км. В среднем течении Усы численность свиязи была равна 0.5 ос./10 км.

Anas acuta. Малочисленный вид. Возможно, гнездится. Одиночная самка шилохвости отмечена в среднем течении Воркуты.

Anas querquedula. С.М.Успенский (1965) наблюдал пару трескунков 13 июня 1957 на разливе ручья под городом Воркутой. Одиночные трескунки отмечены нами 22 июня 2015 в верхнем течении Воркуты.

Anas clypeata. Брачные пары широконосок отмечены в бассейне реки Воркуты 5-6 июня (Морозов 1987а).

Aythya ferina. На реке Воркуте (район одноимённого города) одиночных самцов красноголовой чернети наблюдали 20 мая 1990 и 9 июня 1992 (Морозов 1997).

Aythya fuligula. На реке Воркуте первых хохлатых чернетей наблюдали 26 мая – 1 июня, относительно интенсивный пролёт – с 27 мая по 18 июня (Морозов 1987а). Гнездится. Во время наших исследований летом 2015 года встречались одиночные, пары и однополые группы (до 3 особей) самцов и самок. Птицы часто держались вместе со стайками средних крохалей. Плотность населения хохлатой чернети в верхнем течении Воркуты была равна 1.3, в среднем течении 4.2, в нижнем течении – 3.2 и в среднем составила 2.9 ос./10 км. В среднем течении Усы численность этих уток составила 0.3 ос./10 км.

Aythya marila. Под городом Воркутой первых пролётных морских чернетей отметили 16 июня 1957 (Успенский 1965). Летом 2015 года пара отмечена 21 июня в верхнем течении Воркуты.

Clangula hyemalis. Возможно, гнездится. Были отмечены одиночные самки и пары птиц. Плотность населения морянки в верхнем течении Воркуты была равна 0.8, в среднем течении 0.3, в нижнем – 0.3 и в среднем составила 0.5 ос./10 км. На Усе морянки не отмечены.

Bucephala clangula. Встречены одиночные и группы до 3 гоголей, в среднем течении Воркуты (1.3, численность в среднем для реки составила 0.4 ос./10 км). Мигрирующие вверх по реке гоголи отмечены 23 июня 2015.

Melanitta nigra. Одиночные самцы и самки синьги зарегистрированы в среднем и нижнем течении Воркуты (0.3 ос./10 км), в среднем для реки – 0.2 ос./10 км. Стая из 25 уток, пролетающая вверх по Усе, отмечена 27 июня.

Mergus albellus. Стая из 14 самок лутка отмечена 24 июня в среднем течении Воркуты. Птицы летели вверх по течению реки.

Mergus serrator. Наиболее многочисленный вид водоплавающих птиц. Встречались одиночные, пары и стайки (4-14 особей). Вероятно, гнездится. Плотность населения среднего крохаля в верхнем течении Воркуты 3.0, в среднем течении 24.2, в нижнем – 14.2 и в среднем составила 13.8 ос./10 км. В среднем течении Усы численность крохаля была равна 21 ос./10 км.

Circus cyaneus. Прилёт полевого луня в окрестностях города Воркуты происходил 17-19 мая и 27-30 мая (Морозов 1987а). В окрестностях города гнездо луня размещалось на бугре среди ерниковой тундры, 26 июля в нём находилось 4 разновозрастных птенца (Успенский 1965). В пойме нижнего течения Воркуты охотившийся самец полевого луня зарегистрирован 25 июня 2015. Полевой лунь указан обычным в среднем течении Усы (Галушин и др. 1981), но летом 2015 здесь не наблюдался.

Buteo lagopus. Обычный гнездящийся вид. Численность зимняка в верховьях Воркуты равнялась 1.9, в среднем течении 0.4, в нижнем – 0.3, в среднем составила 0.8 ос./10 км. Численность мохноногого канюка в бассейне среднего течения Усы была равна 0.3 ос./10 км. Из общего числа отмеченных птиц 25% были светлой морфы. Гнёзда найдены 21 и 22 июня в верхнем течении Воркуты. Одно располагалось на высоте 8 м на песчано-глинистом обрывистом берегу реки высотой 14 м. Гнездо было сделано из сучьев ивы. Другое гнездо располагалось на верхней платформе брошенной геологоразведочной буровой (высотой 22.5 м), среди крупноерниковой ивняково-мохово-кустарничковой холмистой тундры в 200 м от берега реки. Гнездо скрывалось за трелёвочной будкой, насиживающая птица вела себя очень скрытно и взлетела только после постукиваний по стойкам буровой. Вероятно, насиживание подходило к завершению или в гнезде уже были недавно вылупившиеся птенцы.

Haliaeetus albicilla. 25 июня в низовьях Воркуты взрослый орлан-белохвост сидел в развилке ели на возвышенном берегу.

Falco columbarius. В окрестностях города Воркуты прилёт проходил 25 мая – 3 июня, при этом 23-29 мая некоторые птицы были уже на гнездовых участках и сформировали брачные пары (Морозов 1987а). Дербник отмечен в верхнем течении Воркуты (1.1) и в среднем течении Усы (0.3 ос./10 км). Птиц с гнездовым поведением наблюдали 22 июня на высоких и обрывистых берегах верховьев Воркуты; гнездовая пара отмечена 1 июля 2015 в лесной елово-берёзовой колке на возвышенном берегу Усы.

Falco vespertinus. Одиночный самец кобчика отмечен 12 августа 1973 в сельскохозяйственных угодьях около г. Воркуты (Минеев 1988).

Falco tinnunculus. Около железнодорожной станции Песец в 1982 году пустельга найдена на гнездовье (Костин, Шубин 1983). 5 июня и 5

сентября 1982 одиночные самки отмечены в окрестностях города Воркуты, в 1983 году здесь отмечены гнездящиеся птицы (Морозов 1987б, 1997).

Lagopus lagopus. В районе исследований в 2015 году белая куропатка была немногочисленна на гнездовье. Плотность населения птиц в верховьях Воркуты была равна 0.9, в низовьях 1.0 ос./10 км. В среднем численность куропатки в бассейне Воркуты составила 0.6, в среднем течении Усы – 3.9 ос./10 км. Низкая численность белой куропатки, вероятно, связана с общим трендом снижения плотности птиц на северо-востоке европейской части России, а также антропогенным фактором (вытаптывание гнёзд стадами северных оленей, незаконная добыча в период размножения). Куропатки из восточной части Большеземельской тундры при многоснежье мигрируют в бассейны рек Большая Роговая, Сейда, Воркута и Уса (Скробов 1975).

Pluvialis apricaria. Гнездящийся вид. Одиночные, пары и стайки (3-5 особей) золотистых ржанок встречались в холмистой мохово-лишайниково-кустарничковой тундре и в пойме реки. Плотность населения в верхнем течении Воркуты 3.4, в среднем течении 3.6, в нижнем – 2.0 и в среднем составила 3.0 ос./10 км.

Charadrius hiaticula. Гнездящийся вид. Отмечен в верхнем (0.3) и нижнем течении Воркуты (0.7), в среднем плотность населения галстучника составила 0.3 ос./10 км.

Charadrius dubius. Одиночный малый зуёк отмечен 23 мая 1991 в долине реки Воркуты у посёлка Южный (Морозов 1997).

Eudromias morinellus. Осенний отлёт молодых хрустанов в районе города Воркуты наблюдали с 12 августа по 6 сентября (Морозов 1987а).

Arenaria interpres. Одиночных камнешарок наблюдали 11 июня 1958 на пролёте в окрестностях города Воркуты (Успенский 1965). Одиночные особи, пары и стайки до 6 особей отмечены здесь 6 июня 1982, 6-16 июня 1983, 11 июня 1984 и 5-13 июня 1985 (Морозов 1987а).

Haematopus ostralegus. Одиночный кулик отмечен 24 июня 2015 в среднем течении Воркуты (рядом с железнодорожной станцией Песец). Ранее одиночный кулик-сорока зарегистрирован 2 июня 1986 около станции Седловая (Морозов 1988).

Tringa glareola. В окрестностях города Воркуты первые фифи отмечены 7 июня, массовый пролёт происходил 11-12 июня (Успенский 1965). В районе исследований широко распространённый, гнездящийся вид. Численность фифи в верхнем течении Воркуты 12.5, в среднем течении 0.6, в нижнем течении 4 и в среднем составила 5.7 ос./10 км. В среднем течении Усы численность фифи 3.3 ос./10 км.

Tringa nebularia. Немногочисленный гнездящийся вид. Большой улит отмечен нами летом 2015 года в нижнем течении реки Воркута

(0.6) и в среднем течении Усы (1.6 ос./10 км). Птицы с гнездовым поведением отмечали на Усе. Большого улита несколько раз наблюдали 27 июня 1984 среди елово-берёзового редколесья у деревни Никита (бассейн Усы). Из этого же района в пойме Усы 25 июня 1969 добыт экземпляр, хранящийся в Воркутинском краеведческом музее (Морозов 1988). Большой улит встречен 23-25, 31 мая, 3-17, 30 июня и 2 июля (в 1989, 1991-1993 годах) в бассейнах Усы и Воркуты (Морозов 1997).

Tringa erythropus. В окрестностях города Воркуты щёголь обычен на гнездовье среди холмистой мохово-лишайниковой тундры на комплексных болотах. Первые птицы появились здесь 27 мая – 9 июня. Одиночные, вероятно, мигрирующие взрослые самцы отмечены в верховьях Воркуты 5-14августа (Морозов 1987а).

Actitis hypoleucos. Одиночные перевозчики и пары встречались в верхнем (0.6) и нижнем (0.7 ос./10 км) течении Воркуты. В среднем плотность населения перевозчика была равна 0.2 ос./10 км. Гнездится в южной крупноерниковой кустарниковой тундре около города Воркуты. Выводки найдены 1 августа близ этого города в устье ручья Безымянного (Гладков 1962). В этом же месте выводки отмечены 13 июля – 4 августа 1983 и 21 июля 1985 (Морозов 1987б).

Xenus cinereus. Многочисленный гнездящийся вид. Одиночные, пары и стайки птиц (4-8 особей) встречались по берегам и в пойме реки. Плотность населения мородунки составила 0.1 ос./км^2. Численность мородунки в верхнем течении Воркуты 10.2, в среднем течении – 11.9, в нижнем – 21 и в среднем составила 14.4 ос./10 км. В среднем течении Усы численность мородунки 11.5 ос./10 км. В выводке, найденном 2 июля в среднем течении Усы, было 2 птенца в возрасте 1-2 сут. Н.А.Гладков (1962) находил гнездящихся птиц под городом Воркутой, а молодые уже способные летать птицы встречены 1 августа на ручье Безымянном около этого города.

Philomachus pugnax. Начало весенней миграции турухтана отмечено в окрестностях города Воркуты 11 июня 1958 (Успенский 1965). Птицы летят руслом одноимённой реки.

Calidris minuta. Пролётные стаи куликов-воробьёв вместе со стаями пуночек, лапландских подорожников и рогатых жаворонков отмечены 5 июня 1958 в окрестностях города Воркуты (Успенский 1965). В.В.Морозов (1987а) регистрировал под городом пролётные стаи (3-35 особей) с 5 по 16 июня. Осенний пролёт выражен слабо.

Calidris temminckii. В окрестностях города Воркуты пролётные белохвостые песочники отмечены 7 июня (Успенский 1965); 31 июля и 1 августа здесь встречены самостоятельные молодые (Гладков 1962).

Calidris ferruginea. В тундре близ города Воркуты стаи краснозобиков (22-33 особи), летящих на север, наблюдали 5-19 июня 1983-1985 (Морозов 1987б).

Calidris alpina. В пойме реки Воркуты одиночные и стайки (3-12 особей) чернозобиков, вместе с куликами-воробьями и золотистыми ржанками мигрируют 2-13 июня (Морозов 1987а).

Lymnocryptes minimus. Токующих гаршнепов наблюдали в окрестностях города Воркуты (Успенский 1965), последнюю птицу осенью отметили 7 сентября (Морозов 1987а).

Gallinago gallinago. Вероятно, гнездится. Первых токующих птиц в окрестностях города Воркуты слышали 7 июня 1984 (Минеев, Минеев 2012).Обыкновенный бекас отмечен в верхнем (0.3) и нижнем (0.8) течении реки Воркуты, в среднем плотность населения этих куликов составила 0.4 ос./10 км.

Gallinago stenura. Многочисленный гнездящийся вид. Под городом Воркутой впервые ток азиатского бекаса отмечен 13 июня 1958, в последующие дни регистрировались группы (до 4-5 особей) токующих куликов (Успенский 1965). Во время исследований в 2015 году токующие самцы регистрировались практически на каждом пойменном ивняково-разнотравном лугу с зарослями древовидной ивы. Нами было отмечено 25 мест токования азиатского бекаса, но вероятно, их намного больше. Пять раз в разных точках бассейна Воркуты наблюдались тока нескольких (2-5 птиц) бекасов одновременно, на одном и том же месте. Птицы держались друг от друга на расстоянии 1.5-2 м, одновременно проходили круги на высоте 50-60 м и одновременно пикировали. На ивняково-разнотравном лугу с каменисто-галечными площадками при впадении Воркуты в Усу подчас одновременно токовало от 1 до 5 бекасов, но большую часть времени они токовали на соседних площадках поодиночке. Наиболее активно ток проходил в утренние (от 3 до 8 ч) и вечерние (с 17 ч 45 мин до 20 ч 30 мин) часы. Птицы также токовали в течение дня (с 9 ч 00 мин до 16 ч 11 мин), но менее динамично. Продолжительность тока составляла от нескольких минут до более чем 0.5 ч. При похолодании птицы токовали менее оживлённо, часто просто проходя круги без характерного пикирования, просто присаживаясь в кусты с похрюкиванием. Плотность населения азиатского бекаса в верхнем течении Воркуты 1.6, в среднем течении 4.7, в нижнем – 3.4 и в среднем составила 3.2 ос./10 км. В среднем течении Усы – 3.4 ос./10 км.

Gallinago media. Под городом Воркутой 13 июня 1958 дупеля активно токовали в смешанных группах (50-100 особей) самцов и самок. С меньшей интенсивностью птицы токовали в конце июня (Успенский 1965). В ходе исследований летом 2015 года дупель не отмечен.

Numenius phaeopus. Гнездящиеся средние кроншнепы отмечены в окрестностях города Воркуты и в долине реки Усы (Лобанов 1978; Морозов 1987а). Полные ненасиженные кладки обнаружены 9 июня 1983 и 12 июня 1982, вылупление происходило 15-16 июля 1982, 4-6

июля 1983, 29-30 июня 1984 и 12-13 июля 1985 (Морозов 1987а). В 2015 году в бассейне Воркуты встречены одиночные, пары и стайки (до 3 особей). Средний кроншнеп гнездится в холмистых мохово-кустарничковых увлажнённых тундрах. Плотность населения в верхнем течении Воркуты 1.8, в среднем – 4.3, в нижнем – 2.3; в среднем она составила 2.8 ос./10 км. В среднем течении Усы численность среднего кроншнепа составила 0.8 ос./10 км.

Limosa lapponica. Пара малых веретенников отмечена 26 июня 2015 в нижнем течении Воркуты. Птицы мигрировали на юго-юго-восток на высоте 100 м. Стайка из 5 малых веретенников отмечена 30 июня в среднем течении Усы. Птицы летели вверх по реке. Одиночный малый веретенник вместе с 3 золотистыми ржанками отмечен 3 июня 1985 у железнодорожной насыпи возле станции Юнь-Яга (Морозов 1988).

Stercorarius parasiticus. Встречены во время весенней миграции в окрестностях города Воркуты 3-9 июня. Здесь же 6 июля 1982 найдено гнездо с птенцом и проклюнутым яйцом. На том же болоте 21 июля 1983 найден птенец (Морозов 1987а).

Stercorarius longicaudus. Обыкновенный вид. Возможно, гнездится. Встречались одиночные, пары и группы от 3 до 11 особей. Кочующие группы длиннохвостых поморников (3-7 особей) в конце июня-начале июля перемещались (на высоте от 50 до 500 м) в основном на северо-запад и северо-восток долиной реки. Плотность населения в верхнем течении Воркуты 0.3, в среднем течении 3.3, в нижнем – 0.5 и в среднем была 1.4 ос./10 км. В среднем течении Усы – 6.1 ос./10 км.

Larus minutus. Малая чайка обнаружена на гнездовье в верхнем течении Воркуты в окрестностях одноимённого города. На зарастающем озере около посёлка Мульда 30 июня 1986 наблюдали пару у гнезда с 2 яйцами (Морозов 1991, 1997, 2003). Одиночная малая чайка зарегистрирована 1 июля 2015 в среднем течении Усы неподалёку от места впадения в неё Воркуты.

Larus ridibundus. На Воркуте (район города Воркуты) 16 июля 1977 отмечены 3 озёрные чайки вместе с серебристыми чайками (Лобанов 1982). В этом же районе на отмелях Воркуты одиночные озёрные чайки вместе с сизыми отмечены 6 июля 1983. Перелетающие к северу стаи (3 и 11 особей) наблюдали 25 июня 1983 и 13 июня 1984 (Морозов 1987б). Три взрослые птицы зарегистрированы 9 июня 1989, одиночная – 9 июня 1991 (Морозов 1997).

Larus argentatus. Кладка из 3 яиц серебристой чайки найдена 21 июня 1958 в окрестностях города Воркуты (Успенский 1965). В 2015 году в бассейне Воркуты встречены одиночные, пары и стаи от 3 до 25 серебристых чаек. Стаи отмечены в верхнем течении Воркуты, в самой большой было 96 птиц. Чайки сидели на каменисто-валунном берегу

вместе с сизыми чайками. Из 96 особей 16 были неполовозрелыми. В верхнем течении Воркуты численность серебристых чаек 6.3, в среднем течении 0.6, в нижнем – 3.9 и в среднем составила 3.6 ос./10 км. В среднем течении Усы – 1.1 ос./10 км.

Larus hyperboreus. В окрестностях города Воркуты первые бургомистры отмечены 9 мая, одиночные особи и стаи (до 40 особей) на разводьях реки Воркуты – 26 мая – 12 июня (Морозов 1987а).

Larus canus. Весенняя миграция сизых чаек под городом Воркутой зарегистрирована 24 мая – 11 июня. Летом стаи (3-40 особей) держатся на реке возле города и посёлков. 14 и 27 июня 1984, 14 и 24 июня 1985 найденные гнёзда (окрестности города) содержали по 3 слабонасиженных яйца. Птенцы отмечены 4 июля 1982. 20 июля они были почти с родителей, но не летали. Семьи с 2-3 лётными молодыми наблюдали 21 августа 1983 и 17 августа 1985. Последние отлетающие птицы отмечены 10 сентября – 1 октября (Морозов 1987а). В 2015 году встречались одиночные, пары и стаи (3-17 особей). Гнёзда сизой чайки найдены 23 и 24 июня в среднем течении Воркуты. Одно было размещено на искусственном каменистом полуостровке на одном из «водохранилищ», другое – на небольшом (10×3 м) островке. Сделано гнездо из сухой травы и ветоши. Хотя кладка погибла от паводка, чайки вели себя беспокойно и совершали пикирования. Плотность населения сизой чайки в верхнем течении Воркуты 10.6, в среднем течении 20.4, в нижнем – 12 и в среднем составила 14.3 ос./10 км. В среднем течении Усы этот показатель составил 11 ос./10 км.

Sterna hirundo. Одиночные птицы и небольшие стайки (3-5 особей) встречены в низовьях Воркуты совместно с полярными крачками. В среднем течении Усы плотность населения речной крачки составила 9 ос./10 км.

Sterna paradisaea. Первая мигрирующая одиночная полярная крачка под городом Воркутой отмечена 6 июня 1958 (Успенский 1965). В районе исследований встречались одиночные, пары и стаи (3-12 особей). В нижнем течении Воркуты 25 июня отмечена стая из 50 полярных крачек. Летом 2015 года плотность населения полярной крачки в верхнем течении Воркуты 14.3, в среднем течении 11.4, в нижнем – 10.8, в среднем – 12.2 ос./10 км. В среднем течении Усы –17.8 ос./10 км.

Columba oenas. Одиночный клинтух отмечен 27 мая 1986 в дельте реки Аячьяхи у посёлка Северный (Морозов 1991).

Columba livia. Оседлый вид города Воркуты (Лобанов 1978; Минеев, Минеев 2012), станции Сейда (Минеев, Минеев 2011). Летом 2015 года сизые голуби также отмечены в Сейде.

Streptopelia turtur. Одиночная горлица отмечена 26 мая 1986 у посёлка Октябрьский (Морозов 1991).

Cuculus canorus. В окрестностях железнодорожной станции Пе-

сец активно токовавший самец обыкновенной кукушки и самка встречены 4 июня 1991 (Морозов 1997).

Cuculus saturatus. Самец глухой кукушки отмечен 25 июня 2015 в прибрежных зарослях ивняка в низовьях Воркуты в районе заброшенного совхоза Лек-Воркута. Некоторое время птица следовала за лодками исследователей. Вероятно, размножается.

Nyctea scandiaca. Под городом Воркутой мигрирующих белых сов наблюдали 29 мая 1983 и 25 мая – 6 июня 1984 (Морозов 2005).

Asio otus. Гнездование ушастой совы зарегистрировано в окрестностях города Воркуты возле посёлка Аяч-Яга (Морозов 1987б).

Asio flammeus. По опросным сведениям, болотная сова – обычный вид в среднем течении Усы.

Aegolius funereus. По опросным данным, мохноногий сыч гнездится в елово-берёзовых колках в среднем течении Усы.

Surnia ulula. Гнездо ястребиной совы найдено 17июня 1985 в елово-берёзовом редколесье в месте впадения Лагорты в реку Юнь-Яга (Бутьев, Костин 1997).

Strix nebulosa. Бородатая неясыть регулярно встречается под городом Воркутой. Крупная инвазия сов отмечена в октябре 1974 года (Лобанов 1978, 1982).

Dendrocopos major. Большой пёстрый дятел встречен в июне и августе 1974 года в городском парке и в аэропорту Воркуты (Минеев, Минеев 2012). В окрестностях посёлка Юр-Шор и города Воркуты эти дятлы встречены 4 августа 1977 (Лобанов, 1982). По опросным данным, гнездится в елово-берёзовых колках в среднем течении Усы.

Picoides tridactylus. Взрослая самка добыта 6 сентября 1991 в ивовом пойменном лесу по реке Воркуте (Морозов 1997).

Riparia riparia. Гнездящийся вид. Встречены стайки от 4 до 14 береговушек. Найденные три колонии располагались в песчано-глинистых обрывистых (высотой 3-4 м) берегах и насчитывали от 16 до 25 гнездовых нор. Плотность населения в верхнем течении Воркуты 3.9, в среднем течении 4.0, в нижнем течении 6.8 и в среднем 5.5 ос./10 км. В среднем течении Усы – 6.8 ос./10 км.

Hirundo rustica. Одиночная деревенская ласточка наблюдалась 2 августа 1986 у посёлка Заречный (Морозов 1991).

Melanocorypha yeltoniensis. В районе города Воркуты (посёлок Воргашор) взрослая самка чёрного жаворонка держалась 2 сентября на поле горохово-овсяной смеси (Морозов 1997).

Eremophila alpestris. Пролётные стаи рогатых жаворонков вместе с куликами-воробьями, пуночками и лапландскими подорожниками отмечены 5 июня 1958 в окрестностях Воркуты (Успенский 1965).

Alauda arvensis. Пары и одиночные полевые жаворонки встречены 30 июня 1977 близ Воркуты (Лобанов 1982). Поющие самцы неод-

нократно наблюдались в окрестностях этого города летом 1985-1987 и 1989-1991 годов (Морозов 1991, 1997). Поющих самцов и пары наблюдали в июне-июле 1978 и 1980 в предтундровых редколесьях бассейна Усы (Бутьев, Костин 1997).

Anthus pratensis. Гнездится на востоке Большеземельской тундры в районе реки Сырь-Яга и около города Воркуты (Гладков 1962; Лобанов 1978). В 2015 году ток лугового конька отмечен в пойме верхнего и среднего течения Воркуты. Численность в бассейне Воркуты варьировала от 0.6 до 0.7, в среднем 0.54 ос./10 км.

Anthus cervinus. В окрестностях города Воркуты первые краснозобые коньки отмечены 7 июня 1958 (Успенский 1965). Плотность населения летом 2015 года в верхнем течении Воркуты 1.1, в среднем течении 1.3 и в среднем составила 0.8 ос./10 км.

Motacilla flava. Жёлтая трясогузка гнездится в окрестностях города Воркуты (Морозов 1987б, 1997). В 2015 году не отмечена.

Motacilla citreola. В окрестностях Воркуты желтоголовые трясогузки появились 7 июня, массовая миграция проходила 10-12 июня 1958 (Успенский 1965).

Motacilla alba. Белая трясогузка встречается в мохово-кустарничково-травяной тундре поблизости или в зарослях ивняков, по берегам рек, ручьёв и озёр. Плотность населения в верхнем течении Воркуты 0.5, в среднем течении 2.4, в низовьях – 1,5, в среднем 1.5 ос./10 км. В среднем течении Усы – 4.4 ос./10 км.

Perisoreus infaustus. Кукша отмечена 6 августа 1976 в прирусловых ельниках по реке Воркуте и 16 июля 1978 в мелкобугристой ерниковой тундре в окрестностях города Воркуты (Лобанов 1978, 1982). По опросным данным, гнездится в елово-берёзовых редколесьях в среднем течении реки Усы.

Pica pica. Сорока гнездится в окрестностях города Воркуты. Кладки найдены в 1983-1985 годах (Морозов 1987а). Летом 2015 года встречена в пойме на всем протяжении реки Воркуты. Плотность населения в верхнем течении 0.8, в среднем течении 0.4, в нижнем – 0.3 и в среднем составила 0.5 ос./10 км.

Corvus monedula. Одиночная галка в стае серых ворон зарегистрирована 28 мая 1989 в районе шахты «Северная» (Морозов 1997).

Corvus frugilegus. В окрестностях города Воркуты грач отмечен в 1986, с 1988 года гнездится у посёлка Аяч-Яга (Морозов 1991).

Corvus cornix. Серая ворона отмечена на гнездовании в окрестностях города Воркуты (Морозов 1987а), вероятно, гнездится и по всей пойме одноимённой реки. В 2015 году здесь встречались одиночные, пары и группы из 3 птиц. Наибольшая численность серой вороны отмечена в верхнем течении реки (10.8), в среднем течении она была равна 5.6, в нижнем – 2.8, в среднем была равна 6.4 ос./10 км. В сред-

нем течении Усы плотность населения серой вороны была 6.4 ос./10 км.

Corvus corax. В пойме реки Воркуты и окружающей тундре в 2015 году встречены одиночные, пары и семейные группы (до 3 особей) ворона. 22 июня в верховьях реки отмечен ворон, который играл с пойманной маленькой птицей. В полете он бросал её с высоты и ловил около земли. Так повторялось многократно. 24 июня был отмечен ворон с яйцом в клюве, его атаковала сизая чайка. Плотность населения ворона в верхнем течении Воркуты 1.1, в среднем течении 1.8, в нижнем – 0.5 и в среднем составила 1.1 ос./10 км. В среднем течении Усы – 0.3 ос./10 км.

Bombycilla garrulus. Свиристели (по 2-23 особи) отмечены под Воркутой в 1982, 1984 и 1985 годах в изолированных ивовых лесах и по берегам одноимённой реки среди можжевельника (Морозов 1987б). В 2015 году одиночные свиристели и пары встречены в среднем течении Воркуты (0.7) и среднем течении Усы (1.1 ос./10 км). Возможно, гнездится в елово-берёзовых редколесьях.

Prunella montanella. Сибирская завирушка гнездится у города Воркуты (Успенский 1965; Морозов 1987а). Гнездо с 2 яйцами найдено 19 июня 1958 (Успенский 1965). В 2015 году поющие самцы отмечены в среднем (0.6) и нижнем (0.7 ос./10 км) течении Воркуты. Самка с кормом в клюве встречена 26 июня в вечерние часы в ивняке у воды в низовьях реки Воркуты.

Acrocephalus schoenobaenus. Под Воркутой первые камышевки-барсучки отмечены 22 июня 1958 (Успенский 1965). Летом 2015 года плотность населения в верхнем течении Воркуты была 3.6, в среднем течении 6.5, в нижнем – 2.7 и в среднем составила 4.2 ос./10 км.

Sylvia atricapilla. В 2015 году песни черноголовой славки отмечались на всём протяжении маршрута по реке Воркуте.

Phylloscopus trochilus. Многочисленный гнездящийся вид. Плотность населения веснички в верхнем течении Воркуты 31.9, в среднем течении 30.0, в нижнем – 14.0, в среднем составила 25.2 ос./10 км. В среднем течении Усы – 16.7 ос./10 км.

Phylloscopus collybita. Многочисленный гнездящийся вид. Плотность населения теньковки в верхнем течении Воркуты 6.7, в среднем течении 5.9, в нижнем – 6.5, в среднем 6.4 ос./10 км. В среднем течении Усы – 5.0 ос./10 км.

Phylloscopus borealis. Наряду с весничкой, таловка является фоновым видом. Её численность в верхнем течении Воркуты 19.6, в среднем течении 24.8, в нижнем – 17.9, в среднем 20.8 ос./10 км. В среднем течении Усы – 13.6 ос./10 км.

Saxicola torquata. Поющий самец отмечен 3 июля 2015 в среднем течении реки Усы в устье реки Сейды.

Phoenicurus phoenicurus. Под городом Воркутой (посёлок Ворга-

шор) обыкновенная горихвостка встречена 1 июня 1978 (Лобанов 1982). В 2015 году горихвостка отмечена в верхнем и нижнем течении реки Воркуты, а также в среднем течении Усы. Плотность населения в бассейне Воркуты 0.1, в среднем течении Усы – 0.5 ос./10 км. В районе посёлка Сейда 3 июля отмечена пара горихвосток со слётками.

Luscinia svecica. Численность варакушки в верхнем течении Воркуты 0.1, в среднем течении 2.4, в нижнем – 1.4 и в среднем составила 1.2 ос./10 км.

Turdus pilaris. Плотность населения рябинника верхнем течении Воркуты 9.7, в среднем течении 4.8, в нижнем – 0.2 , среднем составила 4.8 ос./10 км. В среднем течении Усы – 3.8 ос./10 км.

Turdus iliacus. Встречается повсеместно. Численность белобровика верхнем течении Воркуты 8.6, в среднем течении 8.8, в нижнем – 17.4 и в среднем составила 11.6; в среднем течении Усы – 4.9 ос./10 км.

Parus montanus. Пару пухляков наблюдали 23-28 сентября 1974 в парке культуры города Воркуты (Лобанов 1982), у посёлка Воргашор две особи встречены 27 августа 1990 (Морозов 1997).

Parus ater. Московки, парами и стайками по 3-6 особей встречались 13-22 июля в пойменных ивняках реки, в городском парке Воркуты этих птиц наблюдали 26 сентября 1983 (Морозов 1987б).

Parus major. Поющие большие синицы отмечены 1 июля 2015 в среднем течении реки Усы.

Sitta europaea. В городском парке Воркуты одиночный поползень встречен 19 сентября 1968 (Лобанов 1982), 27 сентября 1983 отмечены две птицы (Морозов 1987б).

Passer domesticus. Синантропный вид, круглогодично населяет город Воркуту и населённые пункты в Воркутинском районе (наши данные; Успенский 1965, 1969; Лобанов 1978). Обычный гнездящийся вид станции Сейда (Минеев, Минеев 2011).

Passer montanus. Одиночных полевых воробьёв и пары отмечены в городе Воркуте и посёлка Воргашор (Морозов 1997).

Fringilla coelebs. В ивняке на пойменной террасе реки Воркуты (посёлок Рудник, г. Воркута) одиночные самцы зяблика отмечались 28 мая и 3 июня 1984 (Морозов 1987б). В окрестностях города зяблик зарегистрирован 28 мая 1989 и 25 мая 1990 (Морозов 1997).

Fringilla montifringilla. Ранее гнездование юрка уже отмечали в окрестностях Воркуты (Лобанов 1978; Морозов 1987а). В 2015 году юрок был многочисленным видом исследованного региона. Плотность населения в верхнем течении Воркуты 37.5, в среднем течении 36.8, в нижнем течении 19.4 и в среднем составила 31.2 ос./10 км. В среднем течении Усы – 14.2 ос./10 км.

Carduelis carduelis. В конце августа 1985 года В.В.Плотников отметил двух щеглов возле города Воркуты (Морозов 1991).

Acanthis flammea. Численность обыкновенной чечётки в верхнем течении Воркуты была равна 1.7, в среднем течении 2.9, в низовьях реки 2.5, в среднем составила 2.4 ос./10 км. В среднем течении Усы – 1.1 ос./10 км.

Carpodacus erythrinus. Весной в районе города Воркуты первые птицы появились 4-12 июня (Морозов 1987а). В окрестностях этого города чечевица была найдена на гнездовании (Лобанов 1982; Морозов 1987а). Летом 2015 года в верховьях Воркуты численность чечевицы была 1.1, в среднем течении 0.6, в низовьях – 2.0, в среднем составила 1.2 ос./10 км. В среднем течении Усы – 0.5 ос./10 км.

Pinicola enucleator. Трёх щуров наблюдали 26 июня 1978 на берегу реки Воркуты в прирусловых ивняках в районе одноимённого города (Лобанов 1982), там же 12 июня 1983 отметили самку среди можжевельника на берегу ручья (Морозов 1987б).

Pyrrhula pyrrhula. Ранее зарегистрированы многочисленные залёты снегирей (пар, самцов и самок) в окрестности Воркуты (Морозов 1987б, 1997). В 2015 году численность обыкновенного снегиря в верховьях Воркуты была равна 3.4, в среднем течении реки 1.3, в нижнем – 0.7, в среднем 1.8 ос./10 км. Возможно, гнездится.

Emberiza schoeniclus. Тростниковая овсянка отмечена в окрестностях Воркуты (Лобанов 1978). В 2015 году встречалась в верхнем (0.6) и среднем (3.1) течении Воркуты. Плотность населения птиц в среднем равна 1.2 ос./10 км.

Emberiza pallasi. Прилёт первых полярных овсянок в окрестности Воркуты отмечен 6-10 июня. Плотность населения вида здесь в июле 1981 года составила 5.8-9.4, в июле 1982 – 3.4-7.6, в июле 1983 – 6.4-17.3 особи на 1 км^2. (Морозов 1987а).

Emberiza pusilla. Обыкновенный гнездящийся вид. По данным 2015 года, плотность населения овсянки-крошки в верхнем течении реки Воркуты 1.7, в среднем течении 7.2, в нижнем течении 4.0, в среднем 4.3 ос./10 км.

Calcarius lapponicus. Лапландский подорожник – обыкновенный гнездящийся вид тундровых местообитаний. Под Воркутой кладки подорожника встречались с 20-х чисел июня (Успенский 1965). Появление птенцов происходило с 5 июля, вылет из гнёзд – с конца второй до середины третьей декады июля (Гладков 1962). Во время исследований в 2015 году в поймах рек Воркута и Уса не отмечен.

Plectrophenax nivalis. Под Воркутой пролётных и, вероятно, последних пуночек отметили 12 мая (Минеев, Минеев 2012).

Заключение

В ходе исследований с 15 июня по 6 июля 2015 в бассейне Воркуты и в среднем течении Усы зарегистрировано 72 вида птиц Из них гнез-

дование установлено для 31 вида, возможно гнездится ещё 24 вида, характер пребывания 1 вида не выяснен. В пойме Воркуты отмечено пребывание 62 видов, на реке Усе – 40. В целом для бассейнов обследованных рек плотность населения птиц составила 210.8 ос./10 км. (для Воркуты 224.1, а для средней Усы – 171.6 ос./10 км). В верхнем течении Воркуты численность птиц была равна 221.3, в среднем течении – 256.6. в нижнем течении – 196.3 ос./10 км. Наибольшая плотность в бассейне Воркуты характерна для среднего крохаля (13.8), мородунки (14.4), сизой чайки (14.3), полярной крачки (12.2), веснички (25.2), таловки (20.8), белобровика (11.6) и юрка (31.2 ос./10 км). В пойме Усы наибольшая плотность населения была у среднего крохаля (21), мородунки (11.5), сизой чайки (11), речной крачки (9), полярной крачки (17.8), веснички (16.7), таловки (13.6) и юрка (14.2 ос./10 км).

По результатам наших исследований и литературным источникам в бассейнах рек Воркута и Средняя Уса зарегистрировано 118 видов птиц. Из них гнездование установлено для 58 видов, возможно гнездования ещё 24 видов, пролётные – 19, залётные –21 вид. Для исследованного района общими видами птиц, обнаруженных предыдущими исследователями и нами летом 2015 года, являются 43 вида.

Предшествующими исследователями не зарегистрировано 35 видов отмеченных нами: краснозобая гагара, гуменник, кликун, малый лебедь, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, морянка, гоголь, синьга, луток, средний крохаль, зимняк, орлан-белохвост. золотистая ржанка, галстучник, длиннохвостый поморник, речная крачка, глухая кукушка, болотная сова, мохноногий сыч, береговушка, белая трясогузка, ворон, черноголовая славка, весничка, теньковка, таловка, черноголовый чекан, варакушка, рябинник, белобровик, большая синица, обыкновенная чечётка и овсянка-крошка.

Нами не отмечены 46 видов, зарегистрированных предыдущими исследователями: огарь, пискулька, широконоска, красноголовая чернеть, кобчик, пустельга, малый зуёк, хрустан, камнешарка, щёголь, турухтан, кулик-воробей, белохвостый песочник, краснозобик, чернозобик, гаршнеп, дупель, короткохвостый поморник, озёрная чайка, бургомистр, клинтух, обыкновенная горлица, обыкновенная кукушка, белая сова, ушастая сова, ястребиная сова, бородатая неясыть, трёхпалый дятел, деревенская ласточка, чёрный жаворонок, рогатый жаворонок, полевой жаворонок, жёлтая трясогузка, желтоголовая трясогузка, галка, грач, пухляк, московка, поползень, полевой воробей, зяблик, щегол, щур, полярная овсянка, лапландский подорожник и пуночка.

Литература

Бутьев В.Т., Костин А.Б. 1997. Материалы к орнитофауне Полярного Предуралья // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 37-43.

Галушин В.М., Костин Ф.Б., Шубин А.О. 1981. Пернатые хищники лесотундры северо-востока европейской части СССР // *Тез. докл. 8-й Всесоюз. орнитол. конф.* Кишинёв: 53-54.

Гладков Н.А. 1962. Материалы по птицам окрестностей Воркуты (восток Большеземельской тундры) // *Орнитология* **4**: 15-28.

Костин Ф.Б., Шубин А.О. 1983. О гнездовании пустельги в окрестностях г. Воркуты // *Экология хищных птиц.* М.: 72.

Лобанов В.А. 1978. *Изменение видового состава птиц тундры в окрестностях Воркуты.* М. (Рукопись депонир. в ВИНИТИ. № 1599-78).

Лобанов В.А. 1982. Залёты южных видов в Большеземельскую тундру // *Орнитология* **17**: 172-173.

Минеев О.Ю., Минеев Ю.Н. 2011. Фауна птиц бассейна реки Сейда (Большеземельская тундра) // *Рус. орнитол. журн.* **20** (694): 1983-1992.

Минеев Ю.Н. 1978. *Водоплавающие птицы Большеземельской тундры. Фауна и экология.* Л.: 1-110.

Минеев Ю. Н. 1988. Орнитологические находки на европейском Северо-Востоке СССР // *Орнитология* **23**: 217-218.

Минеев Ю.Н., Минеев О.Ю. 2012. *Птицы Большеземельской тундры и Югорского полуострова.* СПб.: 1-383.

Морозов В.В. 1987а. Новые данные по фауне и распространению птиц на востоке Большеземельской тундры // *Орнитология* **22**: 134-147.

Морозов В.В. (1987б) 2015. Материалы к орнитофауне востока Большеземельской тундры // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1103): 408-413.

Морозов В.В. (1988) 2009. Фаунистические находки на востоке Большеземельской тундры // *Рус. орнитол. журн.* **18** (536): 2291.

Морозов В.В. (1991) 2010. О некоторых орнитологических находках на востоке Большеземельской тундры // *Рус. орнитол. журн.* **19** (556): 460-461.

Морозов В.В. 1997. К фауне и распространению птиц в Большеземельской тундре и на Югорском полуострове // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири.* Екатеринбург: 6-7.

Морозов В.В. 2003. Новые фаунистические находки на востоке Большеземельской тундры и Полярном Урале // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Предуралье и Западной Сибири.* Екатеринбург: 158-160.

Морозов В.В. 2005. Белая сова на востоке Большеземельской тундры и Югорском полуострове // *Совы Северной Евразии.* М.: 10-22.

Скробов В.Д. 1975. Большеземельская и Малоземельская тундры // *Тетеревиные птицы: Размещение запасов, использование и охрана.* М.: 11-17.

Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).* М.: 1-808.

Успенский С.М. 1965. Птицы востока Большеземельской тундры, Югорского полуострова и острова Вайгач // *Тр. Ин-та биол. Урал. фил. АН СССР* **38**: 65-102

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1264**: 1013-1021*

Зимние наблюдения за куликами на юге Мадагаскара

А.А.Ластухин

Альберт Аркадьевич Ластухин. Эколого-биологический центр «Караш», ул. Кооперативная, д. 4, Чебоксары, 428000, Чувашская республика, Россия. E-mail: Alast@mail.ru

Поступила в редакцию 5 марта 2016

С 1 января по 12 февраля 2013 мы проводили наблюдениях за птицами на Мадагаскаре (рис. 1). В состав экспедиции входили: Альберт Аркадьевич Ластухин, Александр Ричардович Лаптев и Андрей Геннадьевич Степанов. Основной задачей экспедиции была запись голосов птиц для последующего анализа в различных аспектах. Другие данные собирались как составная часть основной цели. При наблюдениях на морских побережьях в разных частях острова (рис. 2) мы отметили существенную разницу в составе орнитофауны и особенно в разнообразии и количестве куликов.

1- 1-2.01.2013-(10-12.02.2013) - Antananarivu; **2**- 2-5.01.2013 - Ampefy; **3**- 6-8.01.2013-30 km N Fianarantsoa;**4**- 10-12.01.2013 -20 km O Fianarantsoa - Lake Sahambavy; **5**- 12-13.01.2013.- Andrambovato-20 km O Sahalava, rock in the mountains; **6**- 14-5.01.2013 - Ranohira; **7**- 16-17 (20-21).01.2013 -Toliara; **8**- 17-20.01.2013 - Anantsoiio-26 km S -Toliara, estuary Onilahy; **9**- 23-24.(28-29).01.2013 - Fort-Dafin; **10**- 24-27.01.2013 - 8 km SW Airpotr of Fort-Dafin; **11**– 29-31.01.2013 - road from Ebakika to Manantenina; **12**- 1-2.02.2013 - Manantenina; **13**- 03-4.02.2013 - Farafangana; **14**– 5-6.02.2013 - Amporoforo-Manakara; **15** - 7-9.02.2013- Ifanadiana.

Рис. 1. Маршрут экспедиции по Мадагаскару.

Рис. 2. Пункты наблюдений за куликами: 1, 2 – Юго-западный берег. Долина реки Онилахи. 3, 4 – Юго-западный берег. Берег около г. Толеар. 5, 6 – Южный берег, 8 км от города Порт-Дафин. 6, 7- Восточный берег. Окрестности г. Манакара.

Орнитологические исследования включали следующие методы: полевые наблюдения по всему маршруту с помощью биноклей; запись

голосов всех встреченных на маршрутах птиц на цифровой диктофон; фотографирование птиц в природе; запись описаний характерных внешних признаков птиц на диктофон непосредственно во время наблюдений за ними.

Всего нами отмечен 131 вид птиц, в том числе 13 видов куликов (см. таблицу) из 36 видов этих птиц, зарегистрированных на острове, включая случайно залётных (Langrand 1990; Lepage 2015).

Распределение куликов по различным частям острова Мадагаскар на зимовках

Вид	Статус	Пункты наблюдений (рис. 1)	Регионы острова		
			Запад	Юг	Восток
Pluvialis squatarola	Обычный зимующий	7	+	–	–
Charadrius hiaticula	Зимующий	7, 8, 10	++	+	–
Charadrius pecuarius	Резидент	8	+	–	–
Charadrius marginatus	Резидент	10	–	+	–
Charadrius mongolus	Редкий зимующий	10	–	+	–
Charadrius leschenaultii	Зимующий	7	+	–	–
Charadrius tricollaris	Резидент	8	+	–	–
Limosa lapponica	Зимующий	7	+	–	–
Numenius phaeopus	Обычный зимующий	7, 8, 10	++	+	–
Tringa nebularia	Зимующий	7, 8, 13	++	–	+
Arenaria interpres	Зимующий	8	+	–	–
Calidris alba	Зимующий	7, 10	+	+	–
Calidris ferruginea	Обычный зимующий	7, 8	++	–	–
Всего			11	5	1

Тулес *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758). Встречен только на западном берегу южной части острова, на побережье в черте города Толеар (Toliara, -23.3347, 43.6267) 16 и 20-21 января. Накануне вечером 15 января был высокий прилив. На побережье птиц практически не было. На следующий день в обед начался сильный отлив, освободив большие площади песчаного мелководья на сотни метров, среди которых образовались многочисленные косы и лагуны. Тут же появились большие стаи разнообразных птиц, среди которых звонкими криками выделялись тулесы. Они держались среди других птиц: крачек *Thalasseus bengalensis*, цапель *Butorides striata*, фламинго *Phoenicopterus roseus* и куликов: *Charadrius hiaticula*, *Charadrius leschenaultii*, *Limosa lapponica*, *Numenius phaeopus*, *Tringa nebularia*, *Arenaria interpres,* – по одному или небольшими группами. Самая крупная стайка состояла из 18 тулесов. Придерживались самой кромки отлива. Так кормились до конца дня. Вечером и в сумерках можно было слышать их громкие голоса. Несколько южнее, в 26 км от Толиара, 18-19 января в устье реки Онилай (Onilahy) на илистых пресноводных отмелях среди множества куликов тулес встречен не был, как и во всех остальных пунктах наших наблюдений. На этом основании можно сделать вывод, что ту-

лесы небольшими стайками от одиночек до 18 птиц кормятся у кромки Мозамбикского пролива во время отлива на солёных отмелях. На пресноводных отмелях в устьях рек в то же время их не было. Тулесы активно перекликаются как днём, так и ночью. Общее число наблюдавшихся нами птиц в середине января можно оценить в 40-50 особей в окрестностях города Толиар на 3 км побережья.

Галстучник *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758. Встречен на западном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 января; на южном побережье 25 января в окрестностях посёлка Манамбаро (Manambaro, Taolanaro, Toliara, -25.0676, 46.9363). Они кормились среди других встреченных тут же видов: *Th. bengalensis*, *B. striata*, *Ph. roseus*, *Ch. hiaticula*, *Ch. leschenaultii*, *L. lapponica*, *N. phaeopus*, *T. nebularia*, *A. interpres*, *Calidris ferruginea* по одному или парами. Стаек галстучников не наблюдали. Южнее, в 26 км от Толиара, 18-19 января в устье реки Онилай на илистых пресноводных отмелях одна пара заняла небольшой участок и кормились на нём, не отлетая далеко. На южном побережье острова 25 января видели всего одну птицу. Она кормилась на морском побережье на песке среди выброшенных водорослей и морского хлама. По-видимому, галстучники, прилетев на остров стайками (в Чувашии, например, они весной и осенью пролетают всегда стайками из 8-30 особей), далее рассеиваются по парам или поодиночке. Кормятся у кромки Мозамбикского пролива во время отлива на солёных отмелях, а также и на пресноводных илистых плёсах в устьях рек. Общее число наблюдаемых нами птиц в середине января можно оценить в 5-10 особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья. На юге острова в окрестностях Манамбаро видели всего одного галстучника.

Зуёк-пастух *Charadrius pecuarius* Temminck, 1823. Встречен только на западном берегу острова в 26 км южнее Толиара 18-19 января в устье реки Онилай на илистых пресноводных отмелях. Они кормились среди других околоводных видов: *Casmerodius albus*, *Ardea cinerea*, *Ardea humbloti*, *Ardea ardesiaca*, *Egretta dimorpha*, *Ph. roseus*, *Ch. hiaticula*, *L. lapponica*, *N. phaeopus*, *T. nebularia*, *C. ferruginea* небольшой стайкой из 9 птиц. Кормовой участок представлял собой увлажнённый и местами трещиноватый от жары илистый берег поймы с растущей местами травой. Стайка передвигалась в общем направлении, когда передние уходили вперёд, задние старились их догнать или перегнать. На этом основании можно сделать вывод о том, что зуёк-пастух кормится на пресноводных илистых полусухих плёсах в устьях рек. Общее число наблюдаемых нами птиц в середине января в устье реки Онилай можно оценить в 10 особей.

Белолобый зуёк *Charadrius marginatus* Vieillot, 1818. Встречен только раз на южном побережье острова 25 января в окрестностях посёлка Манамбаро. Одна птица кормились среди других видов куликов:

Рис. 3. Кулики на зимовке на Мадагаскаре: 1 – *Arenaria interpres*, 2 – *Calidris alba*, 3 – *Numenius phaeopus*, 4 – *Limosa lapponica*, 5 – *Charadrius leschenaultii*, 6 – *Charadrius mongolus*, 7 – *Tringa nebularia*, 8 – *Pluvialis squatarola*. Фото автора.

Ch. hiaticula, *Charadrius mongolus*, *N. phaeopus*, *Calidris alba*. Кормовой участок – песчаный берег в устье пресноводного залива, впадающего протокой в морской прибой. Птица бегала по песку вслед за отступающей волной и выхватывала принесённую ею съедобную мелочь. Птица ювенильной окраски. На этом основании можно сделать вывод о том, что белолобый зуёк в исследуемом районе редок, кормится на пресноводных плёсах в устьях рек или на морском побережье.

Монгольский зуёк *Charadrius mongolus* Pallas, 1776. Встречен на южном побережье 25 января в окрестностях посёлка Манамбаро. Держался на песчаном берегу в устье пресноводного залива, впадающего протокой в море. Птица в зимнем наряде кормилась на отмелях во время отлива. Видели всего одну птицу, державшуюся вместе с *C. alba*.

Толстоклювый зуёк *Charadrius leschenaultii* Lesson, 1826. Встречен только на западном берегу Мадагаскара в черте города Толеар 16 января. Пара этих зуйков держалась среди *Ph. roseus*, *Ch. hiaticula*, *L. lapponica*, *N. phaeopus*, *T. nebularia*, *A. interpres*, *C. ferruginea*. Стаек не наблюдали. Обе встреченные особи были в зимнем наряде Кормились на песчаном берегу во время отлива, близко к урезу воды. Общее число наблюдаемых нами птиц в середине января можно оценить до 5 особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья.

Трёхполосый зуёк *Charadrius tricollaris* Vieillot, 1818. Встречен только на западном берегу острова в 26 км южнее от Толиара 19 января в устье реки Онилай. Пара зуйков ненадолго остановилась на небольшом пресноводном водоёме возле скалистого побережья. Водоём мелкий – скорее лужа с зелёной от водорослей водой. Немного поковыряли грунт и жухлую сырую растительность прямо у уреза воды, а затем улетели в сторону русла реки.

Малый веретенник *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758). Встречен только на западном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20 января. Веретенники держались парами или поодиночке среди других птиц. Стаек не наблюдали. Кормились на песчаных отмелях. Корм добывали в очень мелких лужах, оставшихся после отлива. Все были в зимнем наряде. На этом основании можно сделать вывод о том, что малый веретенники, прилетев на остров стайками, далее рассеиваются. Общее число наблюдавшихся нами птиц в середине января можно оценить в 5-10 особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья.

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758). Встречен на западном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 января; южнее в 26 км от Толиара 18-19 января в устье реки Онилай и на южном побережье 25 января в окрестностях посёлка Манамбаро. Кроншнепы держались среди других птиц по одному, парами или стайками, самая большая из которых насчитывала 26 птиц. Южнее, в 26 км от Толиара, 18-19 января в устье реки Онилай мы насчитали в

стае 23 птицы. Здесь в полдень часть средних кроншнепов пряталась от жары под кронами мангровых кустов между их воздушных корней. Основное место кормёжки находилось у кромки Мозамбикского пролива во время отлива на солёных отмелях. Удалось заметить и главный предмет добычи – мелкие (панцирь 20-30 мм) крабы. Их скопления насчитывают от 60 до 120 и более особей на 1 м^2. При приближении опасности они тут же зарываются в песок. Кроншнепы без видимых усилий погружают в песок клюв и вытаскивают крабов. Общее число наблюдаемых нами средних кроншнепов в середине января можно оценить в 50-60 особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья. На южном побережье острова 25 января видели всего одну птицу. Уместно отметить, что на юго-восточном побережье соседнего с Мадагаскаром острова Маврикий А.Н.Ширяев сфотографировал одиночного среднего кроншнепа в районе пляжа Le Chaland 26 января 2014. Можно сделать вывод о том, что средний кроншнеп находит на западном побережье очень благоприятные условия для зимовки. Местное население, на них почему-то не охотится. Общее число наблюдавшихся нами птиц в середине января можно оценить в 50-60 особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья.

Большой улит *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767). Встречен на западном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 января; южнее, в 26 км от Толиара, 18-19 января в устье реки Онилай. Одиночная пролётная птица встречена 1 февраля (единственный вид кулика на восточном берегу) над пресноводными болотами Манантенины (Manantenina, Taolanaro, Toliara, -24.272, 47.314) (рис. 1, пункт 12). Встречались среди находившихся тут же других видов околоводных птиц поодиночке, парами или стайками (до 7 особей). В 26 км к югу от Толиара 18-19 января в устье реки Онилай мы видели стайку из 5 птиц. Все были в зимнем наряде. Кормятся большие улиты у кромки Мозамбикского пролива во время отлива на солёных отмелях, в основном находясь в воде около мелких островков с водорослями. В устьях пресноводных рек они находят корм в неглубоких протоках на илистых участках. Общее число птиц в середине января можно оценить в 25-30 особей в окрестностях Толиара на 3 км побережья.

Камнешарка *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758). Встречена только на западном берегу острова в черте города Толеар 16 января. Три камнешарки держались среди других птиц. Кормятся у кромки Мозамбикского пролива во время отлива на солёных отмелях.

Песчанка *Calidris alba* (Pallas, 1764). Встречена на западном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 января и на южном побережье 25 января в окрестностях посёлка Манамбаро. Песчанки держались парами и небольшими стайками до десятка птиц. Кормятся у кромки прибоя и на отмелях. Также собирают корм после набежавших

волн и на морском побережье. Общее число наблюдаемых нами птиц в середине января в окрестностях города Толеар можно оценить в 15 особей на 3 км побережья.

Краснозобик *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763). Встречен на западном берегу острова в черте города Толеар 16 и 20-21 января и в 26 км к югу от Толиара 18-19 января в устье реки Онилай. Краснозобики были повсюду среди других птиц и держались стайками. Кормятся у кромки Мозамбикского пролива во время отлива на солёных отмелях. В устьях пресноводных рек также находят корм в неглубоких протоках на илистых участках, иногда зарастающих травой, но всегда влажных. В устье реки Онилай мы насчитали стаю более чем из 300 краснозобиков.

Заключение

На южном Мадагаскаре из куликов Северной Азии выявлены следующие зимующие виды: *Pluvialis squatarola*, *Charadrius hiaticula*, *Charadrius mongolus*, *Charadrius leschenaulti*, *Limosa lapponica*, *Numenius phaeopus*, *Tringa nebularia*, *Arenaria interpres*, *Calidris alba*, *Calidris ferruginea* – всего 10 видов (76.9%). В трёх пунктах найдены: *Ch. hiaticula*, *N. phaeopus*, *T. nebularia*, в двух пунктах – *C. alba*, *C. ferruginea*, остальные – только в каком-либо одном. Самый многочисленный вид – краснозобик – наблюдали более 500 раз. Самый редкий – монгольский зуёк – встречен единственный раз.

Как видно, запад, юг и восток южной части Мадагаскара имеют разную привлекательность для куликов, как зимующих, так и местных (см. таблицу). В западной части у берега Мозамбикского пролива встречены 11 видов из 13, или 84.6%. Примерно в эти же сроки (21 января 2011) в 10 км севернее Толиара (Ambondrolava, 23°15’41” ю.ш., 43°37’ 42” в.д.) было выявлено 14 видов куликов (Charlie *et al.* 2012). Из них в нашем списке отсутствуют *Rostratula benghalensis*, *Himantopus himantopus*, *Charadrius thoracicus*, *Actitis hypoleucos*. На южном берегу отмечено 5 видов, или 38.5%, а на восточном – всего 1, или 7.7%. На всех остальных внутренних озёрах и реках кулики нами не встречены, вероятно, из-за их скрытности и малого количества (Long *et al.* 2008).

Причина указанных различий в разном климате. Восточный берег гористый, постоянно влажный, с первичными тропическими дождевыми лесами, большими сильно заросшими болотами и реками. Берег Индийского океана песчаный, круто обрывается в глубину. Западный берег, наоборот, хоть и гористый, но менее влажный, изобилует отмелями и песчаными косами. Южный берег носит переходный характер. Всё это отражается на возможности добывания корма куликами.

Выражаю искреннюю благодарность моим постоянным спутникам в экспедициях А.Р.Лаптеву, А.Г.Степанову; M.A. и O.A. Lastukhin за помощь в обеспечении фото, аудио

записывающей техникой и литературой; Е.А.Коблику, П.С.Томковичу и А.Ф.Ковшарю за полезные консультации и определение некоторых видов.

Литература

Gardner Ch.J., De Ridder C., De Ridder B., Jasper L.D. 2012. Birds of Ambondrolava mangrove complex, southwest Madagascar // *Check List* **8**, 1: 1-7.

Lepage D. 2015. Avibase – Всемирные Контрольные Списки Птиц Мадагаскар. http://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=MG&list=howardmoore

Langrand O. 1990. *Guide to the Birds of Madagascar*. Yale Univ. Press: 1-364.

Long P.R., Zefania S., Ffrench-Constant R.H., Székely T. 2008. Estimating the population size of an endangered shorebird, the Madagascar plover, using a habitat suitability model // *Anim. Conserv.* **11**, 2: 118-127.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1264**: 1021-1023*

Встречи некоторых редких хищных птиц и сов в Закарпатской области

В.Н.Глеба

Василий Николаевич Глеба. Украинское общество охраны птиц, ул. Красноармейская, д. 148, пгт. Королево, Виноградовский район, Закарпатская область, 90332, Украина.
E-mail: glebasileus@mail.ru

Поступила в редакцию 23 января 2016

В этом сообщении приводятся сведения о встречах некоторых редких видов хищных птиц и сов, включённых в Красную книгу Украины. Наблюдения проводились на территории Виноградовского, Береговского и Хустского районов Закарпатской области и охватывают период с 1998 по 2015 год с перерывом с 2004 по 2007.

Осоед *Pernis apivorus*. Пару осоедов, парящих над восточными склонами Чёрной горы возле села Малая Копаня (Виноградовский район) наблюдали 2 мая 2014 (рис. 1). Птицы прилетели сюда с запада вдоль русла Тисы. Через некоторое время осоеды направились вглубь горной гряды.

Чёрный коршун *Milvus migrans*. 14 июля 1998 коршун парил над лесом на окраине каменного карьера возле села Рокосово Хустского района. 20 ноября 2009 одна особь пролетела вниз по течению Тисы, возле посёлка Королёво Виноградовского района. Коршуна преследовали два во́рона *Corvus corax*. Ещё одна встреча с одиночным коршуном произошла 13 сентября 2011. Коршун пролетал вниз по течению на том же участке реки, что и предыдущая особь. На этот раз за хищником погнались с криком 3 серые вороны *Corvus cornix*, отделившиеся от стаи, которая перелетала через речку. В двух последних случаях

именно вороновые, преследующие хищника с криком, дали наблюдателю возможность заметить коршуна. Единственная встреча на весенней миграции произошла в апреле 2011 на том же участке. Коршун перелетел Тису и полетел через Королёво в юго-восток.

Рис. 1. Взрослый осоед *Pernis apivorus*, парящий над склонами Чёрной Горы возле села Малая Копаня. 2 мая 2014. Фото автора.

Луговой лунь *Circus pygargus*. В апреле 2010 года взрослый самец отмечен над берегом Тисы возле Королёво. 9 сентября 2011 над болотистым рукавом Тисы у Королёво отмечена пролетающая молодая особь. 31 марта 2015 на Сальве встречен взрослый самец, перелетавший пруды. 12 сентября 2015 на полях в окрестности Королёво пролетел охотящийся низко над землёй самец (рис. 2).

Рис. 2. Самец лугового луня *Circus pygargus*, охотящийся над полями около посёлка Королёво. 12 сентября 2015. Фото автора.

Сплюшка *Otus scops*. Пение сплюшки отмечено в июне 2015 года на территории одного из детских садов Королёво. Совка держалась на старой усыхающей птичьей черешне. Голос сплюшки был слышен на протяжении первой недели месяца и записан нами на диктофон.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. Единственная встреча с уже летающим слётком состоялась 18 июля 1998 в буковом лесу около села Черна Виноградовского района. При приближении наблюдателя неясыть перелетала недалеко, подпуская человека на 20-30 м. За год до этого в этом лесу ураганный ветер повалил немало деревьев.

Сипуха *Tyto alba*. Зимой 2002/03 года одна мёртвая особь (возможно, поражённая электрическим током) висела проводах ЛЭП вдоль железной дороги около села Батрадь Береговского района. 15 ноября 2010 на железнодорожной станции в селе Батево (Береговой район) встречена одна сипуха. Она летела из села в поле через железнодорожные пути. Хотя уже были сумерки, сову хорошо удалось рассмотреть в свете прожектора, освещающего привокзальные строения.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск ***1264****: 1023-1024*

Случай гнездования филина *Bubo bubo* в Сумском Полесье

В.М.Малышок, Н.П.Кныш

*Второе издание. Первая публикация в 2000**

29 марта 1991 вблизи села Калиевка Шосткинского района Сумской области В.М.Малышком было обнаружено гнездо филина *Bubo bubo*. Гнездовой биотоп: участок старого высокоствольного смешанного леса (суборь) в окружении лугов, полей, небольших болот и кустарников. Гнездо находилось на земле возле большого дуба, в неглубокой ямке с прошлогодней травой. Кладка из двух слабо насиженных яиц (59.8×49.2 мм – 69.5 г; 60.0×48.1 мм – 71.2 г) была изъята и сейчас хранится в оологической коллекции В.М.Малышка.

Важно отметить, что эта находка даёт существенную коррективу современным представлениям о статусе вида в Левобережном Полесье (Гаврись 1999), согласно которым последние случаи гнездования филина отмечены в середине 1960-х годов в Свесском лесничестве Ямпольского района Сумской области (Матвеенко 1971). Кстати, эту ссылку на «случаи гнездования» можно подвергнуть сомнению, поскольку в цитируемой работе М.Е.Матвеенко (1971) сообщается лишь о факте добычи филина в 1963 году в лесах Ямпольского лесхоззага и что чучело его хранится в красном уголке Свесского лесничества. Нам известно, что первоначальная информация об этом исходила от охотоведа

* Малышок В.М., Кныш Н.П. 2000. Случай гнездования филина в Сумском Полесье // *Беркут* **9**, 1/2: 125-126.

Ямпольского лесхоззага Г.О.Петли. Известно также, что другие исследователи ни разу не указывали на пребывание вида в регионе (Жежерін 1962; Афанасьев 1998; Кузьменко 1998).

Таким образом, эта находка есть первое документированное подтверждение гнездования филина в Сумском Полесье в XX веке.

Литература

Афанасьев В.Т. 1998. *Птицы Сумщины*. Киев. 1-93.

Гаврись Г.Г. 1999. О возможности восстановления популяции филина *Bubo bubo* на территории Деснянского Полесья (Брянско-Старогутского лесного массива) // *Перспективы развития экологической сети и создания трансграничных охраняемых территорий в бассейне Десны*. М.: 63-67.

Жежерін В.П. 1962. Про поширення деяких рідкісних та нечисленних видів птахів Українського Полісся // *Зб. праць Зоол. музею АН УССР* **31**: 104-109.

Кузьменко Ю.В. 1998. Сови території проектованого Деснянсько-Старогутського НПП // *Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи іх вирішення: Мат-ли науково-практ. семінару*. Київ: 102-103.

Матвеенко М.Е. 1971. *Птицы Сумской области (повидовые очерки)*. Прил. к дис. ... канд. биол. наук. Сумы. 1-244 (рукопись).

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1264**: 1024-1025*

Новые данные по численности и распределению скопы *Pandion haliaetus* и орлана-белохвоста *Haliaeetus albicilla* на крупных водоёмах Северо-Запада России

М.В.Бабушкин, А.В.Кузнецов

*Второе издание. Первая публикация в 2015**

Исследования 2010-2014 годов охватили западную часть Вологодской, север Ярославской и юго-запад Архангельской областей, а также южную и центральную часть республики Карелия. Эти учёты позволили отметить изменения численности скопы *Pandion haliaetus* и орлана-белохвоста *Haliaeetus albicilla* за последние 10-15 лет.

Рыбинское водохранилище. В Дарвинском заповеднике и его охранной зоне (на полуострове в центре водохранилища) ежегодно гнездится 50-55 пар скопы и 35-38 пар орланов. За их пределами гнездятся

* Бабушкин М.В., Кузнецов А.В. 2015. Новые данные по численности и распределению скопы и орлана-белохвоста на крупных водоёмах Северо-Запада России // *14-я Международ. орнитол. конф. Северной Евразии. 1. Тезисы*. Алматы: 48-50.

ещё 30-35 пар скопы и 20-22 пары орланов. Таким образом, на всём побережье северной части водохранилища обитает 80-90 пар скопы и 55-60 пар орланов. Современные данные по их численности на юге водохранилища отсутствуют.

Шекснинское водохранилище. Численность скопы на северном его побережье, в пределах национального парка «Русский Север», за последние 10 лет возросла с 7 до 17 пар. На западном и восточном побережьях найдены ещё 6 пар этого вида. В настоящее время на водохранилище обитает 22-25 пар скопы и 12-15 пар орланов.

Озеро Белое. В 2011 году в юго-восточной части озера, в истоке Шексны найдена ранее неизвестная группировка скопы из 5 гнёзд, три из которых располагалось на опорах заброшенной ЛЭП. Ещё 5 гнездовых участков скопы обнаружено на восточном и западном побережье озера. На западном берегу озера ранее обитало 6-8 пар орланов, а ныне гнездится 10-11 пар.

Озеро Воже. В 2011 году выявлен рост численности скопы до 9-11 пар и орлана – до 11-13 пар. Их гнездовые участки приурочены к наиболее труднодоступным частям побережья.

Юго-восточное побережье Онежского озера. В 2014 году обследовали южное побережье озера, где по сравнению с началом 2000-х годов гнездовая численность скопы возросла до 10 пар, а орлана – до 7-9 пар.

Водлозеро. На побережье озера и по реке Илексе в 2012 году обнаружено 14 гнездовых участков орлана. По сравнению с началом 2000-х годов, его численность практически не изменилась. В настоящее время в Водлозерском национальном парке обитают не менее 20-24 пар орланов. Численность скопы возросла до 14-15 гнездовых пар.

Выгозеро. В 2014 году выявлено 12-14 гнездовых участков скопы и 7-9 участков орлана на южном и восточном побережьях озера.

В связи с большей доступностью водного транспорта, количество отдыхающих на воде существенно возросло, и они стали проникать в отдалённые участки водоёмов, где расположены гнездовые участки редких птиц. Индустрия туризма интенсивно осваивает прибрежную зону, в которой прокладываются дороги и строятся новые базы отдыха, кемпинги и причалы. Но при этом не отмечается снижения численности скопы и орлана, а наблюдается даже некоторый рост их популяций, что свидетельствует о возрастании взаимной толерантности человека и крупных рыбоядных хищников на Северо-Западе России.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1264**: 1026-1027*

Особенности осеннего пролёта горлиц *Streptopelia decaocto*, *S. turtur*, *S. orientalis* и *S. senegalensis* на перевале Чокпак в предгорьях Западного Тянь-Шаня

С.Х.Зарипова, А.Э.Гаврилов

*Второе издание. Первая публикация в 2015**

На перевале Чокпак (предгорья Западного Тянь-Шаня) встречается 4 вида горлиц: кольчатая *Streptopelia decaocto*, обыкновенная *S. turtur*, большая *S. orientalis* и малая, или египетская *S. senegalensis*. Всего в августе-октябре 1966-2012 годов во время визуальных учётов встречены 4086, стационарными ловушками отловлены 4238 и, кроме того, добыты 1743 горлицы. Наибольшая численность отмечена у большой горлицы (окольцованы 3863, учтены 3793, добыты 1614 особи), которая составила 92.1% от общего числа зарегистрированных горлиц. Число отмеченных обыкновенных горлиц (окольцованы 320, учтены 232 и добыты 106) оказалось гораздо ниже и составило 6.5%. Малая и кольчатая горлицы составили всего по 0.7% от общего числа горлиц.

Начало осенних подвижек отмечено в августе. На перевале первых больших и обыкновенных горлиц регистрировали во время визуальных учётов 15 августа. Малую горлицу отмечали 20 августа, а кольчатую – 28 августа. В среднем первыми начинают мигрировать обыкновенные горлицы, затем большие и кольчатые, последними – малые. Срединные даты их пролёта, в порядке перечисления видов – 8 сентября, 15 сентября, 22 сентября и 5 октября.

Взрослые птицы всех видов горлиц мигрируют несколько раньше молодых. Наиболее значимые различия отмечены между срединными датами пролёта взрослых (7 сентября) и молодых (12 сентября) особей обыкновенной и малой (3 и 10 октября, соответственно) горлиц. У большой горлицы эти различия (15 и 17 сентября) незначительны. Взрослых кольчатых горлиц отлавливали 5 августа (2 особи), 17 августа (3) и 25 августа (6), а одиночных молодых – 15 сентября и 20 октября.

По данным возвратов колец выяснено, что через перевал Чокпак мигрируют обыкновенные горлицы, гнездящиеся в Киргизии и Казахстане, большие горлицы – из Западной Сибири и Казахстана. Для кольчатой и малой горлиц характерны перемещения на небольшие

* Зарипова С.Х., Гаврилов А.Э. 2015. Особенности осеннего пролёта горлиц на перевале Чокпак (Шак-пак) в предгорьях Западного Тянь-Шаня // *14-я Международ. орнитол. конф. Северной Евразии. 1. Тезисы.* Алматы: 198-199.

расстояния (до 200 км), но тем не менее их осеннее движение на перевале Чокпак имеет хорошо выраженный характер.

Выявленные различия в сроках миграции данных видов горлиц и их возрастных групп через перевал Чокпак связаны, на наш взгляд, с пролётом (или кочёвкой) одной (у малой и кольчатой) или нескольких (у большой и обыкновенной горлиц) популяций. Незначительные различия пролёта взрослых и молодых особей большой горлицы, вероятно, связаны с прохождением через перевал как минимум трёх популяций, населяющих территории Казахстана, Киргизии и России, сроки миграций которых накладываются друг на друга.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1264**: 1027*

Встречи некоторых редких видов птиц в Среднем Приднепровье

А.А.Матус

*Второе издание. Первая публикация в 2002**

Gavia arctica. 22 июня 1999 одна кочующая чернозобая гагара в течение нескольких часов кормилась на Днепре возле усадьбы Каневского заповедника (Черкасская область).

Ciconia nigra. 29 июля 2000 наблюдалась группа из 2 взрослых и 3 молодых чёрных аистов во внутреннем заливе острова Круглик в Каневском заповеднике.

Stercorarius longicaudus. Один взрослый длиннохвостый поморник наблюдался 17 декабря 2001 в районе парка «Дубовая роща» в городе Запорожье в стае чаек-хохотуний *Larus cachinnans*, летящих с кормёжки.

Larus ichthyaetus. 2 июня 2001 черноголовый хохотун отмечен вместе с хохотуньями на трупе толстолобика в верхней части острова Круглик (Каневский заповедник).

Emberiza aureola. 12-16 мая 2002 поющий самец дубровника наблюдался в Лесном массиве в городе Киеве, впоследствии исчез.

* Матус А.А. 2002. Встречи некоторых редких видов птиц в Среднем Приднепровье // *Беркут* **11**, 1: 26.