ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2016
XXV

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1305

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXV

Экспресс-выпуск • Express-issue

2016 № 1305

СОДЕРЖАНИЕ

2389-2395 Обнаружение орлана-долгохвоста *Haliaeetus leucoryphus* на гнездовании в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области весной 2016 года. М.Л.ОПАРИН, О.С.ОПАРИНА, А.Б.МАМАЕВ, О.А.РУБАН

2396-2399 Первая находка гнезда горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* в Изваре (Волосовский район Ленинградской области). И.В.СТАСЮК

2399-2401 Интересные встречи птиц в окрестностях города Тайынша. М.В.СОРОЧИНСКИЙ

2401-2406 О тенденциях изменения численности некоторых видов птиц в фауне Бобровского Прибитюжья. А.Ю.СОКОЛОВ

2406-2415 Новые и редкие птицы юго-западной части Ростовской области. Б.А.КАЗАКОВ

2415-2419 Гнездование некоторых видов водоплавающих птиц в северной части острова Вайгач и на близлежащих островах. Т.С.ПОНОМАРЁВА

2419 О зимовке вяхиря *Columba palumbus* на юго-востоке Казахстана. И.А.БЕВЗА

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2016
Дата опубликования: 6 июня 2016

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXV
Express-issue

2016 № 1305

CONTENTS

2389-2395 Discovery of the Pallas's fish eagle *Haliaeetus leucoryphus* nesting in Bokey Orda Raion of West Kazakhstan Oblast in the spring of 2016. M. L. OPARIN, O.S. OPARINA, A.B. MAMAEV, O.A. RUBAN

2396-2399 The first nesting record of the black redstart *Phoenicurus ochruros* in Izvara (Volosovsky Raion of Leningrad Oblast). I.V. STASYUK

2399-2401 Interesting meetings birds in and around Taiynsha. M.V. SOROCHINSKY

2401-2406 On tendencies of number changes in some birds species in Bobrovsky Pribityugje's fauna. A. Yu. SOKOLOV

2406-2415 New and rare birds of south-western part of the Rostov Oblast. B. A. KAZAKOV

2415-2419 Nesting of some waterfowl species in the north part of the island of Vaigach and on the neighboring islands. T.S. PONOMAREVA

2419 About wintering of the wood pigeon *Columba palumbus* in the south-east of Kazakhstan. I.A. BEVZA

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2016

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск ***1305****: 2389-2395*

Обнаружение орлана-долгохвоста *Haliaeetus leucoryphus* на гнездовании в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области весной 2016 года

М.Л.Опарин, О.С.Опарина, А.Б.Мамаев, О.А.Рубан

Михаил Львович Опарин, *Ольга Сергеевна Опарина*, *Асхат Борисович Мамаев*, *Олег Александрович Рубан*. Саратовский филиал Института проблем экологии и эволюции РАН (СФ ИПЭЭ РАН), ул. Рабочая, д. 24, Саратов, 410028, Россия. E-mail: oparinml@mail.ru

Поступила в редакцию 4 июня 2016

В 2016 году в ходе экспедиционных работ на территории Западно-Казахстанской области республики Казахстан мы обнаружили 14 мая гнездящуюся пару орланов-долгохвостов *Haliaeetus leucoryphus* (Pallas, 1771) в 30 км от посёлка Бисен Бокейординского района на склоне балки, впадающей в озеро Аралсор у сухого пруда (рис. 1, 2). В 2014 году мы устраивали стоянку в том же месте в это же время, но кроме степных орлов *Aquila nipalensis* и курганников *Buteo rufinus* никаких других крупных хищных птиц не встречали. Гнездо орланов-долгохвостов располагалось в 120 м от нашего лагеря на дереве лоха в 3.5-4.0 м над землёй (рис. 3, 4). По балке на протяжении 200 м росли редко расположенные деревья лоха.

Вид на озеро Аралсор в окрестностях гнезда орлана-белохвоста. 15 мая 2016.

Рис. 2. Степь с пасущимися сайгаками *Saiga tatarica*
в окрестностях гнезда орлана-долгохвоста. 15 мая 2016.

Рис. 3. Гнездо орлана-долгохвоста *Haliaeetus leucoryphus* на дереве лоха. 18 мая 2016.

Мы проработали на этой стоянке до 20 мая, самка орлана-долгохвоста практически все время находилась в гнезде (рис. 5), а самец постоянно кружил над степью и периодически присаживался на гнездо, принося самке корм.

Рис. 4. Гнездо орлана-долгохвоста *Haliaeetus leucoryphus* на дереве лоха. 17 и 18 мая 2016.

Рис. 5. Самка орлана-долгохвоста *Haliaeetus leucoryphus* на гнезде. 17 мая 2016.

Рис. 6. Орланы-долгохвосты *Haliaeetus leucoryphus* в полёте у гнезда. 17 мая 2016.

Поблизости от места нашей стоянки жилых летовок и зимовок животноводов не было, но по степи бродили табунки лошадей и небольшие стада коров. В 2016 году в окрестностях были многочисленными малые суслики *Spermophilus pygmaeus*. Следует отметить, что обычные здесь в холодный период года стада сайгаков *Saiga tatarica* ко времени нашего приезда уже откочевали к северу в район российско-казахстанской границы. За всё время наших экскурсий мы видели лишь 4 самцов этого вида (рис. 2). Следует отметить, что зайцы весной этого года были в степи весьма обычными, часто встречались огари *Tadorna ferruginea*, реже пеганки *Tadorna tadorna*. Таким образом, кормовая база в районе гнездования пары орланов-долгохвостов была достаточно обильной. Следует отметит, что Горькая речка, впадающая в Аралсор, и в которой водится рыба, находится в пределах гнездовой территории обнаруженной нами пары долгохвостов.

Рис. 7. Орлан-долгохвост *Haliaeetus leucoryphus* при заходе на гнездо. 17 мая 2016.

Нам удалось сделать фотографии, которые позволяют подтвердить видовую принадлежность птиц (рис. 5-8). К гнезду мы не приближались, чтобы не спугнуть птиц, но по всем признакам, самка сидела на яйцах. Удалось сделать снимки самки, сидящей на гнезде (рис. 5).

Следует отметить, что в последние десятилетия данных по гнездованию орлана-долгохвоста в Волго-Уральском междуречье нет. Низкую

численность этого вида в Казахстане в 1950-е годы отмечает И.А.Долгушин (1962). О немногочисленности и спорадичности распространения этого орлана пишет Г.П.Дементьев (1951). Не упоминается о гнездовании долгохвоста и в монографии Г.В.Линдемана с соавторами (2005), работавшими на этой территории с 1950-х по 2000-е годы.

Рис. 8. Орлан-долгохвост *Haliaeetus leucoryphus*, сидящий на земле в степи в окрестностях гнезда. 18 мая 2016.

И.Б.Волчанецкий и Н.П.Яльцев (1934) и И.Б.Волчанецкий (1937) отмечают, что в конце 1920-х – начале 1930-х годов гнездящиеся пары орланов-долгохвостов встречались по реке Еруслан на участке от села Салтово до станции Гмелинка, также обычны эти птицы были по Узеням и на Камыш-Самарских озёрах, где встречались парами, выводками и одиночками. По данным Н.П.Дубинина (1953), в 1949-1953 годах в долине реки Урал летом бродячие орланы-долгохвосты были обычными по всему нижнему течению реки и встречались как по одиночке, так и скоплениями до нескольких десятков особей.

По данным В.Л.Шевченко (1978), в конце 1950-х – начале 1970-х годов численность орлана-долгохвоста резко сократилась, и он редко встречался по Уралу и крайне редко в разных местах междуречья.

Г.В.Линдеман с соавторами (2005) приводят данные о том, что они встречали одиночных орланов-долгохвостов в конце сентября – октябре в окрестностях озера Эльтон в 1958, 1964, 1978, 1981 и 1982 годах. Ле-

том одиночные птицы были встречены ими в июне 1968 года близ озера Соркуль в 90 км восточнее посёлка Джанибек, в августе 1976 года – в лесонасаждениях Джанибекского стационара. В июне 1977 года в 30 км к северо-востоку от Джанибека найден долгохвост, погибший на линии электропередачи. Эти же авторы сообщают, что на многочисленных маршрутах в других частях междуречья и в долине реки Урал от Уральска до Гурьева орлан-долгохвост встретился им лишь однажды, 5 сентября 1981, в долине Урала у посёлка Кушум. По одной птице этого вида они встретили на берегах Эмбы в её нижнем течении 4 и 5 июля 1991.

Таким образом, сведения о гнездовании орлана-долгохвоста в степях и полупустынях Волжско-Уральского междуречья известны лишь для конца 1920-х и начала 1930-х годов (Волчанецкий, Яльцев 1934; Волчанецкий 1937). Серьёзные исследователи, работавшие на этой территории с конца 1940-х годов по настоящее время ни разу не наблюдали ни гнездовых пар, ни выводков орлана-долгохвоста (Дубинин 1953; Шевченко и др. 1978; Линдеман и др. 2005). Наша встреча гнездящихся орланов-долгохвостов является единственной за последние 70 лет для Волго-Уральского междуречья.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант 16-05-00488

Литература

Волчанецкий И.Б. 1937. К орнитофауне Волжско-Уральской степи // *Тр. Науч.-исслед. зоол.-биол. ин-та Харьков. ун-та* **4**: 21-81.

Волчанецкий И.Б., Яльцев Н.П. 1934. К орнитофауне Приерусланской степи АССР НП // *Учён. зап. Сарат. ун-та* **11**, 1: 63-93.

Гаврин В.Ф., Долгушин И.А., Корелов М.Н., Кузьмина М.А. 1962. *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **2**: 1-780.

Дементьев Г.П. 1951. Отряд хищные птицы Acipitres или Falconiformes // *Птицы Советского Союза*. М., **1**: 70-341.

Дубинин Н.П. 1953. Птицы лесов нижней части долины р. Урал. Ч. 1 // *Тр. Ин-та леса АН СССР* **18**: 1-127.

Линдеман Г.В., Абатуров Б.Д., Быков А.В., Лопушков В.А. 2005. *Динамика населения позвоночных животных Заволжской полупустыни*. М.: 1-252.

Шевченко В.Л., Гаврилов Э.И., Наглов В.А., Федосенко А.К., Татаринова О.М. 1978. Об орнитофауне Волжско-Уральского междуречья (хищные птицы и совы) // *Тр. Ин-та зоол. АН КазССР* **38**: 99-114.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск ***1305****: 2396-2399*

Первая находка гнезда горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* в Изваре (Волосовский район Ленинградской области)

И.В.Стасюк

Иван Вадимович Стасюк. Музей-усадьба Н.К.Рериха, деревня Извара,
Волосовский район, Ленинградская область, 188414, Россия. E-mail: norroendrengr@mail.ru

Поступила в редакцию 5 июня 2016

Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* сравнительно недавно начала заселять Северо-Запад России. В Ленинградской области она впервые зарегистрирована в 1984 году, когда был отловлен годовалый самец во время кольцевании птиц на орнитологической станции Ленинградского университета в урочище Гумбарицы на юго-восточном берегу Ладожского озера (Иовченко, Носков 2005). На гнездовании она впервые обнаружена в 2006 году у южного берега Финского залива в окрестностях железнодорожной станции Бронка и в посёлке Бронна (Савинич 2010).

Рис. 1. Самец горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros*. Форелевая башня, Извара. Волосовский район Ленинградской области. 5 июня 2016. Фото автора.

В соседней Псковской области горихвостка-чернушка была впервые найдена на гнездовании в 2000 году в Пскове и у деревни Велье в Печорском районе (Струкова 2000; Бардин 2000), а в 2002 году установлено её гнездование на юго-западе области (Фетисов 2002). С тех пор

Рис. 2. Заброшенная Форелевая башня в деревне Извара. Стрелкой показано окно, через которое горихвостки-чернушки залетали в помещение, где находилось их гнездо. 5 июня 2016. Фото автора.

Рис. 3. Слёток горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros*. Извара. 5 июня 2016. Фото автора.

чернушка становится всё более обычной птицей и в Псковской области (Фетисов 2008; Бардин 2013, 2015), и в Ленинградской (Богуславский 2010; Иовченко, Занин 2010; Храбрый 2015). Однако на территории памятника природы «Музей-усадьба Н.К.Рериха» в деревне Извара (Волосовский район Ленинградской области) горихвостка-чернушка до настоящего времени не наблюдалась (Бардин, Стасюк 2014).

5 июня 2016 в Изваре мною обнаружены гнездо и выводок горихвостки-чернушки в заброшенной Форелевой башне на берегу родникового озера, из которого берёт начало речка Изварка, образующая при слиянии с речкой Чёрной реку Лемовжу (см. рисунки).

Рис. 4. Самец горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* с кормом для птенцов. Форелевая башня, Извара. 5 июня 2016. Фото автора.

Это гнездо располагалось в заброшенном здании Форелевой башни на берегу родникового озера, внутри пустующей заколоченной комнаты первого этажа. Птицы проникали внутрь через зарешеченное окно, не имеющее стёкол. Удалось сфотографировать одного слётка, вспархивавшего на оконную решётку (рис. 3). Ещё несколько слётков прятались в тёмном углу на полу комнаты, громко призывая родителей. Самец и самка кормили выводок, влетая и вылетая в окна здания (рис. 4).

Литература

Бардин А.В. 2000. Вторая находка горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* на гнездовании в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **9** (126): 20-22.

Бардин А.В. 2013. Ещё о горихвостке-чернушке *Phoenicurus ochruros* в городе Печоры Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **22** (930): 2865-2868.

Бардин А.В. 2015. О горихвостке-чернушке *Phoenicurus ochruros* в городе Печоры в 2015 году // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1217): 4214-4215.

Бардин А.В., Стасюк И.В. 2014. Птицы Извары и её окрестностей // *Извара – памятник природы, истории, культуры*. СПб.: 125-134.
Богуславский А.В. 2010. Встречи горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* в Старой Ладоге и Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн*. **19** (548): 221.
Иовченко Н.П., Занин С.Л. 2010. Первые находки горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* (S. G. Gmelin, 1774) на гнездовании в Санкт-Петербурге // *Поволжский экол. журн*. **3**: 331-336.
Иовченко Н.П., Носков Г.А. 2005. Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* (Gm.) в Ленинградской области // *Орнитологические исследования в Приладожье*. СПб.: 205-222.
Савинич И.Б. 2010. Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* гнездится в окрестностях Санкт-Петербурга // *Рус. орнитол. журн*. **19** (547): 183-184.
Струкова О.А. 2000. Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* — новый гнездящийся вид Псковской области // Рус. орнитол. журн. **9** (111): 19-20.
Фетисов С.А. 2002. Новый случай размножения горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн*. **11** (185): 463-465.
Фетисов С.А. 2008. Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн*. **17** (399): 191-196.
Храбрый В.М. 2015. *Птицы Петербурга*. СПб.: 1- 463.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1305**: 2399-2401*

Интересные встречи птиц в окрестностях города Тайынша

М.В.Сорочинский

Максим Викторович Сорочинский. Северо-Казахстанское областное музейное объединение, ул. Конституции Казахстана, д. 48, Петропавловск, 150000, Казахстан.
E-mail: max_car-man.kbsk@mail.ru

Поступила в редакцию 3 июня 2016

Приведены данные о некоторых птицах, встреченных в городе Тайынша и на его окраинах. Часть видов заслуживают особого внимания как включённые в Красные книги России и Казахстана. Информация по некоторым видам представляет интерес в связи с вопросом об изменении границ ареалов.

Phalacrocorax carbo. 6 августа 2008 над накопителем сточных вод (котлованом) севернее Тайынши наблюдался один баклан. Он несколько раз облетел водоём и улетел в восточном направлении.

Casmerodius albus. 21 июля 2011 на котловане около 21 ч отдыхали две большие белые цапли.

Aythya nyroca. 30 апреля 2010 на временном разливе севернее накопителя наблюдались 2 белоглазых нырка (Сорочинский 2016).

Circus macrourus. Самец степного луня был встречен 1 мая 2008 у временного разлива южнее котлована (Сорочинский и др. 2008). 10 мая 2009 самец наблюдался на водоёме-накопителе. 30 апреля 2010 в посадках около котлована учтены 2 птицы. 10 мая 2010 самец наблюдался на котловане. 26 мая 2010 там же обнаружены 2 гнезда. Первое, с 6 яйцами, найдено в восточной части котлована в зарослях бурьяна, в 5 м от воды, на земле. Основной строительный материал гнезда состоял их сухих стеблей бурьяна и соломин злаков. Второе, с 7 яйцами, располагалось в западной части водоёма на заломе камыша. Гнездо располагалось приблизительно в 4 м от воды и было сделано из сухих стеблей камыша. Расстояние между гнёздами около 200 м. Во время посещения котлована 17 июня 2010 в «восточном» гнезде было 5 птенцов. «Западное» гнездо оказалось пустым. Вероятно, оно разорено бродячими собаками.

5 мая 2012 на водоёме-накопителе замечена 1 самка степного луня. 8 мая 2012 на котловане наблюдался 1 самец. 22 мая 2016 там же были учтены самец и самка. Самка с добычей (мелким грызуном) кружила над зарослями камыша в южной части котлована. Самец с криками летал неподалёку. Скорее всего, там находилось гнездо. Однако из-за затопления подойти к этому месту было невозможно.

Gallinula chloropus. 6 августа 2009 на водоёме-накопителе наблюдалась одна камышница. Птица выскочила из зарослей камыша, пробежала в 5 м от наблюдателя по мелководному плёсу и скрылась в более густых камышовых крепях.

Recurvirostra avosetta. До значительного зарастания котлована (примерно до 2009 года) шилоклювка регистрировалась в учётах. Так, 13 июня 2005 на котловане были учтены 2 птицы. 15 мая 2008 наблюдались 8 птиц, кормившихся на временном разливе южнее котлована. В тот же день 3 птицы учтены на самом котловане. 6 июля 2008 на указанном выше разливе встречены 8 птиц, вероятно, те же, что были учтены 15 мая (Сорочинский и др. 2008). С тех пор шилоклювок на изучаемой территории не наблюдали.

Xenus cinereus. 24 мая 2009 на котловане отдыхали 3 мородунки. 14 июля 2011 там же наблюдалась 1 особь.

Lymnocryptes minimus. 5 мая 2012 на северной стороне котлована из низкого злакового разнотравья был поднят гаршнеп. Птица молча вылетела из-под ног и, пролетев метров 30, вновь скрылась в траве.

Streptopelia decaocto. Впервые на территории Тайынши кольчатая горлица отмечена в 1998 году (Березовиков, Ерохов 2000). Последующие достоверные встречи с ней зарегистрированы уже в 2000-х годах. Так, в 2011 году 3 птицы встречены в городе, в 2012 по 2 особи замечены 13 января (!) (Сорочинский 2012) и 9 июня на территории города. 11 августа 2014 на котловане были учтены 2 птицы.

Athene noctua. 7 июля 2008 один домовый сыч наблюдался мной в полуразрушенном здании на территории города (Сорочинский и др. 2008). Встреча произошла около полудня. Сыч спокойно сидел в нише между несущей балкой и стеной на высоте около 6 м, не проявляя беспокойства, и смотрел на наблюдателя. Встреча представляет интерес для вопроса о современном распространении домового сыча, причём, по новым данным, подвида *A. n. noctua* (Тарасов 2011).

Lanius collurio. 11 августа 2014 в акациевой посадке севернее водоёма-накопителя наблюдались 2 обыкновенных жулана. 22 мая 2016 в той же посадке была замечена одна особь.

Lanius excubitor. 14 октября 2012 одиночный серый сорокопут наблюдался в кленовой посадке севернее котлована.

Литература

Березовиков Н.Н., Ерохов С.Н. 2000. Фаунистические заметки о птицах Северо-Казахстанской области // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 24-33.

Сорочинский М.В. 2012. Зимняя встреча кольчатой горлицы в СКО // Газ. Общ-ва любителей птиц «Ремез» **28**: 3.

Сорочинский М.В. 2016. Гусеобразные Anseriformes окрестностей города Тайынша // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1301): 1705-1707.

Сорочинский М.В., Вилков В.С., Губин С.В. 2008. Орнитофауна окрестностей г. Тайынша Северо-Казахстанской области // *Каз. орнитол. бюл.:* 124-127.

Тарасов В.В. 2011. Распространение домового сыча в Западной Сибири // *Вестн. Оренбург. ун-та* 5 (124): 93-95.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1305**: 2401-2406*

О тенденциях изменения численности некоторых видов птиц в фауне Бобровского Прибитюжья

А.Ю.Соколов

*Второе издание. Первая публикация в 2005**

Регулярные наблюдения в течение последних 15 лет на территории Бобровского Прибитюжья Воронежской области (включая Хреновской бор) позволяют судить о тенденциях изменения численности некоторых гнездящихся видов птиц этого региона.

Большая белая цапля *Casmerodius albus*. Залёты одиночных птиц в Прибитюжье отмечались с 1980-х годов (Соколов 1999а). В 1997 году

* Соколов А.Ю. 2005. О тенденциях изменения численности некоторых видов птиц в фауне Бобровского Прибитюжья // *Стрепет* **3**, 1/2: 51-56.

в окрестностях города Боброва впервые зарегистрировано гнездование 2 пар (Соколов, Простаков 1997). В настоящее время большая белая цапля стала встречаться на территории Бобровского района значительно чаще – как в поймах рек, так и на искусственных водоёмах. Летом 2004 года 1-2 пары, вероятно, гнездились в пойме реки Битюг в окрестностях села Старая Чигла, на границе Аннинского и Бобровского районов Воронежской области. В августе 2005 года предположительно выводки отмечены в пойме реки Битюг в окрестностях посёлка Дугинка (11 августа 2005 – 8 птиц) и в пойме реки Икорец в окрестностях села Юдановка (18 августа 2005 – 6 птиц).

Огарь *Tadorna ferruginea*. По данным Н.А.Северцова (1950), в середине XIX века огарь был довольно обычным обитателем Воронежской губернии. И.И.Барабаш-Никифоров и Л.Л.Семаго (1963) для Бобровского района этот вид не приводят, указывая на его редкость для всей Воронежской области. С 1998 года огари (как одиночные птицы, так и пары) стали ежегодно отмечаться на территории Бобровского района (Соколов и др. 1998). Подавляющее большинство встреч приурочено к району, в котором имеется небольшая колония сурков. Однако достоверные случаи гнездования пока не известны.

Большой подорлик *Aquila clanga*. С 1987 по 1997 год в пойме реки Битюг (в окрестностях Хреновского бора) регулярно гнездились 2-3 пары (Соколов 1999а; Соболев и др. 1999), но при обследовании этой территории в 1998 году не было отмечено ни одной пары. Одной из причин снижения численности явилось, по-видимому, вытеснение подорликов с гнездовых территорий орланом-белохвостом *Haliaeetus albicilla*, появившимся на гнездовании в Прибитюжье в 1997 году (Соколов, Простаков 1997; Соколов 1999б). Однако летом 2004 года удалось выявить 2 гнездовых участка больших подорликов у северной и южной границ Хреновского бора, в непосредственной близости от поймы реки Битюг. В 2005 году был обнаружен ещё один вероятный гнездовой участок этого орла в пойменном лесу в окрестностях села Шестаково Бобровского района. Таким образом, можно говорить о некотором восстановлении численности вида в Бобровском Прибитюжье.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Длительное время этот вид в Прибитюжье не гнездился. Вновь гнездование отмечено в 1997 году (Соколов, Простаков 1997). Помимо гнездящейся пары, здесь постоянно держались 2-3 неполовозрелые птицы. С 2004 года в пойме реки Битюг на территории Бобровского района известно 2 гнездовых участка. Количество неразмножающихся орланов, обитающих в данном районе, составляет 4-5 особей. В зимнее время оно может увеличиваться за счёт птиц, прикочёвывающих из более северных районов.

Чеглок *Falco subbuteo*. Специальных учётов численности данного вида в Прибитюжье (в том числе и на территории Хреновского бора) не

проводилось, однако визуально было отмечено её значительное снижение, проявившееся в конце 1990-х годов. Состояние населяемых чеглоком биотопов и его кормовой базы, а также численность основных «поставщиков» гнёзд – ворона *Corvus corax*, канюка *Buteo buteo*, чёрного коршуна *Milvus migrans* и других видов существенным образом не изменились. Возможной причиной является увеличение численности тетеревятника *Accipiter gentilis* в лесах Прибитюжья, что рассматривается, в частности, как возможный фактор влияния на популяции таких птиц, как европейский тювик *Accipiter brevipes*, обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus* и некоторых других видов (Белик 2003).

Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus*. Примерно в то же время, что и у чеглока, снижение численности отмечено и у пустельги. Раньше этот сокол был довольно обычен на гнездовании в полезащитных лесополосах (в старовозрастных насаждениях плотность составляла 0.8-1.4 пары на 10 км лесополос). Реже отмечалось гнездование в других биотопах (например, на окраине пойменной дубравы на левобережье реки Битюг в 1988 году). В 1995 году при сборе оологического материала по сороке *Pica pica* попутно приходилось сталкиваться и с гнёздами пустельги. Тогда её численность ещё оставалась на прежнем уровне, но затем произошло резкое снижение. Сейчас в прежних местах обитания случаи гнездования единичны, хотя южнее и юго-восточнее Бобровского района пустельга встречается несколько чаще.

Клинтух *Columba oenas*. Ещё в конце 1980-х годов гнездился в Хреновском бору, но уже в начале 1990-х годов подтвердить его гнездование не удалось. В течение примерно 10 лет были известны встречи клинтухов только во время пролёта. В 2004 году гнездование предполагалось в нагорной дубраве в окрестностях села Старая Чигла Аннинского района. В июне 2005 года явно местные птицы неоднократно наблюдались в пойме реки Битюг в окрестностях посёлка Николо-Варваринка и села Пчелиновка Бобровского района. Там же 13 августа 2005 встречены выводки. Вероятной причиной исчезновения клинтуха в данном районе в конце XX века могли стать активные рубки дуба (в том числе и дуплистых деревьев, необходимых для гнездования этого голубя). В Прибитюжье в это же время перестал гнездиться и другой дуплогнездник – сизоворонка *Coracias garrulus*. Появлению вида на гнездовании в настоящее время могло способствовать расселение по долине Битюга желны *Dryocopus martius*, чьи дупла, по данным многих авторов (Мальчевский, Пукинский 1983; Никифоров и др. 1989; Котов 1993), клинтух охотно занимает.

Желна *Dryocopus martius*. Первые встречи в Хреновском бору регистрировали в конце 1970-х – начале 1980-х годов (Нумеров 1996; Турчин и др. 1999). Неоднократно этого дятла отмечали здесь в начале 1990-х годов (Соколов 1999). Факт гнездования впервые был установ-

лен в 1991 году (Барышников 2001а). Расширение гнездового ареала шло, по всей видимости, с востока. Об этом могут свидетельствовать несколько фактов: во-первых, летом 1988 года в ходе экспедиции по реке Хопер в его пойме на границе Саратовской и Воронежской областей неоднократно отмечались гнездящиеся пары. Во-вторых, более позднее (в 1997 году) появление желны на гнездовании в Усманском бору – более северном, чем Хреновской (Венгеров, Лихацкий 1999; Нумеров, Венгеров 1999). Наконец, 28 октября 1989 желна была встречена в лесополосе на территории практически безлесного Таловского района Воронежской области (примерно в 12 км западнее посёлка Таловая), что в какой-то степени может служить иллюстрацией пути проникновения чёрного дятла в Хреновской бор и Прибитюжье. В 1996 году гнездование желны было отмечено в пойме реки Битюг в окрестностях села Пчелиновка Бобровского района, что примерно на 40 км юго-западнее места обнаружения первого гнезда в 1991 году. В настоящее время желна населяет преимущественно пойменные леса Прибитюжья, в меньшей степени – участки лиственного леса в Хреновском бору.

Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus*. Первая достоверная встреча в Прибитюжье имела место в 1991 году (Барышников 2001б), однако длительное время заметного увеличения численности не наблюдалось. В 2004 году на территории города Боброва зафиксировано гнездование 2 пар сирийского дятла: у одной 7 июля 2004 отмечено кормление вылетевшего выводка, судьбу второй пары проследить не удалось (Соколов 2004). В марте 2005 года на обоих прошлогодних гнездовых участках вновь было отмечено токование, а позже – и гнездование. Кроме того, 21 апреля 2005 в пойме реки Битюг, фактически на окраине Боброва, встречена ещё одна пара, проявлявшая выраженное территориальное поведение. Встречи сирийского дятла в осенне-зимнее время на территории города Боброва носят регулярный характер; вне населённого пункта данный вид не отмечался.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata*. В Бобровском районе впервые отмечен в 1996 году (Соколов, Простаков 1997). В дальнейшем находки гнездящихся пар регистрировались неоднократно в различных местах (Соколов 2000). На данный момент известно по крайней мере 6 таких точек. Везде черноголовый чекан населяет сходные биотопы – пустыри, залежи, днища балок с участками густой поросли сорняков (крапивы, лопуха, циклахены дурнишниколистной *Cyclachaena xanthiifolia)*. В окрестностях Боброва гнездовые участки двух пар в 2004 году находились в 600-700 м один от другого.

Ополовник *Aegithalos caudatus*. В Бобровском Прибитюжье ополовник зарегистрирован на гнездовании в 1998 году (Соколов и др. 1999). Особенно активный рост численности гнездящихся птиц отме-

чен в 2004-2005 годах. В частности, 9 апреля 2005 наблюдалось гнездостроение в небольшом пойменном ивняке практически на окраине города Боброва. В период с 29 мая по 28 июня 2005 в пойме реки Битюг и на окраинах Хреновского бора встречено 5 выводков длиннохвостых синиц (в 2 км севернее Боброва в урочище Сиротина роща, в окрестностях посёлков Дугинка, Лушниковка и села Шестаково Бобровского района). Помимо этого, гнездование предполагалось в полезащитной лесополосе вдоль трассы Бобров – Верхний Икорец.

Просянка *Miliaria calandra*. Достоверные случаи гнездования на территории Бобровского Прибитюжья в последние 25-30 лет не регистрировались. С 2003 года в южных районах Воронежской области отмечено повышение численности этого вида (Венгеров 2004). Самец, по всем признакам из гнездящейся пары, наблюдался 2 июля 2004 на пойменном лугу в месте слияния рек Чигла и Битюг, на границе Аннинского и Бобровского районов Воронежской области (Соколов 2004). 10 июня 2005 территориальный самец просянки встречен в пойме реки Битюг на днище балки в 2-2.5 км юго-восточнее села Липовка Бобровского района.

Литература

Барабаш-Никифоров И.И., Семаго Л.Л. 1963. *Птицы юго-востока Чернозёмного центра*. Воронеж: 1-210.

Барышников Н.Д. (2001а) 2006. Гнездование желны *Dryocopus martius* в Хреновском бору (Воронежская область) // *Рус. орнитол. журн.* **15** (316): 395.

Барышников Н.Д. 2001б. Сирийский дятел – новый гнездящийся вид Воронежской области // *Орнитология* **29**: 282.

Белик В.П. 2003. Хищничество тетеревятника и его роль в биоценозах // *Ястреб-тетеревятник: Место в экосистемах России*. Пенза; Ростов-на-Дону: 146-168.

Венгеров П.Д. 2004. Динамика популяции просянки (*Emberiza calandra* L.) в Воронежской области и о необходимости внесения её в региональную Красную книгу // *Материалы раб. совещ. по проблемам ведения региональных Красных книг*. Липецк: 99-103.

Венгеров П.Д., Лихацкий Ю.П. 1999. Состояние некоторых редких для Центрального Черноземья видов птиц в Воронежском заповеднике // *Редкие виды птиц и ценные орнитологические территории Центрального Черноземья*. Липецк: 76.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 1-480.

Котов А.А. 1993. Клинтух // *Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Совообразные*. М.: 65-69.

Никифоров М.Е., Яминский Б.В., Шкляров Л.П., 1989. *Птицы Белоруссии*. Минск: 1-479.

Нумеров А.Д. 1996. Класс Птицы Aves // *Природные ресурсы Воронежской области: Позвоночные животные. Кадастр*. Воронеж: 48-159.

Нумеров А.Д., Венгеров П.Д. 1999. Новые сведения по редким видам птиц ЦЧР // *Редкие виды птиц и ценные орнитологические территории Центрального Черноземья*. Липецк: 78.

Северцов Н.А. 1950. *Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии*. М.: 1-308.

Соболев С.Л., Турчин В.Г., Дудин П.И., Бережнов И.В. 1999. Некоторые редкие виды хищных птиц и сов Хреновского бора // *Редкие виды птиц и ценные орнитологические территории Центрального Черноземья*. Липецк: 55-59.

Соколов А.Ю. 1999а. Встречи редких видов птиц в Хреновском бору и на сопредельных территориях // *Редкие виды птиц и ценные орнитологические территории Центрального Черноземья*. Липецк: 60-63.

Соколов А.Ю. 1999б. Изменение численности европейского тювика, орлана- белохвоста и большого подорлика на территории Воронежской области // *3-я конф. по хищным птицам Вост. Европы и Сев. Азии*. Ставрополь, **2**: 144-146.

Соколов А.Ю. 2000. Об изменениях видового состава гнездящихся птиц Прибитюжья // *Эколого-фаунистические исследования в Центральном Черноземье и сопредельных территориях*. Липецк: 148-150.

Соколов А.Ю. 2004. Зоологические находки и встречи регионально редких видов позвоночных животных в поймах рек Дон и Битюг // *Материалы раб. совещ. по проблемам ведения региональных Красных книг*. Липецк: 155-158.

Соколов А.Ю., Простаков Н.И. 1997. Новые данные о встречах редких видов птиц в центральной части Прибитюжья // *Состояние и проблемы экосистем Среднего Подонья*. Воронеж, **10**: 45-47.

Соколов А.Ю., Простаков Н.И., Ерёмина Н.М. 1999. Новые данные о видах позвоночных животных, отмеченных в Хреновском бору и на сопредельных территориях // *Состояние и проблемы экосистем Среднерусской лесостепи*. Воронеж, **13**: 48-50.

Турчин В.Г., Соболев С.Л., Сотникова Е.И., Воробьёв И.И. 1999. Некоторые регионально редкие виды птиц долины р. Битюг // *Редкие виды птиц и ценные орнитологические территории Центрального Черноземья*. Липецк: 64-65.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1305**: 2406-2415*

Новые и редкие птицы юго-западной части Ростовской области

Б.А.Казаков

Второе издание. Первая публикация в 1976[*]

Исследуемая территория занимает юго-западную часть Ростовской области и располагается в основном к югу от низовий Дона и Западного Маныча. Необходимость авифаунистического исследования этой территории вызвана слабой изученностью местной авифауны. К тому же ландшафты исследуемой территории за последние десятилетия особенно сильно окультурены, что, безусловно, наложило отпечаток на всю фауну и авифауну в частности. Некоторые сведения по этому вопросу были опубликованы Н.К.Черниковым (1881), Г.Сарандинаки (1909), С.Н.Алфераки (1910), А.В.Лерхе (1940), Н.С.Олейниковым

[*] Казаков Б.А. 1976. Новые и редкие птицы юго-западной части Ростовской области // *Орнитология* **12**: 61-67.

(1953), Н.А.Рашкевичем (1957), А.С.Будниченко (1965), В.А.Миноранским (1962а,б), В.С.Петровым и В.А.Миноранским (1962), нами (Казаков 1960, 1962, 1966, 1967) и другими авторами.

Наши наблюдения и сборы проводились в течение ряда лет (1956-1968) на территории Неклиновского, Веселовского, Сальского и Пролетарского районов Ростовской области. За этот период собрано около 400 шкурок птиц. Кроме того, мы использовали некоторые материалы орнитологической коллекции кафедры зоологии Ростовского государственного университета. Определение подвидовой принадлежности упомянутых ниже птиц было осуществлено на материалах орнитологических коллекций Зоологического музея Московского государственного университета и Зоологического института Академии наук СССР.

Нет необходимости давать физико-географическую характеристику исследуемой территории. Она достаточно хорошо освещена в ряде специальных работ. Ниже мы приводим наблюдения по видам птиц, редко встречающимся, новым, некоторым обычным, характер распространения которых до сих пор не был выяснен на исследуемой территории.

Клинтух *Columba oenas*. Редко встречаемая на пролёте птица. 14 ноября 1959 три особи отмечены в дельте Дона, 19 апреля 1962 и 3 октября 1967 несколько птиц встречено в окрестностях станицы Пролетарской (Пролетарский район).

Вяхирь *Columba palumbus*. На пролёте многочислен, гнездится редко. Весенний пролёт вяхирей начинается в первой декаде апреля и продолжается до начала мая. Птицы летят стаями численностью 40-60 особей. В это время уже можно встретить токующих самцов и пары.

В летние месяцы токующие самцы и пары птиц встречены нами в Ленинском лесхозе (Азовский район). Там же найдено несколько гнёзд. Так, 24 мая 1961 в старом дубовом лесу на одном из клёнов второго яруса найдена сильно насиженная кладка. Это гнездо располагалось на высоте 4 м от земли. Постройка типична. В подобной же стации 8 и 13 июля 1959 найдено два гнезда, расположенных на дубах на высоте 8-10 м. В одном из них была сильно насиженная кладка, размеры яиц (n = 4): 42.0-41.0×30.6-29.2 мм. В другом гнезде ещё не было яиц, хотя самка сидела на гнезде. Характерно, что в двух последних гнёздах хорошо выражен неглубокий лоток с выстилкой из корешков какого-то растения. На расстоянии 15-30 м от гнёзд вяхирей найдены гнёзда чеглока *Falco subbuteo*, коршуна *Milvus migrans* и пустельги *Falco tinnunculus* с кладками и птенцами.

Осенний пролёт вяхирей начинается здесь в третьей декаде августа и продолжается до середины октября. Массовый пролёт приходится на вторую и третью декады сентября. Осенью в стаях насчитывается от 5 до 200 иногда и более особей, но чаще всего их количество колеблется в пределах от 20 до 60.

Серый журавль *Grus grus*. Редкая пролётная птица. Четыре журавля отмечены 28 апреля 1955 В.Э.Мартино (устн. сообщ.) в окрестностях станицы Егорлыкской (Целинский район), 29 особей – 10 апреля 1964 над Ростовом, 6 сентября 1961 и 6 апреля 1964 3 и 4 особи в окрестностях станицы Пролетарской.

Журавль-красавка *Anthropoides virgo*. Редкая пролётная птица. В юго-восточных районах области редко встречается на гнездовье (Петров, Миноранский 1962). Шесть особей этого вида отмечены нами 30 августа 1960 в окрестностях станицы Морской Чулек (Мясниковский район), 3 июня 1960 – 1 и 27 августа 1968 – 7 особей в окрестностях станицы Пролетарской. О случае гнездования пары красавок в окрестностях села Кулешовки (Азовский район) в 1966 году нам сообщил пастух А.И.Панченко. Птицы устроили гнездо в редком тростнике на сухой части луговины, граничащей со степью (пашня). Прогоняя здесь скот, он регулярно наблюдал за гнездом. 23 августа молодые и взрослые птицы навсегда покинули гнездовую территорию.

Дрофа *Otis tarda*. Редкая пролётная птица. Весенние продвижения дроф начинаются в третьей декаде марта (19 марта 1962 – Племовцесовхоз № 1, Пролетарский район; 28 марта 1967 – село Пчеловодное, Аксайский район) и продолжается до конца первой декады апреля. Птицы летят парами и небольшими стаями в восточном направлении. Встречены дрофы там же и в более поздние сроки – 22 апреля 1962 Н.А.Рашкевич (1957) указывает на гнездование этих птиц в молодых лесополосах Сальского района. Нами в летний период здесь дрофы не встречены. В южных районах области эти птицы зимуют. Так, в зимы 1962-1964 годов одиночные дрофы неоднократно были отмечены нами возле станицы Пролетарской, а 1 февраля 1965 – в окрестностях Ростова-на-Дону.

Стрепет *Tetrax tetrax*. Отмечен нами один раз, но за пределами исследуемой территории (хутор Гапкин, Константиновский район). По словам местных жителей, стрепет здесь гнездится.

Кречётка *Chettusia gregaria*. Одиночные особи отмечены В.Э.Мартино (устн. сообщ.) летом 1955 года в окрестностях станицы Егорлыкской; 4 птицы – 8 августа 1962 и 12 птиц 26 августа 1968 зарегистрированы нами в окрестностях станицы Пролетарской.

Камнешарка *Arenaria interpres*. Встречена нами 8 августа 1965 в окрестностях города Батайска.

Серый гусь *Anser anser*. Обычен, но не многочислен на пролётах в поймах Дона и Маныча. В прошлом довольно широко распространённый вид, в настоящее время на гнездовье стал большой редкостью. Некоторое увеличение его численности отмечает А.Гусев (1968) только в местах, где запрещена всякая охота. Микропопуляция серых гусей отмечена нами на озере Казинка (Пролетарский район), где, по сведе-

ниям Ф.Ф.Жолобова, начальника Казинского охотхозяйства, ежегодно гнездится 10-15 пар гусей. Гнёзда они устраивают на островах и реже на сплавинах. Откладывание яиц начинается в третьей декаде марта. Гнездовой период растянут. Так, в гнёздах, построенных на островах среди редкого тростника, 27 апреля 1962 из четырёх яиц вылупились три птенца, 30 апреля 1962 было 9 слабонасиженных яиц. В этот же день было отмечено два выводка с довольно крупными птенцами.

Выводки с лётными молодыми продолжают встречаться на «родных» водоёмах до наступления летне-осенней охоты на водоплавающих птиц. В первые же дни охоты серые гуси перелетают на хорошо охраняемые водоёмы на Маныче и в низовьях Дона. Например, в первые две утренние зори такой охоты в 1968 году (25-26 августа) мы учли на точечном стационаре в окрестностях станицы Пролетарской более 600 гусей, летевших на большой высоте вниз по Манычу. На охраняемых территориях эти птицы продолжают встречаться до отлёта. Так, в первой декаде октября 1967 года значительные скопления серых гусей отмечены нами на территории государственного заказника Калмыцкой АССР.

Пеганка *Tadorna tadorna*. Обычна, но не многочисленна в средней и восточных частях Веселовского, в западной части Пролетарского водохранилища (Петров, Миноранский 1962) и довольно обычна на озере Маныч-Гудило. Весенние продвижения этих птиц начинаются здесь в начале марта. Небольшие стаи встречаются на протяжении всего апреля. С конца марта и до конца апреля происходят брачные игры, образование и отделение пар. Гнездятся пеганки в норах лис (Казинское охотхозяйство), в старых карьерах (окрестности станицы Пролетарской), в обрывах по берегам водоёмов. Выводок с самкой встречен нами 12 мая 1962 в степи между озером и карьером (окрестности станицы Пролетарской). В конце августа, в сентябре там же отмечены стаи пеганок, состоящие из одного-двух выводков. Позже (октябрь 1961-1963) встречаются стаи из 150-200 и более особей.

Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus*. А.Г.Шехов (1956) и В.А.Миноранский (1962б) приводят этот вид для озера Маныч-Гудило. Нами пеликаны отмечены в 65 км западнее Чикалдинских островов, на озере Казинка в апреле и мае 1962-1963 годов. Там же в конце апреля 1963 года мы наблюдали три впервые загнездившиеся пары. В одном гнезде позже был один птенец. В летнее время мы нередко встречали пеликанов, кормившихся на Веселовском водохранилище значительно западнее станицы Пролетарской.

Колпица *Platalea leucorodia*. Редкая, спорадически гнездящаяся птица. Н.С.Олейников (1953) указывал на постоянное гнездование колпиц на некоторых водоёмах Маныча. Небольшие колонии этих птиц найдены А.И.Гончаровым (устн. сообщ.) весной 1958 года в окрестно-

стях хутора Тузлуково (Багаевский район). Позже, в 1961 году, они там не гнездились. Нам известно несколько колоний колпиц на озере Казинка, в каждой из которых насчитывалось 20-50 гнёзд. 30 апреля 1962 в колониях были гнёзда: со слабонасиженными кладками из 3-4 яиц, свежими кладками из 1-3 яиц, встречались пустые гнёзда, отмечены птицы, строящие гнезда. Гнёзда, столбообразные постройки из тростника высотой в среднем 50 см, были уложены на заломленный тростник, лоток выстлан листьями тростника. Размеры яиц (n = 9): 73.2-66.7×48.0-46.9 мм, в среднем 70.8×47.6 мм. 17 мая 1962 там же уже во многих гнёздах были недельные птенцы и сильно насиженные кладки. Рядом с одной из колоний колпиков размещалась большая колония серых цапель *Ardea cinerea*, а среди другой колонии встречались гнезда серых, рыжих *Ardea purpurea*, больших белых цапель *Egretta alba* и квакв *Nycticorax nycticorax*.

17 июля 1962 мы наблюдали стаи колпиков, кормившихся на озере Солёном и других мелководных водоёмах в окрестностях станицы Пролетарской. Стаи состояли из молодых и взрослых птиц. Позже, в конце августа – начале сентября (1962, 1963, 1968), нам нередко приходилось наблюдать стаи этих птиц на местах гнездовий. Ещё позже, во второй половине сентября, эти птицы отмечались уже редко.

Каравайка *Plegadis falcinellus*. Редко встречающаяся птица. Как указывает Н.С.Олейников в своей работе (1953) и в работе с соавторами (1967), каравайки редко гнездились по Манычу. В коллекции кафедры зоологии Ростовского государственного университета хранятся шкурки молодых и взрослых птиц, добытых на местах гнездовий в июне и июле 1948 года в окрестностях хутора Тузлуково. На Маныче стайки караваек из 5-6 особей мы отмечали 24 и 30 апреля 1962 только на озере Казинка, а 8 августа 1965 – стайки из 10 и 17 особей в окрестностях Батайска. Начиная с 1968 года каравайки стали гнездиться в плавнях в окрестностях села Кулешовка.

Чёрный аист *Ciconia nigra*. Чучело птицы, добытой осенью 1949 года в окрестностях станицы Пролетарской, хранится в местной школе-интернате. Две молодые особи доставлены нам 29 сентября 1968 из окрестностей хутора Недвиговки (Мясниковский район).

Чеглок *Falco subbuteo*. Обычен и многочислен на весенних и осенних пролётах; на гнездовье, вопреки утверждению В.А.Миноранского и В.И.Харченко (1967), редок. Весенний пролёт чеглоков начинается в первой декаде апреля и продолжается до начала мая. Г.Сарандинаки (1909), исследовавший Атаманское лесничество (Ленинский лесхоз), считал этот вид здесь пролётным. С.Н.Алфераки (1910) упоминает о гнездовании чеглоков в окрестностях Таганрога. В гнездовой период чеглоки встречены нами на территории Ленинского лесхоза. По прилёте птицы занимают свободные или освобождающиеся гнёзда ворон

Corvus cornix, сов, грачей *Corvus frugilegus*, коршунов, лишь поправляя выстилку. С этого момента пара охраняет гнездовой участок. Откладывание яиц начинается в первых числах июня (1 июня 1961, 6 июня 1965), но случается и позже. Так, 5 июля 1959 найдено гнездо с 3 слабонасиженными яйцами. Размеры яиц (n = 5): 42.8-38.6×35.5-30.8 мм. Осенний пролёт чеглоков проходит во второй половине сентября. На пролётах встречаются одиночные птицы и стаи, насчитывающие по 10-80 особей. Г.Сарандинаки (1909) указывал на случаи зимовки здесь чеглоков. Нами в зимний период чеглоки не отмечены.

Канюк *Buteo buteo*. Среди хищных птиц на весеннем и осеннем пролётах – самый многочисленный. На гнездовье, вопреки утверждению В.А.Миноранского и В.И.Харченко (1967), встречается крайне редко. Весенний пролёт канюков начинается в третьей декаде марта, наиболее интенсивно идёт во второй декаде апреля, а заканчивается в конце первой декады мая. А.С.Будниченко (1965, 1968) отмечал на гнездовье этих птиц в Сальском и Целинском районах. Нами на гнездовье канюк обнаружен в Ленинском лесхозе, где 8 июля 1959 в старом дубовом лесу найдено гнездо с полуоперившимся птенцом. Там же в конце мая (1961, 1965), июне и июле (1959) отмечались кормящие птенцов особи. Подвидовая принадлежность обитающих здесь канюков не выяснена. Осенний пролёт этих птиц проходит с конца августа до начала октября. Некоторые особи при наличии пищи задерживаются до середины октября (14 октября 1956, 17 октября 1968).

Сплюшка *Otus scops*. Несомненно, гнездится на территории Ленинского лесхоза. Эти птицы там часто отмечались нами в мае, июне и июле (1959 1961, 1965). Одна особь встречена нами 17 ноября 1957 в окрестностях Ростова-на-Дону.

Ушастая сова *Asio otus*. Редко гнездящаяся птица. На гнездовье эти совы найдены нами в Ленинском лесхозе и в пойменном лесопарке в окрестностях Ростова-на-Дону. В гнезде, обнаруженном 23 апреля 1961, было 6 птенцов и 1 наклюнувшееся яйцо. У самого крупного птенца появились трубки маховых и рулевых перьев. В другом гнезде, найденном 2 июня 1967, было 2 свежерасклёванных яйца. В первом случае совы заняли старое воронье гнездо, во втором – прошлогоднее сорочье. В осенний период ушастые совы отмечены нами главным образом в тех местах поймы Дона и смежных с ней территорий, где наблюдались значительные скопления грызунов. На днёвках эти птицы отмечены только в густых лесонасаждениях, сильно заросших кустарником и травой. Количество сов на местах днёвок колебалось от 8 до 70. В стаях ушастых сов иногда встречались болотные совы *Asio flammeus*. Скопления сов на днёвках отмечены нами 27 октября и 17 ноября 1959 на одном и том же участке в лесонасаждениях поймы Дона, в окрестностях Ростова, 28 ноября 1965, 6 декабря 1966, с 26 ноября по 15 де-

кабря 1967 в лесополосах на границе поймы и поля в окрестностях Кулешовки. В 1968 году первые совы были отмечены здесь в конце сентября. Колебания численности на постоянных местах днёвок связаны, вероятно, с миграциями сов в это время (ноябрь-декабрь). Часть сов здесь постоянно зимует. Так, после пыльных бурь в феврале 1969 года были найдены погибшие, сильно истощённые птицы.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. Редкая гнездящаяся птица. В весенний период передвижения этих птиц нами не отмечены. Значительное количество их найдено на гнездовье только в старых участках леса на территории Ленинского лесхоза. Так, в конце апреля здесь отмечено гнездостроение, «пение», встречены пары птиц у дупел. 21 апреля 1961 добыта пара птиц. Состояние гонад таково: семенники самца 15×7 мм, фолликулы в яичнике самки 6 мм в диаметре. В конце мая (1961) и начале июня (1965) там же было найдено более 20 дупел с крупными, почти оперёнными птенцами. Дупла были сделаны в дубах, тополях и ясеневидных клёнах (в одном случае в иве) на высоте от 30 см до 9 м от земли.

В осенний период кочующие дятлы были отмечены нами в сентябре, октябре и ноябре (1956-1966) в различных районах исследуемой территории. Одиночная особь зарегистрирована 28 июля 1962 в саду на одном из островов Маныча (Пролетарский район).

А.С.Будниченко (1965) для окрестностей Ставрополя и Велико- Анадольского лесничества приводит подвид *D. m. major* (Linnaeus, 1758). И.Б.Волчанецкий (1959) для Предкавказья называет *D. m. tenuirostris* Buturlin, 1906. Экземпляры, добытые нами в летнее время на территории Ленинского лесхоза и в равнинных урочищах Краснодарского края, ничем не отличаются от просмотренных нами *D. m. tenuirostris* из коллекций ЗИН АН СССР и Зоологического музея МГУ. Дятлы же, добытые осенью и зимой в окрестностях Ростова и в северных районах области, сходны с дятлами из-под Днепропетровска, Бердянска, Воронежской области (река Битюг), т.е. ближе всего к *D. m. candidus* (Stresemann, 1919). Среди них не оказалось близких сколько-нибудь к типичным *D. m. major*.

Вертишейка *Jynx torquilla*. Отмечена нами только на пролёте в конце апреля. (1954-1968). А.В.Лерхе (1940) указывает на неоднократное нахождение гнёзд этих птиц в окрестностях Ростова, в Манычском лесхозе (Веселовский район). Ни нам, ни В.С.Петрову и Б.А.Нечаеву (1962) гнездование вертишейки в указанных местах позже подтвердить не удалось.

Сойка *Garrulus glandarius*. Редкая гнездящаяся птица. В весенний период сойки отмечены нами в окрестностях Ростова 23 марта 1959 (пара птиц) и 11 апреля 1967 (три птицы). Позже, в конце апреля 1961 года, сойки отмечены в Ленинском лесхозе. 30 мая 1961 здесь же

в старом дубовом лесу найдено гнездо сойки с 2 свежими яйцами. Оно было расположено в развилке ствола ясеня на высоте 3 м от земли. Диаметр гнезда 32 см, диаметр лотка 14 см, высота гнезда 23 см, глубина лотка 8.5 см. Гнездо построено из тонких ветвей, лоток выстлан тонкими корешками и стеблями травы. Размеры яиц: 33.4×23.3 и 34.2×23.9 мм. В июне и июле 1959 года мы неоднократно наблюдали там же выводки соек. 5 июля 1959 была добыта молодая птица с недоросшими маховыми и рулевыми перьями. Добытые здесь летом и осенью (сентябрь-ноябрь) экземпляры относятся к подвиду *G. g. krynicki* Kaleniczenko, 1839.

В осенний период сойки отмечены в сентябре-ноябре (1955, 1958, 1960, 1968) в различных районах исследуемой территории. Все добытые нами в это время вне Ленинского лесхоза птицы, как и экземпляры из коллекции кафедры зоологии Ростовского университета, добытые Б.А.Нечаевым в осенние месяцы в окрестностях Ростова, относятся к номинальному подвиду. На исследуемой территории сойки гнездятся ещё и в Манычском лесхозе (Петров, Нечаев 1962). Здесь, согласно устному сообщению В.С.Петрова, гнездится *G. g. glandarius* (Linnaeus, 1758). Ленинский и Манычский лесхозы лежат на одной широте и удалены друг от друга на 130 км.

Розовый скворец *Pastor roseus*. Редко встречающаяся и нерегулярно гнездящаяся птица. Это подтверждает анализ известных фаунистических очерков. Г.Сарандинаки (1909) считает этот вид залётным в Приазовье. С.Н.Алфераки (1910) здесь же называет этих птиц обычными, даже конкурирующими с обыкновенным скворцом *Sturnus vulgaris*. А.В.Лерхе (1940) приводит розового скворца только для восточных районов Ростовской области. С.Н.Варшавский (1965) считает, что в Донских, Сальских и Калмыцких степях розовый скворец гнездится спорадически. В Краснодарском крае (Очаповский 1967) этот вид очень редок. Мы располагаем сведениями о гнездовании розового скворца в Пролетарском и Константиновском районах (1962-1963). Кроме того, стаи этих птиц отмечены нами в июне 1959 года в Азовском районе. Характер пребывания их здесь не выяснен.

Первые стаи розовых скворцов встречены в конце апреля. Массовый пролёт приходится на середину мая. В третьей декаде мая небольшие стаи розовых скворцов продолжают продвижение. К гнездостроению птицы приступают сразу после прилёта. Место для выбора гнёзд не всегда типично. В Пролетарском районе мы встречали колонии этих птиц в карьерах, в обрывах по берегам водоёмов, в кучах камней и кирпичей, сложенных на местах строительства в сёлах и кирпичных заводов, в соломенных крышах ферм, в пиломатериалах. А в Константиновском районе одна колония отмечена даже в штабеле леса на порубке. Полные кладки отмечены уже в конце второй декады мая. В

третьей декаде июня в массе появляются слётки. Птицы покидают колонии и начинают кочевать, Кочующие стаи розовых скворцов отмечены нами в июле и августе во многих районах исследуемой территории. Отлетают розовые скворцы не позднее середины сентября.

Мы очень признательны А.М.Судиловской, С.В.Луцкой, Л.С.Степаняну, К.А.Юдину, Л.А.Портенко, Б.В.Некрасову за помощь в этой работе.

Литература

Алфераки С.Н. 1910. Птицы Восточного Приазовья // *Орнитол. вестн.* 1: 11-35, 2: 73-93, 3: 162-170, 4: 245-252.

Будниченко А.С. 1968. Птицы искусственных лесонасаждений степного ландшафта и их питание. Ч. 1 // *Учён. зап. Тамбов. пед. ин-та* **22**: 5-285.

Будниченко А.С. 1968. *Птицы искусственных лесонасаждений степного ландшафта и их питание. Ч. 2. Эколого-географическая характеристика авифауны.* Воронеж: 1-264.

Варшавский С.Н. 1965. Материалы по фауне птиц Нижнего Дона, Сальских и Калмыцких степей в связи с некоторыми её изменениями в 30-60-х годах XX столетия // *Материалы зоол. совещ. по проблеме «Биологические основы реконструкции, рационального использования и охраны фауны южной зоны европейской части СССР».* Кишинёв.

Волчанецкий И.Б. 1959. Очерк орнитофауны Восточного Предкавказья // *Тр. Науч.-исслед. ин-та биол. и биол. ф-та Харьков. ун-та* **28**: 7-38.

Гусев А. 1968. О водоплавающей дичи в Ростовской области // *Ресурсы водоплавающей дичи в СССР, их воспроизводство и использование: Тез. докл. 2-го Всесоюз. совещ.* М., **1**: 90-92.

Казаков Б.А. 1960. Птицы, гнездящиеся в окрестностях Ростова // *Материалы науч. студ. конф., посвящ. 90-летию Ростов. ун-та.* Ростов-на-Дону.

Казаков Б.А. 1962. К орнитофауне юго-западных районов Ростовской области // *Материалы 3-й Всесоюз. орнитол. конф.* Львов.

Казаков Б.А. 1966. К фауне воробьиных юго-западной части Ростовской области // *Тез. докл. 2-й науч. сессии Сев.-Кавказ. совета по коорд. и планир. науч,-исслед. работ но техн. и естеств. наукам.* Ростов-на-Дону.

Казаков Б.А. 1967. К фауне хищных птиц и сов Западного Предкавказья // *Природа Северного Кавказа и её охрана: Тез. докл. конф., посвящ. 50-летию советской власти.* Нальчик.

Лерхе А.В. 1940. Птицы // *Природа Ростовской области.* Ростов-на-Дону: 257-280.

Миноранский В.А. 1962а. О расширении ареала европейской зеленушки в Ростовской области // *Орнитология* **4**: 132-134.

Миноранский В.А. 1962б. О гнездовании кудрявого пеликана на озере Маныч-Гудило // *Зоол. журн.* **41**, 7: 1107-1108.

Миноранский В.А., Харченко В.И. 1967. Некоторые изменения в орнитофауне Ростовской области и Восточного Приазовья // *Экология млекопитающих и птиц.* М.: 308-316.

Олейников Н.С. 1953. Рыбоядные птицы и их влияние на рыбное хозяйство манычских водохранилищ // *Учён. зап. Ростов. ун-та* **19**: 127-137.

Олейников Н.С. и др. 1967. Редкие водные и околоводные птицы Западного Предкавказья // *Природа Северного Кавказа и её охрана: Тез. докл. конф., посвящ. 50-летию советской власти.* Нальчик.

Очаповский В.С. 1967. Видовой комплекс птиц Краснодарского края и распространение их по зонам // *Науч. тр. Краснодар. пед. ин-та* **66**: 111-126.

Петров В.С., Миноранский В.А. 1962. Летняя орнитофауна озера Маныч-Гудило и прилежащих степей // *Орнитология* **5**: 266-275.

Петров В.С., Нечаев Б.А. 1962. Орнитофауна древесно-кустарниковых насаждений Манычского лесхоза // *Материалы 3-й Всесоюз. орнитол. конф.* Львов.

Рашкевич Н.А. 1957. О формировании фауны и распределения птиц в степных полезащитных насаждениях // *Учён. зап. Каракалпак. пед. ин-та* **1**: 243-261.

Сарандинаки Г. 1909. Некоторые данные для орнитологии Ростовского н/Д округа Донской области // *Сб. студ. биол. кружка при имп. Новороссийском ун-те* **4**: 1-75.

Черников Н.К. 1881. Очерки ружейной охоты в Задонских степях и по рекам Салу и Манычу // *Природа и охота* 2.

Шехов А.Г. 1956. Пеликаны и чайки на озере Маныч-Гудило // *Природа* **10**: 115-116.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1305**: 2415-2419*

Гнездование некоторых видов водоплавающих птиц в северной части острова Вайгач и на близлежащих островах

Т.С.Пономарёва

*Второе издание. Первая публикация в 1994**

Наблюдения проводили в июле 1991 года на северном и северо-западном побережье острова Вайгач и на островах в губе Долгой. Изучали летнее распределение, численность, гнездование белощёкой казарки *Branta leucopsis*, обыкновенной гаги *Somateria mollissima*, гаги-гребенушки *Somateria spectabilis*, малого лебедя *Cygnus bewickii*, гуменника *Anser fabalis*.

Северная часть острова Вайгач имеет холмистый, местами почти горный рельеф с многочисленными выходами скал, щебнистыми водораздельными плато, глубокими каменистыми каньонами, прорезанными речками и ручьями. Повсюду разбросано множество озёр с болотистыми или скалистыми берегами. Русла рек и ручьёв также местами заболочены. Береговая линия изрезанная. Берега обрывистые, скалистые или же пологие, в виде галечниковых бухт и пляжей. Растительность скудная, мохово-лишайниковая, по долинам рек и ручьёв – более разнообразная, с примесью злаково-осокового разнотравья. Острова в губе Долгой в большинстве своём скалистые, приподнятые, с такой же скудной растительностью, как на побережье Вайгача. Размеры их от 1-2 до 15-20 га.

1991 год был средним по погодным условиям и по фенологии. Однако в силу определённого соотношения ветров и течений в Карских

* Пономарёва Т.С. 1994. Гнездование некоторых видов водоплавающих птиц в северной части острова Вайгач и на близлежащих островах // *Бюл. МОИП.* Отд. биол. **99**, 6: 66-69.

Воротах сложилась необычная ледовая обстановка. В начале июля пролив ещё был забит льдами (8-10 баллов, по данным ГМС посёлка Амдерма). В связи с этим подход к северной части острова был затруднён до начала второй декады июля, что и определило сроки проведения исследований.

Белощёкая казарка *Branta leucopsis*. Обычный вид на побережье и близлежащих островах. В начале второй декады июля на Вайгаче было много выводков с маленькими пуховичками. Гнёзда встречались в небольшом числе, главным образом на островах губы Долгой. Яйца были сильно насижены, свежие кладки отмечены единично. Бóльшая часть гнёзд размещалась в скалах и на карнизах (6 шт., или 50%), выступах одиночных камней (4, или 33.3%), на небольших земляных площадках крутых берегов (2, или 16.7%). На Вайгаче гнёзда белощёкой казарки располагались и вдали от морского побережья, в скалистых речных каньонах или в скалах-останцах, на недоступных скальных площадках. Выводки встречались здесь чаще всего в устьях речек и ручьёв, на влажных лугах, куда они собирались на кормёжку. Так, 12 июля на маршруте длиной около 10 км по берегу моря отмечено 17, а 13 июля – 23 выводка. Среднее число птенцов в выводках – 3.7±0.27, с разбросом от 2 до 6. По ориентировочной оценке, соотношение размножающихся и неразмножающихся птиц было в среднем 1:2. Размер кладок варьировал от 3 до 6 яиц, в среднем 4.15±0.4. Общее число выводков, отмеченное нами в северной части острова Вайгач от мыса Вороний нос до устья реки Зелёной, – около 150, а взрослых птиц – 800-900. Бóльшая часть казарок в стаях была с выводками. На пяти обследованных островах в Долгой губе обнаружено 14 выводков с пуховичками и 4 гнезда с насиженными яйцами.

У северной и северо-западной оконечности острова Вайгач расположено около 100 островов, сходных между собой по характеру рельефа и типу растительности. Большинство из них, видимо, пригодны для гнездования белощёкой казарки. Таким образом, общее число казарок на островах у северного и северо-западного побережья острова Вайгач может составлять около 400 пар, а численность всей гнездовой группировки в северной части Вайгача и в его прибрежной зоне, по нашим оценочным данным, должно приближаться к 2 тыс. особей. Исходя из этого, мы считаем данные А.А.Романова (1989) для всего острова Вайгач (2.5-3 тыс. особей) явно заниженными. На наш взгляд, более соответствуют действительности данные В.Н.Калякина (1986), оценивающего общую численность белощёкой казарки на этом острове в 10-25 тыс. особей.

Основными врагами кладок и выводков казарок на островах являются крупные чайки (бургомистр *Larus hyperboreus*, серебристая *Larus argentatus* s.l.), а из четвероногих хищников – песец *Alopex lagopus*.

Однако, судя по соотношению среднего числа птенцов в выводках и среднего числа яиц в кладках, отход потомства в целом невелик. Раньше большой урон гнездовой популяции белощёкой казарки наносило браконьерство местных жителей. В последнее время в северной части острова Вайгач произошло ослабление антропогенного пресса в связи с отсутствием здесь постоянных поселений и уходом временных жителей. Если такая ситуация не изменится, в дальнейшем можно ожидать увеличения численности этой птицы на острове.

Обыкновенная гага *Somateria mollissima*. На острове Вайгач обитает номинальный подвид обыкновенной гаги *S. m. mollissima*. Крайним восточным пределом распространения его являются юго-западная оконечность острова, северо-запад Югорского полуострова и устье Югорского шара (Успенский 1958; Степанян 1975). В северной части Вайгача обыкновенная гага редка, встречаются лишь единичные гнёзда в прибрежной части острова. Очевидно, это является результатом многолетнего сильного антропогенного пресса, который стал снижаться только в последние годы в связи с уменьшением населённости острова, особенно в его северной части. В то же время на мелких островках в губе Долгой обыкновенная гага – обычный фоновый вид. Так, на одном из островов группы Рагозина (площадь около 15 га) было обнаружено 38 гнёзд гаги. Наибольшее число их располагалось совершенно открыто, на щебнистых участках тундры со скудной растительностью или вовсе без неё (20, или 30%). Почти равное количество гнёзд размещалось среди камней (16, или 22.2%) и на участках с тундровой растительностью (17, или 23.9%). Меньше в плавнике (10, или 15%), на песчаных и галечниковых отмелях (3, или 4.5%), на приморском лугу (1, или 1.5%). В середине июля в гнёздах гаги были в основном сильно насиженные яйца. Из некоторых гнёзд птенцы уже ушли. Среднее число яиц в кладках – 4.04±0.15 при разбросе от 2 до 6.

Следует отметить, что гаги на островках ведут себя спокойно. Наседки подпускают человека близко, сходят неохотно, уходят от гнезда недалеко, а обратно возвращаются быстро. Такое поведение, даже с учётом степени насиженности яиц, отличается от поведения часто вспугиваемых гаг на неохраняемых островах Белого моря. В окрестностях Вайгача гаги были явно непуганными. Кроме отсутствия на севере острова постоянных поселений, это объясняется недоступностью с моря в 1991 году его северного побережья из-за неблагоприятной ледовой обстановки.

Основные враги гагачьих кладок, как и повсюду, – крупные чайки, на островах – бургомистр и серебристая, а на самом Вайгаче – ещё и песец. На каждом острове отмечено по 2-4 разорённых гнезда (в среднем около 14% всех гнёзд). В целом состояние гагачьих поселений на островах у северного побережья Вайгача в настоящее время в связи с

ослаблением антропогенного пресса опасений не вызывает. Оценка прежних данных по численности обыкновенной гаги здесь (Карпович, Коханов 1967) и попытка экстраполяции наших данных на другие, пригодные для обитания вида острова, даёт прикидочную цифру 2-2.5 тыс. пар. В случае дальнейшего ослабления антропогенного воздействия численность обыкновенной гаги в указанном районе может возрасти за счёт освоения новых островов и возвращения птиц на побережье самого Вайгача.

Гага-гребенушка *Somateria spectabilis*. Численность вида на острове Вайгач низка. Встречаются единичные гнёзда в тундре. Так, 12 июля 1991 нами отмечено два гнезда во влажной мохово-осоковой тундре, на заболоченном понижении рельефа. В гнёздах были яйца (5 и 7). Обе самки сидели очень плотно, подпустили вплотную. На мелких островках северного побережья Вайгача гага-гребенушка не обнаружена.

Малый лебедь *Cygnus bewickii*. Обычная птица для северной части острова Вайгач. В заболоченных и влажных тундрах здесь, а также вблизи озёр встречалась регулярно. В подходящих для обитания местах плотность малого лебедя составляла 4-7 птиц и 0.5-0.7 пары на 1 км^2. Это выше, чем отмеченная нами плотность на острове Долгий в 1990 году (Пономарёва 1991) и примерно соответствует плотности вида в Малоземельной тундре, составлявшей 2.9-8.5 ос./км^2 (Минеев 1987).

В середине июля у большинства размножавшихся птиц были выводки с пуховыми птенцами средних размеров. Нами обнаружено только одно гнездо малого лебедя в заболоченной тундре. В гнезде было два маленьких птенца, на которых сидела самка. Увидев человека, она заранее сошла с гнезда и стала уползать, стелясь по земле и распуская крылья. Довольно велика неразмножавшаяся часть популяции. Соотношение размножавшихся и неразмножавшихся птиц составило, по нашим подсчётам, примерно 1:4. Кое-где (на влажных лугах, в дельтах рек и ручьёв) можно было наблюдать скопления кормящихся малых лебедей численностью до 100 птиц. Холостые птицы вели себя менее осторожно, чем птицы с выводками, и подпускали человека на 150-200 м, тогда как при птенцах лебеди начинали проявлять беспокойство и уходить уже за 500-600 м.

Гуменник *Anser fabalis*. Самый многочисленный вид водоплавающих птиц на севере Вайгача. Стаи взрослых птиц и выводки постоянно встречались в тундре и в окрестностях озёр. В среднем плотность гуменника в подходящих местах составляла 18 птиц и 2.3 выводка на 1 км^2. Соотношение размножавшейся и неразмножавшейся частей популяции ориентировочно равнялось 1:6. В середине июля в большей части выводков были уже крупные птенцы с пробивающимися пеньками маховых. Гнёзд с яйцами мы не застали.

Литература

Калякин В.Н. 1986. О распространении и экологии белощёкой казарки на острове Вайгач и Югорском полуострове // *Актуальные проблемы орнитологии*. М.: 93-104.

Карпович В.Н., Коханов В.Д. 1967. Фауна птиц острова Вайгач и северо-востока Югорского полуострова // *Тр. Кандалакшского заповедника* **5**: 268-338.

Минеев Ю.Н. 1987. Экология, численность и охрана лебедей на северо-востоке европейской части СССР // *Экология и миграция лебедей в СССР*. М.: 17-20.

Пономарёва Т.С. 1991. Малый лебедь на острове Долгом // *Сб. науч. тр. ЦНИЛ Главохоты*. М.

Романов А.А. 1989. К распределению и численности некоторых видов гусеобразных на острове Вайгач // *Растительный и животный мир заповедных островов*. М.: 78-82.

Степанян Л.С. 1975. *Состав и распределение птиц фауны СССР: Неворобьиные Non-Passeriformes*. М.: 1-372.

Успенский С.М. 1958. Некоторые виды птиц на северо-востоке европейской части СССР // *Учён. зап. Моск. ун-та* **197**: 35-47.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1305**: 2419*

О зимовке вяхиря *Columba palumbus* на юго-востоке Казахстана

И.А.Бевза

*Второе издание. Первая публикация в 2005**

Вяхирь *Columba palumbus* появился в Карачингильском охотничьем хозяйстве в последние 6 лет и стал обычным гнездящимся фоновым видом (Казахстанский орнитологический бюллетень 2004, с. 69). Зимние встречи вяхирей стали отмечаться в охотхозяйстве в последние три года. Зимой 2003/04 года в зарослях джиды (лоха) держались стаи до трёх десятков, зимой 2004/05 – до 80 птиц. В декабре 2005 года неоднократно отмечался десяток вяхирей вместе со стаей клинтухов *Columba oenas*. Также необычность зимовки вяхирей в Карачингиле отметил Б.П.Анненков.

* Бевза И.А. 2005. О зимовке вяхиря на юго-востоке Казахстана // *Каз. орнитол. бюл.:* 203.