

ISSN 0869-4362

Русский
орнитологический
журнал

2017
XXVI



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1420
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издаётся с 1992 года

Т о м X X V I

Экспресс-выпуск • Express-issue

2017 № 1420

СОДЕРЖАНИЕ

1107-1163 Птицы национального парка «Себежский»,
охраняемые в Псковской области.
С.А.ФЕТИСОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVI
Express-issue

2017 № 1420

CONTENTS

1107-1163 Birds of the Sebezhsy National Park,
protected in the Pskov Oblast.
S.A.FETISOV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
S.Petersburg University
S.Petersburg 199034 Russia

Птицы национального парка «Себежский», охраняемые в Псковской области

С.А.Фетисов

Сергей Анатольевич Фетисов. Национальный парк «Себежский», ул. 7 Ноября, 22, г. Себеж, Псковская область, 182250, Россия. E-mail: Seb_park@mail.ru

Поступила в редакцию 21 февраля 2017

История изучения птиц – в том числе редких и исчезающих видов, нуждающихся в охране в Псковской области – регулярно освещается на юго-западе области, в так называемом Себежском Поозерье, в ведомственных отчётах, орнитологической литературе и средствах массовой информации начиная с 1982 года, после того, как в деревне Осыно Себежского района была создана полевая база орнитологов Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета (Кузнецова 1982; Фетисов 1982, 1984, 1985а,б, 1987; Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Мальчевский 1983; Мальчевский, Фетисов, Ильинский 1984, 2010; Мальчевский и др. 1984; Пукинский, Сагитов 1985, 2014; Ильинский и др. 1991; и др.). К сожалению, в самом начале XXI века эта база прекратила своё существование из-за отсутствия финансирования, но перед этим, в 1996 году, на той же территории начал функционировать национальный парк «Себежский». Теперь разнообразные материалы о птицах здесь начали собирать не только ставшие «сторонними» орнитологи, в том числе Санкт-Петербургского университета, продолжавшие работать в Себежском Поозерье, но и специалисты самого Парка. В частности, в XXI веке увидели свет орнитологические монографии «Птицы Себежского Поозерья и национального парка «Себежский»» (Фетисов и др. 2002) и «Птицы Псковского Поозерья» (Фетисов 2013а), кадастровая сводка «Национальный парк «Себежский» (2005), «Труды национального парка «Себежский»» (2011) и многие статьи о птицах Парка, охраняемых в России и Псковской области, так что буквально в течение 10-15 лет национальный парк «Себежский» стал весьма удобной «модельной» охраняемой территорией (рис. 1) для проведения мониторинговых исследований по состоянию популяций редких птиц не только в Себежском, но и во всём Псковском Поозерье, расположенном почти в центре Белорусско-Валдайского Поозерья.

При этом Себежское Поозерье многие годы находилось на самой периферии то Витебской, то Псковской губерний, поэтому до появления здесь специалистов из Санкт-Петербурга орнитофаунистических исследований здесь не проводилось, если не считать, что в 1924 году Себежский уезд посетила экспедиция под руководством известного бе-

лорусского орнитолога А.В.Федюшина (1926)*, а с 1971 года в окрестностях деревни Осыно начал периодически экскурсировать С.А.Фетисов, в то время ещё студент кафедры зоологии позвоночных Ленинградского университета. Однако регулярные орнитофаунистические исследования в Себежском Поозерье удалось организовать, как уже говорилось, только в 1982 году. В 1980-х годах под руководством А.С.Мальчевского в них активное участие принимали научные сотрудники Ленинградского университета В.И.Головань, И.В.Ильинский, М.В.Пукинская, Ю.Б.Пукинский, Р.А.Сагитов, С.А.Фетисов и В.А.Фёдоров, а также студенты кафедры зоологии позвоночных: Ю.Н.Бубличенко, И.В.Горбунова, М.В.Патрикеев, В.Г.Пчелинцев и В.Г.Шашко. За первые 10 лет своей работы они собрали немало материалов о разных птицах Себежского Поозерья, включая редких в Прибалтике птиц и виды, занесённые в Красные книги России и Белоруссии. Это позволило обратить внимание местной общественности не только на необходимость охраны отдельных редких видов птиц, но и на сохранение их среды обитания на всей той территории, которая и получила вскоре статус национального парка «Себежский» (Фетисов 1987; Ильинский и др. 1991; Фетисов и др. 2002; Фетисов 2013а; и др.).




Рис. 1. Картограмма территории национального парка «Себежский» и его положения (на врезке) в пределах Псковской области.

* К сожалению, из текста его статьи теперь не всегда удаётся установить точные места встреч тех или иных видов птиц, но данные о характере пребывания этих видов в Себежском Поозерье крайне ценны до сих пор.

После начала проектирования национального парка в 1992 году начался новый важный этап в изучении орнитофауны Себежского Поозерья. Результаты зоологических изыскательских работ, проведённых в 1992-1993 годах сотрудниками Биологического научно-исследовательского института Санкт-Петербургского университета, изложены в целом ряде ведомственных отчётов (Фетисов, Головань, Ильинский 1992; Фетисов, Ильинский 1992, 1993а,б; Фетисов и др. 1993) и орнитологической литературе (Fetissov, Pjinsky 1995; Фетисов, Ильинский, Головань 1998а; и др.). В период проектирования Парка были подведены очередные итоги изучения видового состава и статуса птиц на его территории и составлен первый список видов, наиболее нуждающихся в охране (Фетисов, Ильинский 1993в; Ильинский, Фетисов 1994).

В 1996 году было завершено создание Себежского национального парка Федеральной службы лесного хозяйства России. С 1997 года в нём было начато проведение детальной инвентаризации видового состава растительного и животного мира (Фетисов 2013а, 2016а; и др.). Этому немало способствовало то, что в Санкт-Петербурге был создан на общественных началах Псковский полевой отряд Балтийского фонда природы Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, в который вошли в том числе орнитологи, пожелавшие работать в Себежском Поозерье. Основные результаты их исследований, особенно в первые 10 лет существования Парка, не раз публиковались в литературе и представлены во многих ведомственных отчётах (Фетисов и др. 1997; Фетисов 1998а,б, 1999а,б, 2000-2001; Конечная и др. 1999; Сагитов, Фетисов 1999-2000; Фетисов, Конечная 2000; Фетисов, Конечная, Мусатов 2000; и др.). В большинстве из них подчёркивалось, что изучение распространения, экологии и поведения редких видов птиц — одно из важнейших направлений деятельности Псковского полевого отряда, а в национальном парке «Себежский» орнитологи получили к тому же редкую возможность продолжить создание базы данных о редких видах, начатое ленинградскими орнитологами ещё в 1982 году, и начать мониторинг состояния этих видов на определённой и к тому же охраняемой территории. Наряду с этим была ещё раз наглядно продемонстрирована важная роль самого национального парка в качестве резервата редких птиц в Псковском Поозерье (Фетисов, Ильинский 1997; Фетисов и др. 1997; Кузнецова 1998; Фетисов 1998в,г; Kuznetsova 1998; Леоке 1999, 2008; Фетисов, Мусатов 1999; и др.). Так, на начало XXI века из особо охраняемых птиц в нём удалось зарегистрировать 16 видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2001), 43 — в Красную книгу Республики Беларусь (2004) и 52 — в Красную книгу Латвии (Red Data Book... 2000) (Фетисов, Ильинский, Головань 1998б; Фетисов и др. 2000а,б, 2001). Одновременно при поддержке Балтийского фонда природы и Госкомэкологии Псковской области и

сам национальный парк «Себежский» начал проводить всё более планомерные исследования распространения и экологии особо охраняемых птиц на своей территории и успешно завершил работы по гранту Глобального экологического фонда «Флора и фауна национального парка «Себежский» как резервата редких и исчезающих видов, охраняемых в России, Латвии и Белоруссии» и российско-датскому проекту «К устойчивому управлению Себежским национальным парком», в котором важное место отводилось организации мониторинга состояния редких видов птиц (Фетисов 1999а, 2000-2001, 2013б, 2016а; Fetisov, Sagitov 1999; Musatov, Fetisov, Konechnaya 1999-2000; Конечная, Фетисов 2000; Мусатов, Тунчик, Фетисов 2000; Фетисов, Андреева, Конечная 2001; Фетисов, Конечная, Андреева 2001; Фетисов и др. 2002, 2011; Конечная и др. 2005; Фетисов, Конечная, Рябенко 2011; и др.).

Таким образом, с 1982 года (т.е. на протяжении 35 лет) на территории национального парка «Себежский» ведётся регулярное изучение распространения, численности, статуса, экологии и поведения большинства редких и особо охраняемых видов птиц Псковского Поозерья. Сначала эта работа велась силами орнитологов Санкт-Петербургского государственного университета на их полевом стационаре в деревне Осыно и в составе Псковского полевого отряда Балтийского фонда природы, потом – сотрудниками самого Парка. Благодаря этому многолетнему и трудоёмкому коллективному труду многих орнитологов мне удалось проанализировать и обобщить в данной статье около 200 литературных и ведомственных источников с данными о 51 виде особо охраняемых птиц, зарегистрированных на территории Парка.

Пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить всех лиц, упомянутых в статье, и ещё раз напомнить, что без их участия наше знание об особо охраняемых птицах национального парка «Себежский» было бы далеко не полным.

Ниже в виде видовых очерков представлены краткие обзоры имеющихся в настоящее время опубликованных и ведомственных материалов, а также некоторые неопубликованные ранее данные автора по разным видам особо охраняемых птиц национального парка «Себежский». Все эти виды недавно были включены в первую Красную книгу Псковской области (Приказ ... 2013; Красная книга... 2014). Помимо того, некоторые из них занесены также в Красную книгу Российской Федерации (2001); в тексте они обозначены звёздочкой (*). Порядковыми номерами в тексте отмечены виды, зарегистрированные в Себежском национальном парке после его создания. Ещё некоторые виды, не имеющие порядковых номеров, наблюдали на территории Парка только до его создания, т.е. до 1996 года.

1. ***Чернозобая гагара *Gavia arctica*.** Перелётный вид, встречающийся в Парке на пролёте и изредка в летний период. Впервые зарегистрирован здесь в 1985 году, но, конечно, встречался и раньше. Селится на некоторых озёрах, гораздо реже – реках (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а, 2013а; и др.). Во время пролёта весной гагар наблюдали с 16 апреля (2007) до 28 мая (2004) на озёрах Нечерица, Осыно, Се-

бежское и на реке Нище (рис. 2) (Фетисов 1998в, 2002-2004, 2006-2007; Герасимов, Петренко, Фетисов 2004). Осенью пролёт отмечали с конца сентября (2006 и 2008) до 24 октября (2002) на озёрах Нечерица, Ница, Ормея, Ороно, Осыно (Фетисов 2002; Фетисов, Стукальцов 2009; Волков, Фетисов 2010а). В период размножения – 7 июня 1985 – на центральном плёсе озера Нечерица держалась стайка из 4 (днём) и 7 (вечером) особей, не покинувших озёра, несмотря на их преследование на лодке (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов, Ильинский 1997). Основной фактор угрозы для вида – гибель в браконьерских рыболовных сетях (Герасимов, Петренко, Фетисов 2004; Фетисов 2004, 2007, 2008а, 2009а, 2013а; Стукальцов, Фетисов 2008).




Рис. 2. Места встреч чернозобой гагары в национальном парке «Себежский»:
 ● – во время весеннего пролёта; ▲ – в период размножения; ■ – во время осеннего пролёта.
 Фото на врезке (чернозобая гагара в брачном наряде) автора.

2. Малая поганка *Tachybaptus ruficollis*. Пролётный и случайно гнездящийся (перелётный) вид. Единственный раз отмечен в Парке в 1997 году, когда В.Г.Барановский наблюдал выводок на озере Ормея (Фетисов и др. 2002) (рис. 3). После этого новых сведений о малой поганке не появилось, хотя её не раз регистрировали в соседнем Опочецком районе (Волков, Фетисов, Яковлева 2012; Фетисов 2012а, 2013а).

3. Красношейная поганка *Podiceps auritus*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Первая особь зарегистрирована 15 мая 1998 в заброшенном и сильно заросшем по берегам водной растительностью

Парке до полного ледостава. Так, в 2014 году одна серощёкая поганка появилась на озере Ороно 1 января (Фетисов 2014а), а в 2012 году 2 серощёкие поганки держались в полыньях на том же озере с 9 по 14 января, пока лёд не сковал это озеро окончательно (Фетисов 2013а).




Рис. 4. Места встреч волчка в национальном парке «Себежский»:

- — взрослых особей в период размножения; ▲ — молодой особи (на первом году жизни);
- — на гнездовании в 1986 году. Фото на врезке (малая выпь в гнезде на озере Себежское) автора и В.А.Фёдорова.

5. **Волчок** *Ixobrychus minutus*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид, очень редкий в Себежском Поозерье (Фетисов 1984; Ильинский и др. 1991), включая территорию Парка (Ильинский, Фетисов 1994; Musatov, Fetisov, Konechnaya 2000; и др.). Ведёт крайне скрытный образ жизни, поселяется в густых тростниковых зарослях на прудах, в устьях рек и на озёрах. Взрослые самцы отмечены на озёрах Припеши 20 июня 1986 и Озерявы 16 июня 2010 (Фетисов и др. 2002). В 1986 году на озере Себежское (рис. 4) В.А.Фёдоровым (1997) найдено гнездо малой выпи, построенное между 15 и 21 июня. Первое яйцо было отложено 21 июня, первый проклёв обнаружен 7 августа, вылупилось 5 птенцов. Их рацион состоял из мелкой рыбы. Птенцы оставили гнездо 19-20 августа. 8 августа 2008 ещё один вполне самостоятельный птенец малой выпи был обнаружен неподалёку от озера Ороно, в городе Себеж на улице Береговая; он попал там под машину и погиб.

6. ***Чёрный аист** *Ciconia nigra*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Гнездится в Себежском Поозерье, выбирая для этого наиболее глухие и малодоступные человеку участки старого леса, гранича-

щие с болотами, сырыми лугами, поймами и заброшенными хуторами (Фетисов и др. 2002; и др.). По данным за 1982-1990 годы, в Себежском районе на территории около 3000 км² обитало не менее 6-8 пар (Ильинский и др. 1991; Plyinsky, Fetisov 1993; Ильинский, Фетисов 1998). На территории Парка или на самой границе с ним в 1970-е годы взрослых аистов видели в окрестностях деревни Казинка и на поле у деревни Новиково; в 1980-е – возле озера Анисимовское, деревень Осыно и Рудня, в урочищах Боровые и Слобода (на реке Нища), в ряде других мест бывшего Себежского охотничьего заказника; в 1990-е – возле озера Выдринское и в пойме реки Нища, в заболоченном лиственном лесу на юго-западном берегу озера Осыно и в районе озера Ужинец; в 2000-е – в урочище Слобода (на реке Нища) и на северо-западном берегу озера Ормея (рис. 5) (Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов 2002, 2006, 2008б, 2009а; Фетисов и др. 2002; Волков, Фетисов 2010а).




Рис. 5. Места встреч чёрного аиста в национальном парке «Себежский»:

О – взрослых особей в период размножения: а – в 1970-е годы, б – в 1980-е – в 1990-е г – в 2000-е.

● – место встречи выводка в 1988 году; ■ – гнездовой участок в 1993-1995 годах.

Фото на врезке (чёрный аист в гнезде) автора.

14 августа 1988 в урочище Малые Осинки в окрестностях деревни Осыно встречен выводок чёрного аиста, а в 1993-1995 годах местные жители из деревни Байдаково наблюдали птенцов в гнезде, расположенном в 1 км к западу от озера Ормея (Ильинский, Фетисов 1994; Ильинский, Фетисов 1998; Фетисов и др. 1997). В 1999-2000 годах это

гнездо (рис. 5) ещё оставалось жилым. На основании этих сведений чёрный аист включён в список наиболее ценных гнездящихся птиц Парка (Фетисов, Ильинский, Головань 1998б; Фетисов, Мусатов, Конечная 1999; Fetisov, Sagitov 1999; Андреева и др. 2000; Фетисов и др. 2000а,б; Musatov, Fetisov, Konechnaya 2000).

7. ***Пискулька** *Anser erythropus*. Отмечался в Парке только в качестве транзитно мигрирующей птицы и далеко не каждый год. В частности, по одному пискульке было отмечено в 1994 и 1998 годах во время осеннего пролёта в стаях совместно с белолобыми гусями *Anser albifrons* (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005а, 2009а, 2012б), и на этом основании вид включён и остаётся в списке птиц Парка (Фетисов и др. 2000 а; Ильинский и др. 2001; Фетисов 2005б). Помимо того, 2 октября 2010 во время кратковременного, но чрезвычайно многочисленного пролёта белолобого гуся по одному пискульке, заметно отличавшимся по размеру от других гусей, удалось наблюдать сразу в двух стаях белолобых гусей, летевших над озером Ороно и деревней Илово (Волков, Фетисов 2010а).

8. **Лебедь-кликун** *Cygnus cygnus*. Пролётный, гнездящийся (перелётный), зимующий вид. До начала XXI века кликун далеко не каждый год встречался в Себежское Поозерье и Парке, причём только во время весенних миграций. Так, в 1984 году один лебедь был отмечен весной на озере Ороно, 23 марта 1993 над озером Дёмино пролетели 5 особей, 24 марта 2000 нескольких отдыхавших кликунов наблюдали на озере Ормея (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005в). Однако с годами подобные встречи стали всё более частыми. Например, весной 2010 года взрослые особи встречались в Парке сразу в трёх местах: 27 марта – пара на реке Дегтярка (возле озера Припеши), 8 апреля – пара на озере Хотяжи, 14 апреля – одновременно 3 пары на озере Ормея. В марте 2013 года стая из 5 особей держалась на реке Свольна, а с середины до конца апреля 2014 года стая из 12 кликунов (среди них один из взрослых с синим пластиковым ошейником) оставалась на озере Осыно и т.д. Помимо того, часть кликунов начала оставаться в Парке на лето и проявлять поведение, свойственное им при выборе гнездового участка. В мае 2009 года 2 таких пары лебедей наблюдали на озере Ороно, ещё одну – на озере Припеши; в мае 2010 – пару на рыбообразном пруду в деревне Черново; в июне-июле 2011 – пару на озере Себежское (в Чёрной луке, у деревни Чернея) и одну особь – на озере Ормея; летом 2014 года – пару на озере Ормея; летом 2015 – пару на озере Ница (рис. 6). Наконец, в 2012 году первые 2 пары кликунов успешно загнездились в Парке на озёрах Колпенец (рис. 6, фото на врезке) и Ница, в 2014 – пара на озере Колпенец, в 2015-2016 годах – по паре на озёрах Колпенец и Усборье (Фетисов 2014а,б, 2015а, 2016г). Осенний пролёт кликунов в Парке наблюдается в основном в конце сентября – октябре, но

многие особи задерживаются на озёрах почти до ледостава (Фетисов, Стукальцов 2009; и др.). В 2010 году в Парке был впервые зарегистрирован также случай зимовки пары кликунов на незамерзающей реке Угоринка, в 2013-2014 зимующие птицы держались на полыньях на озере Ормея и Ормейской канаве (Волков, Фетисов 2010б,в, 2011а; Фетисов 2010-2011, 2014а, 2015а; Стукальцов, Тассо, Фетисов 2016), в 2016 году – на озере Озерявы (Фетисов 2016г).




Рис. 6. Места встреч лебедя-кликлуна в национальном парке «Себежский»: ○ – пар, выбравших гнездовой участок; ● – успешно размножавшихся пар; ■ – кликунов (в том числе семей) в зимний период. Фото на врезке (лебедь-кликун с птенцами на озере Колпенец) автора.

***Белоглазый нырок (белоглазая чернеть) *Aythya nyroca*.** Залётный вид. За последние 40-50 лет в Псковской области удалось наблюдать только одного самца 21 июня 1982 на озере Дёмино (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002), вошедшем в 1996 году в состав национального парка «Себежский».

9. Большой крохаль *Mergus merganser*. Пролётный, гнездящийся (перелётный), зимующий вид. До XXI века на территории нынешнего Парка были известны лишь отдельные встречи крохалей, например, 14-24 апреля 1984 и 8-10 августа – одиночных самцов на озере Осыно, 4 мая 1998 – одной пары на озере Зеленец и весной 2000 года – одной пары на озере Нечерица (Фетисов 1984, 2009а; Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002). В период размножения, в июле, крохали встречались в Себежском Поозерье ещё более редко: на озере Уклеино

в 1996 году (Фетисов и др. 2002), на озере Вятитерьво – в 2000 (Потебня, Тарасов 2001). На основе этих данных большой крохаль занесён в список птиц Парка в качестве пролётного, нерегулярно летящего вида (Фетисов и др. 2000б). В первой половине 2000-х годов, однако, случаи майских встреч больших крохалей, державшихся парами, заметно участились. Единичные пары или пары в составе стаяк были отмечены в 2002 году на озере Зеленец, в 2003 – на озере Нечерица, в 2005 – на озере Свибло, в последующие годы – на озёрах Осыно и Хотяжи, на рыбопродуктивном пруду в деревне Черново (Фетисов 2002-2003, 2014а; Фетисов, Волков 2011). Более того, выводок большого крохали наблюдали ещё в 1993 году в Россонском районе Белоруссии, близ себежского озера Нитятцы (Гричик, Парейко, Яминский 1998, 2004), т.е. на самой границе с Парком, а в 2015 году первый выводок удалось зарегистрировать в самом Парке на озере Себежское (Фетисов 2015б). Помимо того, в 2010 году в Парке впервые зазимовали, как минимум, 5 крохалей, в 2011 – не менее 9, а в 2014 – 6 особей (Фетисов 2010-2011; Фетисов, Волков 2010-2011; Волков, Фетисов 2011б,в). Двумя основными причинами, препятствующими гнездованию большого крохали в Парке, служат фактор беспокойства птиц со стороны человека и дефицит естественных убежищ для гнездования, а также, отчасти, гибель птиц в браконьерских рыболовных сетях (Фетисов и др. 2002; Фетисов, Дроздецкий 2005; Стукальцов, Фетисов 2008).




Рис. 7. Места встреч большого крохали в национальном парке «Себежский»: О – пар в период размножения: а – в 1980-е годы, б – в 1990-е; в – в 2000-е; г – в 2010-е. • – места встреч выводков; ■ – места зимовок. Фото на врезке (большие крохали во время зимовки на озере Озерявы) автора.

10. ***Скопа** *Pandion haliaetus*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. В 1980-е годы в Себежском Поозерье обитали 5-6 пар скоп (Ильинский и др. 1991, 2000). На территории нынешнего Парка жилые гнёзда были найдены в окрестностях озёр Дёмино и Долгое (Ильинский и др. 1983, 2010; Ильинский, Фетисов 1994), нежилое гнездо – возле озера Чердынец (Фетисов и др. 2002). О местах встреч скоп неоднократно сообщалось не только в специальной литературе, но и в средствах массовой информации (Кузнецова 1982; Фетисов 1982, 1984-1985, 1997, 1998г; Кузнецова 1998; Фетисов, Ильинский, Головань 1998а; и др.). В Парке основные места кормёжки скоп (без учёта озёр, на берегу которых они гнездились): озёра Анисимовское, Вятитерьво, Глыбуха, Дёмино, Корники, Мотяз, Нечерица, Нитятцы, Озерявы, Омелуха, Ормея, Ороно, Осыно, Припешы, Себежское, Ужинец, Усборье и Хотяжи, реки Нища и Осынка, рыбопородный пруд у деревни Черново (рис. 8) (Фетисов и др. 1997, 2002; Кятова, Тарасов 1999; Никифорова, Тарасов 1999; Могиленко, Тарасов 2001; Потебня, Тарасов 2001; Тузова, Королькова 2003; Фетисов 2003, 2007, 2014а; Леоке, Фетисов 2006, 2015; Самусенко и др. 2006; Самусенко, Ершова 2007; Леоке 2008; Волков, Фетисов 2010а, 2011в; Мельникова и др. 2011; Фетисов, Волков 2011; Егорова, Ершова 2012; Мельникова, Ершова 2012; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; Гультияев, Ершова 2013; Колокольцева, Александров, Ершова 2013; Стукальцов, Баканов, Ершова 2013; Колокольцева, Ершова 2014; Фетисов, Фёдоров 2014; Гришмановский, Ершова 2015; Максимова, Ершова 2015; Стукальцов, Черноок, Ершова 2015). Гнёзда скоп в Парке известны на берегах озёр Долгое, Корники, Ужинец и Чёрное, на болотах Копоты (рис. 8) и Нескорица, в верховьях реки Лопушинка, на вырубке в урочище Боровые (Фетисов и др. 1997, 2002; Фетисов 2002-2004, 2007, 2014а, 2016г; Фетисов, Стукальцов 2009; Волков, Фетисов 2010-2011; Фетисов, Волков 2011; Иванов, Ершова 2012; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; Ильинский, Мусатов, Фетисов 2015; Фетисов, Ильинский, Мусатов 2015), гнездовые участки (на которых не найдены гнёзда) – в районе озёр Выдринское, Нитятцы и Усборье (Фетисов и др. 2002; Леоке, Фетисов 2006). В последние 15 лет в Парке ежегодно размножалось до 3-5, а в отдельные годы даже 6 пар (Фетисов 2002-2004, 2006-2007, 2009а, 2013б; Фетисов и др. 2002). Минимальный показатель – 3 пары – наблюдали в 2014 году (Фетисов 2014а). Первых скоп весной отмечали в разные годы 14 апреля – 3 мая. 23 и 24 апреля (2005 и 2003) пары уже беспокоились возле гнёзд на болоте Копоты и возле озера Корники. Птенцов перед вылетом из гнёзд или их вылет наблюдали 10-21 июля (Фетисов и др. 2002; Фетисов, Волков 2011; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; и др.). Последних охотившихся скоп отмечали осенью обычно во второй половине сентября; лишь однажды позднее, 14 октября 2004, на озере Осыно (Фетисов

2004). В рационе скопы зарегистрированы лещ *Abramis brama* (8 случаев), щука *Esox lucius* (3) и судак *Sander lucioperca* (1). Гнёзда скоп нередко разрушаются сильным ветром, реже – тяжестью «шапок» мокрого плотного снега; птенцы гибнут иногда от воронов *Corvus corax*, а лётные птицы – от столкновения с проводами (Фетисов и др. 2002).




Рис. 8. Места встреч скопы в национальном парке «Себежский»:

○ – гнездовые участки скопы, известные до 2005 года; ● – гнездовые участки скопы, известные в последние 10 лет (2006-2015 годы); ■ – места охоты скоп во время размножения. Фото на врезках (гнездо скопы и скопа у гнезда на болоте Копоты) автора.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Пролётный, вероятно гнездящийся (перелётный) вид. В период сезонных миграций самцы зарегистрированы: весной – 23-29 апреля (1983 и 1985) на мелиорированных полях восточнее деревни Осыно и на лугах в урочищах Радуни и Боенские Луга (под Идрицей); осенью – 4-23 сентября (1994 и 1996) в сельскохозяйственных угодьях у деревни Осыно. В период размножения одиночных самцов наблюдали в 1980-х годах над полями около деревень Осыно (1983), Ковалёвка (1989), Мальково (1984-1985) и Дедино (Ильинский и др. 1991; Фетисов и др. 2002)*, в основном вдоль границ с Парком, однако достоверных сведений о гнездовании полевого луня не только в Парке, но и во всём Себежском Поозерье не получено.

11. ***Змееяд** *Circaetus gallicus*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Входит в группу наиболее малочисленных и легко уязвимых

* Встречи самок во внимание не принимались в связи с трудностями определения вида.

птиц Себежского поозерья (Ильинский и др. 1991, 2000). Впервые змеяед, причём дважды с кормом, отмечен на территории современного Парка в мае-июле 1982 года в Осынском лесничестве между озёрами Зеленец, Колпын, Дёмино и Нитятцы (Фетисов 1982; Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010), а в 1984 году найдено гнездо неподалёку от урочища Боровые (Фетисов 1984; Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002). В 1985 году это гнездо пустовало, возможно, из-за проводившихся возле него лесоработок (Патрикеев 1987). Однако в последующие годы змеяедов неоднократно встречали в разных местах Парка (рис. 9), в том числе пару птиц в период размножения: 14 апреля 2010 – между деревнями Дворище и Чёрная Грязь; 21 июля 2010 – на северном берегу озера Дёмино, 26 июня 2012 – в урочище Холодни-ки (Волков, Фетисов 2010а; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012). Кроме того, в сентябре 1996 года слётки змеяеда пойман между деревнями Галузино и Сутоки, сравнительно недалеко от Парка (Гуль 2000; Фетисов 2009а).




Рис. 9. Места встреч змеяеда в национальном парке «Себежский»:

- – взрослых особей в период размножения; ○ – в период весеннего пролёта;
- – место гнездования в 1984 году. Фото на врезке (птенец змеяеда) И.В.Ильинского.

12. ***Большой подорлик** *Aquila clanga*. Пролётный, вероятно гнездящийся (перелётный) вид, относящийся к группе наиболее малочисленных и легко уязвимых птиц Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991; Фетисов 1987; и др.). До образования Парка большой подорлик был зарегистрирован на его территории всего в двух местах: одну пару

неоднократно отмечали в 1986 и 1989 годах в лесу, примыкающем к Красиковскому болоту, а одиночную птицу наблюдали 30 мая 1988 близ озера Ормея (рис. 10). В последующие годы – уже в самом Парке – одиночные большие подорлики часто охотились летом 1997-2000 годов между озёрами Нечерица и Ужинец, чаще всего в пойме реки Свольна (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Однако найти гнездо этого вида в Парке пока так и не удалось, хотя взрослых птиц продолжали наблюдать в 2012, 2014 и 2016 годах в пойме реки Нища рядом с Красиковским болотом (Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; Фетисов, Фёдоров 2014; Фетисов 2014а, 2016г).




Рис. 10. Места встреч большого и малого подорликов в период размножения в национальном парке «Себежский». Большой подорлик: ○ – места встреч взрослых особей; □ – гнездовые участки; Малый подорлик: ● – места встреч слётков; ■ – места находок гнёзд. Фото на врезке (птенец малого подорлика в гнезде) автора.

13. *Малый подорлик *Aquila pomarina*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. В 1982-1990 годах был сравнительно обычен среди крупных хищных птиц Себежского Поозерья: здесь обитало не менее 10 его пар (Ильинский и др. 1991), так что на участках старого смешанного леса, граничащего с лугами, пастбищами и пустошами, плотность поселения составляла 2 пары на 100 км². Первое гнездо (с 2 яйцами) найдено в 1984 году близ деревни Мальково (рис. 10), неподалёку от границы будущего Парка; второе – в 1992 году в окрестностях озера Анисимовское. Ещё одно гнездо находилось под регулярным наблюдением в 1998-2000 годах в окрестностях деревни Нища, немного

юго-восточнее Парка (рис. 10); в 1999 году там успешно вылетел один птенец (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Помимо того, гнездовые участки малых подорликов были в 1987-2000 годах в урочище Ширяево, к югу от деревни Осыно, а в 1999-2000 – примерно в 3 км к северу от деревни Рудня. (В сентябре 2000 на этих участках были пойманы 2 ослабевших от голода слётка*, доставленных вскоре в Ленинградский зоопарк.) Охотившихся в период гнездования подорликов встречали до 2000 года и в других местах Парка и на границе с ним: в урочищах Боровые, Дубищи и Орловичи, близ деревень Бондари, Новиково и Полейковичи (Фетисов и др. 1997, 2002). В начале XXI века малый подорлик, однако, сильно сократил свою численность не только в Парке, но и во всём Псковском Поозерье и более или менее регулярно встречался лишь в окрестностях деревни Осыно, где пара с птенцом была отмечена в августе 2002 и 26 июля 2009, а одиночные взрослые особи регулярно появлялись в период размножения до 2014 года (Фетисов 2006, 2009а, 2013а; Фетисов, Стукальцов 2009; и др.). Ещё одна взрослая птица со слётком отмечена 1 августа 2011 и 18-22 июля 2012 в окрестностях деревни Илово-2 (Фетисов, Волков 2011; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012). Единичных же особей в периоды пролёта встречали 26 сентября 2004 на пастбище у деревни Чернея, 14 апреля 2010 – на суходольном лугу к северу от деревни Дворище (Фетисов 2004; Волков, Фетисов 2010а, 2011а).

14. ***Беркут** *Aquila chrysaetos*. Пролётный, вероятно гнездящийся, зимующий вид. В 1980-1990-е годы одиночных беркутов неоднократно встречали на территории нынешнего Парка в основном в двух районах: во-первых, на болоте к юго-западу от озера Нечерица и в окрестностях озёр Долгое и Припешы; во-вторых, вокруг деревни Осыно, в пойме реки Нища и на Красииковском болоте (Фетисов и др. 1997, 2002). После создания Парка одиночные охотившиеся беркуты в течение всего года зарегистрированы на ещё большей его территории (рис. 11): помимо окрестностей деревни Осыно, их наблюдали в пойме реки Чёрной у деревни Рудня; на обширном болоте, примыкающем к озеру Бронье (в июле 2011-2012); на заболоченном берегу озера Травивец (в июле 2010); возле деревни Черново, рыбопродуктивного пруда и озера Островно (в июне 2010-2011, 10 сентября 2012); у деревни Белогурово (сразу 2 особи в апреле 2010); над озером Ороно (в январе 2010) и других местах (Фетисов, Стукальцов 2009; Волков, Фетисов 2010а, 2011а; Фетисов 2011; Фетисов, Волков 2011; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; Результаты... 2013). Однако чаще всего беркутов по-прежнему видели

* Лето и сентябрь 2000 года были крайне дождливыми и холодными в Себежском Поозерье, поэтому многие хищные птицы не смогли выкормить своих птенцов в гнёздах и не подкармливали слётков после оставления ими гнёзд. В тот же год подорлики оставили своё гнездо с кладкой яиц в окрестностях деревни Нища, скорее всего – после похолодания 18 июня до минус 6°C.

вокруг деревни Осыно, где они не раз охотились даже на окраине самой деревни, подкарауливая домашнюю птицу (Фетисов 2002, 2006; Волков, Фетисов 2011в). Несмотря на регулярные встречи беркутов в Парке, их гнезда пока не найдено. Правда, один слёткок пойман в Себежском Поозерье 12 августа 2004 в урочище Бланты (Дроздецкий, Петренко, Фетисов 2004, 2014; Фетисов 2004), примерно в 5 км к северу от деревни Сляжево. Осенью и зимой в Себежском Поозерье появляются беркуты, родившиеся в Финляндии. Так, в ноябре 2007 в урочище Наволоки, недалеко от Парка, отловлен годовалый беркут, помеченный, будучи птенцом, финским кольцом Е 18476. Другой беркут, помеченный в Финляндии кольцом Е 20248, погиб в феврале 2009 года от удара током на ЛЭП между деревнями Дедино и Ляхово (Буланов, Фетисов 2008-2009; Фетисов 2009а,б). Ещё один молодой беркут сильно ослабел после обильного снегопада и, возможно, погиб от голода в январе 2007 года; он сидел на краю дороги недалеко от деревни Большое Крупово и с трудом отлетал в сторону при приближении человека (Фетисов 2007).




Рис. 11. Места встреч беркута в национальном парке «Себежский»:
○ — до 1996 года; ● — после 1996 года (после создания Парка).
Фото на врезке (молодой беркут) автора.

15. ***Орлан-белохвост** *Haliaeetus albicilla*. Пролётный, гнездящийся, зимующий вид, известный на территории Парка с 1971 года. Позднее было найдено его гнездо на берегу озера Осыно, разрушенное в 1979 году браконьером, но уже в 1982 удалось найти другое гнездо в

104 квартале Осынского лесничества (Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Патрикеев 1987; Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 1999, 2014), в котором орланы размножались в 1982, 1987, 1988, 1992, 1994, 1999, 2002 и 2004-2005 годах, хотя появлялись на время в своём гнезде и встречались в его окрестностях почти каждый год. В 1996 году, вероятно, на том же гнездовом участке, но гораздо ближе к озеру Осыно, отмечен слёт орланов (рис. 12), а в 2000 году В.В.Ивановский сообщил о новом гнезде, расположенном неподалёку от озера Осыно (Фетисов 2002, 2004, 2006; Фетисов и др. 2002). Помимо того, в июле 2004 года и 1 августа 2012 одну пару орланов с 2 слётками сотрудники Парка наблюдали на восточном берегу озера Нечерица, в районе деревни Волоцня и озера Глыбуха (Фетисов 2004; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012), а 3 августа 2011 – другую пару с 1 слётком в окрестностях озера Анисимовское (Волков, Фетисов 2011в; Фетисов, Волков 2011). Охотившихся же орланов наблюдали в Парке круглогодично в очень многих местах (рис. 12): возле озёр Анисимовское, Белое, Березвица, Вятитерьво, Дёмино, Долгое, Колпын, Лисно, Нечерица, Озерявы, Омелуха, Ормея, Ороно, Островно, Осыно, Себежское, Ужинец, Чердынец, Хотяжи, Ярица, а также в поймах рек Нища и Свольна, на болотах Копоты и Красииковское, на рыбопроизводном пруду у деревни Черново и др. (Фетисов и др. 1997, 1999, 2014; Могиленко, Тарасов 2001; Фетисов 2002-2004, 2006-2007, 2011, 2013а, 2014а, 2016г; Фетисов и др. 2002; Волков, Фетисов 2010а, 2011в; Фетисов, Волков 2011; Результаты... 2012; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; Фетисов, Фёдоров 2014). Но в целом этот вид всё же всегда был довольно редок и легко уязвим не только в Парке, но и во всём Псковском Поозерье (Ильинский и др. 1991; Фетисов и др. 1999, 2014). Во время миграций и зимой число орланов в Себежском Поозерье, однако, несколько увеличивается; в кормных местах можно встретить тогда даже небольшие группы птиц. Так, 8 марта 2010 на Красииковском болоте на туше павшего лося *Alces alces* кормились одновременно 6 орланов (Волков, Фетисов 2010а), тогда как в летний период лишь над озёрами Нечерица и Себежское редко встречается более 3-4 особей. При наличии доступного корма один взрослый орлан съедает за один раз примерно 1 кг рыбы (Дроздецкий, Суханов, Фетисов 2004). Территориальные связи «себежских» орланов весьма обширны. Участки обитания некоторых особей лежат непосредственно на границе Парка с Белоруссией: например, летом 1999-2000 годов один из них улетал с добычей с озера Ормея на запад, в сторону белорусского охотничьего заказника «Освейский» (Леоке, Фетисов 2006, 2015; Леоке 2008). Один орлан, окольцованный в Латвии, разбил себе крыло у озера Мидино, был отловлен там в начале апреля и передан на содержание в эколого-биологический центр «Кречет» в Санкт-Петербурге (Фетисов 2002). Другой ор-

лан, окольцованный, будучи птенцом, в окрестностях озера Колпын в 1992, был замечен, по данным Центра кольцевания, в 1995 году на зимовке в Польше (Фетисов 2009а). В последние годы появились орланы, терпимые к присутствию человека. На озёрах Нечерица, Озерявы и Себежское, например, некоторые орланы иногда вылетают на лёд, где рыбаки подкармливают их рыбой. В целях охраны орлана следует продолжать поиски и следить за состоянием отдельных гнёзд, а также организовывать зимнюю подкормку птиц. Целесообразно также строительство гнездовых платформ в местах возможного размножения орланов. В разных районах Псковской области отмечена положительная роль в сохранении орлана-белохвоста нескольких особо охраняемых природных территорий, в том числе национального парка «Себежский» (Мусатов, Сагитов, Фетисов 2000).





Рис. 12. Места встреч орлана-белохвоста в национальном парке «Себежский». ■ — места охоты взрослых особей; ● — места находки гнёзд; ○ — места встреч слётков. Фото на врезках автора. Озеро Дёмино — одно из охотничьих угодий орлана-белохвоста в Парке. Слёток орлана на гнездовом участке в окрестностях озера Осыно.

16. ***Сапсан** *Falco peregrinus*. Пролётный, летующий вид. До создания Парка одиночных сапсанов несколько раз отмечали, по сообщению Ю.Б.Пукинского, на этой территории летом 1982-1985 годов, а в мае 1996 сапсана наблюдал также В.В.Степанов неподалёку от Парка, над рекой Нища в урочище Касьминка (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Места встреч этого вида были известны и в Освейском охотничьем заказнике (Природа Белоруссии 1989), граничащим с Парком в

юго-западной его части. Позднее сапсан встречен в Парке (рис. 13) летом 19 июля 2010, когда пара птиц появилась над болотом Копоты, где выясняла некоторое время отношения с парой скоп, и 3 июня 2016 над тем же болотом. 6 июля 2011 ещё один сапсан отмечен над посёлком Сосновый Бор, сравнительно недалеко от Парка. Гораздо чаще одиночных охотившихся сапсанов регистрировали в периоды послегнездовых кочёвок и сезонных пролётов над Парком в 2007-2011 годах: 12 апреля – над озером Большое Олбито возле деревни Ковалёвка; 7 августа – между деревнями Чёрная Грязь и Дворищи; 3 сентября – над церковью в городе Себеж; в середине сентября – над деревней Илово и озером Ороно; 28 сентября – в урочище Нива на озере Осыно (Фетисов 2007, 2009а, 2016г; Фетисов, Стукальцов 2009; Волков, Фетисов 2010а, 2011в; Фетисов, Волков 2011).



17. **Дербник** *Falco columbarius*. Пролётный, гнездящийся, зимующий вид. Достоверно гнезвился в окрестностях деревни Осыно ещё в 1924 году, где 21 июля А.В.Федюшин (1926, 1927) добыл трёх молодых птиц, покинувших гнездо. По сообщению П.С.Томковича, тушка одной из них (самки) хранится теперь в Зоологическом музее Московского университета. В последние десятилетия дербник чрезвычайно редок, хотя одиночных особей изредка наблюдали в гнездовое время в Осинском и Руднянском лесничествах: в 1982 году – в урочище Боровые, в

1984 – близ деревни Рудня, в 1998 – на Красииковском болоте (Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Фетисов и др. 2002). Ближайшие места встреч этого вида известны также в пограничном с Парком Освейском охотничьем заказнике (Природа Белоруссии 1989). После создания Парка одиночных дербников отмечали (рис. 13): 3 и 6 июля 2000 – над восточным побережьем озера Ормея (Леоке 2008), 11 мая 2002 – на болоте Журавлёво Гнездо в окрестностях озера Чёрное (Фетисов 2002; 2009 а), 22 июля 2010 и 25 июля 2012 – у озера Зеленец. Помимо того, 27-30 апреля 2013 В.В.Ивановский видел дербника в окрестностях деревни Красный Бор, неподалёку от границы с национальным парком «Себежский». 3 декабря 2015 одиночный дербник охотился днём вдоль западного берега озера Ороно в окрестностях деревни Илово-2 (Фетисов 2016г).

18. **Кобчик** *Falco vespertinus*. Пролётный, вероятно гнездящийся (перелётный) вид. Как и в других районах Псковской области, повсеместно редок (Ильинский и др. 1991; Красная книга... 2014). На территории современного Парка известны встречи лишь отдельных охотившихся самцов в 1980-1990-х годах: 8 июня 1983 – на восточной окраине Красииковского болота; 21 мая 1984 и 26 июня 1985 – над мелиорированными лугами восточнее деревни Осыно; 9 июля 1994 – в городе Себеже недалеко от вокзала; 18 июля 1997 – над Красииковским болотом между деревней Красииково и рекой Нища (Фетисов и др. 1997, 2002; Фетисов 2009а). Возможно, что этот вид гнезвился в окрестностях деревни Красииково, где был отмечен неоднократно (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002).

19. **Обыкновенная пустельга** *Falco tinnunculus*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Была обычным гнездящимся видом Себежского уезда бывшей Витебской губернии. В частности, гнездо с 3 почти полностью оперёнными птенцами найдено 17 июля 1924 на восточном берегу озера Нища (Федюшин 1926). Однако с 1960-х годов пустельга начала сокращать свою численность и стала большой редкостью на гнездовье в Себежском Поозерье (Ильинский и др. 1991; Красная книга... 2014), хотя продолжает ещё встречаться здесь в гнездовой период. В 1980-е годы пустельга отмечена на территории нынешнего Парка лишь в 4 пунктах, а гнездилась, судя по поведению взрослых птиц, только однажды – в 1982 году близ урочище Боровые (Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Во время сезонных миграций её, правда, нередко наблюдали охотящейся над обширными мелиорированными землями к востоку от деревни Осыно: весной – 23 апреля 1983; осенью – 26-27 августа 1983, 29 августа 1997, 15-16 сентября 1989, 6 октября 2009 (Фетисов и др. 2002; Фетисов, Стукальцов 2009), а также на соседней с Парком территории Мальковских карьеров (Фетисов, Андреева, Конечная 2001; Фе-

тисов, Конечная, Андреева 2001). Одна молодая пустельга, помеченная в июле 1957 года в Финляндии (кольцо Н 22167), обнаружена в середине сентября 1957 в окрестностях Себежа (Фетисов и др. 2002).

20. ***Белая куропатка** *Lagopus lagopus*. Ведёт в основном оседлый образ жизни, хотя в зимний период может предпринимать даже дальние кочёвки в поисках корма. На территории Парка обитает подвид среднерусская белая куропатка *L. l. rossicus* Serebrowski, 1926. Судя по сведениям из «Экономических примечаний к планам Генерального межевания земель Себежского уезда Витебской губернии»^{*} эта птица была известна здесь ещё в XVIII веке, в частности в окрестностях бывших деревень Бондари, Волоцня, Глубочица, Дворищи, Красиково, Ширяева, Ореховно, Орловичи и Осыно, а в описаниях современных урочищ Волоцня и Орловичи белая куропатка упоминалась 9 раз (Меньшов, Фетисов 2007). Куропатка считалась обычным гнездящимся видом на моховых болотах Себежского уезда также в первой половине XX века (Федюшин 1926), но к концу XX века стала очень редка и была отнесена к группе наиболее малочисленных и легко уязвимых птиц Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991)[†]. Тем не менее, в середине 1960-х годов С.А.Фетисов дважды поднимал выводки куропаток на небольшом верховом болотце в урочище Панский Двор (рис. 14), в 1,5 км к юго-западу от деревни Осыно (Фетисов, Мусатов 2012). 9 июля 1982 выводок куропаток был зарегистрирован возле озера Травивец; 21 марта 1984 свежие наброды 10-12 особей, в том числе токовые «чертежи» самцов, отмечены на Красиковском болоте, а зимой 1996 года одна куропатка отмечена неподалёку от деревни Осыно (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002). В феврале 1997 года, в период проведения ежегодных зимних маршрутных учётов, кормовые наброды ещё 3 особей были учтены сотрудниками Парка на Красиковском болоте (Фетисов, Иванов, Леонтьева 1999; Фетисов, Стукальцов 2000). На современной территории Парка, площадь которого сравнительно невелика (около 50 тыс. га), а верховые болота в нём мелкоконтурны, численность белой куропатки в 2000-2010-е годы была минимальна (Волков, Фетисов 2011в; Фетисов 2011; Фетисов, Мусатов 2012; и др.). Не исключено даже, что этот вид исчезает теперь в Парке в некоторые годы, но потом снова появляется в осенне-зимний период в результате кочёвок со смежных болот Белоруссии, в первую очередь из заказников «Освейский» и «Красный Бор». Как бы то ни было, весной 2000 года В.Н.Дроздецкий видел в Парке одну куропатку в урочище Юнделевский хутор. Весной 2002 года, по данным А.И.Стукальцова, пара куропаток была вспугнута на болоте возле озера Ленёвец. В начале мая

^{*} См.: РГАДА. Ф. 1355, оп. 1, ед. хр. 28, 29.

[†] Зимой 1997/98 года при проведении областного учёта численности белой куропатки в Себежском районе её уже не удалось найти вовсе (Фетисов, Иванов, Леонтьева 1999).

2006 года трёх белых куропаток наблюдали на болоте, расположенном северо-восточнее озера Березвица (Фетисов 2006). В 2011 году зимний помёт куропаток был найден в трёх местах в редком сосняке на болоте Копоты (Волков, Фетисов 2011а; Фетисов, Волков 2011). За период существования Парка белая куропатка регулярно упоминалась при обновлении его видовых списков, в том числе редких птиц (Фетисов и др. 2000а,б, 2002; Ильинский и др. 2001; Фетисов, Ильинский, Чистяков 2001; Андреева и др. 2005; Фетисов 2005б; Фетисов, Волков 2012), а также в обзорных работах по особо охраняемым видам Парка (Фетисов, Конечная 2005). В настоящее время статус белой куропатки в Себежском парке, к сожалению, не известен, хотя раньше она гнездилась в нём в особо охраняемой зоне (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а; Головань, Ильинский, Фетисов 2005). Одним из наиболее неблагоприятных факторов для выживания белой куропатки в условиях Себежского Поозерья служит, вероятно, потепление климата, в связи с чем куропатки становятся очень уязвимы для пернатых хищников в беснежные зимы (Фетисов, Мусатов 2012).




Рис. 14. Места встреч белой куропатки в национальном парке «Себежский»:

- — выводков; ■ — особей или следов деятельности. Фото на врезках автора. Зимний помёт белой куропатки на болоте Копоты и следы кормовых набродов стайки белых куропаток на болоте Красиковское.

21. Водяной пастушок *Rallus aquaticus*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. В 1980-е годы он был довольно обычен на ряде водоёмов Себежского Поозерья, хотя его численность заметно варьи-

вала по годам (Фетисов и др. 2002). На территории нынешнего Парка локальные поселения пастушка были известны в 1983-1985 годах на озёрах Ормея, Осыно и Себежское (рис. 15), а также на реке Нища и ручьях, впадающих в озёра Нечерица и Осыно (Ильинский, Фетисов 1994). В 1985 году – впервые для Северо-Запада России – в Себежском Поозерье было найдено 5 гнёзд водяного пастушка с кладками, из них 4 на Себежском озере, а 1 – на озере Нечерица (Фёдоров 1998). В 1990-х годах пастушка наблюдали на восточном берегу озера Ормея (Леоке, Фетисов 2006, 2015; Леоке 2008), реках Олбितिца и Свольна и на заболоченном пруду возле деревни Дворище (Фетисов и др. 2002). Плотность поселения вида в период проектирования Себежского парка в мае-июле 1992 года составляла: на реках, ручьях и канавах – 1.1 ос./км²; на озёрах и прудах – 0.8; на низинных болотах – 2.0 (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а; Головань, Ильинский, Фетисов 2005).




Рис. 15. Места встреч водяного пастушка в национальном парке «Себежский»: ■ – районы находок гнёзд; ● – места встреч токующих самцов; ○ – места встреч беспокоившихся особей. Фото на врезке (водяной пастушок на гнезде на озере Себежское) И.В.Ильинского.


После образования Парка пастушков отмечали на его территории (рис. 15) на озёрах Мотыж (16 мая 2012 двух в устье ручья, впадающего в озеро у деревни Жуки), Ороно (21 сентября 2006 одного у деревни Илово-2, в мае-июне 2016 в Иловской луке) и Осыно (одного-двух токующих самцов 7 и 20 мая 2002 в урочище Павлюков Рог; одного 20 сентября 2006 и 17 мая 2008 в урочище Мельница), а также на реке Свольна (21 июля 2010 одного у моста через речку в урочище Рудня),

на протоке между озёрами Бронье и Ница (2 мая 2012 двух токующих самцов в урочище Городище), на бывших торфоразработках под Себежем (1 мая 2012 одного на заросшем пруду юго-западнее деревни Креково) (Фетисов 2016; неопубл. данные).

22. Погоныш *Porzana porzana*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Встречается по окраинам низинных болот, заболоченным берегам водоёмов и на полянах возле разлившихся лесных ручьёв. Распределение погонышей по территории и их численность могут сильно изменяться по годам (число токующих самцов, слышимых в 1980-х годах с одной точки в одних и тех же местах, менялось от 0 до 3-4, а ночью 4 мая 2008, во время массового пролёта, в пойме реки Ница у деревни Полейковичи было слышно одновременно 6-7 токующих самцов). Плотность поселения погонышей в мае-июле 1992 года составляла: на реках, ручьях и канавах – 1.1 ос./км²; на озёрах и прудах – 0.4; на низинных болотах – 3.9; на пойменных лугах – 4.7 (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а). Начало прилёта приходится на третью декаду апреля – первую декаду мая. Первые брачные крики самцов отмечены 20 апреля (1988 и 1995) – 9 мая (1992). Интенсивный пролёт идёт около недели. В этот период погоныши кричат во многих местах, например, в пойме реки Ница, на берегах озёр Белое, Мотаж, Нечерица, Озерявы, Ороно, Осыно и др. (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2003, 2007, 2009а; Фетисов, Фёдоров 2014), откуда потом исчезают. Оставшиеся особи токуют обычно до конца мая – начала июня (Фетисов 2003, 2016г) и ведут себя чрезвычайно скрытно. Так, в 2007 году, когда присутствие погонышей в Парке не было зарегистрировано даже во время их токования, один из них был добыт 8 августа кошкой на сыром берегу (или на мелководье в густых тростниках) озера Ороно в деревне Илово, под Себежем (Фетисов 2008в, 2016а,в). В единственном гнезде погонышей, найденном в 1983 году на Красииковском болоте, было 13 яиц. 8 июня в нём начали вылупляться птенцы (Фетисов и др. 2002). Два чучела взрослых погонышей и магнитная запись голоса этого вида представлены в орнитологической экспозиции Себежского краеведческого музея (Фетисов, Пинигина, Цветкова 1998).

23. Малый погоныш *Porzana parva*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Известен в Себежском Поозерье, в том числе на территории нынешнего Парка, с 1982 года (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002), а в 1983 году впервые для Северо-Запада России было найдено его гнездо на озере Осыно (Пукинский, Сагитов 1985, 2014). Применяя метод акустических аттрактантов (Ильинский, Фетисов 1986), в 1984-1985 годах выявлено несколько локальных поселений малого погоныша (рис. 16) на таких озёрах Парка, как Нечерица, Ница, Озерявы, Осыно и Ормея, а также озёрках на Красииковском болоте и реке Ница (Пукинский 1989, 2008; и др.). Наибольшую численность малых

погонышей наблюдали в тростниковом займище на реке Нища в урочище Слобода, где на участке в 15 га отметили 11 гнездовых пар; некоторые из них находились не далее 80 м одна от другой (Фетисов и др. 2002). В период проектирования Парка в мае-июле 1992 года плотность поселения вида составляла: на реках, ручьях и канавах – 1.7; на озёрах и прудах – 0.6 ос./км² (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а; Фетисов 2009а). В отличие от обыкновенного, малый погоныш поселяется в Себежском Поозерье исключительно по берегам водоёмов и водотоков, занимая мелководья, где чередуются участки открытой воды с зарослями тростника, хвоща и сплавинами (Ильинский, Фетисов 1994). После образования Парка токующих погонышей слышали на озёрах Нечерица (в районе истока реки Свольна 1 мая 2012), Ормея (в мае 2002), Осыно (в урочище Павлюков Рог – 6 и 7 мая 2002 и 10 мая 2009; в урочище Мельница – 17 мая 2008), Припешы (22 мая 2009) и Себежское (в колонии озёрных чаек *Larus ridibundus* в черте Себежа 28 апреля 2012), на реках Нища и Осынка (Фетисов 2002, 2012в; Фетисов, Стукальцов 2009; неопубл. данные С.А. Фетисова).



***Золотистая ржанка** *Pluvialis apricaria*. Встречалась в 1980-е годы на самой границе с территорией нынешнего Парка не только на пролёте, но и в период размножения. Так, 1-4 особи этого вида неоднократно появлялись на мелиорированных землях вокруг деревни Осы-

но. Пара птиц была отмечена в урочище Самодурово 1-8 июля 1984, 25-28 июня 1987 и с 13 мая по 12 июня 1988. В последнем случае кулики держались на определённом участке, токовали и проявляли выраженное беспокойство. Такое же поведение у пары птиц наблюдали и в мае-июне 1989 года. Во время осенних миграций ржанок также встречали возле деревни Осыно. С 3 по 7 октября 1993 года 1-2 особи каждую ночь кормились здесь на грязной полевой дороге, и 2 из них были пойманы и окольцованы (МА 021004, МА 021010). Кроме того, в 1996 году одна золотистая ржанка держалась 20-23 сентября на пастбище возле деревни Осыно (Фетисов и др. 2002). Тем не менее, этот вид уже тогда относился к группе наиболее малочисленных и легко уязвимых птиц Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991).




Рис. 17. Места встреч кулика-сорочки в национальном парке «Себежский».
● — места встреч пролётных особей. Фото на врезке (кулик-сорока) автора.

24. ***Кулик-сорока** *Haematopus ostralegus*. Пролётный вид. Все его встречи на территории Себежского Поозерья (за исключением одной на озере Себежское у деревни Селявы) зарегистрированы в основном в двух местах — на озёрах Осыно и Ороно (рис. 17), т. е. в районах, где проводились наиболее регулярные наблюдения за птицами: на озере Осыно — в период существования орнитологического стационара Биологического института Ленинградского университета в деревне Осыно (до образования Парка), на озере Ороно — после переезда автора на жительство в деревню Илово (на берегу озера Ороно) в связи с нача-

лом работы в национальном парке «Себежский». Всего удалось отметить 10 встреч (15 особей) в период с 31 мая по 21 августа: одну (1) – в мае, 3 (7 особей) – в июне, 4 (5) – в июле и 2 (2 особи) – в августе (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2006, 2009а, 2015в; Волков, Фетисов 2010а). Ближайшие известные места размножения кулика-сороки находятся, по сообщению В.П.Козлова, в Браславском районе Витебской области (Никифоров, Яминский, Шклярков 1989) и в урочище Выбутские пороги на реке Великой под городом Псковом (Фетисов 1999в).




Рис. 18. Места встреч большого улит в национальном парке «Себежский»:

■ — места гнездовых участков; ● — места встреч пролётных особей.

Фото на врезке (большой улит на болоте Коноты) автора.

25. Большой улит *Tringa nebularia*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Был известен на гнездовании по берегам небольших лесных озёр: Завирье, Травивец и др. ещё в начале 1980-х годов (Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010). Так, взрослых птиц, беспокоившихся возле выводков, отмечали 13-14 июня 1983 на заболоченном лугу возле озера Дёмино и 30 мая 1984 у озера Травивец (рис. 18). 8 июля 1982 выводок птенцов в возрасте 8-10 дней наблюдали на берегу белорусского озера Телятное, на границе с нынешнем Парком в урочище Боровые (Фетисов и др. 2002). Однако уже в те годы большой улит относился к группе малочисленных птиц Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991), а в последнее десятилетие стал на гнездовании в Парке ещё более редок. В частности, после образования Парка этот вид был отмечен в период размножения всего трижды: один раз —

у озера Бездонное и дважды – на краю болота Копоты, где улиты беспокоились возле выводков (рис. 18) в первой и второй декадах июня 2005 и 2006 годов (Фетисов 2009а; и др.). Наиболее ранние весенние встречи улитов зарегистрированы 21 апреля (1983) и 24 апреля (2011). В течение первой половины мая отдельных, вероятно, пролётных особей неоднократно наблюдали в пойме реки Нища (особенно часто в урочище Слобода), окрестностях озёр Анисимовское и Осыно, на бывших торфозаготовках у деревни Креково, на спущенном рыбопродукционном пруду в деревне Черново (Фетисов 2002, 2009а; Фетисов, Волков 2011). Во время летних перемещений улиты встречались с 27 июля до 21 августа: 3 особи – на бывших торфозаготовках в 7 км к западу от Себежа, одиночные особи – на обнажившихся отмелях озёр Осыно и Себежское (Фетисов 2004, 2015в, неопубл. данные).

26. Травник *Tringa totanus*. Пролётный, летующий (перелётный) вид. К настоящему моменту травник отмечен на территории Парка (рис. 19) всего 4 раза. 17 мая 1983 пара кормилась на сыром лугу в окрестностях деревни Осыно. 2 июня 1989 три взрослых травника держались, не проявляя беспокойства, на мелиорированных землях примерно в тех же местах, что и в 1983 (Фетисов и др. 2002). 19 июня 2011 одиночная птица кормилась на берегу обмелевшего пруда в деревне Черново. 30 апреля 2016 один травник пролетел на север над озером Ороно (Фетисов 2016г).




Рис. 19. Места встреч травника и дупеля в национальном парке «Себежский»:
● – места встреч травника; ■ – места токования дупеля. Фото на врезке (травник) автора.

27. **Дупель** *Gallinago media*. Пролётный, вероятно гнездящийся (перелётный) вид. Встречается в Себежском Поозерье крайне редко и уже давно относится к группе наиболее малочисленных и легко уязвимых птиц (Ильинский и др. 1991). Небольшой ток дупелей существовал в начале мая 1983 года на кочковатом сыром лугу в 600 м от деревни Осыно (рис. 19). До начала выпаса скота его посещало не менее 3 самцов, но потом ток был разогнан. На следующий год, 21 и 22 мая 1984, примерно в тех же местах удалось отметить голоса уже только 2 одиночных самцов, но после этого и они исчезли (Фетисов и др. 2002). В конце июля – августе одиночных дупелей наблюдали, кроме того, в 1980-1990-е годы на сырых, поросших кустами лугах в урочище Орловичи, на восточном берегу озера Нечерица (Фетисов 2009а). Более того, по данным А.И.Стукальцова, в первой декаде мая 2006 года там токовали 3-5 самцов. Однако в связи с прекращением сенокосения в урочище Орловичи луга заросли густым мелколесьем и этот дупелиный ток тоже перестал существовать.




Рис. 20. Наиболее частые места пролёта большого кроншнепа в национальном парке «Себежский».

● – места встреч кроншнепов во время весеннего пролёта; ■ – места летне-осенних перемещений.

Фото на врезке (мигрирующая стайка кроншнепов) автора.

28. ***Большой кроншнеп** *Numenius arquata*. Регулярно встречается в Парке только на пролёте, хотя в мае-июне 1982-1989 годов отдельные токующие особи и пары появлялись в сельскохозяйственных угодьях в окрестностях деревень Осыно и Полейковичи, на самой границе с нынешним Парком. Их токовые полёты регистрировали обычно в

первой-второй декадах мая, но иногда вплоть до второй декады июня (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Теперь эти угодья заросли мелко-лесьем и утратили своё былое значение для кроншнепа (Фетисов 2002), а сам большой кроншнеп отнесён ещё в начале 1990-х годов к группе наиболее малочисленных и легко уязвимых птиц Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991). Весенний пролёт этого кулика происходит на территории Парка, тем не менее, довольно регулярно, обычно в третьей декаде апреля – первой декаде мая, реже – начиная с первой декады апреля: 7 апреля 2010, 11 апреля 2007, 16-17 и 20 апреля 2011, 21 апреля 1988, 22 апреля 1991, 23 апреля 1983, 24 апреля 1987, 28 апреля 1995, 3 мая 1998, 5 мая 1986 (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2007; Волков, Фетисов 2010а, 2011в). Самые крупные стаи, насчитывавшие около 40 особей, наблюдали 3 мая 1998 над карьерами возле деревни Мальково и 16 апреля 2011 над озером Ороно. Чаще в стаях было не более 15-20, ещё чаще – 5-10 кроншнепов. Все они летели в разное время суток, в том числе ночью, на высоте обычно не выше 150-200 м, как правило, в северном – северо-восточном направлениях. Лишь одна стая (из 37 птиц) вела себя иначе: она неоднократно меняла направление своего полёта 16 апреля 2011, возможно, в поисках удобного места для кормёжки и отдыха или гнездовых биотопов, и улетела от деревни Илово в восточном – юго-восточном направлении.

Летние перемещения больших кроншнепов над Парком оказались весьма «размыты» по времени. Две стаи кроншнепов (из 7 и 31 особи) удалось наблюдать уже в первой половине июня: 8 июня 1993 и 14 июня 2011; они летели на запад – юго-запад и, скорее всего, состояли из птиц, не участвовавших по разным причинам в размножении. Помимо них, 28-30 июня 2008 и в первых числах июля того же года возле деревни Илово пролетали в том же направлении, издавая голосовые сигналы, как одиночные кроншнепы, так и небольшие их группы. Во второй же половине июля – первой половине августа ежегодно отмечали заметные направленные перемещения кроншнепов стайками из 5-10 и даже 15-17 особей. Их наблюдали с 10 июля (2008) до 16 августа (2011) на широком фронте – от деревни Осыно и Красиковского болота до озёр Ороно и Себежское (рис. 20) – нацеленном в основном в юго-западном, реже южном направлениях (Фетисов 2006, 2015в; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012).

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*. Пролётный вид, известный в Себежском Поозерье, в том числе на территории нынешнего национального парка «Себежский», во время летних кочёвок (28 июня 1985, 13 июля 1982, 21 июля 1987), причём дважды в стаях с большими кроншнепами. В двух случаях – 11 мая 1984 и 16 июля 1987 – пара средних кроншнепов и смешанная стайка больших и средних кроншнепов кормилась на полях в урочище Самодурово в окрестностях де-

ревни Осыно (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Теперь эти уголья заросли мелколесьем. После образования Парка средних кроншнепов на его территории не наблюдали. Чучело взрослой особи этого вида представлено в орнитологической экспозиции Себежского краеведческого музея (Фетисов, Пинигина, Цветкова 1998).




Рис. 21. Места встреч большого веретенника в национальном парке «Себежский».

• – во время весеннего пролёта; ■ – на гнездовании. Фото на врезке (большой веретенник на лугу у деревни Осыно) автора.

29. Большой веретенник *Limosa limosa*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Относится к группе малочисленных и легко уязвимых птиц Себежского Поозерья. Отличается изменениями в поведении, вызванными хозяйственной деятельностью человека и приобретением способности гнездиться на сельскохозяйственных полях (Ильинский и др. 1991). До образования Парка большие веретенники не раз были отмечены во время размножения на его нынешней территории (рис. 21): в 1983 году – одна пара у Красииковского болота, а также поселение из 7 пар на полях в окрестностях деревни Осыно; в 1984 – одна пара в пойме реки Нища; в 1985 – одна пара у деревни Осыно; в 1986 – 2 пары на пойменном лугу возле озера Лисно; в 1987-1990 – по 2-3 пары на полях у деревни Осыно (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Полные кладки состояли из трёх (1 случай) и четырёх (4) яиц. Вылупление птенцов происходило с 31 мая по 9 июня. Взрослые птицы переставали беспокоиться возле выводков во второй декаде июля. После образования Парка одиночные пролётные веретенники зарегистрированы 24 апреля 2011 на кормёжке на отмели одного из прудов в рай-

оне бывших торфоразработках у деревни Креково (Фетисов, Волков 2011) и 24 апреля 2014 над озером Ороно (Фетисов 2014а), а 24-29 апреля 2010 группа из 3 особей регулярно кормилась на влажном сенокосном лугу и сильно заболоченном участке луга на северной окраине деревни Осыно, приближаясь иногда к жилому дому, расположенному в виде хутора на краю этой деревни, на 30-50 м (Волков, Фетисов 2010а). Весенние перемещения отдельных веретенников затягивались иногда до третьей декады июня. Так, весной 1998 года одна пара появилась у деревни Осыно, токовала там, но не осталась для гнездования. 17 мая 2012 одного веретенника вспугнули на лугу возле озера Ормея. 19 июня 2006 стайка больших веретенников пролетела над озером Ороно. Наряду с этим, в мае 2003 года гнездовая колония веретенников из 6 пар располагалась на сенокосном лугу между деревней Осыно и одноимённым озером, всего в 200 м от деревни; в конце июня В.А.Дюбов видел на этом лугу пуховичков (Фетисов 2003, 2009а). 13 мая 1998 спаривание веретенников наблюдали возле канавы, вытекающей из озера Выдринское. 16 мая 2012 один веретенник токовал над болотцем возле деревни Букатино.




Рис. 22. Места встреч белокрылой крачки в период размножения в национальном парке «Себежский». ■ – места встреч на гнездовании. Фото на врезке (белокрылая крачка) автора.

30. Белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Сравнительно регулярно встречается на некоторых озёрах Себежского Поозерья. В период размножения её отмечали 28 мая 1985 (одна крачка) на озере Бородулинское; 20 июня

1986 и 30-31 мая 1988 (несколько птиц) в гнездовом биотопе на озере Ормея (Рис. 22) (Фетисов и др. 2002). Уже тогда было высказано предположение (Ильинский и др. 1991), что отдельные пары белокрылых крачек могут гнездиться иногда в колониях чёрных крачек *Chlidonias niger*. Оно подтвердилось в 2011 и 2014 годах на озере Ормея. 22 июля 2011 там удалось наблюдать 3 взрослых и 2 молодых белокрылых крачек среди стаи (примерно в 50 особей) чёрных крачек, а 14 мая 2014 не менее 11 белокрылых крачек в гнездовой колонии чёрной крачки в юго-западной части озера Ормея (Фетисов 2014а). Ближайшее к озеру Ормея место размножения белокрылой крачки давно известно в Освейском охотничьем заказнике (Природа Белоруссии 1989), по соседству с национальным парком «Себежский» – там, где этот вид неоднократно гнезвился в 1980-1990-х годах на озере Освея (Наумчик, Дорофеев, Бирюков 2000).




Рис. 23. Места встреч клинтуха в национальном парке «Себежский»: ● – во время весеннего пролёта; ■ – на гнездовании. Фото на врезке (клинтух на пролёте у деревни Мальково) автора.


31. Клинтух *Columba oenas*. Пролётный, вероятно гнездящийся (перелётный) вид. В начале XX века считался обычным гнездящимся видом Себежского уезда (Федюшин 1926), но к настоящему времени стал крайне редок (Ильинский и др. 1991). До образования Парка на его территории было отмечено всего 2 гнездовые пары клинтухов (рис. 23): одна – 3 и 27 мая 1983 на опушке старого осинника в окрестностях деревни Осыно, другая – 18 июля 1983 на краю сосняка-черничника неподалёку от озера Дёмино (Фетисов и др. 2002). После образования

Парка одиночных особей во время размножения наблюдали 18 мая 2003 у деревни Забелье, на западном берегу озера Озерявы (Фетисов 2003) и 25 июля 2012 на дороге между озером Зеленец и урочищем Боровые. Помимо того, в урочище Мальковские карьеры, возле деревни Мальково, удалось дважды зарегистрировать прилетевших или пролётных клинтухов. Так, 11 апреля 2011 года 8 особей пролетели днём стаей, следуя на восток и пересекая Мальковские карьеры, а 23 апреля 2014 у деревни Мальково пролетел одиночный клинтух (Фетисов 2014а).

32. Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur*. Пролётный, вероятно гнездящийся (перелётный) вид. В начале 1980-х годов горлица уступала по численности среди диких голубей в Себежском Поозерье лишь вяхирю *Columba palumbus*. В наиболее благоприятных для неё станциях – небольших лиственных рощах, сосновых молодняках вблизи полей и лугов и т.п. – плотность её поселений достигала тогда 1 пары на 1 км². В мае-июле 1992 года, в период проектирования Парка, на его территории было зарегистрировано: в сосновых борах – 0.3; в лиственных – 0.4; в сосновых молодняках – 0.4; в придорожных лесополосах – 0.7 ос./км² (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а). Первые песни горлиц отмечали обычно в первой декаде мая (например, 7 мая 1984, 9 мая 1986). В раннюю весну 1989 года первая горлица была встречена 2 мая. Откладку яиц наблюдали в третьей декаде мая – первой декаде июля. Однако уже в 1990-е годы численность обыкновенной горлицы начала существенно уменьшаться (Ильинский и др. 2000) и сократилась настолько, что в XXI веке на территории Парка была зарегистрирована всего одна горлица, вспугнутая машиной 18 мая 2003 года на обочине шоссе возле деревни Мальково (Фетисов 2003).

33. Болотная сова *Asio flammeus*. Пролётный, вероятно гнездящийся (перелётный) вид. В начале XX века была обычной птицей Себежского уезда (Федюшин 1926), но к 1980-м годам стала под Себежем крайне редкой и встречается нерегулярно, хотя, возможно, и гнездится (Ильинский и др. 1991, 2001; Фетисов и др. 2000а-б, 2002). Все встречи болотной совы здесь зарегистрированы лишь в окрестностях деревни Осыно (рис. 24). Отдельные пары и одиночные особи отмечены в данном районе в мае 1983-1984 годов, в третьей декаде августа 1987 и 1989, в конце сентября – первой половине октября 1993-1995, 1997, 2007 и 2009 годов, в середине ноября 1994 (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005г, 2007, 2015г; Фетисов, Стукальцов 2009). На основе этих данных болотная сова внесена в список птиц Парка и перспективного («теневого») рамсарского угодья «Себежское Поозерье» в качестве редкого, особо охраняемого вида (Фетисов, Ильинский, Чистяков 2001; Фетисов 2005б; Конечная, Мусатов, Фетисов 2009). Токующих болотных сов удалось наблюдать 21-22 мая 1983 в

урочище Самодурово, где мелкоконтурные поля перемежаются заболоченными, поросшими кустарником и травой, торфяными низинами (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005г). В сентябре-октябре болотные совы наиболее регулярно охотились на скошенных лугах с присад (чаще с копён сена) или на лету, раз за разом облетая поисковым полётом участки с наиболее низким и редким травостоем. Их добычей служили только мышевидные грызуны, хотя совы вспугивали с земли и птиц. Охотящихся ночью болотных сов можно сравнительно легко поймать для осмотра и кольцевания сачком на длинной ручке, освещая при этом сов мощным пучком света; две из них были пойманы таким образом возле деревни Осыно в сентябре-октябре 2004 (Фетисов 2015г).



● — во время осенних кочёвок и пролёта; ■ — на гнездовании.

В последние 20 лет, в период деградации сельского хозяйства, настоящими проблемами сохранения охотничьих угодий болотных сов стали, во-первых, зарастание лугов, в том числе мелиорированных, кустарниками и, во-вторых, выжигание весной луговой растительности. Весенние палы, ежегодно сознательно устраиваемые местным населением, очень пагубны для этого вида, т.к. они создают дефицит мест для гнездования или даже служат причиной гибели ранних кладок, а также сильно ухудшают состояние его кормовой базы. Помимо того, некоторые охотники продолжают стрелять сов как «вредных» птиц. Например, весной 1992 одна болотная сова была бессмысленно убита

кем-то из охотников и брошена в период вальдшнепиной охоты (Фетисов и др. 2002). В целях экологического просвещения чучело одной взрослой особи и магнитная запись голоса болотной совы представлены в орнитологической экспозиции Себежского краеведческого музея (Фетисов, Пинигина, Цветкова 1998; Фетисов 2009а, 2013а).




Рис. 25. Места встреч мохноногого сыча в национальном парке «Себежский»:
● – во время кочёвок или пролёта; ■ – на гнездовании. Фото на врезке (мохноногий сыч) автора.

34. Мохноногий сыч *Aegolius funereus*. Пролётный, гнездящийся вид. Относится в Себежском Поозерье к группе редких и легко уязвимых птиц (Ильинский и др. 1991). По сообщению В.В.Ивановского, гнездится на территории нынешнего Парка (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005г), хотя до сих пор здесь зарегистрировано всего 2 его встречи (рис. 25). В мае 1982 года один самец отмечен по голосу на участке старого осинника на берегу озера Травивец (Ильинский, Фетисов 1994). 13 апреля 2007 одного сыча наблюдали на приусадебном участке с садом и постройками деревенского типа в городе Себеже (Фетисов 2007). Кроме того, 12 октября 1999 один сыч охотился ночью над скошенными лугами в урочище Малеево, близ деревни Долосцы, недалеко от юго-восточной границы с Парком (Фетисов и др. 2002).

35. Воробьиный сычик *Glaucidium passerinum*. Гнездящийся, зимующий вид. Как и мохноногий сыч, относится в Себежском Поозерье к группе наиболее малочисленных и легко уязвимых птиц (Ильинский и др. 1991). Тем не менее, В.В.Ивановскому (устн. сообщ.) удалось найти в 1990-х годах гнездо воробьиного сыча на территории нынеш-

него Парка (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005г). Однако общее число встреч сычиков в Парке пока ничтожно (рис. 26). Известно, что 15 июля 1997 крапивники *Troglodytes troglodytes* окрикивали одного сыча возле деревни Забелье-1 (Фетисов и др. 1997, 2002). 7 ноября 2014 другой сычик отмечен на мысу озера Ороно возле деревни Илово-2 (Фетисов 2015 в). Зимой 2012/13 года ещё один сычик встречен в сосняке в окрестностях озера Осыно (Результаты... 2013).




Рис. 26. Места встреч воробыиного сычика в национальном парке «Себежский». Фото на врезке (воробыиный сыч на берегу озера Ороно) автора.

Бородатая неясыть *Strix nebulosa*. Вероятно гнездящийся вид. Отдельные встречи этой совы Ю.Б.Пукинским известны летом в 1980-е годы на территории нынешнего Парка в Осыньском лесничестве, на восточном берегу озера Нечерица (Пукинский 1988; Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005г). Они послужили основанием для включения данного вида в список птиц Парка (Ильинский, Фетисов 1994; Ильинский и др. 2001; и др.), но после его образования подтвердить присутствие бородастой неясыти на этой территории пока не удалось.

Сизоворонка *Coracias garrulus*. Пролётный, вероятно гнездящийся (перелётный) вид. В начале XX века была довольно обычной гнездящейся птицей Себежского уезда (Федюшин 1926), но уже в 1970-х годах стала повсеместно редкой (Ильинский и др. 2000а,б). В первой половине 1980-х годов были отмечены последние 3 одиночные сизоворонки на границе с нынешним национальным парком «Себежский»: 27 и 28 июня 1982 – над озером Осыно и 10 июня 1984 – в окрестностях

деревни Ковалёвка (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002). Чучело взрослой особи есть в Себежском краеведческом музее (Фетисов, Пинигина, Цветкова 1998; Фетисов 2009а).

Зимородок *Alcedo atthis*. Пролётный вид. Гнездится в Себежском Поозерье на реке Великой (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а; Пухов 2011), но в других местах встречается здесь очень редко (Ильинский и др. 1991). На территории нынешнего Парка, ещё до его образования, были зарегистрированы всего 4 встречи одиночных зимородков. 5 августа 1982 и 15 августа 1984 пролётных особей отмечали в окрестностях озера Осыно, а в сентябре 1989 года один зимородок попался в паутинную сеть на берегу озера Осыно. Ещё одну птицу наблюдали 25 сентября 1999 на реке Нице в урочище Слобода (Фетисов и др. 2002).




Рис. 27. Места встреч удода на гнездовании в национальном парке «Себежский»: ● — 1982-1996 годы; ■ — 1997-2015 годы (после создания Парка). Фото на врезке (удод в деревне Илово-2) автора.

36. Удод *Uria ebor*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. В начале XX века был известен в Себежском уезде, хотя считался редкой и непериодически гнездящейся птицей (Федюшин 1926). В 1970-1980-е годы наблюдалось существенное повышение численности удода во всём Себежском Поозерье, но в конце 1980-х годов его численность вновь упала настолько, что удода наблюдали не каждый год (Ильинский и др. 2000а,б; Фетисов и др. 2002). На территории Парка удод селится в поймах водоёмов или вблизи населённых пунктов. В 1982-1985 годах гнездовые пары или токовавшие самцы держались в окрестностях деревень Забелье, Красиково, Рудня, Селявы, Чернея, в поймах

рек Нища и Свольна (рис. 27) (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002). После создания Парка одиночные удо́ды или пары встречались в нём в летний период: в 1990 году – в окрестностях деревни Рудня; в 1997 и 2004 – в 200-250 м к юго-востоку от деревни Забелье-1; в 2005 – на краю деревни Байдаково; в 2005, 2007-2012 – на окраине деревни Илово-2, примерно в 5 км от Себежа; в 2011 – на стадионе и возле православного кладбища в Себеже (Фетисов и др. 1997, 2002; Фетисов 2004, 2007, 2014а). Наиболее ранние даты прилёта удо́дов – 15 апреля 2010, 21 апреля 2007* и 25 апреля 1984. Токование происходит обычно во второй декаде мая – первой декаде июня.

37. Зелёный дятел *Picus viridis*. Вероятно гнездящийся вид. В начале XX века был известен в Себежском уезде (Федюшин 1926; Васильковский 1928), но во второй половине XX века его численность повсеместно настолько сократилась (Красная книга... 2014), что этот дятел встречается теперь в Себежском районе лишь в отдельных местах (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов 2009а). В 1980-е годы, например, одиночных самцов на территории нынешнего Парка удалось наблюдать только в лиственных и смешанных лесах в окрестностях деревни Осыно и урочище Боровые (Фетисов и др. 2002). После создания Парка зелёных дятлов несколько раз отмечали возле деревни Рудня (рис. 28). Так, 7 октября 2007 взрослый самец кормился на обочине дороги в сухом бору неподалёку от здания лесничества в деревне Рудня (Фетисов 2007). 20 мая 2009 самец токовал на опушке бора примерно в том же месте (Фетисов, Стукальцов 2009). В 2010 году, по данным Н.З.Ходулёва, 20 июня один зелёный дятел держался в сосновом бору на границе 4 и 8 кварталов, а 12 октября – 5 и 7 кварталов Руднянского лесничества. Помимо того, 16 июля 2010 взрослую самку вспугнули на обочине дороги в деревне Казинка, а 3 июля 2012 другая самка кормилась на муравейнике, расположенном в урочище Заозерье, на северном берегу озера Осыно.

38. Трёхпалый дятел *Picoides tridactylus*. Оседлый вид. Обнаружен в Себежском уезде ещё в 1924 году А.В.Федюшиным (1926) в Ливенской лесной даче†. На территории нынешнего национального парка «Себежский» случаи его размножения доказаны дважды. Первое в Псковской области жилое дупло трёхпалого дятла, устроенное в сухом сломанном стволе чёрной ольхи, найдено 19 июня 1982 в логу между озёрами Дёмино и Травивец. 24 июня из него успешно вылетели птенцы (Фетисов, Ильинский 1993г). 26 мая 2015 нелётный птенец другой пары (в качестве добычи обыкновенного осоеда *Pernis apivorus*) отмечен (и сфотографирован) неподалёку от озера Анисимовское (Фетисов

* Весь день 21 апреля 2007 года в деревне Илово-2 шёл снег с дождём.

† По данным П.С.Томковича, один экземпляр трёхпалого дятла, добытого там А.В.Федюшиным (1926), до сих пор хранится в Зоологическом музее Московского университета.

2015д). Помимо того, при обследовании рассматриваемой территории трёхпалых дятлов наблюдали: в 1982 году – на вырубках в сосновых борах и смешанных лесах в 104, 112 и 120 кварталах Осынского лесничества; в 1988 – на восточном берегу озера Осыно; в 1989 – на опушке леса в урочище Боровые; 13 мая 1998 – в урочище Гандино около озера Ормея; 8 мая 1999 и 14 мая 2007 – соответственно, в ельнике и на старой вырубке в сосняке близ деревни Стеймаки-2; 9 июля 2008 – неподалёку от озера Озерявы (рис. 28) (Фетисов 1982; Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Мальчевский, Пукинский 1983; Ильинский и др. 2000а,б; Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Из-за скрытного образа жизни и обитания в глухих, преимущественно еловых лесах, общая численность трёхпалых дятлов, возможно, занижается. Тем не менее, данный вид образует в Себежском Поозерье лишь спорадические изолированные поселения и может существенно пострадать при рубке хвойных лесов, так как это его основное местообитание.




Рис. 28. Места встреч зелёного и трёхпалого дятлов в национальном парке «Себежский»: ● – зелёного дятла; ■ – трёхпалого дятла. Фото на врезке (трёхпалый дятел в окрестностях озера Дёмино) автора.

Полевой конёк *Anthus campestris*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид, относящийся к группе наиболее малочисленных и уязвимых птиц Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991). Его локальные поселения были обнаружены на территории нынешнего Парка ещё в 1980-е годы в окрестностях города Себежа и деревни Мальково. Везде они были приурочены к участкам «... с изреженной низкорослой травянистой растительностью и сухим, хорошо прогреваемым грунтом»

(Пукинский, Пукинская 1986). В период проектирования Парка – в мае-июле 1992 года – плотность поселения полевого конька составляла на пастбищах и залежах 0.017 ос./км² (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а; Фетисов и др. 2002), но потом сведения о нём больше не поступали.




Рис. 29. Места встреч серого сорокопута в национальном парке «Себежский»:
 • – до создания Парка; ■ – после создания Парка; в – встречи выводков
 (см. точные факты в тексте). Фото на врезке (серый сорокопут) автора.

39.*Серый сорокопут *Lanius excubitor*. Пролётный, гнездящийся (перелётный), нерегулярно зимующий вид. Довольно редкая и легко уязвимая птица Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991), гнездящаяся отдельными парами в основном на небольших верховых болотах, реже – в заброшенных сельскохозяйственных угодьях. Первое гнездо сорокопутов на территории нынешнего национального парка «Себежский» найдено в 1982 году на окраине болота у озера Чердынец (Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Фетисов 1985; Ильинский, Фетисов 1994; и др.). Оно располагалось в кроне сосны на высоте 9 м. 31 мая в нём находилось лишь 2 птенца, ещё 4 слётка были обнаружены на соседних деревьях на удалении до 50 м от гнезда (Ильинский 1983; Фетисов и др. 2002). До создания Парка серых сорокопутов неоднократно видели в период размножения на полях в окрестностях деревни Осыно: 15 июля 1988 там отмечен выводок; 9 мая и 23 августа 1989 на этих же полях охотились взрослые птицы (рис. 29). В период сезонных перемещений сорокопутов встречали на лугах непо-

далёку от деревни Осыно (20 марта 1984), на заболоченном лугу на южном берегу озера Осыно и на Красииковском болоте (март – первая половина апреля 1980-х годов). После создания Парка серые сорокопуты продолжали держаться в окрестностях деревни Осыно (26 марта 1997; 29 августа 2003; август 2005-2006 годов; март 2015), в частности в урочище Самодурово (22 августа 1997; 20 августа – 11 сентября 2002) и на Красииковском болоте (17 октября 1996; 19 июля 1997 выводок неподалёку от деревни Красииково), а также у деревни Мальково (июль 1997) (Фетисов 1997, 2002-2003, 2006, 2009а, 2011; Фетисов и др. 1997, 2002; Результаты... 2015).




Рис. 30. Размещение участков обитания соловьиного сверчка в национальном парке «Себежский»:

● – места пения самцов на гнездовых участках; ■ – место гнезда на озере Осыно.

Фото на врезке (соловьиный сверчок на реке Ницца) автора.

40. Соловьиный сверчок *Locustella luscinioides*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. До 1980-х годов не был известен в северо-западных областях России. Первое гнездо в Псковской области найдено в 1982 году в Себежском Поозерье на берегу озера Осыно (Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Мальчевский и др. 1984, 2010). Теперь этот вид наиболее многочислен в Псковской области именно в Себежском Поозерье (Ильинский и др. 1991, 2000а), в первую очередь в национальном парке «Себежский» (Фетисов и др. 2000а,б; Фетисов 2015е). Он обитает в тростниковых зарослях по поймам рек, на зарастающих озёрах и старицах, где имеются густые смешанные заросли тростника и других водных растений. Так, в 1980-е годы соловьиный

сверчок был впервые встречен в 1982 году в урочище Павлюков Рог на юго-восточном берегу озера Осыно, а вскоре и по соседству с ним – на озёрках и канаве в Красииковском болоте и в пойме реки Нищи (Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Мальчевский и др. 1984). В последующие годы певшие самцы были отмечены, кроме того, на заболоченном озёрке у деревни Прасни, неподалёку от озера Себежское, и в пойме реки Свольна (Фетисов и др. 2002; и др.)*. В 1990-е годы к известным местам поселений сверчков добавились новые (рис. 30): на озёрах Нечерица, Ормея, Ороно, Припеша, в пойме реки Глубочица, на протоке между озёрами Бронье и Ница (Ильинский, Фетисов 1994; Леоке, Фетисов 2006; Леоке 2008), а также в старице реки Нищи в урочище Слобода. Средняя плотность поселения сверчков в период проектирования национального парка «Себежский» (в мае-июле 1992) составляла: на реках – 1.7; на озёрах и прудах – 0.8 ос./км² (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а; Фетисов и др. 2002; Головань, Ильинский, Фетисов 2005). В 2000-е годы соловьиные сверчки появлялись на большинстве своих старых участков обитания и заселили новые. Среди них: исток реки Свольны из озера Нечерица, западный берег озера Озерявы и Гнилая лука на озере Нечерица, окрестности моста на реке Осынка, озёра Ветцо, Мотяз и Ормея (возле истока реки Дегтярка) (Фетисов 2002-2004, 2007; Фетисов, Стукальцов 2009). В 2010-е годы к новым местам обитания сверчков в Парке добавились ещё участки на озёрах Березвица, Колпенец, Ормея (на южном берегу озера) и Сычно, а также на болоте южнее деревни Дворище, неподалёку от озера Вятитерьево (рис. 30) (Фетисов 2012в, 2014а, 2016г). Общая численность соловьиного сверчка на территории Парка увеличилась за последние 30 лет примерно в 5 раз, с 11 пар в 1980-х годах до 50 пар в 2010-х (Фетисов 2015е). Наиболее многочисленны поселения соловьиных сверчков отмечены в последнее десятилетие на низинном Красииковском болоте, включая пойму реки Осынки (порядка 10-12 самцов), на озере Ормея (до 7-8 поющих самцов в год), а также на озёрах Припеша и Нечерица, на реке Свольне.

Первые песни соловьиного сверчка отмечаются в гнездовых станциях в Парке, как правило, в конце апреля – первой декаде мая: 23 апреля 1990, 26 апреля 1995, 27 апреля 2014, 29 апреля 2009, 1 мая 2012, 2 мая 2010, 4 мая 2008, 5 мая 1991, 6 мая 1999 и 2005, 7 мая 2003, 8 мая 2002 (Фетисов 2002-2003, 2015е; Фетисов и др. 2002; Фетисов, Стукальцов 2009). Самцы активно поют в мае-июне. В июле активность пения значительно слабеет: продолжительность пения становится всё короче, а песни днём – редкостью.

* Все эти факты попали, помимо публикаций, в отчёты орнитологов Ленинградского университета, переданные ими Себежскому музею природы (Мальчевский, Фетисов, Ильинский 1984; Фетисов 1987), а также в СМИ (Фетисов 1982, 1985а,б).

Гнездо соловьиного сверчка, найденное 5 июля 1982 на озере Осыно, располагалось в прибрежных зарослях тростника, в 40-50 м от берега, где не было ни сплави́н, ни зарослей кустарника. В нём было 4 птенца в возрасте 1-2 дней (Мальчевский и др. 1984, 2010). Последние песни сверчков в сезоне зарегистрированы в первой-второй декадах июля: 4 июля 2010, 9 июля 2014, 10 июля 2000 и 2004, 18 июля 2006. По косвенным данным, эти сроки соответствуют завершению выкармливания последних птенцов и, возможно, даже их вылету из гнёзд.

Ястребиная славка *Sylvia nisoria*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. Была обычной птицей Себежского Поозерья в первой половине XX века (Федюшин 1926). Гнездилась на территории нынешнего национального парка «Себежский» (у озера Заозерье, около деревни Осыно и других местах) в 1980-е годы, хотя встречалась уже спорадично и в небольшом числе. Наиболее обычными были поселения из 2-3 пар в заброшенных деревнях, старых парках и на хуторах. Кладки появлялись в течение третьей декады мая – июне. Количество яиц в 6 кладках варьировало от 3 до 5. Вылупление птенцов отмечали 11, 17 и 27 июня 1982. Наиболее поздние встречи ястребиной славки зарегистрированы в первой декаде сентября (Фетисов и др. 2002). В период проектирования Парка в мае-июле 1992 года средняя плотность населения вида составляла: в сосновых молодняках – 1.3; на пойменных лугах – 1.6; в сельских поселениях – 0.8 ос./км² (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а), однако в последующие годы сведения об этом виде в Себежском поозерье больше не поступали.




Рис. 31. Места встреч обыкновенного ремеза в национальном парке «Себежский»: ● – места встреч ремезов; ■ – места находок гнёзд. Фото на врезке (обыкновенный ремез на озере Ороно) автора.

41. **Обыкновенный ремез** *Remiz pendulinus*. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. О возможности гнездования ремеза в Себежском уезде писал ещё А.В.Федюшин (1926). В настоящее время ремез встречается в Себежском Поозерье весьма редко, хотя и достоверно гнездится (Ильинский и др. 1991). В 1970-е годы его гнёзда находили в поймах рек Олбитаца, Нища и Осынка. В 1983 году ремез был дважды отмечен в поймах рек Олбитаца и Осынка, а 17 июля 1985 – на берегу озера Себежское (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). В национальном парке «Себежский» ремезов наблюдали неоднократно: 8 апреля 2010 – одну особь на берегу реки Свольна (в урочище Рудня); 20 апреля 2011 – одного, скорее всего, самца на берегу канала Дегтяревка около от деревни Картенки; 8 марта 2012 – пролётную стайку из 5 особей в тростниках на озере Ороно возле деревни Илово-2; 16 июня 2014 – одного самца (по данным В.А.Фёдорова) на берегу озера Ороно на окраине деревни Илово-2 (Фетисов 2014а).

Таким образом, в национальном парке «Себежский» к настоящему моменту зарегистрировано 14 видов птиц, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2001), и 41 вид – в Красную книгу Псковской области (2014). Соответственно, ещё 2 и 10 видов с такими же статусами отмечено на той же территории до создания на ней Парка, т. е. до 1996 года. Все они включены в видовые списки птиц национального парка «Себежский» (Фетисов и др. 2000 а; Ильинский и др. 2001; Фетисов 2005б), в том числе в списки видов, представляющих для Парка наибольшую ценность и подлежащих специальной охране (Фетисов, Ильинский 1993в; Фетисов 1998г; Фетисов, Ильинский, Головань 1998б; Конечная, Фетисов 2000; Фетисов и др. 2000б, 2001; Фетисов, Ильинский, Чистяков 2001; Конечная и др. 2016а,б). В связи с этим на все эти виды – помимо «краснокнижного» статуса – распространяется в законодательном отношении ещё природоохранный статус ООПТ такого ранга как национальный парк (федерального значения).

Благодаря этому довольно большому числу особо охраняемых видов, включая птиц, сам национальный парк приобретает свой вполне определённый природоохранный статус (свою природоохранную значимость). Характеристика этого показателя для национального парка «Себежский» не раз фигурировала в литературе, начиная от средств массовой информации до специальной кадастровой сводки об этой территории (Fetisov, Iljinsky 1995; Кузнецова 1998; Kuznetsova 1998; Фетисов, Мусатов, Конечная 1999; Fetisov, Sagitov 1999; Musatov, Fetisov, Konechnaya 1999; Андреева и др. 2000, 2005; Конечная, Фетисов 2000; Бурмистров и др. 2003; Антипова и др. 2005; Фетисов, Волков 2012). В 2000 году Парк был включён в Перспективный («теневой») список Рамсарской конвенции как водно-болотное угодье «Себежское

Поозерье»*, расположенного в границах национального парка (Мусатов, Фетисов, Конечная 2000; Musatov, Fetisov, Konechnaya 2000; Конечная, Мусатов, Фетисов 2009; Конечная и др. 2016а,б), и в систему «ленточного коридора» ООПТ Псковской области, расположенного в пограничной полосе между Белоруссией, Латвией и Эстонией (Мусатов 1997, 1999б; Мусатов, Розов, Черевичко 1998; и др.). Наиболее перспективна эта территория для организации трансграничной охраны многих особо охраняемых видов птиц между Россией и Белоруссией, т.к. национальный парк «Себежский» непосредственно граничит сразу с двумя белорусскими ООПТ – государственными ландшафтными заказниками «Красный Бор» и «Освейский».

Л и т е р а т у р а

- Андреева Е.Н., Антипова Л.Ф., Конечная Г.Ю., Фетисов С.А. 2000. Национальный парк «Себежский» как резерват видов, охраняемых в России, Белоруссии и Латвии // *Особо охраняемые природные территории. Материалы 2-й междунаrod. конф.* СПб.: 183-184.
- Андреева Е.Н., Конечная Г.Ю., Куприянов А.В., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2005. Природное наследие // *Национальный парк «Себежский»*. Псков: 54-77 (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 1).
- Антипова Л.Ф., Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю., Судницына Д.Н., Фетисов С.А. 2005. Физико-географическая характеристика // *Национальный парк «Себежский»*. Псков: 13-32 (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 1).
- Буланов М., Фетисов С. 2008. Необычный гость из Финляндии // *Газ. «Призыв»*. Себеж. 5 апреля 2008 № 26 (10713): 2.
- Буланов М., Фетисов С. 2009. Новости с себежского перекрёстка птичьих трасс // *Газ. «Призыв»*. Себеж. 15 апреля 2009 № 28 (10817): 3.
- Бурмистров С.Л., Норданстиг Г., Петров П.Е., Фетисов С.А. 2003. Птицы Псковской области как объекты наблюдения для орнитологов-любителей из Швеции // *Северо-Западная Россия и Белоруссия: Вопросы экологической, исторической и общественной географии. Материалы обществ.-науч. конф. с международ. участием. Статьи и тезисы*. Псков: 151-153.
- Васильковский П.Е. 1928. Фауна Ленинградской области // *Природа и население Ленинградской области. Справочная книга по краеведению*. М.: Л.: 83-119.
- Волков С.М., Фетисов С.А. 2010а. Новые встречи редких охраняемых видов птиц в национальном парке «Себежский» (по материалам, собранным в 2010 году) // *Развитие туризма в Балтийском регионе: Предпосылки, современное состояние и перспективы*. Псков: 173-176.
- Волков С.М., Фетисов С.А. 2010в. Новые данные о лебеде-кликуне *Cygnus cygnus* в Себежском национальном парке // *Рус. орнитол. журн.* **19** (620): 2275-2277.
- Волков С.М., Фетисов С.А. 2011а. Новые встречи лебедя-кликунa *Cygnus cygnus* в национальном парке «Себежский» (Россия) // *Красная книга Республики Беларусь: Состояние, проблемы, перспективы*. Витебск: 24-25.
- Волков С.М., Фетисов С.А. 2011б. Зимняя орнитофауна национального парка «Себежский» (Псковская область, Россия) // *Актуальные проблемы приграничных районов*

* Ramsar Shadow List: номер угодья – 26; тип водно-болотного угодья – М, О, Тр, Ts, Xf, Хр, 1, 7, 9; критерии Рамсарской конвенции – 1, 2, 3.

Беларуси и Российской Федерации. Материалы международ. науч.-практ. конф. Витебск: 283-285.

- Волков С.М., Фетисов С.А. 2011в. О встречах птиц, включённых в Красную книгу России, в Псковской области в 2011 году // *Проблемы социально-экономической и эколого-хозяйственной политики стран бассейна Балтийского моря. Материалы международ. науч.-практ. конф.* Псков: 177-179.
- Волков С.М., Фетисов С.А., Яковлева М.С. 2012. Случай зимовки малой поганки *Tachybaptus ruficollis* в Псковском Поозерье // *Рус. орнитол. журн.* **21** (756): 1086-1094.
- Герасимов А.Е., Петренко А.С., Фетисов С.А. 2004. Случай гибели чернозобой гагары (*Gavia arctica*) в сетях на озере Себежское // *Природа Псковского края* **17**: 26-27.
- Головань В.И., Ильинский И.В., Фетисов С.А. 2005. Плотность населения птиц в разных типах местообитаний // *Национальный парк «Себежский»*. Псков: 226-236 (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 1).
- Гричик В.В., Парейко О.А., Яминский Б.В. (1998) 2004. Гнездование большого крохала *Mergus merganser* в Белоруссии // *Рус. орнитол. журн.* **13** (269): 752-755.
- Гришмановский А.С., Ершова Е.И. 2015. Птицы экологических троп национального парка «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2014*. Псков: 205-205.
- Гуль В.Н. 2000. Новая находка змеяда *Circaetus gallicus* в Себежском Поозерье (Псковская область) // *Рус. орнитол. журн.* **9** (110): 9-10.
- Гультяев Ю.В., Ершова Е.И. 2013. Фауна наземных позвоночных животных проектной экотропы «Озерявки – Большие Островки» и их следы жизнедеятельности // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2012*. Псков: 134-141.
- Дроздецкий В.Н., Петренко А.С., Фетисов С.А. 2004. К размножению беркута *Aquila chrysaetos* в Себежском Поозерье // *Природа Псковского края* **17**: 28-29.
- Дроздецкий В.Н., Петренко А.С., Фетисов С.А. 2014. О гнездовании беркута *Aquila chrysaetos* в Себежском Поозерье // *Рус. орнитол. журн.* **23** (961): 265-266.
- Дроздецкий В.Н., Суханов В.В., Фетисов С.А. 2004. О количестве рыбы, поедаемой за один раз орланом-белохвостом *Haliaeetus albicilla* // *Природа Псковского края* **17**: 29.
- Егорова Н.А., Ершова Е.И. 2012. Видовой состав птиц окрестностей экологической тропы национального парка «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2011*. Псков: 165-172.
- Иванов В.П., Ершова Е.И. 2012. Фауна позвоночных животных верхового болота Нескорица национального парка «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2011*. Псков: 140-148.
- Ильинский И.В. 1983. Сем. Сорокопуты – Laniidae // *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **2**: 66-74.
- Ильинский И.В., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2015. О распространении и численности скопы *Pandion haliaetus* в Псковской области // *Социально-политические и эколого-хозяйственные проблемы развития Балтийского региона*. Псков: 257-262.
- Ильинский И.В., Пукинский Ю.Б., Фетисов С.А. (1983) 2010. Орнитофаунистические находки на юго-западе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **19** (568): 799-800.
- Ильинский И.В., Фетисов С.А. 1986. Опыт использования акустических аттрактантов в целях выявления и учёта численности скрытноживущих видов птиц // *Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учёта жив. мира: Тез. докл.* М., **1**: 131-132.
- Ильинский И.В., Фетисов С.А. 1994. Видовой состав и характер пребывания птиц в проектируемом национальном парке «Себежский» // *Земля Псковская, древняя и современная. Тез. докл. науч.-практ. конф.* Псков: 129-145.
- Ильинский И.В., Фетисов С.А. 1998. Чёрный аист (*Ciconia nigra* L.) в Псковской области: История изучения и современное состояние // *Проблемы сохранения биоразнообразия Псковской области*. СПб.: 118-125. (Тр. СПбОЕ. Сер. 6. Т. 1).

- Ильинский И.В., Фетисов С.А., Головань В.И., Фёдоров В.А. 1991. Летняя орнитофауна Себежского поозерья // *Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф.* Минск, 2, 1: 245-246.
- Ильинский И.В., Фетисов С.А., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2000. Орнитофауна Себежского Поозерья // *Фауна и экология птиц бассейна реки Западная Двина. Материалы междунаро. науч. конф.* Витебск: 41-43.
- Ильинский И.В., Фетисов С.А., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2001. Птицы (Aves) // *Биоразнообразие и редкие виды национального парка «Себежский»*. СПб.: 208-218. (Тр. СПбОЕ. Сер. 6. Т. 4).
- Колокольцева Е.И., Александров П.А., Ершова Е.И. 2013. Водные и околоводные птицы озёр Нечерица и Озерявки // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2012*. Псков: 109-118.
- Колокольцева Е.И., Ершова Е.И. 2014. Водные и околоводные птицы озёр Нечерица и Озерявки // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2013*. Псков: 143-155.
- Конечная Г.Ю., Косенков Г.Л., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2016а. Характеристика перспективного («теневого») водно-болотного угодья «Себежское Поозерье» в формате рамсарской анкеты на 2016 год // *Изучение и сохранение природного и историко-культурного наследия ООПТ Псковской области. Сб. науч. статей, посвящ. 20-летию нац. парка «Себежский»*. Себеж: 4-132.
- Конечная Г.Ю., Косенков Г.Л., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2016б. Природоохранный потенциал национального парка «Себежский» (Россия) в перспективе трансграничного российско-белорусского сохранения редких видов, внесённых в Красную книгу Республики Беларусь // *Экологическая культура и охрана окружающей среды: 2-е Дорофеевские чтения*. Витебск: 196-199.
- Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю., Рябенко И.П., Фетисов С.А. 2005. Мониторинг состояния окружающей среды, биоразнообразия и природных ресурсов // *Национальный парк «Себежский»*. Псков: 137-143. (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 1).
- Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю., Сагитов Р.А., Фетисов С.А. 1999. Основные результаты работы Псковского полевого отряда Балтийского фонда природы в 1998 году // *Вопросы экологического воспитания и образования в системе: детское дошкольное учреждение – школа – техникум – ВУЗ. Материалы Псков. обл. экол. конф.* Великие Луки: 122-129.
- Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2009. Материалы для информационного листа потенциального рамсарского водно-болотного угодья «Себежское Поозерье» // *Природа Псковского края* 29: 3-46.
- Конечная Г.Ю., Фетисов С.А. 2000. *Результаты инвентаризации редких видов грибов, растений и животных с целью функционального зонирования территории национального парка «Себежский»*. Отчёт по микропроекту «Инвентаризация биологического разнообразия и зонирование». Себеж; Псков; СПб.: 1-255 (рукопись).
- Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных*. 2004. Минск: 1-320.
- Красная книга Российской Федерации. (Животные)*. 2001. М.: 1-862.
- Красная книга Псковской области*. 2014. Псков: 1-544.
- Кузнецова Н. 1982. В сорока километрах от Себежа... // *Газ. «Ленинградский университет»*. 1 октября 1982 № 28 (2938): 5.
- Кузнецова Т. 1998. Затерянный мир... Псковщина // *Экохроника* 3 (37): 14-15.
- Кятова В., Тарасов В.А. 1999. Отчёт по изучению фауны позвоночных животных // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-99*. Псков: 84-86.
- Леоке Д.Ю. 1999. Лебедь-шипун *Cygnus olor* в национальном парке «Себежский» (Псковская область) // *Рус. орнитол. журн.* 8 (86): 12-14.

- Леоке Д.Ю. 2008. Орнитологические наблюдения на озере Ормея (национальный парк «Себежский») // *Природа Псковского края* **26**: 32-35.
- Леоке Д.Ю., Фетисов С.А. 2006. Заметки о водоплавающих и околоводных видах птиц на озере Ормея (национальный парк «Себежский», 1999-2000 годы) // *Нац. парк «Себежский»: Научно-исследовательская работа, охрана, экологическое просвещение и развитие экологического туризма. Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию нац. парка «Себежский»*. Псков: 116-119.
- Леоке Д.Ю., Фетисов С.А. 2015. Заметки о водоплавающих и околоводных птицах на озере Ормея (национальный парк «Себежский», 1999-2000 годы) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1168): 2582-2585.
- Максимова Е.Д., Ершова Е.И. 2015. Водные и околоводные птицы некоторых озёр национального парка «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2014*. Псков: 217-228.
- Мальчевский А.С. 1983. Развитие орнитологических исследований и охраны птиц в Ленинградской области в 1980-1983 гг. // *Тез. докл. 11-й Прибалт. орнитол. конф.* Таллин: 15-18.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., 1: 1-480; 2: 1-504.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б., Ильинский И.В., Фетисов С.А. (1984) 2010. Соловьиный сверчок *Locustella luscinioides* – новый вид гнездовой фауны Северо-Запада РСФСР // *Рус. орнитол. журн.* **19** (608): 1960-1961.
- Мальчевский А.С., Фетисов С.А., Ильинский И.В. 1984. *Фауна высших позвоночных Себежского края*. Отчёт по хоз. дог. за 1984 г. Себеж: 1-172 (рукопись).
- Мельникова В.А., Ершова Е.И. 2012. Анализ водной и околоводной орнитофауны озёр Нечерица, Озерявки и Белое национального парка «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2011*. Псков: 172-185.
- Мельникова В.А., Колокольцева Е.А., Фигуркин Д.С., Ершова Е.И. 2011. Анализ видового состава водного и околоводного орнитокомплекса озёр Нечерица и Озерявки национального парка «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2010*. Псков: 146-161.
- Меньшов Н.П., Фетисов С.А. 2007. Материалы к инвентаризации и долгосрочному мониторингу орнитофауны Себежского Поозерья и национального парка «Себежский» // *Северо-Запад России: Эколого-хозяйственные проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества. Материалы регион. обществ.-науч. конф. Ч. 1. Статьи и тезисы*. Псков: 178-181.
- Могиленко Ю., Тарасов В.А. 2001. Рыбоядные птицы озера Вятитерьво // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2000*. Псков: 106-107.
- Мусатов В.Ю. 1997. Значение сети особо охраняемых природных территорий, сопредельных с Республикой Беларусь районов Псковской области для сохранения биологического разнообразия региона // *Охраняемые природные территории и объекты Белорусского Поозерья: Современное состояние, перспективы развития: Тез. докл.* Витебск: 14-16.
- Мусатов В.Ю. 1999. Озёра Псковского Поозерья в системе особо охраняемых природных территорий // *Озёра Белорусского Поозерья: Современное состояние, проблемы использования и охраны. Материалы междунаро. науч. конф.* Витебск: 142-144.
- Мусатов В.Ю., Розов Н.Г., Черевичко В.И. 1998. Состояние охраны редких и исчезающих видов растений и животных в Псковской области // *Проблемы сохранения биоразнообразия Псковской области*. СПб.: 13-15 (Тр. СПбОЕ. Сер. 6. Т. 1).
- Мусатов В.Ю., Сагитов Р.А., Фетисов С.А. 2000. Особо охраняемые природные территории и сохранение орлана-белохвоста *Haliaeetus albicilla* в Псковской области // *Сохранение биологического разнообразия Фенноскандии. Междунаро. конф. Тез. докл.* Петрозаводск: 72-73.

- Мусатов В.Ю., Тунчик С.А., Фетисов С.А. 2000. Исследования на особо охраняемых природных территориях Псковской области // *Исследования на особо охраняемых природных территориях Северо-Запада России. Материалы регион. науч. конф., посвящ. 10-летию Валдайск. нац. парка*. Великий Новгород: 8-12.
- Мусатов В.Ю., Фетисов С.А., Конечная Г.Ю. 2000. Себежское Поозерье // *Водно-болотные угодья России. Т. 3. Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции*. М., 3: 69-75.
- Национальный парк «Себежский». 2005. Псков: 1-283 (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 1).
- Никифоров М.Е., Яминский Б.В., Шкляров Л.П. 1989. *Птицы Белоруссии: Справочник-определитель гнёзд и яиц*. Минск: 1-479.
- Никифорова О., Тарасов В.А. 1999. К изучению орнитофауны акватории озера Озерявки // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-99*. Псков: 98-100.
- Патрикеев М.В. 1987. О влиянии лесоразработок на численность и видовой состав хищных птиц юго-запада Псковской области // *Влияние антропогенной трансформации ландшафта на население наземных позвоночных животных*. М., 2: 145-146.
- Потебня А., Тарасов В.А. 2001. Качественный состав фауны позвоночных животных в районе расположения Псковской областной краеведческой экспедиции «Истоки»-2000 // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2000*. Псков: 96-99.
- Приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 18.07.2013 г. № 550 «Об утверждении Перечня объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Псковской области».
- Природа Белоруссии. Популярная энциклопедия*. 1989. 2-е изд. Минск: 1-598.
- Пукинский Ю.Б. 1988. Места обитания редких и исчезающих видов птиц, требующих охраны // *Природная среда и охрана природы Псковской области. Карта 1 (Охрана природы в процессе её использования)*. М.
- Пукинский Ю.Б. (1989) 2008. «Болотные курочки» // *Рус. орнитол. журн.* **17** (451): 1703-1713.
- Пукинский Ю.Б., Пукинская М.В. (1986) 2003. К распространению полевого конька *Anthus campestris* на Северо-Западе РСФСР // *Рус. орнитол. журн.* **12** (243) 1294-1295.
- Пукинский Ю.Б., Сагитов Р.А. (1985) 2014. К распространению и биологии малого погоньша *Porzana parva* на Северо-Западе России // *Рус. орнитол. журн.* **23** (967): 420-426.
- Пухов В.П. 2011. Материалы к орнитофауне Себежского Поозерья // *Тр. нац. парка «Себежский»*. Себеж, 1: 318-320.
- Результаты зимних учётов птиц России и сопредельных регионов*. Вып. 26. Зимний сезон 2011/2012 г. 2012. М.: 1-56.
- Результаты зимних учётов птиц России и сопредельных регионов*. Вып. 27. Зимний сезон 2012/2013 г. 2013. М.: 1-54.
- Результаты зимних учётов птиц России и сопредельных регионов*. Вып. 29. Зимний сезон 2014/2015 г. 2015. М.: 1-56.
- Сагитов Р.А., Фетисов С.А. 1999. Балтийский Фонд Природы и инвентаризация биологического разнообразия в национальном парке «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-99*. Псков: 4-6.
- Сагитов Р.А., Фетисов С.А. 2000. Опыт инвентаризации биологического разнообразия видов в национальном парке «Себежский» // *Особо охраняемые природные территории. Материалы 2-й международ. конф.* СПб.: 184-186.
- Самусенко Т.А., Ершова Е.И. 2007. Водные и околотовдные птицы Себежского национального парка // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2006*. Псков: 117-120.

- Самусенко Т.А., Шемякина О.А., Завьялов Е.А., Корнева О.К. 2006. Птицы некоторых озёр и прибрежных зон национального парка «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2005*. Псков: 98-100.
- Стукальцов А.И., Тассо В.К., Фетисов С.А. 2016. О зимовках лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* на территории национального парка «Себежский» // *Изучение и сохранение природного и историко-культурного наследия ООПТ Псковской области. Сб. науч. статей, посвящ. 20-летию нац. парка «Себежский»*. Себеж: 152-155.
- Стукальцов А.И., Фетисов С.А. 2008. Рыболовные снасти как причина гибели водоплавающих птиц и водных млекопитающих (на примере национального парка «Себежский») // *Экологические и социальные проблемы Северо-Запада России и стран Балтийского региона. Материалы обществ.-науч. конф. с международ. участием*. Псков: 264-268.
- Стукальцов Д.А., Баканов В.Д., Ершова Е.И. 2013. Птицы экологической тропы «Большой Гребёл» национального парка «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2012*. Псков: 119-127.
- Стукальцов Д.А., Черноок Н.А., Ершова Е.И. 2015. Зоологические объекты экологической тропы «Большой Гребёл» национального парка «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2014*. Псков: 185-193.
- Труды национального парка «Себежский»*. 2011. Себеж, 1: 1-333.
- Тузова Т., Королькова А. 2003. Видовое разнообразие птиц в окрестностях оз. Нечерица Себежского района // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-2002*. Псков: 81-84.
- Федюшин А.В. 1926. Материалы к изучению птиц Белоруссии: О птицах Витебщины // *Бюл. МОИП*. Нов. сер. Отд. биол. **35**, 1/2: 112-168.
- Фетисов С.А. 1982. Первые результаты // *Газ. «Призыв»*. Себеж. 14 октября 1982 № 124 (7576): 4.
- Фетисов С.А. 1984. Результаты сезона // *Газ. «Призыв»*. Себеж. 3 ноября 1984 № 132 (7896): 4.
- Фетисов С.А. 1985а. Зоологи – музею // *Газ. «Призыв»*. Себеж. 17 января 1985 № 8 (7928): 4.
- Фетисов С.А. 1985б. «Прописка» под Себежем // *Газ. «Призыв»*. Себеж. 2 марта 1985 № 27 (7947): 4.
- Фетисов С.А. 1987. *Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения птицы Себежского поозерья*. Отчёт по дог. о творч. сотрудничестве за 1987 г. Себеж: 1-65. (рукопись).
- Фетисов С.А. 1997. Птицы и звери, рекомендованные в Красную книгу России, в национальном парке «Себежский» // *Газ. «Призыв»*. Себеж 29 апреля 1997 № 34 (9579): 3.
- Фетисов С.А. 1998а. Псковский полевой отряд Балтийского фонда природы // *Информ. бюл. БФП СПбООЕ*. СПб., **2**: 3.
- Фетисов С.А. 1998б. Изучение биологического разнообразия в национальном парке «Себежский» // *Информ. бюл. БФП СПбООЕ*. СПб., **2**: 4.
- Фетисов С.А. 1998в. Новые сведения о чернозобой гагаре *Gavia arctica* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **7** (42): 3-5.
- Фетисов С.А. 1998г. Редкие виды (О птицах, занесённых в новую Красную книгу России, в национальном парке «Себежский») // *Газ. «Призыв»*. Себеж 20 мая 1998 № 41 (9690): 3.
- Фетисов С.А. 1999а. О работе Псковского полевого отряда БФП СПбООЕ // *Тез. сообщ. Отчёт. Сессия БФП СПбООЕ*. СПб.: 5.
- Фетисов С.А. 1999б. Новые перспективы для проведения экологического мониторинга в Псковском Поозерье: Национальный парк «Себежский» // *Материалы исследований обл. детской комплекс. краевед. экспедиции «Истоки»-99*. Псков: 6-12.
- Фетисов С.А. 1999в. Первая находка гнезда кулика-сороки *Haematopus ostralegus* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **8** (76): 3-8.
- Фетисов С.А. 2000. История и результаты изучения биологического разнообразия на территории национального парка «Себежский» // *Тр. СПбНИИЛХ* **3** (4): 35-55.

- Фетисов С.А. 2001. История изучения видового разнообразия на территории Себежского национального парка // *Биоразнообразие и редкие виды нац. парка «Себежский»*. СПб.: 5-20. (Тр. СПбОЕ. Сер. 6. Т. 4).
- Фетисов С.А. 2002. Встречи редких в Белорусско-Валдайском Поозерье птиц на псковской территории в бассейне реки Западной Двины в 2002 году // *Красная книга Республики Беларусь: Состояние, проблемы, перспективы. Материалы республ. научн. конф.* Витебск: 207-209.
- Фетисов С.А. 2003. Встречи редких видов птиц в национальном парке «Себежский» в 2003 году // *Северо-Западная Россия и Белоруссия: Вопросы экологической, исторической и общественной географии. Материалы обществ.-науч. конф. с международ. участием. Статьи и тезисы*. Псков: 82-86.
- Фетисов С.А. 2004. Встречи редких и охраняемых птиц в Себежском Поозерье в 2004 году // *Природа Псковского края* **16**: 22-25.
- Фетисов С.А. 2005а. Пискулька *Anser erythropus* в Псковской области // *Природа Псковского края* **19**: 21-24.
- Фетисов С.А. 2005б. Видовой список позвоночных животных // *Национальный парк «Себежский»*. Псков: 256-274 (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 1).
- Фетисов С.А. 2005в. Современный статус и экология лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **14** (293): 615-626.
- Фетисов С.А. 2005г. Совы Псковской области // *Совы Северной Евразии*. М.: 75-101.
- Фетисов С.А. 2006. Новые результаты инвентаризации и мониторинга птиц, включённых в Красную книгу России, в Себежском Поозерье (Псковская область, Россия) // *Рекреационно-туристический потенциал Северо-Запада России. Материалы международ. (рос.-белорус.) обществ.-науч. конф. Статьи и тезисы*. Псков: 186-188.
- Фетисов С.А. 2007. Материалы к орнитофаунистическим находкам на особо охраняемых природных территориях Псковской области в 2007 году // *Северо-Запад России: Эколого-хозяйственные проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества. Материалы регионал. обществ.-науч. конф. Ч. 1. Статьи и тезисы*. Псков: 174-178.
- Фетисов С.А. 2008а. Случаи гибели чернозобых гагар *Gavia arctica* в рыболовных сетях в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (452): 1731-1734.
- Фетисов С.А. 2008б. Обзор современных научных исследований о птицах, включённых в Красную книгу Российской Федерации, на территории Псковской области // *Экологические и социальные проблемы Северо-Запада России и стран Балтийского региона. Материалы обществ.-науч. конф. с международ. участием*. Псков: 268-276.
- Фетисов С.А. 2008в. Гибель птиц от домашних кошек в Себежском национальном парке // *Рус. орнитол. журн.* **17** (407): 429-436.
- Фетисов С.А. 2009а. Охраняемые и редкие птицы водно-болотных угодий Псковского Поозерья на границе с Белоруссией // *Рус. орнитол. журн.* **18** (471): 435-459.
- Фетисов С.А. 2009б. Окольцованные беркуты *Aquila chrysaetos* на территории Псковской области // *Природа Псковского края* **28**: 31-33.
- Фетисов С.А. 2010. Зимние пернатые «гости» на водоёмах национального парка «Себежский» // *Газ. «Островок». Нац. парк «Себежский»* **24**: 2-3.
- Фетисов С.А. 2011. Результаты инвентаризации видового состава и мониторинга состояния зимней орнитофауны национального парка «Себежский» // *Проблемы социально-экономической и эколого-хозяйственной политики стран бассейна Балтийского моря. Материалы международ. науч.-практич. конф.* Псков: 179-182.
- Фетисов С.А. 2012а. О статусе малой поганки *Tachybaptus ruficollis* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **21** (757): 1116-1126.
- Фетисов С.А. 2012б. Пискулька *Anser erythropus* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **21** (720): 124-127.
- Фетисов С.А. 2012в. Новые виды птиц на водоёмах Псковского Поозерья, зарегистрированные за последние 90 лет // *Многолетние процессы в природных комплексах запо-*

ведников России. Материалы Всерос. научн. конф., посвящ. 80-летию Центр.-Лесного заповедника. Великие Луки: 282-287.

- Фетисов С.А. 2013а. Птицы Псковского Поозерья. Т. 1. История изучения орнитофауны. Гагары, поганки, веслоногие. Себеж: 1-285. (Тр. нац. парка «Себежский». Вып. 3).
- Фетисов С.А. 2013б. Значение национального парка «Себежский» в сохранении редких и исчезающих видов птиц России и Республики Беларусь // *Экологическая культура и охрана окружающей среды: 1-е Дорофеевские чтения*. Витебск: 226-227.
- Фетисов С.А. 2014а. Материалы к ведению в Псковской области Красной книги (раздел «Птицы», 2014 год) // *Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем трансграничных регионов. Материалы международ. науч.-практ. конф.* Псков: 259-261.
- Фетисов С.А. 2014б. Расселение и начало размножения лебедя-кликунa *Cygnus cygnus* в Псковском Поозерье // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1011): 1817-1830.
- Фетисов С.А. 2015а. Новые случаи размножения лебедя-кликунa *Cygnus cygnus* в национальном парке «Себежский» (Псковское Поозерье) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1187): 3235-3238.
- Фетисов С.А. 2015б. Первый случай размножения большого крохали *Mergus merganser* в национальном парке «Себежский» (Псковское Поозерье) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1185): 3186-3190.
- Фетисов С.А. 2015в. Материалы к ведению в Псковской области Красной книги (раздел «Птицы», 2015 год) // *Социально-политические и эколого-хозяйственные проблемы развития Балтийского региона. Материалы международ. науч.-практ. конф.* Псков: 263-267.
- Фетисов С.А. 2015г. Охраняемые птицы Псковской области: болотная сова *Asio flammeus* // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1125): 1117-1134.
- Фетисов С.А. 2015д. Трёхпалый дятел *Picoides tridactylus* в добыче осоеда *Pernis apivorus* в Себежском Поозерье // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1148): 1889-1893.
- Фетисов С.А. 2015е. Охраняемые птицы Псковской области: соловьиный сверчок *Locustella luscinioides* // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1167): 2527-2543.
- Фетисов С.А. 2016а. Особо охраняемые виды птиц национального парка «Себежский»: инвентаризация и мониторинг состояния популяций в 1982-2015 годах // *Изучение и сохранение природного и историко-культурного наследия ООПТ Псковской области. Сб. науч. статей, посвящ. 20-летию нац. парка «Себежский»*. Себеж: 156-208.
- Фетисов С.А. 2016б. Зимовка лебедя-кликунa *Cygnus cygnus* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1268): 1119-1127.
- Фетисов С.А. 2016в. Охота домашних кошек на птиц в Себежском Поозерье // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1247): 471-489.
- Фетисов С.А. 2016г. Материалы к ведению в Псковской области Красной книги (раздел «Птицы», 2016 год) // *Историческая география Восточной Европы: природное и культурное наследие. Материалы международ. науч.-практ. конф.* Псков: 194-200.
- Фетисов С.А., Андреева Е.Н., Конечная Г.Ю. 2001. Биологическое разнообразие и редкие виды территории, предлагаемой для присоединения к национальному парку «Себежский» (Псковская область, Россия). Отчёт по дог. о творч. сотrud. между НП «Себежский» и БФП СПбОО за 2001 г. СПб.; Себеж: 1-41 (рукопись).
- Фетисов С.А., Волков С.М. 2010. О зимовках водоплавающих и околоводных птиц в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **19** (560): 560-573.
- Фетисов С.А., Волков С.М. 2011. Встречи в 2011 году редких и исчезающих видов птиц, включённых в Красную книгу Республики Беларусь, в национальном парке «Себежский» // *Красная книга Республики Беларусь: Состояние, проблемы, перспективы. Материалы международ. науч. конф.* Витебск: 175-177.
- Фетисов С.А., Волков С.М. 2012. Роль национального парка «Себежский» в сохранении редких и исчезающих видов птиц Псковской области // *РИО + 20: Итоги и перспективы. Материалы международ. науч.-практ. экол. конф.* Великие Луки. 14: 271-276.

- Фетисов С.А., Волков С.М., Стукальцов А.И. 2012. О встречах птиц, включённых в Красную книгу России, в Псковской области в 2012 году // *Экологические, экономические и социально-культурные предпосылки трансграничного сотрудничества в Балтийском регионе. Материалы международ. науч.-практ. конф.* Псков: 255-258.
- Фетисов С.А., Головань В.И., Ильинский И.В. 1992. *Материалы зоологического обследования территории Себежского национального парка.* Отчёт по изыскательским работам для разработки раздела ТЭО Себежского ГПНП «Фауна». Себеж; СПб.: 1-177 (рукопись).
- Фетисов С.А., Головань В.И., Ильинский И.В., Конечная Г.Ю., Хааре А.О. 1997. *Материалы для кадастра флоры сосудистых растений и фауны наземных позвоночных Псковской области (I - 1997: Красногородский, Опочецкий, Псковский, Пустошкинский и Себежский административные районы).* Отчёт по хоз. договору № 504 от 15 мая 1997 г. между Гос. комитетом по охране окр. среды Псковской обл. и Балтийским фондом природы СПБОЕ. Псков; СПб.: 1-95 (рукопись).
- Фетисов С.А., Дроздецкий В.Н. 2005. Новые данные о гнездовании большого крохала *Mergus merganser* в Псковской области // *Природа Псковского края* **19**: 29-31.
- Фетисов С.А., Иванов С.Ю., Леонтьева А.В. 1999. Результаты учёта численности белой куропатки в Псковской области зимой 1997/1998 годов // *Проблемы экологии и региональной политики Северо-Запада России и сопредельных территорий. Материалы международ. науч.-практ. конф.* Псков: 87-89.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В. 1992. *Состояние рыболовного и охотничьего хозяйства на территории проектируемого Себежского национального парка в 1987-1991 годах.* Отчёт по изыскател. работам для разработки раздела ТЭО Себежского ГПНП «Охота, рыболовство». Себеж-СПб.: 1-43 (рукопись).
- Фетисов С.А., Ильинский И.В. 1993а. *Пояснительная записка по разделу «Фауна» ТЭО Себежского национального парка.* СПб.: 1-137 (рукопись).
- Фетисов С.А., Ильинский И.В. 1993б. *Пояснительная записка по разделу «Охота, рыболовство» ТЭО Себежского ГПНП.* СПб.: 1-43 (рукопись).
- Фетисов С.А., Ильинский И.В. 1993в. Наземные позвоночные животные, наиболее нуждающиеся в охране на территории Себежского национального парка // *Краеведение и охрана природы.* Псков: 49-52.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В. 1993г. Трёхпалый дятел (*Picoides tridactylus*) в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **2**, 1: 71-75.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В. 1997. Летние встречи чернозобой гагары *Gavia arctica* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **6** (24): 14-16.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Бубличенко А.Г., Пчелинцев В.Г. 1993. *Результаты зоологического обследования территории проектируемого Себежского национального парка в зимне-весенний период 1993 года.* Отчёт по изыскател. работам для разработки разделов ТЭО Себежского ГПНП «Фауна» и «Охота, рыболовство». СПб.: 1-55 (рукопись).
- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И. 1998а. Биотопическое размещение и плотность населения птиц в проектируемом национальном парке «Себежский» // *Проблемы сохранения биоразнообразия Псковской области.* СПб.: 92-100. (Тр. СПБОЕ. Сер. 6. Т. 1).
- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И. 1998б. Птицы, включённые в новую Красную книгу России, в национальном парке «Себежский» // *Природа Псковского края* **2**: 12-14.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2000а. Видовой состав и статус птиц Себежского Поозерья и национального парка «Себежский» // *Социальные и экологические проблемы Балтийского региона. Материалы обществ.-науч. конф. Докл. и тез.* Псков: 146-155.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2000б. Птицы национального парка «Себежский», охраняемые в России, Белоруссии и Латвии // *Фауна и*

экология птиц бассейна реки Западная Двина. Материалы международ. науч. конф. Витебск: 93-95.

- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2001. Международный охранный статус птиц Себежского Поозерья и национального парка «Себежский» // Социальные и экологические проблемы Балтийского региона. Материалы обществ.-науч. конф. Ч. 2. Статьи. Псков: 199-210.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2002. Птицы Себежского Поозерья и национального парка «Себежский». СПб., 1: 1-152; 2: 1-128.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Хааре А.О. 1997. Встречи редких птиц в Псковской области в 1997 году // Рус. орнитол. журн. 6 (23): 10-12.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Мусатов В.Ю. 2015. Охраняемые птицы Псковской области: скопа *Pandion haliaetus*. Часть 1. Статус вида, распространение и численность // Рус. орнитол. журн. 24 (1182): 3083-3118.
- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Чистяков Д.В. 2001. Редкие и охраняемые виды наземных позвоночных // Биоразнообразие и редкие виды нац. парка «Себежский». СПб.: 248-254. (Труды СПбООЕ. Сер. 6. 4).
- Фетисов С.А., Конечная Г.Ю. 2000. Видовое разнообразие и инвентаризация растительного и животного мира национального парка «Себежский» // Природное и историко-культурное наследие Северо-Запада России. Петрозаводск: 206-225.
- Фетисов С.А., Конечная Г.Ю. 2005. Охраняемые виды грибов, растений и животных национального парка «Себежский» // Запад России и ближнее зарубежье: Устойчивость социально-культурных и эколого-хозяйственных систем. Материалы межрегион. обществ.-науч. конф. с международ. участием. Статьи и тезисы. Псков: 202-205.
- Фетисов С.А., Конечная Г.Ю., Андреева Е.Н. 2001. К оценке территорий, предлагаемых для присоединения к национальному парку «Себежский» // Северо-Запад России: Взаимодействие общества и природы. Материалы обществ.-науч. конф. Докл. и тез. Псков, 2: 119-121.
- Фетисов С.А., Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю. 2000. Псковский полевой отряд Балтийского Фонда Природы: Результаты работы в 1996-1999 годах // Проблемы природопользования и формы активного экологического воспитания и образования. Материалы Псков. обл. эколог. конф. Великие Луки: 86-94.
- Фетисов С.А., Конечная Г.Ю., Рябенко И.П. 2011. Результаты научной работы и экологического мониторинга в национальном парке «Себежский» (по материалам публикаций за 15 лет) // Тр. нац. парка «Себежский». Себеж, 1: 25-72.
- Фетисов С.А., Конечная Г.Ю., Рябенко И.П., Волкова Н.В. 2011. Авторский каталог и тематический указатель научных работ, опубликованных в 1996-2010 годах сотрудниками национального парка «Себежский» и работавшими в Парке «сторонниками» специалистами // Тр. нац. парка «Себежский». Себеж, 1: 73-147.
- Фетисов С.А., Милевский И.Г. 2006а. Красношейная поганка *Podiceps auritus* – новый гнездящийся вид Псковского Поозерья // Национальный парк «Себежский»: Научно-исследовательская работа, охрана, экологическое просвещение и развитие экологического туризма. Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию нац. парка «Себежский». Псков: 113-115.
- Фетисов С.А., Милевский И.Г. 2006б. Красношейная поганка *Podiceps auritus* – новый гнездящийся вид Псковского Поозерья // Рус. орнитол. журн. 15 (324): 113-115.
- Фетисов С.А., Мусатов В.Ю. 1999. Краснокнижные виды птиц Белоруссии, гнездящиеся на озёрах Псковского Поозерья // Озёра Белорусского Поозерья: Современное состояние, проблемы использования и охраны. Материалы международ. научн. конф. Витебск: 108-109.
- Фетисов С.А., Мусатов В.Ю. 2012. Охраняемые виды птиц Псковской области: средне-русская белая куропатка *Lagopus lagopus rossicus* // Рус. орнитол. журн. 21 (821): 2985-3021.

- Фетисов С.А., Мусатов В.Ю., Конечная Г.Ю. 1999. Предварительная оценка природного и историко-культурного наследия национального парка «Себежский» // *Природа Псковского края* 4: 3-11.
- Фетисов С.А., Пинигина Т.В., Цветкова И.В. 1998. Орнитологическая экспозиция Себежского музея природы как возможное звено в процессе экологического просвещения населения // *Проблемы природопользования, экологического воспитания и образования. Материалы российско-белорусской экол. конф.* Великие Луки: 29-34.
- Фетисов С.А., Сагитов Р.А., Иванов С.Ю., Леонтьева А.В. (1999) 2014. Орлан-белуха *Haliaeetus albicilla* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **23** (963): 291-307.
- Фетисов С.А., Стукальцов А.И. 2000. Численность куриных птиц Galliformes в национальном парке «Себежский» // *Природа Псковского края* **11**: 13-16.
- Фетисов С.А., Стукальцов А.И. 2009. Орнитофаунистические находки на территории национального парка «Себежский» в 2009 году // *Сбалансированное развитие Северо-Запада России: Современные проблемы и перспективы. Материалы обществ.-науч. конф. с международ. участием. Статьи и тезисы.* Псков: 251-254.
- Фетисов С.А., Фёдоров В.А. 2014. Новые данные об охраняемых видах птиц в пойме реки Нища (Себежское Поозерье) // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1034): 2473-2485.
- Фёдоров В.А. 1997. О гнездовании волчка *Ixobrychus minutus* на юго-западе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **6** (14): 16-19.
- Фёдоров В.А. 1998. О гнездовании водяного пастушка *Rallus aquaticus* в Себежском Поозерье (Псковская область) // *Рус. орнитол. журн.* **7** (44): 3-5.
- Шемякина О.А. 2005. К орнитофауне ООПТ Псковской области по наблюдениям в 2004-2005 годах // *Запад России и ближнее зарубежье: Устойчивость социально-культурных и эколого-хозяйственных систем. Материалы межрегион. обществ.-науч. конф. с международ. участием. Статьи и тезисы.* Псков: 208-209.
- Fetisov S.A., Iljinsky I.V. 1995. Protection needed for largely unknown nature in Pskov region // *WWF Baltic Bull.* **4/5**: 26-30.
- Fetisov S.A., Sagitov R.A. 1999. Discovering Sebezhsy National Park, One Inventory at a Time // *Russian Conservation News* **18**: 8-9.
- Ilyinsky I.V., Fetisov S.A. 1993. The Black Stork in the Sebezhsy lake region. Present status // *1st Intern. Black Stork Conservation and Ecology Symp.* Jurmala: 47.
- Kuznetsova T. 1998. Pskov forests: a forgotten world // *Экохроника* 3 (37): VI.
- Musatov V.Yu., Fetisov S.A., Konechnaya G.Yu. 1999. Network of Protected Wetlands in the Pskov Region Expands // *Russian Conservation News* **18**: 10.
- Musatov V.Yu., Fetisov S.A., Konechnaya G.Yu. 2000. Sebezhsy Lake Complex // *Wetlands in Russia. Vol. 3. Wetlands on the Ramsar Shadow List.* Wetlands International Global Series. Moscow, **6**: 59-61.
- Red Data Book of Latvia. Rare and threatened species of plants and animals. Vol. 6. Birds and mammals.* 2000. Riga: 1-274.

