ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2017
XXVI

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1526
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVI

Экспресс-выпуск • Express-issue

2017 № 1526

СОДЕРЖАНИЕ

4801-4803 Новые сведения о гнездовых поселениях обыкновенной пустельги *Falco tinnunculus* в антропогенном ландшафте верховьев Колымы. Ю.А.СЛЕПЦОВ

4804-4810 Встреча раннего выводка серой неясыти *Strix aluco* в Александровском парке города Пушкина. С.В.ПОНОМАРЦЕВ, Ф.О.АРТЮШКОВ

4810-4811 Встреча рогатого жаворонка *Eremophila alpestris* на востоке Чукотского полуострова. М.А.АНТИПИН

4811-4813 Зимнее появление лесного сыча *Aegolius funereus* в северных предгорьях Нарымского хребта на Южном Алтае. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ

4813-4815 Встреча сизой горихвостки *Rhyacornis fuliginosa* в Крыму. И.А.СИКОРСКИЙ

4816-4829 Аннотированный список птиц окрестностей города Певека, Чукотский автономный округ. П.С.ТОМКОВИЧ

4829-4831 К распространению горной трясогузки *Motacilla cinerea* в Верхнепечорском Предуралье. Н.Д.НЕЙФЕЛЬД, В.В.ТЕПЛОВ

4831 Стерх *Grus leucogeranus* в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Ю.И.ГОРДЕЕВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2017
Дата опубликования: 10 ноября 2017

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVI
Express-issue

2017 № 1526

CONTENTS

4801-4803 New information about breeding of the common kestrel *Falcon tinnunculus* in the anthropogenic landscape of the upper Kolyma. Yu.A.SLEPTSOV

4804-4810 Finding early brood of the tawny owl *Strix aluco* in the Alexander Park of Pushkin. S.V.PONOMARTSEV, F.O.ARTYUSHKOV

4810-4811 The record of the horned lark *Eremophila alpestris* in the east of the Chukchi Peninsula. M.A.ANTIPIN

4811-4813 Winter appearance of the Tengmalm's owl *Aegolius funereus* in the northern foothills of the Narym Ridge in the Southern Altai. N.N.BEREZOVIKOV

4813-4815 The record of the plumbeous water redstart *Rhyacornis fuliginosa* in Crimea. I.A.SIKORSKY

4816-4829 Annotated bird list for Pevek town vicinity, Chukotka Autinomous Area, the Far East of Russia. P.S.TOMKOVICH

4829-4831 To the distribution of the grey wagtail *Motacilla cinerea* in the Upper Pechora Preduralye. N.D.NEIFELD, V.V.TEPLOV

4831 The Siberian crane *Grus leucogeranus* in the Beryozovo Raion, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug. Yu.I.GORDEEV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2017

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1526**: 4801-4803*

Новые сведения о гнездовых поселениях обыкновенной пустельги *Falco tinnunculus* в антропогенном ландшафте верховьев Колымы

Ю.А.Слепцов

Юрий Александрович Слепцов. Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, ул. Портовая, д. 18, Магадан, 685000, Россия. E-mail: slep-u@yandex.ru

Поступила в редакцию 8 ноября 2017

В последние годы в верхнем течении реки Колымы наблюдается заселение обыкновенной пустельгой *Falco tinnunculus* антропогенного ландшафта (Дорогой 2011, 2013). Особую актуальность подобные исследования имеют в свете охранного статуса этой птицы (Красная книга… 2008). Наши работы проведены в посёлке Сеймчан (62°55′ с.ш., 152°23′ в.д.) в мае 2016 и 2017 годов.

На места гнездования в исследуемом регионе пустельга прилетает в конце апреля – начале мая. В 2016 году первые прилетевшие птицы отмечены 2 мая, а в 2017 году 5 мая все гнездовые пары уже находились на занятых участках. Некоторые самцы демонстрировали элементы токового поведения – резкий вертикальный набор высоты с последующим пикированием к земле.

В 2016 году отмечено 3 гнездовых участка (рис. 1). Птицами были заняты чердачные помещения в жилом пятиэтажном доме (№ 2), трёхэтажном учреждении (№ 7) и в заброшенном пятиэтажном доме (№ 6).

Рис. 1. Расположение гнездовых участков пустельги *Falco tinnunculus* в посёлке Сеймчан в 2016 (№№ 2, 6, 7) и 2017 (№№ 1-7) годах. Снимок получен с использованием программы Google Earth.

В 2017 году, кроме занятых повторно участков, отмечены ещё 4 гнездовые пары: в заброшенном гаражном строении на окраине посёлка (№ 1) и в чердачных помещениях жилых домов (№№ 3-5). Интересно, что на участке № 5 в 2014 году гнездился чеглок *Falco subbuteo*. Минимальное расстояние между участками составляло 200 м (№ 3–№ 5), максимальное – 1100 м (№ 1–№ 7).

Рис. 2. Самка пустельги *Falco tinnunculus* в вентиляционном отверстии чердачного помещения 5-этажного жилого дома. Посёлок Сеймчан, 7 мая 2017. Фото автора.

Такое плотное поселение соколов, по нашему мнению, обусловлено несколькими причинами. Во-первых, укромное гнездование пустельги на чердаках исключает доступ естественных хищников. Наличие сквозных вентиляционных отверстий позволяет птице в случае опасности улететь через одно из них (рис. 2). К тому же, к части таких помещений люди не имеют прямого доступа. Осенний осмотр чердачных помещений двух участков выявил устройство гнёзд непосредственно под вентиляционным отверстием в виде небольших углублений с выстилкой из шерсти полёвок. Во-вторых, в окрестностях некогда развитого в аграрном плане посёлка расположены ныне зарастающие пашни, которые служат благоприятным биотопом для мелких грызунов. Нам неоднократно доводилось наблюдать пустельгу, охотящуюся на этих полях (рис. 3). В-третьих, способность птиц к размножению уже на второй год жизни даёт возможность образования гнездовых пар и заселению новых территорий.

Рис. 3. Гнездовая пара пустельги *Falco tinnunculus*. Вверху самец с добычей, предположительно с красно-серой полёвкой *Clethrionomys rufocanus*. 13 мая 2017. Фото автора.

Осенью 2017 года в посёлке Сеймчан нами выявлено резкое сокращение численности полевого воробья *Passer montanus* по сравнению с весенними наблюдениями. Мы предполагаем, что это может быть связано с высокой гнездовой плотностью и хищничеством пустельги, которая, кроме основных кормовых объектов – мелких грызунов, может охотиться и на мелких птиц.

Полученные нами данные имеют интерес и требуют более детального изучения вопросов биологии этого редкого для региона вида.

Литература

Дорогой И.В. 2011. К распространению некоторых птиц в Магаданской области // *Рус. орнитол. журн.* **20** (687): 1811-1815.

Дорогой И.В. 2013. Новые находки пустельги *Falco tinnunculus* в верховьях Колымы // *Рус. орнитол. журн.* **22** (922): 2616-2619.

Красная книга Магаданской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. 2008. Магадан; 1-429.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1526**: 4804-4810*

Встреча раннего выводка серой неясыти *Strix aluco* в Александровском парке города Пушкина

С.В.Пономарцев, Ф.О.Артюшков

Сергей Вячеславович Пономарцев. E-mail: ponomartsevsv@gmail.com
Фёдор Олегович Артюшков. E-mail: fart05@mail.ru

Поступила в редакцию 8 ноября 2017

8 апреля 2017 в 17 ч в Александровском парке города Пушкина (Санкт-Петербург) Фёдором и Анастасией Артюшковыми были обнаружены четыре совёнка серой неясыти *Strix aluco*. Они находились на двух соседних молодых дубах, растущих на берегу пруда Озерки (59° 43'10" с.ш., 30°23'30" в.д.). Птенцы спокойно сидели на ветках, затаившись, никуда не перемещаясь и не издавая никаких звуков (рис. 1). Однако с наступлением сумерек их поведение резко изменилось: они стали пищать, призывая родителей, и начали активно перемещаться. Птенцы совершали неловкие движения, пытаясь перепрыгивать с ветки на ветку, с трудом удерживали равновесие после прыжка, часто махая крыльями. Два совёнка перелетели на ель, стоящую рядом на островке. В тот день взрослых сов не видели.

Рис. 1. Сидящие парами на дубах четыре птенца серой неясыти *Strix aluco*.
Александровский парк в Пушкине. 8 апреля 2017. Фото С.В.Пономарцева.

Эту семью серых неясытей наблюдали ещё один раз 10 апреля 2017 Фёдор Артюшков и Никита Пономарцев. На этот раз в дневное время были обнаружены 5 птенцов и одна взрослая неясыть рыжей морфы

(рис. 2-6). Совы сидели на ветвях дубов недалеко от деревьев, где были обнаружены в первый раз. Днём совы совершали только незначительные перемещения.

Рис. 2. Семья серых неясытей *Strix aluco:* 5 слётков (один не попал в кадр) и одна взрослая сова. Александровский парк в Пушкине. 10 апреля 2017. Фото Ф.О.Артюшкова.



Рис. 3. Взрослая серая неясыть *Strix aluco* рыжей морфы. Александровский парк в Пушкине. 10 апреля 2017. Фото Ф.О.Артюшкова.

Рис. 4. Два из пяти птенцов серой неясыти *Strix aluco*.
Александровский парк в Пушкине. 10 апреля 2017. Фото Ф.О.Артюшкова.

В последующие дни мы пытались найти сов ещё раз, но нам этого не удалось. Во второй половине апреля В.М.Храбрый и С.А.Байбекова искали их здесь, самих птиц не увидели, но нашли погадки под дубом. 13 апреля 2017 мы также обошли почти весь Александровского парка, однако неясытей не нашли. Видимо, птицы куда-то откочевали или хорошо спрятались.

Поскольку серые неясыти насиживают кладку около 30 дней, а птенцы покидают гнездо спустя 28-37, в среднем 30 дней после вылупления (Пукинский 2005), то можно примерно оценить, что яйца были отложены родителями с 9 по 13 февраля. Не только для широты Петербурга, но и для всего ареала такие сроки размножения являются ранними (Дементьев 1951; Пукинский 2005). Большинство серых неясытей откладывает яйца в конце марта – начале апреля. Для Северо-Запада России отмечен единственный случай столь раннего гнездования серой неясыти, когда в конце марта 1972 года в Ленинградский зоопарк принесли почти оперившегося птенца, найденного под Павловском (Мальчевский, Пукинский 1983).

Ранние находки птенцов серой неясыти известны также для Москвы; рассчитанные сроки начала откладки яиц в одном случае приходились даже на конец декабря (Шариков 2003).

В парках Петербурга зимние кладки наблюдались также у ушастой совы *Asio otus* (Храбрый, Байбекова 2015). Зимнее размножение отмечались у этого вида и в Москве (Морозов, Конторщиков 2008).

Можно попытаться связать столь раннее гнездование серой неясыти в Александровском парке в Пушкине с тёплой погодой конца января и начала февраля. Действительно, в конце января в период с 27-го по 31-е числа температура воздуха колебалась в районе 0°, а в начале февраля в период с 1-го по 4-е числа температура не опускалась ниже минус 5°С (Рис. 5)*.



Рис. 5. Среднесуточная температура января и февраля 2017 года в Санкт-Петербурге.

Возможно, относительно высокая температура воздуха конца января и начала февраля способствовала активизации полового поведения неясытей. Также в период с 2013 по 2016 годы наметилась тенденция к увеличению средней температуры февраля. В этот период средняя температура февраля не опускалась ниже минус 2.61°С (рис. 6). В 2017 году средняя температура февраля опустилась до отметки -4.01°С. По сравнению со средним значением температуры февраля в Петербурге

* Все данные о погоде взяты с сайта www.weatherarchive.ru.

за период с 1999 до 2017 год, которое составляет -5.1°C, февраль 2017 года был примерно на 1° теплее. Также можно отметить тенденцию к потеплению в марте. Начиная с 2014 и по 2017 годы средняя температура этого месяца не опускается ниже +0.83°C, тогда как средняя температура марта в 2009-2013 годы была отрицательной (рис. 6). Таким образом, можно предположить, что повышение средней температуры февраля и марта последних лет способствовало смещению половой активности серых неясытей на более ранние сроки.



Рис. 6. Средняя температура февраля и мая в Санкт-Петербурге за период с 1999 по 2017 год.

Вылупление птенцов, обнаруженных нами, должно было происходить 10-14 марта. Март 2017 года также был достаточно тёплым, средняя температура составила +0.93°C, тогда как средняя температура марта за период с 1999 по 2017 год составляет -1.1°C. Таким образом, тёплый март, возможно, способствовал тому, что у серых неясытей, обнаруженных нами, до вылета из гнезда дожили 5 птенцов, что является очень большим показателем для этого вида.



Рис. 7. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года на фоне предшествующих годов, начиная с 1999

Рис. 8. Средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге в апреле в период с 1999 по 2017 год.

Несмотря на тёплые январь, февраль и март, апрель 2017 года оказался уникально холодным (рис. 7). Первые числа оказались весьма тёплыми – средняя температура не опускалась ниже 0°, а 10 апреля оказалось самым тёплым, начиная с 1999 года, тогда как 12 апреля температура воздуха опустилась почти до 0°. В последующие дни, до 19-го числа включительно, температура воздуха была отрицательной. Восемь дней (12-19 апреля) держалась рекордно низкая для этих дат температура за период с 1999 по 2017 годы. В последующие дни апреля температура воздуха, хотя и не была отрицательной, но держалась близко к нижней границе. В период с 12-го по 18-е числа регулярно шёл снег. Средняя температура апреля 2017 года составила +2.58°C.

За период с 1999 года холоднее был только апрель 2003 года (+2.33°C) (рис. 8). Средняя же температура воздуха для апреля в Петербурге составляет +5.5°C.

Конечно, нельзя связывать столь ранний факт гнездования серой неясыти только с погодой. Скорее всего, зимой 2016/17 года совы были также хорошо обеспечены пищей. К сожалению, в нашем распоряжении оказалась только одна погадка, и мы не можем с большой достоверностью судить о том, чем питались неясыти.

О дальнейшей судьбе выводка серых неясытей мы можем только предполагать. С одной стороны, ухудшившаяся погода в апреле 2017 года могли негативно сказаться на выживаемости молодых. С другой стороны, из-за апрельских заморозков уже прилетевшие птицы оказались застигнутыми непогодой. Совы могли охотиться на ослабленных птиц и в этом отношении холодный апрель был для них полезен.

Литература

Дементьев Г.П. 1951. Отряд совы Striges или Strigiformes // *Птицы Советского Союза*. М., **1**: 342-429.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 1-480.

Морозов Н.С., Конторщиков В.В. 2008. Зимние кладки у ушастых сов в Москве в 2008 г. // *Орнитология* **35**: 137-142.

Пукинский Ю.Б. 2005. Серая неясыть *Strix aluco* (Linnaeus, 1758) // *Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, Дятлообразные*. М.: 62-72.

Храбрый В.М., Байбекова С.А. 2015. Зимнее размножение ушастой совы *Asio otus* в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1123): 1057-1062.

Шариков А.В. 2003. Раннее размножение серой неясыти в Москве // *Орнитология* **30**: 222-223.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1526**: 4810-4811*

Встреча рогатого жаворонка *Eremophila alpestris* на востоке Чукотского полуострова

М.А.Антипин

Максим Александрович Антипин. Национальный парк «Берингия». Набережная Дежнева д.10, пгт.Провидения, Чукотский АО, Россия, 689251. E-mail: merops@mail.ru

Поступила в редакцию 9 ноября 2017

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris* впервые встречен на восточном побережье Чукотского полуострова 11 сентября 2015 (см. рисунок). Птица замечена во время посадки на отдых в вечерних сумерках

недалеко от озера Песчаное (64°29'0.23" с.ш., 172°23'14.13" з.д.). По словам инспекторов национального парка, рогатые жаворонки в разные годы периодически встречались осенью на морских побережьях южной части Чукотского полуострова.

Рогатых жаворонков ранее отмечали в окрестностях города Гамбелл на острове Святого Лаврентия (Sealy *et al*. 1971), в 85 км юго-восточнее точки нашей встречи на Чукотском полуострове.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris* в районе озера Песчаное на восточном побережье Чукотского полуострова. Фото М.А.Антипина.

Литература

Sealy S. G., Bédard J., Udvardy M.D., Fay F.H. 1971. New records and zoogeographical notes on the birds of St. Lawrence Island, Bering Sea // *Condor* **73**: 326-327.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1526**: 4811-4813*

Зимнее появление лесного сыча *Aegolius funereus* в северных предгорьях Нарымского хребта на Южном Алтае

Н.Н.Березовиков

Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.
E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 8 ноября 2017

Лесной сыч *Aegolius funereus sibiricus* Buturlin, 1910 – характерная оседлая птица горно-таёжных ландшафтов Южного Алтая, обитающая преимущественно в кедрово-лиственничных лесах по склонам хребтов,

в которых проводит осенне-зимнее время (Сушкин 1938; Березовиков 1989; Стариков 2006). Для большинства горных районов Алтая в многоснежные зимы и в годы неурожаев кедра, когда падает численность мышевидных грызунов, характерны вылеты лесных сычей за пределы тайги на подгорные равнины, где они нередко появляются в населённых пунктах (Гаврин 1962; Кучин 1976; Хроков, Березовиков 1990; Щербаков 2011).

Рис. 1. Лесной сыч *Aegolius funereus*, пойманный в посёлке Большенарымское. Южный Алтай. 5 января 2015. Фото П.Сидорова.

На Южном Алтае до последнего времени случаев появления сычей в степных предгорьях не наблюдалось, поэтому считаю целесообразным сообщить о документированном факте зимнего залёта лесного сыча в низовья реки Нарым у северного подножия Нарымского хребта (49°12' 44" с.ш., 84°30'41" в.д.). В посёлке Большенарымское Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области 5 января 2015 П.Сидоров поймал истощённого лесного сыча, залетевший в скотный двор сельской усадьбы (рис. 1). Эта встреча произошла после продолжительных снегопадов и установления морозной погоды. После передержки в доме, на следующий день сыч был выпущен на свободу (рис. 2). Вероятнее всего, из Нарымского хребта он прикочевал по пойменным зарослям реки Нарым, у посёлка Большенарымское впадающей в Бухтарминское водохранилище.

Рис. 2. Лесной сыч *Aegolius funereus* перед выпуском на свободу. Посёлок Большенарымское. 6 января 2015. Фото П.Сидорова.

Литература

Березовиков Н.Н. 1989. *Птицы Маркакольской котловины (Южный Алтай)*. Алма-Ата: 1-200.

Гаврин В.Ф. 1962. Отряд Совы – Striges // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **2**: 708-779.

Кучин А.П. 1976. *Птицы Алтая*. Барнаул: 1-232.

Стариков С.В. 2006. Аннотированный список птиц Катон-Карагайского национального парка и прилегающих территорий Алтая // *Тр. Катон-Карагайского национального парка*. Усть-Каменогорск, **1**: 147.

Сушкин П.П. 1938. *Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо-Западной Монголии*. М.; Л.:, **1**: 1-320.

Хроков В.В., Березовиков Н.Н. (1990) 2011. К фауне сов Верхнего Прииртышья // *Рус. орнитол. журн.* **20** (712): 2472-2474.

Щербаков Б.В. 2011. Лесной сыч *Aegolius funereus* на Западном Алтае // *Рус. орнитол. журн.* **20** (713): 2490-2497.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1526**: 4813-4815*

Встреча сизой горихвостки *Rhyacornis fuliginosa* в Крыму

И.А.Сикорский

Игорь Анатольевич Сикорский. ГБУ природный заповедник «Опукский». Бульвар Адмиральский, д. 7Е-4Н, Феодосия, Республика Крым, 298100, Россия. E-mail: falco72@yandex.ru

Поступила в редакцию 8 ноября 2017

Сизая, или сизая ручьевая горихвостка *Rhyacornis fuliginosa* (Vigors, 1831) – птица из подсемейства Saxicolinae семейства Muscicapidae. Длина сизой горихвостки 12-14 см. Оперение самца в основном сизое.

Оперение самки светло-серое. Брюхо и грудь белые с серыми пестринами. Хвост чёрный. Самцы и самки различны в окраске. Самцы имеют в общем тёмное, свинцового цвета оперение; светло-серый низ живота; лоб и щеки с чёрным оттенком; каштаново-красные верхние и нижние кроющие хвоста, рулевые и маховые, которые также имеют темно-коричневые края. У самок темно-серые живот и спина, покрытые пятнами: живот – белыми, спина – слегка светло-коричневыми по бокам; верхние и нижние кроющие хвоста белые; хвост и маховые темно-коричневые. Половые различия в окраске наблюдаются и у молодых птиц: молодые самцы имеют белые крапинки только на голове, в то время как у молодых самок есть пятнышки по всему оперению. И самцы, и самки имеют чёрный клюв и светло-коричневые ноги. Молодые птицы похожи на самок. Уместно привести фотографии самца и самки из Википедии (рис. 1).

Рис. 1. Самец (слева) и самка сизой горихвостки *Rhyacornis fuliginosa*.

Сизая горихвостка распространена в Афганистане, Бутане, Китае, Индии, Лаосе, Мьянме, Непале, Пакистане, Таиланде и Вьетнаме. Места обитания – быстрые горные потоки, водопады и подножия гор на высоте до 2400 м над уровнем моря. Питается насекомыми и другими беспозвоночных, на которых птица охотится в воздухе или на скалах. Также использует в пищу ягоды.

Единственный случай встречи сизой горихвостки в Казахстане отмечен Габором Паппом 9 июня 2011 на реке Аягоз, в районе станции Актогай Восточно-Казахстанской области.

Первая регистрация сизой горихвостки в России сделана 4 октября 2013 на берегу залива Покойный (Центральный кордон Байкало-Ленского заповедника, северо-западное побережье Байкала, Иркутская область) (Шабурова 2013).

Во время проведения мониторинга орнитофауны Опукского заповедника 21 октября 2017 обнаружена и сфотографирована небольшая птица сизой окраски, размером немного меньше воробья, определён-

ная как сизая горихвостка. Она встречена недалеко от восточной границы заповедника «Опукский» около песчаного побережья у устья Чебакской балки возле мыса Опук в восточной части Крымского полуострова (45°03'23.13" с.ш.,36°17'07.84" в.д.). Птица сидела на глинистом обрыве высотой 6 м в 3 м от его основания. Фотография неважного качества (рис. 2), сделана с расстояния 40 м, при попытке подойти ближе птица улетела. Снимок сделан между 14 и 15 ч, температура воздуха +16°С, ветер северо-западный, облачно.

Рис. 2. Самец сизой горихвостки *Rhyacornis fuliginosa*. Глинистый обрыв у берега Чёрного моря в заповеднике «Опукский». 21 октября 2017. Фото С.В.Леденкова.

Столь дальний залёт сизой горихвостки к северо-западу от основного ареала очень необычен. Вероятно, это первая регистрация вида в Западной Палеарктике и вторая в России (Шабурова 2013). Регистрация подтверждена Фаунистической комиссией при Мензбировском орнитологическом обществе.

Автор выражает огромную благодарность за помощь в определении сизой горихвостки Е.А.Коблику и И.И.Уколову.

Литература

Шабурова Н.И. 2013. Первая встреча сизой горихвостки *Rhyacornis fuliginosus* в России // *Рус. орнитол. журн.* **22** (936): 3032-3034.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1526**: 4816-4829*

Аннотированный список птиц окрестностей города Певека, Чукотский автономный округ

П.С.Томкович

*Второе издание. Первая публикация в 2007**

Город Певек – крупнейший населённый пункт северо-запада Чукотского автономного округа, связанный авиалиниями с рядом городов России. Его нередко посещали орнитологи на пути к местам своих полевых исследований. Несмотря на это, в литературе удалось найти только фрагментарные сведения о птицах Певека и его окрестностей, при этом без общего списка зарегистрированных там видов (Лебедев, Филин 1959; Спангенберг 1960; Портенко 1972, 1973; Колонии 1980; Кондратьев 1986). Недостаток сведений о распространении и статусе птиц в этой части Чукотки наглядно виден, например, на картах точечного распространения видов в сводке А.А.Кищинского (1988). Важность публикации подобных сведений определяется, среди прочего, необходимостью создания карт видовых ареалов и слежения за происходящими изменениями в распространении и численности видов.

С 30 мая по 3 июля и с 25 по 29 августа 2007 автору этого сообщения довелось осуществить несколько экскурсий по окрестностям Певека и при этом сделать ряд интересных фаунистических находок. Сказанное стало поводом для изложения в данной статье основных результатов фаунистических наблюдений. В этот краткий обзор включены сведения, любезно предоставленные сотрудниками заповедника «Остров Врангеля» В.В.Баранюком, А.Г.Дондуа и И.Е.Менюшиной, а также те разрозненные данные, которые найдены в научной литературе.

Район наблюдений простирается от города Певека и его непосредственных окрестностей (на расстоянии нескольких километров от города) до окрестностей аэропорта (посёлок Апапельгино), расположенного в 16 км к северо-востоку от города на косе между эстуарной частью реки Апапельгин и Чаунской губой Восточно-Сибирского моря. Кроме того, 25 августа удалось поучаствовать в экскурсии по Чаунскому заливу от Певека к мысу Киттиваркен и посёлку Янранай. Посёлок Апапельгино, состоящий преимущественно из одно- и двухэтажных строений, с 2000-2001 годов в значительной мере заброшен людьми, что способствует его плотному заселению птицами. Обследованный район относится к северной полосе подзоны кустарниковых тундр. Низкогорный

* Томкович П.С. 2007. Аннотированный список птиц окрестностей города Певека, Чукотский автономный округ // *Орнитология* **34**, 2: 176-185.

ландшафт окаймляет долину реки Апапельгин на некотором удалении от берега губы, но подходит вплотную к берегу возле города. Вдоль берега губы в районе устья Апапельгина и далее на север полосой до 1 км шириной, протянувшейся примерно на 10 км, расположена приморская сильно заозёренная равнина. Большинство озёр этой равнины соединены протоками с эстуарием реки, по которым они заполняются солоноватой водой в высокие приливы и при штормах; между озёрами преобладает галофитная травянистая растительность.

Период исследований отличался ранней весной и тёплым летом без резких похолоданий. Судя по следам жизнедеятельности, полёвки в некоторых местах были вполне обычны, что важно для присутствия и размножения миофагов. Наземных хищников было мало (отмечена лишь лисица и бродячие собаки), что обеспечило достаточно успешное размножение всех наземногнездящихся птиц.

Видовые очерки

Краснозобая гагара *Gavia stellata*. Крики птиц в полёте слышали в низовьях реки Апапельгин 7 и 18 июня. В том же районе пару каких-то гагар видели 7 июня издали на пресном озере.

Берингов баклан *Phalacrocorax pelagicus*. Единичные взрослые бакланы пролетали 25 августа возле колоний моевок на мысе Киттиваркен и в его окрестностях в Чаунской губе. В плохих условиях наблюдений удалось проследить за полётом одной из птиц и заметить, как она села на обрыве на гнездо ко второй птице. Там размножаются, вероятно, всего несколько пар бакланов. Присутствие и гнездование там до 6 пар бакланов впервые было указано А.Я.Кондратьевым (1986).

Чёрная казарка *Branta bernicla*. В 2007 году регистраций не было. В 1930-е годы немногочисленные в Чаунской губе чёрные казарки встречались преимущественно на северо-восточном берегу губы (Портенко 1972).

Белолобый гусь *Anser albifrons*. Две птицы пролетели 8 июня над приморской равниной близ посёлка Апапельгино. Стайка из 5 этих гусей держалась у окраины посёлка 18 и 20 июня. Стая из 6 гусей пролетела на северо-восток над Певеком 21 июня. Эти скудные наблюдения соответствуют указанию Л.А.Портенко (1972) на то, что в этом районе данный вид многочисленнее других гусей.

Гуменник *Anser fabalis*. Стая из 6 птиц присаживалась на приморской равнине возле посёлка Апапельгино 7 июня, и там же одиночный гуменник пролетел 8 июня. Ранее этот вид был обычен на реке Апапельгин и гнездился на острове Раутан (Портенко 1972).

Белый гусь *Anser caerulescens*. В 2007 году не встречен. Данные о посещении окрестностей Певека белыми гусями и даже гнездовании там отдельных пар имеются у Л.А.Портенко (1972). Кроме того, А.В.

Кречмар с коллегами (1991) сообщали о довольно интенсивном пролёте этих гусей вблизи посёлка Янранай в конце мая. В 2004 году белых гусей дважды отмечал А.Г.Дондуа. Он 5 сентября встретил выводковую группу из трёх молодых с парой взрослых птиц на низменности с приморскими озёрами на острове Большой Раутан, расположенном напротив города Певека, и 13 сентября наблюдал группу из 4 птиц, летевших на юго-восток между Певеком и Апапельгино.

Малый лебедь *Cygnus bewickii*. Пару или одиночных птиц наблюдали при всех визитах в район реки Апапельгин. Возле устья реки 28 июня отдыхали две стаи лебедей из 5 и 8 птиц. На окраине Певека пара лебедей плавала на море 23 июня, а 27 июня –1 июля держалась на большом озере в черте города. Три лебедя постоянно обитали на том же озере в конце августа.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. Одиночные самцы и стайки до 5 птиц стали попадаться в Певеке и окрестностях Апапельгино с 10 июня. Одиночку, мелкие группы и стаю из 10 чирков наблюдали в этом посёлке и его окрестностях 28 августа.

Клоктун *Anas formosa*. Самец отмечен 8 июня на берегу озера на приморской равнине вблизи низовьев реки Апапельгин. О встрече одной птицы где-то «на горной речке» упомянуто А.В.Кречмаром с соавторами (1991).

Шилохвость *Anas acuta*. Пары, а затем одиночные самцы встречены в черте города Певека и в низовьях реки Апапельгин. И.Е.Менюшина наблюдала самку с выводком нелётных птенцов в начале 2000-х годов на большом озере в Певеке. По её же данным, в августе шилохвости обычны по всем озёрам района, что подтвердилось нашими наблюдениями в указанных выше пунктах в конце августа 2007 года.

Морская чернеть *Aythya marila*. Две пары чернетей встречали на озёрах приморской равнины до 20 июня, одну из пар дважды видели на озере в центре посёлка Апапельгино.

Морянка *Clangula hyemalis*. Морянки сравнительно обычны в первой половине июня в районе реки Апапельгин как на самой реке, так и озёрах равнины, включая озёра в пределах одноимённого посёлка. Гнездо с кладкой из 5 яиц найдено 8 июня на участке сухой приподнятой тундры среди озёр приморской равнины. Первые морянки прилетают в Певек ещё в первой половине мая (Кречмар и др. 1991).

Обыкновенная гага *Somateria mollissima v-nigra*. В первой половине июня гаги обычны парами на разводьях Чаунской губы. На приморской равнине в низовьях Апапельгина это наиболее обычные утки. Четыре гнезда с кладками найдены на краю приморской равнины в окрестностях гнезда зимняка. Разорённое хищником гнездо обнаружено в холмистой тундре на удалении от приморской равнины. Самку примерно с 15 крупными птенцами наблюдали 25 августа на берегу

моря возле посёлка Янранай. Ранее сообщалось, что гаги регулярно гнездятся вдоль морского побережья у подножия Валькумейской сопки и в дельте реки Апапельгин (Кречмар и др. 1991).

Гага-гребенушка *Somateria spectabilis*. В 2007 году не встречена. А.В.Кречмар с соавторами (1991) сослались на сведения Е.П.Спангенберга о гнездовании этого вида в конце 1950-х годов по долинам горных речек довольно далеко от морского побережья.

Сибирская гага *Polysticta stelleri*. О наблюдении стаи гаг этого вида на острове Раутан упомянул Л.А.Портенко (1972).

Американская синьга *Melanitta americana*. Как и в случае с гагой-гребенушкой, имеются лишь старые сведения Е.П.Спангенберга о встречах этих птиц на горных речках у восточных границ Чаунской низменности (Кречмар и др. 1991).

Зимняк *Buteo lagopus*. Пара гнездилась на скалистом обрыве в нижней части долины ручья на окраине города Певека. Ещё два гнезда найдены в окрестностях низовьев Апапельгина. Одно из них помещалось на осыпи склона холма, обращённого к долине реки, а второе на бугре, возвышавшемся примерно на 1 м над приморской равниной с многочисленными озёрами. Два осмотренных гнезда содержали 4 и 2 яйца, но в последнем случае кладка на равнине подвергалась нападению пернатого хищника: скорлупа третьего расклёванного яйца найдена в нескольких метрах от гнезда (позже это гнездо было разорено). В гнезде на осыпи холма птенцы поднялись на крыло. В конце августа как взрослые, так и молодые зимняки были повсеместно вполне обычны. О гнездовании зимняков в окрестностях Певека есть сообщение у Л.А.Портенко (1972).

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Неполовозрелая птица пролетела в низовьях реки Апапельгин 28 июня.

Кречет *Falco rusticolus*. Чучело птицы белой окраски хранится в музее средней школы посёлка Янранай. Кречета, летавшего у обрыва к морю между посёлками Валькумей и Западным, 7 сентября 2004 наблюдал А.Г.Дондуа. Об одной встрече этой птицы возле посёлка Янранай упоминал Г.В.Колонии (1980).

Сапсан *Falco peregrinus*. В низовьях реки Апапельгин 28 июня пролетел сапсан, которого атаковал длиннохвостый поморник. Безуспешную охоту сапсана на пролётного дутыша удалось наблюдать там же 28 августа; после этой охоты к птице присоединился второй сапсан. Несколько выводков сапсанов (взрослые и молодые птицы) встречены А.Г.Дондуа на острове Большой Раутан в начале сентября 2004 года. Считается, что сапсаны «нередки по восточному побережью Чаунской губы» и гнездятся там на некоторых реках (Портенко 1972).

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. Среди мусора, оставленного половодьем, в низовьях реки Апапельгин в июне найден кусок крыла,

предположительно принадлежащий данному виду. В конце 1950-х годов Е.П.Спангенберг считал белых куропаток редкими гнездящимися птицами в долинах горных речек у восточных границ Чаунской низменности (Кречмар и др. 1991).

Тундряная куропатка *Lagopus mutus*. Стайка из 8 куропаток в зимнем оперении сфотографирована в начале мая 2007 года И.Е.Менюшиной возле вершин сопок, возвышающихся над городом Певеком. Судя по местообитанию и осмотренному в июне зимнему помёту птиц, скорее всего, это были тундряные куропатки. Эти птицы всегда были малочисленны возле Певека (Портенко 1972; Кречмар и др. 1991).

Канадский журавль *Grus canadensis*. Журавлей наблюдали и слышали их голоса в разных местах от ближних окрестностей города до дальних пунктов наблюдений. Одна из птиц на склоне холма к приморской равнине в районе низовьев реки Апапельгин 28 июня выполняла отвлекающие демонстрации, что указывало на размножение. Весь июнь попадались кочевавшие журавли по 1-3 птицы, но в конце месяца на приморской равнине появились стаи до 7 птиц. В таких же стаях канадских журавлей отмечали в конце августа. На обычность этих журавлей в районе Певека указывал Е.П.Спангенберг (1960), а на гнездование в 1971 году – Г.В.Колонии (1980).

Тулес *Pluvialis squatarola*. Отмечен по голосу 2 июня вблизи города. Этот заметный кулик с консервативными территориальными связями определённо не гнездился в обследованном районе в 2007 году. Это не соответствует прежнему указанию на гнездование вида в окрестностях Певека (Портенко 1972).

Бурокрылая ржанка *Pluvialis fulva*. Редка в холмистой тундре в районе низовьев реки Апапельгин, но при этом два гнезда с полными кладками найдены 14 июня в 180 м одно от другого. В других местах в июне видели только кормившихся птиц. Имеется указание на многочисленность этих куликов в долине реки Апапельгин по наблюдениям 29 мая 1982 (Кречмар и др. 1991), т.е. на весеннем пролёте. Кладка из 4 яиц собрана в окрестностях Певека Е.П.Спангенбергом 19 июня 1959 (Николаев и др. 1977).

Галстучник *Charadrius hiaticula*. Токовавших галстучников в посёлке Апапельгино встречали с 30 мая. Гнездо с кладкой найдено 8 июня на искусственной насыпи у реки на краю посёлка (вылупление птенцов произошло 28 июня), ещё несколько пар обитали в посёлке и по реке Апапельгин. В Певеке регистрации галстучников единичны, но 16 июня близ окраины города возле шлакоотвала найдено гнездо с кладкой (вылупление птенцов – 29 июня). По 1-7 молодых галстучников держались возле посёлка Апапельгино 28 августа на одном из приморских озёр или пролетали над ним. В 1971 году к северу от Певека галстучников было много и они размножались (Колонин 1980).

Хрустан *Eudromias morinellus*. В июне 1959 года Е.П.Спангенберг за неделю работы в горах нашёл 4 гнезда хрустанов (Кречмар и др. 1991); собранная им 19 июня 1959 кладка хранится в Новосибирске (Николаев и др. 1977). В 1971 году Г.В.Колонину (1980) за короткое время удалось найти 3 выводка хрустанов в каменистой тундре к северу от посёлка Янранай, в том числе с нелётными птенцами. В 2007 году эти кулики на экскурсиях по горам вблизи города не встречены вовсе. Возможно, это связано с общим резким снижением численности хрустана (Томкович 2007).

Фифи *Tringa glareola*. Сравнительно обычный вид в низовьях реки Апапельгин, в том числе голос птиц часто был слышен в посёлке Апапельгино в первой половине июня. Два гнезда с полными кладками найдены 7 июня близ посёлка в нижней части склона холма к приморской равнине в низкокустарниковой моховой тундре. Вылупление птенцов произошло там между 20 и 28 июня; в последнюю из этих дат обнаружены беспокоившиеся птицы при 4 выводках вблизи места находки гнёзд и ещё одна птица на окраине посёлка. В городе Певеке голос пролетавшей птицы удалось слышать лишь однажды, 13 июня.

Сибирский пепельный улит *Heteroscelus brevipes*. Одиночная птица кормилась 27 июня на каменистом берегу Чаунской губы несколько юго-западнее Певека.

Мородунка *Xenus cinereus*. В посёлке Апапельгино отмечены не менее 3 токовавших самцов. Гнездо обнаружено среди мусора и куртинок мятлика на шлаковой площадке в нескольких метрах от разрушающегося здания школы; откладка яиц завершена днём 14 июня. Вне посёлка мородунки не найдены.

Камнешарка *Arenaria interpres*. Единственная зарегистрированная птица пролетела над посёлком Апапельгино 8 июня. В конце июля и начале августа 1971 года камнешарки были многочисленны к северу от Певека, и «молодые были уже размером со взрослых» (Колонин 1980).

Плосконосый плавунчик *Phalaropus fulicarius*. В 2007 году этот вид не встречен, тогда как Г.В.Колонин (1980) считал плосконосого плавунчика многочисленным на озёрах к северу от Певека в конце июля и начале августа 1971 года. О стаях плосконосых плавунчиков в Певеке 8 сентября 1958 сообщали В.Д.Лебедев и В.Р.Филин (1959).

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. На большом озере в Певеке стайки до 5 птиц наблюдали 4-5 июня, а в низовьях реки Апапельгин – с 20 июня (20 плавунчиков кормились на озере в центре посёлка Апапельгино 28 июня). Сравнительно обычный вид на приморской заозёренной равнине, где 20 и 28 июня найдены 4 гнезда с кладками разной степени насиженности. В последнюю из этих дат появились птицы, явно беспокоившиеся при выводках. Судя по поведению,

круглоносые плавунчики размножались в этом районе и в 1971 году (Колонин 1980).

Турухтан *Philomachus pugnax*. Одиночных пролетавших турухтанов, до 5 самцов на току и самку, по-видимому, шедшую на гнездо, наблюдали 7 и 8 июня в районе низовьев реки Апапельгин. В конце июня в окрестностях тока и на озерце в центре посёлка Апапельгино обнаружены 3 самки, сопровождавшие выводки (активно беспокоившиеся и выполнявшие отвлекающие демонстрации); 28 августа на приморских озёрах возле посёлка Апапельгино держались в общей сложности около десятка молодых турухтанов. Г.В.Колонин (1980) писал о многочисленности турухтанов на озёрах к северу от Певека на рубеже июля и августа 1971 года.

Песочник-красношейка *Calidris ruficollis*. Пара птиц (самец выполнял элементы брачных демонстраций) кормилась 8 июня на илистом берегу реки Апапельгин на окраине посёлка. В том же посёлке прокруживший песочник-красношейка отмечен 28 июня. На рубеже июля и августа в 1971 году примерно там же держалось много песочников-красношеек (Колонин 1980).

Белохвостый песочник *Calidris temminckii*. Многочислен в посёлке Апапельгино, но редок в его окрестностях и в городе Певеке. Пары наблюдали с 31 мая, одно гнездо найдено в Певеке (6 июня полная свежая кладка) и 5 гнёзд – в посёлке Апапельгино. В Певеке 27 июня отмечен первый песочник, беспокоившийся при выводке.

Чернозобик *Calidris alpina*. Нами ни разу не встречен, тогда как Г.В.Колонин (1980) писал о том, что чернозобиков было много на озёрах к северу от Певека в конце сезона размножения в 1971 году. На полное отсутствие чернозобиков вблизи дельты реки Апапельгин в 1982 году в период массовой весенней миграции куликов указывал А.В.Кречмар с соавторами (1991).

Острохвостый песочник *Calidris acuminata*. Молодые птицы держались 28 августа возле посёлка Апапельгино в галофитной растительности с пятнами ила по берегам приморского озера. Самая крупная стая состояла из 20 дутышей и острохвостых песочников, общее число куликов этого вида вряд ли превышало 20 птиц.

Дутыш *Calidris melanotos*. На гнездовании вид нами не найден. Молодые дутыши кормились 28 августа возле посёлка Апапельгино на приморских озёрах с галофитной растительностью поодиночке и группами (в общей сложности несколько десятков птиц). Г.В.Колонин (1980) предполагал размножение этого вида в 1971 году, судя по поведению птиц. О многочисленности дутышей в период весеннего пролёта 27 мая – 1 июня 1982 на заболоченных депрессиях вблизи дельты реки Апапельгин упомянуто в очерке о чернозобике А.В.Кречмаром с соавторами (1991).

Большой песочник *Calidris tenuirostris*. Характерный голос птицы (повторяемое *«кхирри»*) удалось дважды слышать 9 августа на одной из вершин сопок, возвышающихся над городом Певеком.

Исландский песочник *Calidris canutus*. Группу из 4 птиц наблюдали 29 мая 1982 вблизи устья Апапельгина (Кречмар и др. 1991).

Перепончатопалый песочник *Calidris mauri*. Одиночная молодая птица этого вида 28 августа кормилась на илистом берегу приморского озера возле посёлка Апапельгино рядом с тремя галстучниками.

Обыкновенный бекас *Gallinago gallinago*. Токование нескольких птиц слышали в низовьях реки Апапельгин 7 и 8 июня. На топком осоково-пушицевом болоте на краю приморской равнины у подножия холма 28 июня в двух местах выпугнуты бекасы, выполнявшие отвлекающие демонстрации и издававшие хоркающие звуки.

Азиатский бекас *Gallinago stenura*. Ток птицы слышали только 2 июня над шлейфом сопок в 2 км от Певека. Две птицы, демонстрировавшие беспокойное поведение, встречены 2 июля в нескольких сотнях метров одна от другой на противоположных пологих склонах долины ручья примерно в 1 км северо-восточнее Певека. У одной из этих птиц удалось наблюдать издали двух пуховых птенцов рыжеватого окраса. На присутствие азиатского бекаса в окрестностях Певека в 1959 году впервые указал Е.П.Спангенберг (1960). В конце мая 1982 года токовавшие азиатские бекасы были одними из самых заметных птиц в долине реки Апапельгин (Кречмар и др. 1991).

Американский бекасовидный веретенник *Limnodromus scolopaceus*. Голос пролётной птицы слышали 4 июня в городе Певеке. Два бекасовидных веретенника держались на озере в низовьях реки Апапельгин 7 июня. По-видимому, это было завершение весеннего пролёта (о массовости там бекасовидных веретенников 27 мая – 1 июня 1982 упомянуто А.В.Кречмаром и др. 1991). Одиночная кормившаяся взрослая птица встречена в том же районе 28 июня, а одиночная молодая – 28 августа.

Малый веретенник *Limosa lapponica*. Наблюдения 5 пролетевших птиц и одиночного самца на земле, проявлявшего беспокойство, в низовьях реки Апапельгин относятся к 8 июня. Судя по окраске, тот же самый самец вновь встречен в том же районе 28 июня.

Средний поморник *Stercorarius pomarinus*. Одиночных птиц и группы до 8 взрослых средних поморников наблюдали от северной оконечности острова Раутан и далее на север до мыса Чаячьего 25 августа на водном маршруте по Чаунской губе.

Короткохвостый поморник *Stercorarius parasiticus*. В низовьях реки Апапельгин 7-28 июня изредка наблюдали по 1-3 птицы.

Длиннохвостый поморник *Stercorarius longicaudus*. Кочевавших длиннохвостых поморников отмечали в низовьях реки Апапельгин

начиная с 8 июня; стаю из не менее чем 25 птиц видели там же 8 и 28 июня. Одиночная птица держалась 30 июня в горной тундре в районе Певека. Гнездо с кладкой из 1 яйца найдено 28 июня у подножья холма на морской террасе в низовьях реки Апапельгин. Л.А.Портенко (1973) сообщал о многочисленности вида и о случае размножения поморников в окрестностях Певека.

Бургомистр *Larus hyperboreus*. В малом числе бургомистры встречаются повсеместно. На островках озёр приморской равнины близ реки Апапельгин в двух местах можно было видеть крупных чаек, сидевших в гнёздах, но издали удалось определить видовую принадлежность птиц только одной пары – это были бургомистры. Пару бургомистров с двумя молодыми удалось отметить с вертолёта на приморском озере вблизи аэропорта 24 августа. Вместе с серебристыми чайками бургомистры держатся среди домов в городских кварталах, где 29 августа встречены также молодые птицы.

Серебристая чайка *Larus argentatus vegae*. Обычный вид в городе, на море и в низовьях реки Апапельгин (в последнем месте возможно гнездование). Кочевавшие птицы пролетали даже в горной тундре. Птицы в неполных взрослых нарядах появились с 6 июня, а в конце августа в небольшом числе отмечены подкочевавшие откуда-то молодые. О присутствии серебристых чаек у Певека, по крайней мере с 22 мая по 8 сентября 1958, сообщали В.Д.Лебедев и В.Р.Филин (1959).

Моевка *Rissa tridactyla*. Стая из 8 птиц 16 июня летела с криками над Чаунской губой между городом и островом Раутан. Несколько моновидовых колоний, расположенных к северу от посёлка Янранай на мысе Киттиваркен (=Чаячьем: 69°58' с.ш.) и в его окрестностях, осмотрены издали с воды 25 августа. Общая численность в первом приближении оценена в 5-9 тыс. птиц, причём среди тех из них, которые держались на воде, сеголетки были малочисленны. Эта группа колоний описана А.Я.Кондратьевым (1986) по наблюдениям в 1984 году, когда им были учтены там «немногим более 9 тыс. чаек».

Полярная крачка *Sterna paradisaea*. До трёх птиц вместе встречали в низовьях реки Апапельгин 7-28 июня.

Полярный чистик *Cepphus grylle*. Одиночная взрослая птица встречена 25 августа в Чаунской губе возле колонии моевок на мысе Чаячьем. Не исключено размножение там единичных пар.

Белая сова *Nyctea scandiaca*. И.Е.Менюшина наблюдала птицу в сопках близ Певека в начале мая 2007 года. В 1959 году Е.П.Спангенберг нашёл белую сову гнездящейся на склонах гор у восточных границ Чаунской низменности (Кречмар и др. 1991). В Новосибирске хранится кладка белой совы из 4 яиц из коллекции Е.П.Спангенберга, собранная в «окр. г. Певека», скорее всего тогда, в 1959 году, а не в 1962 году, как указано у В.В.Николаева с коллегами (1977).

Белолобая ласточка *Petrochelidon pyrrhonota*. Американский залётный вид. Птица сфотографирована в посёлке Апапельгино 8 июня.

Воронок *Delichon urbica*. В Певеке ласточек встречали по 1-3 птицы лишь изредка с 31 мая. В конце июня небольшая колония (5 гнёзд) обнаружена в городе у основания сопки на одноэтажном хозяйственном строении из железобетонных плит. В посёлке Апапельгино колония воронков примерно из 30 гнёзд расположена на одном из заброшенных двухэтажных оштукатуренных домов (8-14 июня шло активное строительство гнёзд), а на других строениях, включая пятиэтажные, попадались лишь одиночные гнёзда. В конце августа ласточек уже не было.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*. Этот вид (стайка из 5 молодых птиц) обнаружен лишь в 1971 году в каменистой тундре к северу от посёлка Янранай Г.В.Колониным (1980).

Краснозобый конёк *Anthus cervinus*. Немногочисленная, но вместе с тем наиболее обычная птица тундр; по сырым низинам поднимается в субальпийский пояс гор, населяет пустыри города. Гнёзда (9 июня – 6 яиц и 27 июня – 5 яиц) найдены на окраине Певека. Активно беспокоившихся птиц с кормом для птенцов наблюдали в разных местах с 17 июня, а с 1 июля стали попадаться слётки. В конце августа молодые краснозобые коньки встречались повсеместно.

Гольцовый конёк *Anthus rubescens*. Птицы этого вида найдены в малом числе в горной тундре с курумами на высотах 150-400 м над уровнем моря вблизи Певека. Беспокоившихся птиц с кормом в клюве встречали 23-30 июня. В последнюю из этих дат на склоновой луговине (170 м н.у.м.) обнаружено гнездо с 5 птенцами, которые, будучи потревоженными, стали разлетаться из гнезда. Молодых гольцовых коньков видели в конце августа на насыпной дороге на холме близ посёлка Апапельгино, а также в сопках и у их подножья возле Певека.

Берингийская жёлтая трясогузка *Motacilla tschutschensis*. Обитает по кустарниковым участкам с болотинами, где местами многочисленна. Гнездо с 6 ещё незрячими птенцами осмотрено 20 июня 2007 на краю приморской равнины возле дороги между посёлками Апапельгино и Янранай. Весной появление зарегистрировано 29 мая 1982 (Кречмар и др. 1991).

Белая трясогузка *Motacilla alba*. Обитает во всех населённых пунктах – там отмечены беспокоившиеся птицы, собиравшие корм для птенцов, а также преследовавшие длиннохвостого поморника и серебристую чайку. Слётки встречены в Певеке 23 июня (наблюдение И.Е. Менюшиной) и в посёлке Апапельгино 28 июня. С 29 июня в Певеке появились самостоятельные молодые птицы. В конце августа доводилось видеть не только молодых, но и ещё не улетевших взрослых птиц. Белые трясогузки населяли Певек ещё в 1930-е годы (Портенко 1973).

Наиболее ранняя встреча пары весной – 27 мая 1958 в Апапельгино (Лебедев, Филин 1959).

Ворон *Corvus corax*. Неоднократно видели по 1-3 птицы в районе низовьев реки Апапельгин и на полпути оттуда в город Певек. Всего дважды (24 и 27 июня) голос ворона слышали в сопках возле Певека. Жители города сообщали о встрече выводка на городской свалке. Л.А. Портенко (1973) писал о том, что в 1930-е годы вороны отсутствовали в Чаунской губе и в Певеке.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. Залётный вид. Две птицы пролетели на юго-запад вдоль берега Чаунской губы вблизи Певека. Голос, размеры и отчетливые жёлтые «зеркальца» на крыльях птиц не оставляли сомнений в их видовой принадлежности.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*. До 3 певших самцов регистрировали по кустарникам вдоль низовьев реки Апапельгин 8, 14 и 20 июня, а 28 июня в двух местах в ивняках по ложбинам стока между холмов, примыкающих к приморской равнине, встречены пеночки с кормом в клюве, перелетавшие с беспокойными криками.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Несколько певших самцов встречены в Певеке и поблизости в сопках 2-9 июня. В конце июня птиц регистрировали в четырёх пунктах на окраинах города, а 27 июня видели пару птиц, беспокоившихся и кормивших трёх слётков, хорошо перелетавших. Молодые каменки не представляли редкости во всех населённых пунктах и вдоль насыпных дорог 25-29 августа.

Варакушка *Luscinia svecica*. С 7 по 20 июня несколько самцов пели в ивняках по ложбинам стока между двух холмов, примыкающих к приморской равнине низовьев реки Апапельгин, и ещё один самец – на берегу реки.

Бурый дрозд *Turdus eunomus*. Регулярно отмечался в населённых пунктах, где птицы активно поют. Гнездо с кладкой из 6 яиц найдено 23 июня на полке в трансформаторной будке заброшенной стройки на окраине Певека. В посёлке Апапельгино 28 июня в одном из сараев осмотрено гнездо с 5 оперявшимися птенцами, а 29 августа птица в свежем оперении встречена у ручья в основании одной из горных долин возле Певека. Гнездо этого дрозда (назван «дроздом Науманна») обнаружено около посёлка Янранай в 1971 году Г.В.Колониным (1980).

Домовый воробей *Passer domesticus*. По сообщению В.В.Баранюка, появился в городе в начале 2000-х годов. Ныне это многочисленная птица в Певеке и обычная в аэропорту. Слётки начали попадаться в Певеке с 15 июня, а 16, 17 июня и 27 августа наблюдали самок со строительным материалом для гнёзд, что, по-видимому, свидетельствует о полицикличности размножения этих птиц.

Обыкновенная чечётка *Acanthis flammea*. По 1-2 птицы наблюдали в посёлке Апапельгино и его окрестностях с 7 июня и на окраине

Певека с 16 июня; 23-30 июня отмечены единично на сопках вблизи города. В ивняках по реке Апапельгин 8 июня видели чечётку со строительным материалом, а в ивняках по ложбинам стока между холмов осмотрено гнездо этого вида предыдущего года. На окраине Певека гнездо с первым отложенным яйцом найдено 29 июня в куртине щётковидного ивняка высотой 1 м в пересохшей ложбине стока (2 июля гнездо содержало 3 яйца). В сорной растительности на заброшенных свалках вблизи Певека и Апапельгино чечётки держались 28-29 августа крупными стаями (в одной более 100 птиц 28 августа). Имеется упоминание о том, что гнёзда чечёток были найдены Е.П.Спангенбергом «до границы каменных россыпей» (Кречмар и др. 1991). Кладка из 5 яиц, собранная Е.П.Спангенбергом 10 июня 1959 в «окр. г. Певека», хранится в Новосибирске (Николаев и др. 1977).

Пепельная чечётка *Acanthis hornemanni*. Самцы пепельной чечётки отмечены на окраине Певека 16-27 июня, причём 17 июня в паре с самкой обыкновенной чечётки. В низовьях реки Апапельгин самца наблюдали 20 июня. В тех же местах в конце августа пепельные чечётки (некоторые в зимнем наряде) не представляли редкости в стаях обыкновенных чечёток. О добыче птенцов чечётки на мысе Валькумей в 1913 году и наблюдении стайки у Певека в 1958 году сообщал Л.А.Портенко (1973); однако он относил всех чечёток к светлой форме, считая обыкновенную чечётку «редкой залётной птицей». Наблюдениям 2007 года соответствует указание Г.В. Колонина (1980) о единичности пепельных чечёток среди повсеместно встречавшихся обыкновенных чечёток.

Горный вьюрок *Leucosticte arctoa*. О добыче птицы этого вида 22 июня 1945 в горах южнее Певека имеется сообщение у Л.А.Портенко (1973). Ни нами, ни другими наблюдателями горный вьюрок в рассматриваемом районе не обнаружен.

Овсянка-крошка *Emberiza pusilla*. Единичных певших самцов отмечали вблизи Певека 2-29 июня. При нескольких визитах на участок обитания одного из них всегда удавалось найти птицу, в том числе иногда в паре; 2 июля довелось наблюдать другую пару овсянок, проявлявших беспокойство и носивших зелёных гусениц, предположительно, для птенцов. По голосовсянка-крошка у отмечена в посёлке Апапельгино 28 августа.

Лапландский подорожник *Calcarius lapponicus*. Единственная регистрация в сезон размножения – пение самца 14 июня в седловине между холмами возле низовьев реки Апапельгин. В конце августа молодые подорожники не представляли редкости вблизи Певека и Апапельгино. Л.А.Портенко (1973) упомянул подорожника как «самую обычную птицу у Певека», но возможно, это не относилось к сезону гнездования. В.Д.Лебедев и В.Р.Филин (1959) отметили подорожников

в районе Певека в большом числе 28 мая 1958 (преобладали самки), т.е. в период пролёта.

Пуночка *Plectrophenax nivalis*. Обычная птица населённых пунктов, обитает с низкой плотностью также в каменистых осыпях гор. Пуночки, собиравшие корм для птенцов, отмечены с 15 июня, И.Е.Менюшина наблюдала первых слётков 23 июня, а 25 июня встречены уже вполне хорошо летавшие молодые. Гнездо с птенцами, готовыми к вылету, осмотрено 25 июня в расщелине между камнями в основании сопки на окраине Певека; 28 июня в посёлке Апапельгино пойман едва перелетавший слёток. Пуночек наблюдали в районе Певека в 1958 году 22 мая и 1-9 сентября (Лебедев, Филин 1959).

★ ★ ★

В 2007 году в обследованном районе удалось зарегистрировать 63 вида птиц, а принимая во внимание литературные и опросные сведения, общий список отмеченных там видов птиц составляет 75 видов. Это число невелико для района, характеризующегося сравнительно южным расположением (кустарниковые тундры) и разнообразием ландшафтов. Несомненно, что приведённый список не в полной мере отражает авифауну района и будет уточняться в ходе последующих наблюдений (особенно в периоды миграций). Размножение установлено находками гнёзд или птенцов для 27 видов; ещё для 6 видов в литературе найдены утверждения о гнездовании, не подтверждённые фактами. Кроме того, судя по поведению, гнездящимися следует считать также канадского журавля, турухтана, дутыша, обыкновенного бекаса, весничку и овсянку-крошку; к этой же категории видов мы относим ворона. Размножение весьма вероятно ещё для 5 видов, у которых наблюдали брачные демонстрации, гнездостроительное поведение или встречали брачные пары (морская чернеть, серебристая чайка, варакушка, пепельная чечётка и лапландский подорожник).

При сравнении полученных в 2007 году сведений для Певека с его непосредственными окрестностями и для района низовьев реки Апапельгин обращают на себя внимание низкие показатели разнообразия фауны и обилия птиц в первом из них по сравнению со вторым, что вполне соответствует преобладающим там ландшафтам.

Вместе с тем удивительно полное отсутствие в гнездовой фауне района чернозобика и плосконосого плавунчика, а также исключительная редкость лапландского подорожника – видов, которые в целом характерны для равнинных тундр Евразии, в том числе Чукотки. Не обнаружен также ряд других ожидавшихся видов птиц. Но при этом удалось выявить не только присутствие, но и размножение нескольких видов, которые ранее не были известны на гнездовании так далеко к северу на Чукотке. Это фифи, мородунка, воронок, гольцовый конёк,

весничка, домовый воробей и овсянка-крошка, у которых в последние десятилетия прослежено или предполагается расширение ареалов. Перепончатопалый песочник, белолобая ласточка и свиристель зарегистрированы в качестве залётных видов впервые для Западной Чукотки.

Литература

Кищинский А.А. 1988. *Орнитофауна Северо-Востока Азии: история и современное состояние*. М.: 1-288.

Колонин Г.В. 1980. Орнитологические наблюдения на Чукотке и о-ве Врангеля // *Орнитология* **15**: 197-200.

Кондратьев А.Я. 1986. Колонии морских птиц на арктическом побережье крайнего Северо-Востока СССР // *Морские птицы Дальнего Востока*. Владивосток: 37-47.

Кречмар А.В., Андреев А.В., Кондратьев А.Я. 1991. *Птицы северных равнин*. СПб.: 1-288.

Лебедев В.Д., Филин В.Р. 1959. Орнитологические наблюдения на Западной Чукотке // *Орнитология* **2**: 122-129.

Николаев В.В., Кошелев А.И., Чернышев В.М., Тотунов В.М., Акулинин В.Н. 1977. Оологическая и нидологическая коллекция Зоологического музея Биологического института СО АН СССР (Новосибирск) // *Фауна и систематика позвоночных Сибири: Тр. Биол. ин-та* **31**: 214-244.

Портенко Л.А. 1972. *Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля*. Ч. 1. Л.: 1-424.

Портенко Л.А. 1973. *Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля*. Ч. 2. Л.: 1-324.

Спангенберг Е.П. (1960) 2012. Новые сведения по распространению и биологии птиц в низовьях Колымы // *Рус. орнитол. журн.* **21** (737): 560-567.

Томкович П.С. 2007. Динамика численности хрустана: тревожные мысли на «зыбкой почве» // *Информ. материалы Рабочей группы по куликам* **20**: 43-45.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1526**: 4829-4831*

К распространению горной трясогузки *Motacilla cinerea* в Верхнепечорском Предуралье

Н.Д.Нейфельд, В.В.Теплов

Второе издание. Первая публикация в 2013[*]

Для бассейна верховий реки Печоры горная трясогузка *Motacilla cinerea* ранее указывалась всеми исследователями этого района как характерный представитель гнездовой авифауны горной части и темнохвойной тайги предгорий западного макросклона Северного Урала (Теплоухов 1911; Дмоховский 1933; Портенко 1937; Теплова 1957; Ес-

[*] Нейфельд Н.Д., Теплов В.В. 2013. К распространению горной трясогузки в Верхнепечорском Предуралье // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* **18**: 69-71.

тафьев 1969; Нейфельд, Теплов 2000). На прилегающей Печорской равнине мы впервые отметили её на гнездовании в 2003 году. За минувшее десятилетие в пределах нашей равнинной мониторинговой площадки в окрестностях посёлка Якша (61°49' с.ш., 56°51' в.д.), включающей заповедный участок (16.1 тыс. га) и часть приграничной территории гослесфонда, выявлено 7 гнездовых участков *M. cinerea*. Большинство найдено на нижних отрезках русла небольших таёжных рек Пожег (4 участка) и Большая Гаревка (2) – правых притоков Печоры. Ещё один гнездовой участок обнаружен в 2.5 км к северо-востоку от посёлка Якша в большом овраге, промытом в песчаной надпойменной террасе реки Печоры бурным весенним потоком небольшого ручейка, соединяющего реку с заполненной водой болотной котловиной. Во всех случаях места гнездования были приурочены к высоким обрывам боровой террасы, а гнёзда располагались под пластами дёрна, нависшего над крутыми склонами. Некоторые из участков занимались птицами многократно. Так, например, гнездование в овраге наблюдали в течение 4 лет (2003-2005 и 2012), а один из участков на Большой Гаревке заселялся трижды (2006, 2007, 2011 годы).

Приведённые выше наблюдения, как и ранее опубликованные сведения для сопредельных территорий Русской равнины (Фишер, Казаков 2003; Сотников 2006; Селиванова 2007, 2012; Рыкова 2009), дополняют информацию о расширении современного ареала восточного подвида *M. c. melanope* к западу от Урала.

Литература

Дмоховский А.В. 1933. Птицы Средней и Нижней Печоры // *Бюл. МОИП*. Отд. биол. **42**, 1: 214-241.

Естафьев А.А. 1969. Орнитогеографическая характеристика бассейна Верхней Печоры // *Физиология и экология животных*. Сыктывкар: 101-108.

Нейфельд Н.Д., Теплов В.В. 2000. Птицы юго-восточной части Республики Коми // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* **5**: 132-154.

Портенко Л.А. 1937. *Фауна птиц внеполярной части Северного Урала*. М.; Л.: 1-240.

Рыкова С.Ю. 2009. Изменения орнитофауны Пинежского заповедника и сопредельных участков за последние 30 лет // *Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере*. Сыктывкар: 375-377.

Селиванова Н.П. (2007) 2009. Находки горной трясогузки *Motacilla cinerea* на Среднем Тимане // *Рус. орнитол. журн.* **18** (476): 607.

Селиванова Н.П. 2012. Находки горной трясогузки на юго-западе Республики Коми // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* **17**: 152.

Сотников В.Н. 2006. *Птицы Кировской области и сопредельных территорий*. Т. 2. Ч. 1. Киров: 1-448.

Теплова Е.Н. 1957. Птицы района Печоро-Илычского заповедника // *Тр. Печоро-Илычского заповедника* **6**: 5-115.

Теплоухов С.А. 1911. *Материалы по орнитофауне Пермской губернии (Северная часть Чердынского уезда: верховья рр. Колвы и Печоры с Уньей)*. Казань: 1-45.

Фишер С.В. Казаков В.П. 2003. Современное распространение горной трясогузки в Пермской области // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* **8**: 243-244.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1526**: 4831*

Стерх *Grus leucogeranus* в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа

Ю.И.Гордеев

Второе издание. Первая публикация в 1976[*]

Берёзовский район Ханты-Мансийского автономного округа расположен в северо-западной части ХМАО, на левобережье меридионального отрезка реки Обь в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности и восточных склонов Северного и Приполярного Урала. Первая встреча стерха *Grus leucogeranus* здесь была 30 июня 1966 у села Устрем, находящегося на протоке Малая Обь в 60 км ниже Берёзово.

Взрослая птица была замечена на левом берегу протоки с борта проходящего катера. Погода стояла ясная, и белый журавль был хорошо виден. Он стоял в 8-10 м от берега на открытом месте. Древесная растительность – ивовая роща – находилась в 100-150 м от берега. Когда катер начал приближаться к берегу, птица подняла голову, вытянула шею и метров за 100 взлетела. Она пролетела низко над землёй к ивовой роще и села. Как только катер пристал к берегу, она снова взлетела и скрылась за рощей.

Вторая встреча была 19 августа 1969 около юрт Комрадки Березовского района в 50 км вверх по реке Сосьве от Берёзово. Двух птиц увидели за 300-350 м. Погода стояла пасмурная с низкой облачностью. Катер сбавил ход и начал медленно приближаться. Журавли держались близко друг от друга на берегу, недавно освободившемся от половодья. Древесная растительность была представлена несколькими старыми ивами; когда катер подошёл на 100-150 м, птицы перестали кормиться, насторожились и вскоре взлетели. Пролетев метров 100 от берега, они снова сели и начали кормиться, но, увидев людей на катере, снялись и улетели прочь.

[*] Гордеев Ю.И. 1976. Краткие сообщения о стерхе // *Тр. Окского заповедника* **13**: 112-113.