

ISSN 0869-4362

Русский  
орнитологический  
журнал

2017  
XXVI



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК  
1537  
EXPRESS-ISSUE

# 2017 № 1537

## СОДЕРЖАНИЕ

---

- 5213-5223 Материалы к фауне птиц Кировской области.  
В.Н.СОТНИКОВ, С.Ф.АКУЛИНКИН,  
В.М.РЯБОВ, В.Н.ПИМИНОВ,  
В.В.ПОНОМАРЁВ, Д.В.СКУМАТОВ,  
И.Д.ОБУХОВ, А.М.ЦВЕТКОВА
- 5223-5228 Современный состав и распределение врановых  
птиц Corvidae Якутии. М.А.АФАНАСЬЕВ,  
В.Г.ДЕГТЯРЁВ, Н.Н.ЕГОРОВ
- 5229-5230 Новые встречи князька *Parus cyanus* в устьевой  
области Северной Двины. В.А.АНДРЕЕВ,  
В.М.СПИЦЫН
- 5231 Необычно поздняя встреча теньковки *Phylloscopus*  
*collybita* в Санкт-Петербурге. А.В.БАРДИН
- 5232-5234 Черношейная каменка *Oenanthe finschii* – новый вид  
в фауне птиц Киргизии. И.Р.РОМАНОВСКАЯ
- 5235-5237 О некоторых редких и малоизученных птицах  
Еврейской автономной области (Хабаровский край).  
С.М.СМИРЕНСКИЙ, Е.М.СМИРЕНСКАЯ
- 5237-5238 Залёт кудрявого пеликана *Pelecanus crispus*  
на территорию Пермского края. А.И.ШЕПЕЛЬ
- 5238-5239 Новые данные о залётах птиц на территорию  
Верхнепечорского Предуралья. Н.Д.НЕЙФЕЛЬД,  
В.В.ТЕПЛОВ, М.М.КУРБАНБАГАМАЕВ
- 

Редактор и издатель А.В.Бардин  
Кафедра зоологии позвоночных  
Биолого-почвенный факультет  
Санкт-Петербургский университет  
Россия 199034 Санкт-Петербург

# 2017 № 1537

## CONTENTS

---

- 5213-5223   Materials on the fauna of birds of the Kirov Oblast.  
V.N.SOTNIKOV, S.F.AKULINKIN,  
V.M.RYABOV, V.N.PIMINOV,  
V.V.PONOMAREV, D.V.SKUMATOV,  
I.D.OBUKHOV, A.M.TZVETKOVA
- 5223-5228   Modern list and distribution of corvids Corvidae  
of Yakutia. M.A.AFANASIEV,  
V.G.DEGTYAREV, N.N.EGOROV
- 5229-5230   New records of the azure tit *Parus cyanus*  
in the estuary of the Northern Dvina.  
V.A.ANDREEV, V.M.SPITSYN
- 5231   The unusually late record of the chiffchaff *Phylloscopus*  
*collybita* in St. Petersburg. A.V.BARDIN
- 5232-5234   The Finsch's wheatear *Oenanthe finschii* –  
a new species in the avifauna of Kyrgyzstan.  
I.R.ROMANOVSKAYA
- 5235-5237   On some rare and poorly studied birds of the Jewish  
Autonomous Oblast (Khabarovsk Krai).  
S.M.SMIRENSKY, E.M.SMIRENSKAYA
- 5237-5238   Vagrant Dalmatian pelican *Pelecanus crispus*  
in Perm Krai. A.I.SHEPEL
- 5238-5239   New data on the vagrant birds in the territory  
of Upper Pechora Preduralye. N.D.NEIFELD,  
V.V.TEPOV, M.M.KURBANBAGAMAEV
- 

*A.V.Bardin, Editor and Publisher*  
Department of Vertebrate Zoology  
St. Petersburg University  
St. Petersburg 199034 Russia

## Материалы к фауне птиц Кировской области

В.Н.Сотников, С.Ф.Акуликин, В.М.Рябов,  
В.Н.Пиминов, В.В.Пономарёв, Д.В.Скуматов,  
И.Д.Обухов, А.М.Цветкова

*Владимир Несторович Сотников.* Кировский городской зоологический музей, ул. Ленина, д. 160, Киров, 610007, Россия. E-mail: sotnikovkgzm@gmail.com

*Сергей Фёдорович Акуликин.* МБУК Даровской районный краеведческий музей, ул. Советская, д. 35, пгт. Даровской, Кировская область, 612140, Россия. E-mail: darmuz@bk.ru

*Владимир Михайлович Рябов.* ФГБОУ ВПО Вятский государственный университет, ул. Ленина, д. 198, Киров, 610007, Россия. E-mail: ryapitschi@yandex.ru

*Владимир Николаевич Пиминов.* ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М.Житкова, ул. Преображенская, д. 79, Киров, 610000, Россия

*Виктор Валентинович Пономарёв.* Ул. Юбилейная, д. 2, кв. 27, посёлок Стрижи, Оричевский район, Кировская область, 612090, Россия

*Дмитрий Валентинович Скуматов.* ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М.Житкова, ул. Преображенская, д. 79, Киров, 610000, Россия. E-mail: skumatovd@bk.ru

*Иван Дмитриевич Обухов.* Кировский городской зоологический музей, ул. Ленина, д. 160, Киров, 610007, Россия. E-mail: coal\_on\_ice@mail.ru

*Арина Михайловна Цветкова.* Ул. Карла Маркса, д. 25, кв. 42, Киров, 610020, Россия. E-mail: irinatsvetkova@yandex.ru

*Поступила в редакцию 26 ноября 2017*

Мониторинг орнитофауны Кировской области по разным направлениям продолжается ежегодно. Постепенно накапливаются данные по отдельным видам, уточняется их статус, появляются новые сведения о распространении, численности и гнездовой биологии. Особый интерес уделяется редким, охраняемым, слабоизученным и краеаральным видам. За исключением некоторых случаев, излагаемый материал собран в 2016–2017 годах.

**Большой баклан** *Phalacrocorax carbo*. С территории области (Вятской губернии) в XX веке было известно три случая залёта одиночных птиц (Плесский 1929; Сотников 1995). Три баклана встречены 22 июля 2017 на пруду в селе Парфёновщина Куменского района (река Кырмыжка) и, судя по окраске (белое брюхо), были неполовозрелыми. Птицы сидели на сухих деревьях, чистились и сушили крылья. 26 июля бакланы были там же, отдыхая на торчащих из воды корягах, а через несколько дней исчезли. Мы предполагаем, что эти птицы залетели сюда ещё весной и провели здесь всё лето.

**Волчок** *Ixobrychus minutus*. В 2013 году в затопленном карьере у посёлка Стрижи Оричевского района было найдено первое в области гнездо волчка (Сотников и др. 2014). В последующие годы (2014-2016) в летние месяцы летящие одиночные птицы и пары, а также токование

волчков в этом затопленном карьере отмечались довольно регулярно.

**Краснозобая казарка** *Branta ruficollis*. Этот редкий вид на территории области регистрируется очень нерегулярно. Последний раз краснозобые казарки наблюдались в Юрьянском районе в 2004 году (Сотников и др. 2009). Одинокая летящая птица отмечена 27 октября 2016 над прудом у деревне Бобровы Даровского района.

**Короткоклювый гуменник** *Anser brachyrhynchus*. Впервые в области этот гусь добыт 3 мая 1992 (Сотников, 1999). Второй залёт зарегистрирован в 2017 году. Одна птица из пары была добыта 8 мая в Зуевском районе (Пиминов, Долгих 2017; есть фото). Гусь был отпрепарирован и в настоящее время шкурка хранится в коллекции Кировского городского зоологического музея.

**Малый лебедь** *Cygnus bewickii*. Одну птицу видели в небольшой (6 особей) стае лебедей-кликун *Cygnus cygnus* в Зуевском районе 26 апреля 2016; птицы летели в восточном направлении вдоль поймы реки Чепцы.

**Красноносый нырок** *Netta rufina*. В области было известно три случая появления этих уток, при этом два из них – зимние (Сотников 1999; Сотников и др. 2014). В августе 2005 года самец этого вида был добыт у деревни Бесово Немского района (М.Г.Романец, устн. сообщ.).



Рис. 1. Гнездо сапсана *Falco peregrinus*. 15 апреля 2017. Урочище Тяптичи, скалы на берегу реки Немда, Советский район. Фото В.В.Пономарёва.

**Сапсан** *Falco peregrinus*. Весной 2017 года мы посетили известное гнездо в урочище Тяптичи на скалах на берегах реки Немды в Советском районе. В той же нише, что и в 2016 году, 15 апреля самка насиживала 4 яйца (рис. 1). В 2017 году нами было выявлено ещё одно по-

тенциальное место гнездования сапсана на территории области: у нежилой деревни Атары Советского района 9 августа наблюдали не распавшийся выводок из двух летающих птенцов в сопровождении взрослой птицы. По правому берегу реки Вятки в этом месте есть небольшие скальные выходы известняка, пригодные для устройства гнезда.

**Водяной пастушок** *Rallus aquaticus*. Редкий гнездящийся перелётный вид области. Осенний отлёт происходит в сентябре – начале октября (Сотников 1999). На реке Кобре ниже плотины пруда у деревни Бобровы Даровского района одиночного пастушка наблюдали 1-6 декабря 2016. Взрослая птица кормилась у кромки воды в зарослях осоки под береговыми обрывами на подтопленных кочках (рис. 2). Это первый случай попытки зимовки пастушка в Кировской области.



Рис. 2. Водяной пастушок *Rallus aquaticus*. Река Кобра у деревни Бобровы, Даровский район. 6 декабря 2016. Фото С.Ф.Акуликина.

**Стерх** *Grus leucogeranus*. По сообщению охотоведа А.Ф.Эсаулова, в начале мая 1998 года в пойме реки Юг, в 3 км к северо-западу от села Шолга Подосиновского района, видели «белого» журавля в группе с двумя серыми журавлями *Grus grus*. Птицы сели на луговину неподалёку от охотничьего скрадка, что позволило их рассмотреть. При расспросе охотоведа выяснилось, что журавль был не чисто белый, а с рыжеватым оттенком, то есть очень похожим на годовалого стерха.

**Гаршнеп** *Limnocyptes minimus*. Токование гаршнепа слышали рано утром 11 июня 2016 в пойме реки Вятки в 1 км к западу от деревни Новожила (Оричевский район).

**Черноголовый хохотун** *Larus ichthyaetus*. Залёт хохотуна в Кировскую область регистрировался ранее только однажды – 21 мая 1996 в рыбхозе «Филипповка» в Кирово-Чепецком районе (Сотников 2002). Над старичным озером на окраине посёлка Аркуль Нолинского района взрослый черноголовый хохотун отмечен 29 мая 2016.

**Хохотунья** *Larus cachinnans*, **барабинская чайка** *L. barabensis*. Не углубляясь в проблему систематики *Larus argentatus sensu lato*, скажем, что к концу XX века на территории области были зарегистрированы три вида: серебристая чайка *L. argentatus*, халей *L. heuglini* и хохотунья *L. cachinnans*. Только одна из них – хохотунья – гнездится в Кировской области с 1994 года (Сотников 2002). В последние десятилетия произошла дальнейшая «эволюция» в концепции объёма вида и из кластера «хохотунья» в качестве отдельного вида была выделена «барабинская чайка, или мартын». При этом в ареал барабинской чайки оказалась включена почти вся территория Кировской области, при полном отсутствии здесь хохотуны (Рябицев 2008). Мы предприняли попытку разобраться в этой ситуации, тем более, что у нас есть коллекционные материалы. Анализ этих материалов (чучела, тушки, расправленные крылья, кладки яиц) позволяет нам говорить, что в Кировской области живут и гнездятся оба этих вида (рис. 3, 4).



Рис. 3. Крыло хохотуны *Larus cachinnans*. Взрослая самка. Рыбхоз «Филипповка», Кирово-Чепецкий район. 26 апреля 2000. Фото В.Н.Сотникова.



Рис. 4. Крыло барабинской чайки *Larus barabensis*. Взрослая самка. Рыбхоз «Филипповка», Кирово-Чепецкий район. 23 июля 2006. Фото В.Н.Сотникова.

В конце XX – начале XXI веков было известно лишь одно место нерегулярного размножения больших белоголовых чаек – рыбхоз «Филипповка» в Кирово-Чепецком районе (Сотников 2002). В 1994 году там найдено гнездо барабинской чайки, в 2000 году – хохотуны, а в 2006 году отмечено размножение по одной паре обоих видов. В 2017 году на берегу искусственного озера Карьеры у посёлка Стрижи в Оричевском районе было обнаружено гнездо с тремя сильно насиженными яйцами (рис. 5, 6). Просмотр сделанных там фотографий показал, что гнездо принадлежит паре хохотуний. Но над озером была замечена ещё одна крупная чайка, которая по комплексу признаков (окраска спины, рисунок на маховых крыла), скорее всего, была барабинской чайкой.



Рис. 5. Гнездо хохотуны *Larus cachinnans*. Озеро Карьеры у посёлка Стрижи, Оричевский район. 21 мая 2017. Фото В.В.Пономарёва.



Рис. 6. Пара хохотуний *Larus cachinnans*. Озеро Карьеры у посёлка Стрижи, Оричевский район. 27 мая 2017. Фото А.М.Цветковой.

Параметры яиц хохотуны: масса ( $n = 3$ ), г: 84.8-88.2, в среднем 86.7; размеры ( $n = 7$ ), мм: 68.8-76.0×47.0-50.2, в среднем 71.4×48.3. Параметры яиц барабинской чайки: масса ( $n = 3$ ), г: 76.8-80.4, в среднем 78.8; размеры ( $n = 3$ ), мм: 65.0-67.5×46.0-47.8, в среднем 66.6×47.1.

**Вяхирь** *Columba palumbus*. Обычный гнездящийся перелётный вид области. Прилетает в конце марта – первой половине апреля, улетает в сентябре-октябре (Сотников, 2002). Первая зимовка зарегистрирована в 2008/09 году в деревне Бобровы Даровского района. У животноводческой фермы два вяхиря встречены 25 октября. Там же одиночный голубь держался вместе с галками с 9 января по 6 февраля 2009. Добытая птица оказалась самкой, в её зобе были только зёрна овса.

**Белая сова** *Nyctea scandiaca*. Эта сова обычно появляется на территории области в октябре-ноябре и проводит здесь всю зиму. Иногда они регистрируются раньше – в сентябре и даже в конце августа. Случай наблюдения этой совы в конце августа отмечен в 1927 году (Плесский 1976). И вот через 90 лет полярная сова была встречена в конце августа 2017 года у деревни Шадрино в Опаринском районе (северо-запад Кировской области) (И.В.Анисимов, устн. сообщ.).



Рис. 7. Птенцы ястребиной совы *Surnia ulula*. Деревня Блохицы, Даровский район. Июнь 2017 года. Фото Р.Т.Жениховой.

**Ястребиная сова** *Surnia ulula*. В 2016 году мы опубликовали статью «Новый факт гнездования ястребиной совы *Surnia ulula* в Кировской области» (Акулинкин, Сотников 2016в). В Даровском районе в апреле 2014 года наблюдали две пары этих сов и у одной из них было найдено гнездо. Вторая пара из района наблюдения исчезла, но в 2017 году от местных жителей мы узнали, что она переместилась на 2 км в деревню Блохицы и загнездились на вершине сломанного тополя (пня) на высоте всего 3 м. Тополь стоял на обочине улицы, и насиживающая птица была хорошо видна. Размножение было успешным, и слётки по-

кинули гнездо в первой половине июня. Селяне охраняли птенцов от кошек и собак, и в результате три птенца поднялись на крыло (рис. 7; (В.Н.Женихов, устн. сообщ.).

**Сипуха** *Tyto alba*. Впервые о встрече этого вида в Поволжье сообщил В.А.Аникин (1988). При личной переписке выяснилось, что он наблюдал сипуху «очень хорошо и довольно долго в Артёмовских лугах под г. Горький, кажется в 1973 году». Второй случай залёта был зафиксирован в Ульяновской области в апреле 1988 года (Бородин и др. 2005). В сентябре 2001 года ослабевшая, но ещё живая сипуха была подобрана А.Ю.Огневым на зернотоке в деревне Иванцево Белохолуницкого района (северная половина Кировской области). Он описывает сову так: «чуть больше болотной совы, сверху рыжая, снизу – белая, лицевой диск похож на сердце». Из умершей птицы таксидермистом Р.Х.Гильмутдиновым было изготовлено чучело. Он также хорошо знает определительные признаки сипухи и уверенно подтверждает, что это была именно она. Осмотреть чучело птицы нам не удалось, так как оно вскоре было продано в Москву.

**Ворон** *Corvus corax*. Мы уже описывали случай гнездования воронов на чердаке заброшенного дома в Кирово-Чепецком районе (Сотников и др. 2016). Пара воронов ежегодно гнездится на металлических балках под крышей большого недействующего ангарного цеха завода на окраине посёлка Стрижи Оричевского района. Первое их гнездо там найдено в 2008 году, а в 2017 на металлических конструкциях находились новое жилое гнездо и ещё два прошлых лет постройки (рис. 8).



Рис. 8. Гнездо ворона *Corvus corax* и место его гнездования. Посёлок Стрижи, Оричевский район. 27 марта 2017. Фото В.В.Пономарёва.

**Горихвостка-чернушка** *Phoenicurus ochruros*. В Кировской области регистрируется с 2003 года, а в 2015 году найдено гнездо (Сотников 2008; Акулинкин и др. 2016б). Расселение чернушки, вероятно, продолжается, так как 9 апреля 2016 поющий самец наблюдался в городе Кирове (Ю.Н.Утробин, устн. сообщ.).

**Оляпка** *Cinclus cinclus*. На водосбросах трёх прудов на речках Даровского района (Кобра, Даровка, Пиксур) ежегодно зимует до десятка оляпок. Наблюдения за ними проводились там в 1997-2016 годах. Были выявлены три способа охоты в местных зимних условиях: на глубоких местах оляпки ныряют до дна, оставаясь под водой несколько секунд; на мелководье птицы плавают по поверхности, а корм разыскивают, опустив голову в воду (рис. 9, слева); при глубине 1-3 см (по брюхо) они бродят по дну, часто склёвывая какой-то мелкий корм (рис. 9, справа). Отмечено использование лап, наподобие вороны, при извлечении личинки ручейника из домика. Перед этим оляпка долго бьёт ручейника о камень или корягу.




Рис. 9. Оляпка *Cinclus cinclus*. Река Кобра у деревни Бобровы, Даровский район. 6 декабря 2016. Фото С.Ф.Акулинкина.

**Пёстрый дрозд** *Zoothera varia*. Этот вид в области регистрировался дважды: 20 мая 1999 в Котельничском районе (Кондрухова 2003) и 23 мая 2001 в Верхнекамском (Сотников 2002). Было высказано предположение, что пёстрый дрозд расселяется по территории области и Волжско-Камского края (Сотников 2008). Это предположение подтверждается последними данными. На берегу реки Юг у деревни Низовское в Подосиновском районе 12 октября 2010 в стае рябинников *Turdus pilaris* наблюдался одиночный пёстрый дрозд. Вечером 21 мая 2015 его пение было отмечено на окраине деревни Бобровы в Даровском районе. В центре Бобинского бора в окрестностях Кирова ранним утром 7 мая 2017 отмечена песня пёстрого дрозда. Неожиданно много поющих самцов было отмечено в вечерних сумерках, ночью и утром 21-22 мая 2017 в Афанасьевском районе (восток области). Птицы держались в водораздельных елово-берёзово-осиновых лесах с участками вырубок. На маршруте длиной 9 км учтено 6-7 поющих пёстрых дроздов. Песню пёстрого дрозда слышали также в глубоких сумерках вечером 12 июня

2017 в смешанном берёзово-сосново-еловом лесу в 4 км к югу от села Полом (Белохолуницкий район).

**Князёк, или белая лазоревка** *Parus cyanus*. Эта синица в Кировской области встречается очень редко и нерегулярно (Сотников 2008; Сотников и др. 2016). На кормушке в посёлке Мотоус Зуевского района (восток области) 3 марта 2017 С.Ф.Стреляный наблюдал и сфотографировал князька.

**Серый снегирь** *Pyrrhula cinerea*. Залётный вид в Кировской области (Сотников 2008). После 1937 года, когда самка этого вида была поймана в городе Кирове, от местных птицеловов поступали сообщения о встречах и поимках каких-то «серых (светлых) снегирей», но орнитологи их не осматривали. У Кирова серые снегيري пойманы 16 и 23 ноября 2017 (Д.А.Крылов, устн. сообщ.)



Рис. 10. Гнездо клеста-еловика *Loxia curvirostra*. Окрестности деревни Бобровы, Даровский район. 18 марта 2017. Фото С.Ф.Акулинкина.

**Клёст-еловик** *Loxia curvirostra*. Зимой 2014/15 года в Кировской области при обильном урожае семян ели отмечено массовое гнездование клестов-еловиков (Акулинкин и др. 2016а). Следующей зимой в лесах царил «клестовая тишина», а зимой 2016/17 года при умеренном урожае семян ели мы опять стали находить их гнёзда. Гнёзда располагались на елях высотой 7-18 м, обычно в 1-2 м от вершины. Было

осмотрено 12 гнёзд. Самки строили их с начала февраля по начало апреля. Несколько гнёзд оказалось брошено до окончания строительства, в двух случаях найдены повторные гнёзда. Завершённые кладки ненасиженных яиц обнаружены в период с 6 марта по 5 апреля. Полные кладки состояли из 2-4 яиц, в среднем ( $n = 7$ ) – 3.3 яйца (рис. 12). Размеры яиц ( $n = 23$ ), мм: 18.7-24.2×14.8-17.8, в среднем 21.90×15.94; масса, г: 2.1-3.2, в среднем 2.87. Первые слётки отмечены 19 марта.

**Овсянка-крошка** *Ocyris pusillus*. Этот, ранее редкий пролётный вид Кировской области (Сотников 2008), теперь регулярно отмечается в период осенней миграции (Сотников и др. 2014). В окрестностях города Кирова в 2016-2017 годах птицеловы ловили их в период с 23 августа по 20 октября.

С учётом 4 новых видов (малый лебедь, стерх, барабинская чайка, сипуха), на конец 2017 года фауна птиц Кировской области насчитывает 310 видов.

Авторы выражают благодарность И.В.Анисимову, Р.Х.Гильмутдинову, В.Н. и Р.Т.Жениховым, Д.А.Крылову, А.Ю.Огневу, М.Г.Романцу, С.Ф.Стреляному, Ю.Н.Утробину, А.Ф.Эсаулову за предоставленную информацию, Я.А.Редькину за помощь в определении чаек (хохотунья, барабинская), А.П.Нуртдиновой, Е.И.Ворончихину за помощь в оформлении статьи.

## Литература

- Акуликин С.Ф., Сотников В.Н. 2016а. Наблюдения за птицами в зимне-весенний сезон 2014/15 года в Кировской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1271): 1253-1258.
- Акуликин С.Ф., Сотников В.Н. 2016б. Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* – гнездящийся вид Кировской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1274): 1367-1368.
- Акуликин С.Ф., Сотников В.Н. 2016в. Новый факт гнездования ястребиной совы *Surnia ulula* в Кировской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1275): 1400-1403.
- Аникин В.И. (сост.) 1988. *Птицы Горьковской области, их изучение на экскурсиях в природу и охрана*. Горький: 1-77.
- Бородин О.В., Барабашин Т.О., Корепов М.В., Смирнова С.Л. 2005. О распространении и численности некоторых редких сов в Ульяновской области // *Совы Северной Евразии*. М.: 226-229.
- Кондрухова С.В. (2003) 2009. Встреча пёстрого дрозда *Zoothera varia* в Кировской области // *Рус. орнитол. журн.* **18** (513): 1655.
- Пиминов В.Н., Долгих М.А. 2017. Встречи короткоклювого гуменника *Anser brachyrhynchus* и белощёкой казарки *Branta leucopsis* в Кировской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1464): 2666-2667.
- Плесский П.В. 1929. Птицы Вятского края // *Вятский край*. Вятка: 153-165.
- Плесский П.В. 1976. Класс Птицы // *Животный мир Кировской области*. Киров, **3**: 49-134.
- Рябицев В.К. 2008. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель*. 3-е изд, испр. и доп. Екатеринбург: 1-634.
- Сотников В.Н. 1995. Изменения орнитофауны Кировской области за период 1970-1993 гг. // *Природные ресурсы Западно-Уральского Нечерноземья, их рациональное использование и охрана*. Пермь: 46-57.
- Сотников В.Н. 1999. *Птицы Кировской области и сопредельных территорий*. Т. 1. Неворобьиные. Ч. 1. Киров: 1-432.
- Сотников В.Н. 2002. *Птицы Кировской области и сопредельных территорий*. Т. 1. Неворобьиные. Ч. 2. Киров: 1-528.

- Сотников В.Н. 2008. *Птицы Кировской области и сопредельных территорий*. Т. 2. Воробьинообразные. Ч. 2. Киров.: 1-432.
- Сотников В.Н. 2002. Орнитологические находки в Кировской области в 2000-2001 годах // *Рус. орнитол. журн.* **11** (176): 143-146.
- Сотников В.Н., Акуликин С.Ф., Рябов В.М. 2016. Новые материалы к орнитофауне Кировской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1276): 1427-1433.
- Сотников В.Н., Рябов В.М., Акуликин С.Ф. 2009. Новые данные по редким видам птиц Кировской области // *Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России: Материалы 4-го совещ. «Распространение и экология редких видов Нечернозёмного центра России»*. М.: 280-284.
- Сотников В.Н., Рябов В.М., Пономарев В.В., Акуликин С.Ф. 2014. Новые материалы к орнитофауне Кировской области // *Рус. орнитол. журн.* **23** (956): 67-73.



ISSN 0869-4362

*Русский орнитологический журнал* 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1537**: 5223-5228

## Современный состав и распределение врановых птиц *Corvidae* Якутии

М.А.Афанасьев, В.Г.Дегтярёв, Н.Н.Егоров

Максим Афанасьевич Афанасьев. ООО «Булчут». Ул. Александра Иванова, д. 11, село Сунтар, Якутия, 678290, Россия. E-mail: Maxim\_suntar@mail.ru

Виктор Григорьевич Дегтярёв, Николай Николаевич Егоров. Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН. Проспект Ленина, д. 41, Якутск, 677980, Россия. E-mail: dvgarea@yandex.ru; epusilla@mail.ru

Поступила в редакцию 27 ноября 2017

Экологическая пластичность, склонность к синантропизации, антропофильность являются важнейшими элементами экологии врановых, обеспечивающими им процветание и широкое распространение. Однако эта группа была малозаметна в процессах изменения фауны Якутии, которая за последние 50 лет пополнилась несколькими гнездящимися, расселяющимися и десятками залётных видов (Егоров и др. 2002; Дегтярёв 2007; Вартапетов и др. 2008; Находкин и др. 2008; Дегтярёв, Антонов 2011; Тирский 2009, 2012; Егоров 2013; Degtyarev 2015; Шемякин 2017; Шемякин, Исаев 2017).

До настоящего времени список гнездящихся видов врановых составляли ворон *Corvus corax*, чёрная ворона *Corvus corone orientalis*, грач *Corvus frugilegus*, кукушка *Perisoreus infaustus*, сойка *Garrulus glandarius*, кедровка *Nucifraga caryocatactes*. Ворон и восточная чёрная ворона имеют сплошное распространение в таёжной зоне и формируют синантропные группировки и сезонные скопления, которые, как правило, связаны с полигонами захоронения твёрдых бытовых отходов. Заметное тяготение к окрестностям населённых пунктов в сельской

местности наблюдается у грача. Кукша, сойка и кедровка, хотя и проявляют антропофильность, устойчивых связей с освоенными человеком территориями не имеют. Области гнездования перечисленных видов в Якутии в основном стабильны, лишь грач освоил новые участки обитания по долинам Лены и Вилюя (Ларионов 2017), а ворон проник в дельту Лены (Поздняков 2015). По реке Лене до дельты регистрировались и неоднократно залёты кукши, кедровки и чёрной вороны, тесно связанных с древесной растительностью, которая в виде островков лиственницы Каяндера *Larix sibirica* распространена по долине Лены до 72°35' с.ш. (Перфильева 1985; Поздняков, 2015).

Особое место среди врановых занимает сойка, гнездящаяся в юго-западной части Якутии (Воробьёв 1963). Очевидно, что она имеет потенциал к расселению, который реализовался в крайне незначительной степени, хотя в 1962 году наблюдалась массовая инвазия этого вида по всей Центральной Якутии, в последующие годы (1963-1965) – регулярные залёты по Вилюю (Андреев 1987) и в Центральную Якутию (1970, 1971, 1976, 1977, 1979 годы) (Ларионов и др. 1972, 1980, 1991; Андреев 1987). Наиболее дальний залёт в северо-восточном направлении отмечен в верховьях Индигирки (Красная книга... 1987). С 1990-х годов ни одного наблюдения сойки даже в бассейне реки Вилюй не зарегистрировано. Единственным районом, куда сойка расселилась, является бассейн нижнего течения реки Олёкмы, где, судя по наблюдениям в Олёкминском заповеднике, она в настоящее время наблюдается постоянно (Ревин, Тирский 2010), но гнездование её не установлено.

В 2000-е годы фауна гнездящихся врановых пополнилась сорокой *Pica pica*. В 2007 году пара, пытавшаяся загнеститься, наблюдалась в селе Кочегарово (долина реки Лены, 100 км выше Олёкминска) (А.Е. Пшенников, устн. сообщ.). В Олёкминском заповеднике и на прилегающих территориях осенью регистрировались одиночные сороки, которые, кочуя по тайге, попадали в капканы с приманкой на пушного зверя, задерживались около охотничьих зимовий, а в конце 2000-х годов на метеостанции Джикимда в начале мая регистрировались 2-3 особи, исчезавшие через несколько дней или недель (Ревин, Тирский 2010; Архипов, Кондрашов 2011).

На юго-западной окраине Якутии, в посёлках Витим и Пеледуй в конце марта 2011 года сороки встречались повсеместно, в том числе стаями по 3-5 особей, но в городе Ленске (200 км ниже по течению Лены) ни одной особи не наблюдалось и местным жителям сорока была не известна. Севернее, в бассейне Вилюя, по опросным данным одиночные сороки зимовали в селе Тас-Юрях в конце 1990-х годов, в посёлке Светлый – в 2015-2016 годах, в городе Мирном 5 особей наблюдали зимой 2016/17 года. Неоднократно сороку видели в мае в районе Сунтарской излучины, в том числе зимовавшую одиночную особь в селе

Вилючан (Хордогой) в начале 2000-х годов и пару – в окрестностях села Сунтар 9 мая 2003. В апреле 2016 года в селе Тойбохой местные жители наблюдали каждое утро одну или две сороки, которые исчезли в конце апреля. По-видимому, эти особи переместились в село Сунтар, где они обнаружили в начале мая в юго-западной и северной частях Сунтара (рис. 1), а затем всё лето держались в его окрестностях – в небольшом селе Устье, и остались зимовать. С октября до середины марта они совершали ежедневные перелёты из Устья в Сунтар, обязательно возвращаясь вечером на ночёвку. Держались в основном поодиночке.



Рис. 1. Сорока *Pica pica*. Село Устье. 22 июня 2017.



Рис. 2. Гнездо сороки *Pica pica* на сосне обыкновенной *Pinus sylvestris* и нелётный птенец сороки у гнезда. Село Устье. 22 июня 2017.

В 2017 году в селе Устье 22 июня 2017 обнаружено гнездо сорок. Оно располагалось в 60 м от чайной, автотрассы и жилой застройки в глубине небольшой сосновой рощи, на зрелой сосне на высоте около 6 м. Крупное, рыхлое, просвечивающее гнездо было построено из сухих сучьев (рис. 2). В гнезде находились 3 оперившиеся птенца с недоросшими маховыми. После вылета из гнезда выводок держался обособленно от взрослых, однако раним утром и вечером молодые наблюдались вместе с родителями. С выпадением снега и с похолоданием перелёты сорок в село Сунтар вновь возобновились.

С 2013 года пара сорок появилась и зимует в селе Тас-Юрях (бассейн верхнего течения Вилюя, 90 км на юг от Мирного). В 2016 и 2017 годах сороки предпринимали безуспешные попытки размножения, устроив гнездо на сосне на окраине села (А.В.Максимова, устн. сообщ.).

Для остальной территории Якутии известны лишь две регистрации одиночных залётных сорок (скорее всего, камчатской популяции): в село Колымское (нижнее течение Колымы) в мае 1993 года (Андреев и др. 2015) и в посёлок Усть-Мая (среднее течение Алдана) 22-24 мая 2014.

Помимо гнездящихся видов врановых, в Якутии зарегистрированы и 4 залётных вида этого семейства.

Голубая сорока *Cyanopica cyanus*. Единственная регистрация – одиночный сеголеток 20 сентября 1974 недалеко от Олёкминска (Носков, Гагинская 2017).



Рис. 3. Даурская галка *Corvus dauuricus*. Низовья реки Мая, гидропост «Чабда». 10 мая 2016. Фото И.Д.Павлова.

Даурская галка *Corvus dauuricus*. Регулярно отмечалась в районе Олёкминска и бассейне Олёкмы, в том числе в селе Тяня 4 особи встречены 6 мая 1956 (Дементьев 1937; Портенко 1954; Воробьёв 1963). В бассейне среднего Вилюя даурская галка наблюдалась трижды в

мелких стаях чёрных ворон: 24 апреля 1978 в районе села Эльгяй (Андреев 1987), 10 мая 2007 и 21 апреля 2015 в селе Сунтар и его окрестностях. В 2016 году одиночная особь отмечена в низовьях реки Мая у гидропоста «Чабда» 10-15 мая (рис. 3).

Галка *Corvus monedula*. Одиночная особь в стае грачей наблюдалась в районе гидропоста «Чабда» 20-26 мая 2007.

Серая ворона *Corvus cornix*. В конце августа 1975 года стая из 5 серых ворон наблюдалась в пойме реки Адыча (приток Яны) в 100 км от устья (Лабутин, Гермогенов 1990). Сообщается также о залётах галок в междуречье Оленька и Анабара (Находкин и др. 2008). Областью документированных неоднократных залётов является район Сунтарской излучины на Вилюе: В 1938 и 1967 годах – в селе Эльгяй, в 1941 (две птицы) – в селе Нюрба, в 1969-1970 (зимовка) – в селе Арылах (Андреев 1987). В феврале 2000 года одна серая ворона обнаружена в селе Сунтар; по сообщению местного жителя Н.Н.Тарасова, ворон было две, они придерживались елового массива среди жилой застройки и в морозные дни залетали даже в один из небольших коровников «погреться», но весной исчезли. В ноябре 2008 года одиночная серая ворона ежедневно встречалась в центре Сунтара в квартале многоквартирных домов, где кормилась в мусорных контейнерах. 26 июня 2017 одиночная птица наблюдалась на окраине села.

Таким образом, по состоянию на 2017 год семейство врановых представлено в Якутии 11 видами. В 2000-х годах список врановых пополнился двумя новыми видами, в том числе сорокой, которая пока формирует одиночные синантропные гнездовья при оседлом характере пребывания. Существенного перераспределения или приращения гнездовых ареалов в течение в XX веке и текущем столетии не произошло.

*Публикация подготовлена в рамках проекта ИБПК СО РАН АААА–А17–11702011 0058–4: «Структура и динамика популяций и сообществ животных холодного региона Северо-Востока России в современных условиях глобального изменения климата и антропогенной трансформации северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, сохранение» (2017–2020 гг.).*

## Л и т е р а т у р а

- Андреев А.В., Кондратьев А.В., Потапов Е.Р. 2015. Орнитофауна нижнеколымских тундр: многолетняя динамика на фоне климатических перемен. Сообщение 1. Динамика состава нижнеколымской орнитофауны в XX в. и первом десятилетии XXI в. // *Вестн. СВНИЦ ДВО РАН* 1: 49-59.
- Андреев Б.Н. 1953. *Птицы Среднего Вилюя*. Якутск: 1-126.
- Андреев Б.Н. 1974. *Птицы Вилуйского бассейна*. Якутск: 1-312.
- Андреев Б.Н. 1987. *Птицы Вилуйского бассейна*. Якутск: 1-188.
- Архипов В.Ю., Кондрашов Ф.А. 2011. Материалы по фауне птиц бассейна Олёкмы и окрестностей Олёкминска (Южная Якутия) // *Рус. орнитол. журн.* **20** (641): 543-555.
- Вартапетов Л.Г., Егоров Н.Н., Дегтярёв В.Г., Исаев А.П. 2008. Летнее население птиц долины нижнего течения р. Мая // *Сиб. экол. журн.* **15**, 1: 161-170.
- Воробьёв К.А. 1963. *Птицы Якутии*. М.: 1-336.

- Дегтярёв В.Г. 2007. *Водно-болотные птицы в условиях криоаридной равнины*. Новосибирск: 1-292.
- Дегтярёв В.Г., Антонов А.К. 2011. Регистрации малой поганки, камышницы, погоньша-крошки и дрофы в бассейне среднего течения р. Лены // *Орнитология* **35**, 1: 193.
- Дементьев Г.П. 1937. Опыт анализа основных элементов авифауны Восточной Палеарктики // *Памяти академика М.А.Мензбира*. М.; Л.: 93-128.
- Егоров Н.Н., Исаев А.П., Находкин Н.А. 2002. Орнитофауна среднего течения р. Алгама // *Наземные позвоночные Якутии: экология, распространение, численность*. Якутск: 42-50.
- Егоров Н.Н. 2013. О находке обыкновенной иволги *Oriolus oriolus* в Якутии // *Рус. орнитол. журн.* **22** (895): 1803-1804.
- Красная книга Якутской АССР: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных*. 1987. Новосибирск: 1-99.
- Лабутин Ю.В., Гермогенов Н.И. 1990. *Птицы Якутии: современные данные по составу и распространению*: Препринт. Якутск: 1-40.
- Ларионов А.Г. 2017. Современное распространение и биология грача (*Corvus frugilegus* L.) в Якутии // *Зоол. журн.* **96**, 4: 493-496.
- Ларионов Г.П., Гермогенов Н.И., Сидоров Б.И. 1980. Фауна и экология зимующих птиц Лено-Вилюйского междуречья // *Фауна и экология наземных позвоночных таёжной Якутии*. Якутск: 85-141.
- Ларионов Г.П., Дегтярёв А.Г., Ларионов А.Г. 1991. *Птицы Лено-Амгинского междуречья*. Новосибирск: 1-189.
- Ларионов Г.П., Соломонов Н.Г., Винокуров В.Н. 1972. К распространению некоторых птиц центральных районов Якутии // *Учён. зап. Якут. фил. СО АН СССР*: 136-143.
- Находкин Н.А., Гермогенов Н.И., Сидоров Б.И. 2008. *Птицы Якутии: полевой справочник*. Якутск: 1-384.
- Носков Г.А., Гагинская А.Р. 2017. Новые данные о птицах Южной Якутии // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1448): 2107-2109.
- Перфильева В.И. 1985. Растительность // *Растительный и животный мир дельты реки Лены*. Якутск: 49-78.
- Поздняков В.И. (2015) 2017. Залётные виды в орнитофауне дельты реки Лены // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1407): 659-663.
- Портенко Л.А. 1954. *Птицы СССР (Воробьиные)*. Ч. 3. М.; Л.: 1-255 (Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР. Вып. 54).
- Ревин Ю.В., Тирский Д.И. 2010. *Сводный аннотированный список позвоночных животных заповедника «Олёкминский»*. Олёкминск: 1-102.
- Тирский Д.И. 2009. Залёт горного гуся *Eulabeia indica* в юго-западную Якутию // *Рус. орнитол. журн.* **18** (532): 2189-2190.
- Тирский Д.И. 2012. Залёт горного гуся в юго-западную Якутию на территорию Олёкминского заповедника // *Орнитология* **36**, 1: 190.
- Шемякин Е.В. 2017. Встреча люрика *Alle alle* в среднем течении Колымы в Якутии // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1515): 4422-4424.
- Шемякин Е.В., Исаев А.П. 2017. Находка большой конюги *Aethia cristatella* в низовьях Колымы в Якутии // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1511): 4288-4289.
- Degtyarev V.G. 2015. Range expansion of the Mandarin Duck *Aix galericulata* (Aves: Anseriformes: Anatidae) to the Lena River catchment, Siberia // *J. Threatened Taxa* **7**, 12: 937-7939.



## Новые встречи князька *Parus cyanus* в устьевой области Северной Двины

В.А.Андреев, В.М.Спицын

Валерий Аркадьевич Андреев. Кафедра биологии, экологии и биотехнологии, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова, Набережная Северной Двины, д. 17, Архангельск, 163000, Россия. E-mail: vandreev@atnet.ru  
Виталий Михайлович Спицын. Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН. Набережная Северной Двины, д. 23, Архангельск, 163000, Россия. E-mail: vitalik91993@yandex.ru

Поступила в редакцию 26 ноября 2017

Князёк *Parus cyanus* – редкий вид российской орнитофауны, занесённый в Красную книгу РФ (Бутьев 2001), в Приложение 2 Бернской Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. В связи с этим любые сведения о распространении, биологии и экологии этого вида представляют особую научную ценность.

Северная граница распространения князька проводилась только до Вологодской области (Бутьев 2001) или до Горьковской (ныне Нижегородской) области, до 58° с.ш. (Воинственский 1954). Однако мы встречали князька в разных частях устьевой области Северной Двины (64° 30' с.ш. и выше), в том числе в окрестностях Северодвинска (Андреев 2007, 2010), а в 2013 году впервые зарегистрировали гнездование этого вида в южных окрестностях Архангельска (Андреев 2013).



Рис. 1. Князёк *Parus cyanus*. Окрестности Северодвинска.  
5 мая 2017. Фото В.М.Спицына.

Весной и летом 2017 года мы вели орнитологические наблюдения в окрестностях Северодвинска, расположенного на берегу Двинского залива Белого моря в устьевой области Северной Двины. Во время экскурсии 5 мая в болотистом мелколесье из берёзы, ольхи, ивы на северо-

восточном берегу озера Новое была встречена пара князьков (рис. 1). Белые лазоревки, как обычно, быстро перемещались и перелетали. В тот же день был встречен князёк, летающий вместе с большой синицей *Parus major* в зарослях ивы вдоль дороги (64°34'04" с.ш., 39°54'20" в.д.). Наши поиски возможного гнезда в этом месте во время следующих экскурсий оказались безрезультатными.



Рис. 2. Князёк *Parus cyanus*. Окрестности Северодвинска. 7 июня 2017. Фото В.А.Андреева.

Во время экскурсии 7 июня в 400 м северо-западнее места первой встречи князька, на берегу небольшого безымянного озера в ивняке с тростником мы снова увидели князька (рис. 2). Он так же, как и при первой встрече, внезапно исчез из поля зрения, а наши поиски гнезда не увенчались успехом. Мы, однако, предполагаем, что гнездование князька здесь возможно.

#### Литература

- Андреев В.А. 2007. Новые птицы в Архангельской области // *Рус. орнитол. журн.* **16** (345): 216-217.
- Андреев В.А. 2010. Новые встречи князька *Parus cyanus* в Архангельской области // *Рус. орнитол. журн.* **19** (591): 1477-1478.
- Андреев В.А. 2013. О гнездовании князька *Parus cyanus* в окрестностях Архангельска // *Рус. орнитол. журн.* **22** (901): 1972-1974.
- Бутьев В.Т. 2001. Европейская белая лазоревка *Parus cyanus cyanus* Pallas, 1770 // *Красная книга Российской Федерации (Животные)*. М.: 558-559.
- Воинственский М.А. 1954. Семейство синицевые Paridae // *Птицы Советского Союза*. М., 5: 725-784.



## Необычно поздняя встреча теньковки *Phylloscopus collybita* в Санкт-Петербурге

А.В.Бардин

Александр Васильевич Бардин. SPIN-код: 5608-1832. Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034 Россия. E-mail: ornis@mail.ru

Поступила в редакцию 27 ноября 2017

Как известно, осенняя миграция теньковки *Phylloscopus collybita* в Ленинградской области очень растянута и сильнее всего выражена во второй и третьей декадах сентября; некоторые особи задерживаются даже до конца октября (Мальчевский, Пукинский 1983). В упомянутой монографии самая последняя встреча этой пеночки под Ленинградом датирована 18 октября 1967. Для юго-восточного Приладожья (Гумбаричи) приводится отлов теньковки в рыбацкие ловушки 25 октября 1969 (Носков и др. 1981). Для этого же района Н.В.Лапшин (2000) сообщает о ещё более поздней встрече – 31 октября. В Московской области последние теньковки наблюдались 30 октября (Птушенко, Иноземцев 1968), в Эстонии – 5 ноября (Veroman 1994).

Мне довелось встретить пеночку-теньковку в Санкт-Петербурге необычно поздно – 27 ноября 2017. Между 15 и 16 ч одиночная птица держалась в группе тополей в парке «Василеостровец» на Васильевской острове. Время от времени она громко пела (нужно заметить, что осеннее пение вообще характерно для этого вида). Во время наблюдения температура воздуха была +2°C, ветер слабый, временами проглядывало солнце. Снега ещё нет.

### Литература

- Лапшин Н.В. 2000. Биология теньковки *Phylloscopus collybita* в Карелии // *Рус. орнитол. журн.* 9 (90): 3-27.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана.* Л., 2: 1-504.
- Носков Г.А., Зимин В.Б., Резвый С.П., Рымкевич Т.А., Лапшин Н.В., Головань В.И. 1981. Птицы Ладожского орнитологического стационара и его окрестностей // *Экология птиц Приладожья.* Л.: 3-86.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. *Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий.* М.: 1-461.
- Veromann H. 1994. Chiffchaff *Phylloscopus collybita* (Vieill.) // *Birds of Estonia: Status, Distribution and Numbers.* Tallinn: 201.



## Черношейная каменка *Oenanthe finschii* – новый вид в фауне птиц Киргизии

И.Р.Романовская

Ирина Рашитовна Романовская. Бульвар Эркиндик, 20, школа-гимназия № 6,  
г. Бишкек, Кыргызстан

Поступила в редакцию 26 ноября 2017

В списках птиц Кыргызстана черношейная каменка *Oenanthe finschii* (Neuglin, 1869) до последнего времени отсутствовала. Ближайшие места её гнездования известны в юго-западной части Памиро-Алая в Таджикистане (Иванов 1940, 1969) и в хребтах Нуратау и Мальгузар, являющихся северо-западными отрогами Туркестанского хребта в Узбекистане (Мекленбурцев 1937; Степанян 1990).



Рис. 1. Горы Бели-Сынык. Вдали Туркестанский хребет, ещё покрытый снегом.  
30 апреля 2017. Фото автора.

Во время посещения Баткенской области Кыргызстана мной была совершена экскурсия в пустынные горы Бели-Сынык, лежащие юго-западнее Ферганской долины и в 20 км северо-западнее посёлка Самаркандик (40°05,39' с.ш., 70°37.15' в. д.). Южнее гряды этих гор возвышается Туркестанский хребет, тянущийся с востока на запад и относящийся к Гиссаро-Алайской горной системе (рис. 1, 2).



Рис. 2. Горы Бели-Сынык. Место встречи черношейной каменки *Oenanthe finschii*.  
30 апреля 2017. Фото автора.

В этих сильно опустыненных и живописных горюшках с обнажениями пестроцветных глин 30 апреля 2017 мной был встречен и сфотографирован яркий самец *Oenanthe finschii* (рис. 3). Время года и биотоп позволяют предполагать, что это была местная птица, тем более в Памиро-Алае на этот срок как раз приходится разгар её размножения (Иванов 1969). Дальнейшее обследование этих гор позволит уточнить и документально подтвердить характер пребывания черношейной каменки в западной части Киргизии.

*Выражаю искреннюю признательность всем орнитологам, подтвердившим видовую принадлежность черношейной каменки и оказавшим помощь в подготовке заметки.*



Рис. 3. Самец черношейной каменки *Oenanthe finschii*. Горы Бели-Сынык.  
Баткенская область Кыргызстана. 30 апреля 2017. Фото автора.

### Литература

- Иванов А.И. 1940. *Птицы Таджикистана*. М.; Л.: 1-300.  
Иванов А.И. 1969. *Птицы Памиро-Алая*. Л.: 1-448.  
Мекленбурцев Р.Н. 1937. Материалы по фауне млекопитающих и птиц хребта Нур-ата  
// Тр. Среднеаз. ун-та, сер. 8а, зоол. 26: 1-51.  
Степанян Л.С. 1990. *Конспект орнитологической фауны СССР*. М.: 1-728.



## О некоторых редких и малоизученных птицах Еврейской автономной области (Хабаровский край)

С.М.Смиренский, Е.М.Смиренская

Второе издание. Первая публикация в 1980\*

**Большая выпь** *Botaurus stellaris*. 30 и 31 мая 1975 две птицы держались в тростниках на небольшой старице у села Бабстово. 1 июня 1977 крик выпи мы слышали в ивняках на берегу реки Биджан в 30 км выше села Новотроицкое.

**Дальневосточный аист** *Ciconia boyciana*. Весьма характерный, но немногочисленный обитатель. Основные гнездовья сосредоточены по рекам Ин, Аур, Тунгуска, Бирушка. Отдельными парами гнездится и в других районах. В поисках корма аисты нередко залетают на окраины населённых пунктов. Так, несколько птиц можно было регулярно наблюдать в 1977 году на старицах у сёл Ленинское и Русская Поляна, около города Биробиджана.

**Огарь** *Tadorna ferruginea*. Встречается не каждый год, хотя, по словам местных охотников, изредка наблюдаются выводки. 12 июня 1977 мы дважды в течение дня наблюдали одиночную птицу на одном и том же участке поля неподалёку от села Бабстово.

**Хохлатый осоед** *Pernis ptilorhyncus*. Ни разу не встречен летом в открытых ландшафтах южной части области. Однако в лиственничниках в 20 км к северу от Биробиджана одиночки и пары отмечались ежедневно с 17 по 21 июня 1977.

**Даурский журавль** *Grus vipio*. С 8 по 11 мая 1975 на заболоченных лугах у села Бабстово держалась пара и 2 одиночные птицы. 27 мая 1977 одиночная птица кормилась неподалёку от станции Ленинское. 18 июля 1978 здесь найдено гнездо (диаметр 80 см, высота 15 см) с яйцом (91.5×1.60) и 1-2-дневным птенцом.

**Чёрный журавль** *Grus monacha*. 20 июня 1977 пара чёрных журавлей с птенцами встречена в 20 км к северо-востоку от станции Кирга на лиственничной мари. Птицы с тревожными криками подлетели к нам метров на 20 и, сделав круг, опустились неподалёку. При нашем приближении они неторопливо отошли в сторону, а затем отлетели в лиственничник, но после нашего ухода вскоре возвратились. Сообщение В.Д.Яхонтова (1976) о встрече здесь даурских журавлей представ-

---

\* Смиренский С.М., Смиренская Е.М. 1980. О некоторых редких и малоизученных птицах Еврейской автономной области (Хабаровский край) // *Орнитология* 15: 205-206.

ляется нам ошибочным, так как характер местности не подходит для обитания этого вида. Местные охотники рассказали нам о находке в 1976 году гнезда чёрных журавлей на небольшой листовенничной мари в 8 км к югу от станции Кирга.

**Японский журавль** *Grus japonensis*. 10 мая 1975 найдено гнездо (совместно с Е.Н.Курочкиным и В.Г.Бабенко) с 1 яйцом на заболоченном лугу у села Бабстово. Луг размером 150-200×700-800 м окружён со всех сторон полями и выпасами. Диаметр гнезда 150×140 см, высота – 21, диаметр лотка – 19, высота – 2 см. Размеры яйца 99.0×70.05 мм; масса яйца 243 г. Птицы были встречены здесь снова 30 мая 1975, но гнездо, судя по их поведению, было разорено.

**Малая кукушка** *Cuculus poliocephalus*. 6 июня 1977 в течение дня был слышен крик одиночного самца на небольшой сопке в долине среднего течения реки Биджан. К вечеру птица перелетела в пойменный лес.

**Рыбный филин** *Ketupa blakistoni*. За время работы в среднем течении реки Помпеевки (с начала мая до начала июля 1976 года) нам трижды (19, 28 и 30 мая 1976) удалось слышать характерный дуэт рыбных филинов. Судя по поведению, это были холостые птицы, но наличие подходящих условий (обилие рыбы и крупных дуплистых деревьев) позволяет предположить возможность их гнездования здесь.

**Ястребиная сова** *Surnia ulula*. Пара ястребиных сов встречена 17 июня 1977 в 20 км к северо-востоку от станции Кирга. Птицы активно охотились за мышевидными грызунами в листовенничнике, нарушенном рубками. Временами они куда-то улетали с добычей, но найти гнездо не удалось.

**Бородатая неясыть** *Strix nebulosa*. Достоверно отсутствует в открытых ландшафтах юга области. Этот вид ни разу не встречен и в Малом Хингане. В нарушенных рубками листовенничниках и на листовенничных марях в 20 км к северо-востоку от станции Кирга на маршруте в 5 км встречены 3 пары бородатых неясытей. Птицы активно охотились и в середине дня, особенно при пасмурной погоде.

**Иглоногая сова** *Ninox scutulata*. Немногочисленная птица Малого Хингана, где придерживается пойменных широколиственных лесов.

**Синяя мухоловка** *Cyanoptila cyanomelana*. Немногочисленная спорадично распространённая птица Малого Хингана. На гнездовье приурочена главным образом к нижним течениям рек, впадающих в Амур. Гнёзда найдены по скалистым обрывчикам, в корнях упавших деревьев, в неглубоких полудуплах.

**Короткохвостка** *Urosphena squameiceps*. Обычная птица Малого Хингана. На гнездовании приурочена к захламлённым участкам леса с густым подлеском (обычно по днищам распадков).

**Дроздовидная камышевка** *Acrocephalus arundinaceus orientalis*

(Temminck et Schlegel, 1847). Распространена в области спорадично и общая численность невелика, хотя там, где имеются подходящие условия, селится с большой плотностью. Гнёзда приурочены исключительно к молодым ивовым зарослям, причём птицы занимают только те участки, где к зарослям примыкают открытые места с лугами и болотами.

**Клинохвостый сорокопут** *Lanius sphenocercus*. Распространён в области спорадично. Гнездится по краям рёлок или на отдельных кустах среди остепнённых лугов и полей. Гнездиться начинает рано. Так, в 3 гнёздах, найденных у села Бабстово, было: 8 мая – 6 птенцов в возрасте 3 дней; 10 мая – 7 трёхдневных птенцов; 12 мая 1975 – 8 сильно насиженных яиц. Здесь же птицы гнездились и в 1977 году. Кроме того, пары клинохвостых сорокопутов встречены 10 июня 1977 у сёл Новотроицкое и Дежнево.

**Камышовая овсянка** *Emberiza schoeniclus*. Найдена в тростниках на небольшой старице у села Бабстово. В 1975 году здесь гнездились свыше 10 пар на маршруте в 2 км. В 1977 году тростники почти нацело выгорели от палов, но 12 мая 1977 здесь встречено 8 пар.

**Домовый воробей** *Passer domesticus*. Приурочен к городам и наиболее крупным сёлам области, расположенным преимущественно вдоль железной дороги (Биробиджан, Смидовичи, Облучье, Ядрино). Вдали от железной дороги воробьи появились впервые недавно (Пашково).



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1537: 5237-5238

## **Залёт кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* на территорию Пермского края**

**А.И.Шепель**

*Второе издание. Первая публикация в 2011\**

Кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* наблюдал у посёлка Жабреи Пермского района (57°57' с.ш., 56°42' в.д.) местный житель А.Б.Митяшин (есть фото). Птица держалась на Сылвинском заливе 28-29 июня 2011, затем улетела. Это второй случай залёта пеликана в Пермское Прикамье. Первый был в 1949 году, когда птиц (сколько, не указано) наблюдали летом на реке Шакве в Кунгурском районе, одна особь была добыта и некоторое время находилась в экспозиции краеведческого музея города Кунгура (Николаев 1951, 1958; Наумкин 2001).

---

\* Шепель А.И. 2011. Залёт кудрявого пеликана на территорию Пермского края // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 16: 141.

## Литература

- Николаев С.Ф. 1951. *Природа нашего края (заметки о растительном и животном мире Молотовской области)*. Молотов: 1-202.
- Николаев С.Ф. 1958. *Кунгур*. Пермь: 1-170.
- Наумкин Д.В. 2001. Дополнительные данные по орнитофауне Пермской области // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 6: 126-127.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1537: 5238-5239

## Новые данные о залётах птиц на территорию Верхнепечорского Предуралья

Н.Д.Нейфельд, В.В.Теплов, М.М.Курбанбагамаев

Второе издание. Первая публикация в 2012\*

В предлагаемом сообщении мы приводим наиболее интересные сведения о первых или очень редких повторных залётах некоторых птиц в верховья реки Печоры, зарегистрированных за два последних года. Достоверность полученных опросных данных оценивалась нами в ходе личного общения с респондентами.

**Кудрявый пеликан** *Pelecanus crispus*. Недавно опубликована информация (Шепель 2011) о залёте кудрявого пеликана в конце июня 2011 года на сопредельную территорию Пермского края. В том же году, менее месяца спустя, появление пеликана отметили в 500 км севернее – на юго-востоке Республики Коми в нижнем течении реки Илыч. Несколько дней во второй половине июля одиночная птица держалась в пойме реки в районе устья правобережного притока Сарью (62°39' с. ш., 57°59' в. д.). Здесь её неоднократно наблюдали во время сенокоса многие жители посёлка Приуральск и деревни Еремеево. Данная регистрация вида – первая для района исследований.

**Волчок** *Ixobrychus minutus*. Одиночную особь наблюдали 18-19 мая 2012 в верховьях Печоры в урочище Средние Ключи (62°00' с.ш., 58°68' в.д.) инспекторы охраны заповедника В.Н.Кудрявцев и А.Н.Воронин. Птицу заметили сидящей на прибрежных кустарниках, подтопленных паводком, и сделали несколько фотографий. Поначалу волчок подпускал лодку с людьми на расстояние в несколько метров, затем вёл себя более осторожно, перелетая при приближении наблюда-

---

\* Нейфельд Н.Д., Теплов В.В., Курбанбагамаев М.М. 2012. Новые данные о залётах птиц на территорию Верхнепечорского Предуралья // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 17: 119-121.

телей на противоположный берег. Современная северная граница области гнездования вида в Предуралье проходит примерно в 600 км южнее истоков Печоры (Рябицев 2008). Ранее залёты одиночных волчков в район Печоро-Илычского заповедника отмечали в 1975 и 1986 годах (Бешкарёв 1989).

**Камнешарка** *Arenaria interpres*. Одиночную птицу на каменистом берегу Печоры у посёлка Якша 23 июня 2012 наблюдал и сфотографировал зоолог заповедника С.М.Сокольский. Здесь же она держалась ещё в течение нескольких дней, затем улетела. В бассейне Печоры камнешарка не гнездится, а ближайшие места размножения известны северо-западнее и восточнее её дельты – в тундре у побережья северных морей и на арктических островах (Рябицев 2008). В прошлом появление двух камнешарок в районе заповедника отмечали только в сентябре 1990 года (Бешкарёв, Теплов 1993).

**Золотистая щурка** *Merops apiaster*. 17 июня 2011 в верховьях реки Илыч на кордоне Верхняя Ваджега (63°02' с.ш., 58°33' в.д.) пару золотистых щурок наблюдал инспектор охраны заповедника В.В.Лужинский. В течение нескольких часов птицы держались около жилого дома, отдыхали, присаживаясь на провода антенны радиосвязи, охотились в воздухе на насекомых над прилегающим высокотравным лугом, затем улетели вверх по Илычу. Пункт наблюдения находится на южной окраине северной подзоны тайги в полосе предгорных темнохвойных лесов. Очевидно, это были бродячие особи, кочующие далеко за границами современного гнездового ареала, который в Предуралье не выходит за пределы подтаёжных лесов (Рябицев 2008). Ранее данный вид в районе исследований не отмечали.

#### Л и т е р а т у р а

- Бешкарёв А.Б. 1989. Редкие виды водных и околоводных птиц Печоро-Илычского заповедника // *Экология редких, малоизученных и хозяйственно важных животных европейского северо-востока СССР*. Сыктывкар: 56-59.
- Бешкарёв А.Б., Теплов В.В. 1993. Новые виды птиц Печоро-Илычского заповедника // *Рус. орнитол. журн.* **2**, 1: 90-92.
- Рябицев В.К. 2008. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-634.
- Шепель А.И. (2011) 2017. Залёт кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* на территорию Пермского края // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1537): 5237-5238.

