ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1574
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII
Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1574

СОДЕРЖАНИЕ

983-986 О распространении полевого конька *Anthus campestris* в Закарпатской области. В. Н. ГЛЕБА

986-989 К распространению зимородка *Alcedo atthis* в Омской области. Т. Ю. КОЛПАКОВА

989-995 О зимовке камышницы *Gallinula chloropus*, чирка-свистунка *Anas crecca* и серой утки *Anas strepera* в Санкт-Петербурге. Ю. Б. АШМАРИНА, А. В. БАРДИН

995-996 Кормёжка большой синицы *Parus major* на трупе сизого голубя *Columba livia*. Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ, А. Н. ФИЛИМОНОВ

996-999 Ещё раз о встрече «колибри» в Южном Приморье. В. А. ХАРЧЕНКО, Л. А. ФЕДИНА

999-1000 Новые находки куликов в Запорожской области. В. И. ЛЫСЕНКО

1000-1001 Розовая чайка *Rhodostethia rosea* на северо-востоке СССР. В. А. ОСТАПЕНКО, С. Ф. БЕГУНОВ, Г. Н. ФОМИЧЁВА

1001-1003 Распространение поганок в Московской области в 1977-1981 годах. А. Л. МИЩЕНКО, Е. Н. БУКВАРЁВА

1003 Некоторые черты поведения бекаса *Gallinago gallinago* в период размножения. А. МАЧИКУНАС

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования: 15 февраля 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1574

CONTENTS

983-986 On distribution of the tawny pipit *Anthus campestris* in the Transcarpathian Oblast. V. N. GLEBA

986-989 To the distribution of kingfisher *Alcedo atthis* in the Omsk Oblast. T. Yu. KOLPAKOVA

989-995 On wintering of the common moorhen *Gallinula chloropus*, Eurasian teal *Anas crecca* and gadwall *Anas strepera* in St. Petersburg. Yu. B. ASHMARINA, A. V. BARDIN

995-996 Feeding of the great tit *Parus major* on the corpse of rock pigeon *Columba livia*. N. N. BEREZOVIKOV, A. N. FILIMONOV

996-999 Once again about the meeting of a «hummingbird» in the Southern Primorye. V. A. KHARCHENKO, L. A. FEDINA

999-1000 New finds of waders in the Zaporozhye Oblast. V. I. LYSENKO

1000-1001 The Ross's gull *Rhodostethia rosea* in the northeast of the USSR. V. A. OSTAPENKO, S. F. BEGUNOV, G. N. FOMICHEVA

1001-1003 Distribution of grebes in the Moscow Oblast in 1977-1981. A. L. MISCHENKO, E. N. BUKVAREVA

1003 Some features of the behavior of the snipe *Gallinago gallinago* in the breeding season. A. MACHIKUNAS

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1574****: 983-986*

О распространении полевого конька *Anthus campestris* в Закарпатской области

В.Н.Глеба

Василий Николаевич Глеба. Украинское общество охраны птиц,
ул. Центральная, д. 148, пгт. Королёво, Виноградовский район,
Закарпатская область, 90332, Украина. E-mail: glebasileus@mail.ru

Поступила в редакцию 10 февраля 2018

Полевой конёк *Anthus campestris* является гнездящимся видом птиц в Закарпатской области Украины (Потиш 2009). Обитает на открытых местах низменности, с разреженной растительностью, а также на виноградниках. Согласно недавним исследованиям, численность полевого конька в некоторых местах низменности резко снизилась почти в десять раз (Луговой, Мателешко 1996). И это при том, что в начале XX века вид также считался редким на гнездовании (Грабар 1997). В связи с этим полевого конька можно относить к редким видам птиц Закарпатской области, заслуживающий охраны на региональном уровне (Луговой, Потиш 2004).

В этом сообщении приводятся наши данные о встречах полевых коньков в гнездовой период на Закарпатской низменности. Исследования проводились в Виноградовском районе в период с 1996 по 2017 год с перерывом с 2004 по 2007 год.

Рис. 1. Место обитания полевого конька *Anthus campestris* вдоль железной дороги возле посёлка Королёво. 17 июля 2012. Фото автора.

Все немногочисленные встречи полевых коньков произошли на небольшом участке открытых пространств, представленных сельскохо-

зяйственными угодьями, пастбищами, пустырями. Эта территория находится в треугольнике между посёлками Королёво, Черна и Гудя.

В большинстве случаев мы обнаруживали птиц сидящими на проводах ЛЭП вдоль автомобильных или железнодорожных дорог между указанными населёнными пунктами.

Рис. 2. Самец полевого конька *Anthus campestris* на гнездовом участке. Окраина посёлка Королёво. 3 мая 2013. Фото автора.

Рис. 3. Молодой полевой конёк *Anthus campestris*. Окраина посёлка Королёво. 21 июня 2014. Фото автора.

Впервые одиночный полевой конёк отмечен 30 мая 1999 на южной окраине Королёво. В этом же году ещё один самец трижды встречен на ЛЭП вдоль автодороги Черна–Гудя (30 июня, 4 и 8 июля 1999) на одном и том же участке дороги. В 2000 году на этом же приграничном

участке дороги вновь наблюдались одиночные полевые коньки, сидящие на проводах (9 мая и 23 июля). 8 мая 2002 две птицы наблюдались на ЛЭП вдоль автодороги Королево–Дубовинка.

На протяжении мая-июня 2012-2015 годов, полевые коньки (одна пара) отмечались только в одном месте на южной окраине посёлка Королёво, вдоль железнодорожного пути на отрезке Королево – Дяково (рис. 1). Самца легко можно было обнаружить сидящим на столбах ЛЭП (рис. 2). Птица ходила вдоль железнодорожной насыпи в поисках пищи или отдыхала, сидя на земле. 21 июня 2014 на полевой дороге нами отмечен молодой полевой конёк, который искал пищу на обочине (рис. 3). В это время одна взрослая птица сидела на проводах, проходящих над этой дорогой. 17 мая 2015 один взрослый полевой конёк ловил насекомых, бродя по участку с негустой травой.

Рис. 4. Самец полевого конька *Anthus campestris*. Окраина села Черна. Виноградовский район Закарпатской области. 10 июня 2017. Фото автора.

В июне 2017 года одного самца отмечали на ЛЭП вдоль автодороги при въезде в село Черна со стороны Королёво (рис. 4).

Таким образом, можно предположить, что на исследуемом участке гнездятся две-три пары полевых коньков.

Литература

Грабар А. 1997. Птицы Подкарпатской Руси (Avifauna Carpatorossica) // *Беркут* **6**, 1/2: 91-102 (в обработке А.Е.Лугового с переводом с чешского и русинского).

Луговой А.Е., Мателешко Ю.И. 1996. Новые изменения в фауне и населении птиц урочища Чёрный Мочар (Закарпатская область) // *Праці укр. орнітол. товариства* **1**: 1-234.
Луговой А.Е., Потиш Л.А. 2004. Красная книга Украины и птицы Закарпатья // *Беркут* **13**, 1: 115-121.
Потіш Л.А. 2009. *Птахи Закарпатської області (анотований список)*. Львів: 1-124.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1574**: 986-989*

К распространению зимородка *Alcedo atthis* в Омской области

Т.Ю.Колпакова

Татьяна Юрьевна Колпакова. Кафедры биологии и биологического образования, Омский государственный педагогический университет. E-mail: tkolpakov@mail.ru

Поступила в редакцию 6 февраля 2018

Обыкновенный зимородок *Alcedo atthis* занесён в Красную книгу Омской области (3-я категория). Здесь это гнездящийся перелётный вид. В небольшом числе он встречался на территории области, вероятно, издавна. Так, зимородок был добыт в конце XIX века А.А.Морозовым (1898) в Омском уезде. В начале XX века О.Фиш (Finsch 1909) писал об 1 экз. зимородка в музее И.Я.Словцова. Однако в течение последующих почти 70 лет никаких сведений о зимородке в Омской области в литературе не появлялось. Позднее о встречах зимородка и его гнездовании в окрестностях Омска упоминается в ряде работ (Миловидов, Шевырногов 1977; Якименко 1998; Соловьёв 2005; Одинцев и др. 2013). Например, гнездование одной пары отмечено на речке Замарайке (Миловидов, Шевырногов 1977). С.А.Соловьёв (2005) встретил зимородка в июне 1980 года на правом берегу Иртыша в окрестностях посёлка Чернолучье. В.В.Якименко (1998) наблюдал зимородка в июне 1989 года в пойме Иртыша в парковой зоне Омска, в первой декаде июля 1998 года найдено гнездо с кладкой из 5 яиц на одном из островов Иртыша в пригороде Омска.

В Омском Прииртышье северная граница ареала зимородка доходит до 57-й параллели (Маловичко, Константинов 2000), залетают эти птицы до северной тайги (Рябицев 2008).

Одиночные зимородки наблюдались на берегу Иртыша в районе села Екатерининское, в 20 км выше Тары по Иртышу, и в районе посёлка Князевка, в 80 км к северу от Тары (Якименко 1998). В 2003 году в конце июня мы в течение двух дней наблюдали охоту зимородка на

реке Уразай в окрестностях села Атак Тарского района Омской области (56°48' с.ш. и 74°38' в.д.).

На юге Омской области зимородок также распространён не равномерно. Так, в мае 2012 года было встречено несколько особей, «рыбачащих» на Иртыше в окрестностях посёлка Голубинка Таврического района (Одинцев и др. 2013). В июне 2012 года в Черлакском районе в 3 км от посёлка Большой Атмас (54°03' с.ш. и 74°56' в.д.) вдоль обрывистого берега протоки Иртыша длиной 1.3 км замечены на гнездовании 5-6 пар (Одинцев и др. 2013). Гнездовые норы располагались на обрывистом берегу на высоте от 3 до 10 м от уровня воды, в 100-200 м одна от другой. Нежилых нор было значительно больше, чем заселённых, что позволяет предположить многолетнее гнездование зимородка на этой территории.

Рис. 1. Место расположения гнезда зимородка у посёлка Чернолучье. Июнь 2012 года.

В июне 2011 года в окрестностях посёлка Чернолучье удалось не только наблюдать низко летящую над старицей Иртыша птицу, но и обнаружить жилое гнездо с кладкой из 7 яиц (55°14' с.ш. и 73°01' в.д.). В июне 2012 года в 5 м от старой, выше, обнаружена новая гнездования нора с 5 яйцами (рис. 1-3). А в 300 м располагалась ещё одна жилая нора (Одинцев и др. 2013). В 2013 году в ходе работ по оценке численности этого вида в Чернолучинской рекреационной зоне сделано несколько интересных наблюдений. На постоянном маршруте обнаружена всего одна жилая нора вместо трёх, существовавших ранее (одна была разрушена высоким уровнем воды в 2013 году, другая пустовала).

Здесь же отмечены две «ложные» норы. Интересно, что зимородки повторно заселили одну из ранее существовавших нор (Одинцев, Колпакова 2015).

Рис. 2. Жилая нора зимородка *Alcedo atthis*. Чернолучье. Июнь 2012 года.

Рис. 3. Кольцевание зимородка *Alcedo atthis*. Чернолучье. Июнь 2012 года.

В июне 2017 года охотящийся зимородок обнаружен в черте города Омска, на территории природного парка Птичья гавань и в парке имени 30-летия Победы у протоки Иртыша. Последняя встреча зимородка была 12 сентября 2017 в Птичьей гавани, когда наблюдали птицу, сидевшую на ветке ивы, склонившейся над водой.

Литература

Маловичко Л.В., Константинов В.М. 2000. *Сравнительная экология птиц-норников: экологические и морфологические адаптации*. Ставраполь; М.: 1-228.

Миловидов С.П., Шевырногов С.З. 1977. Птицы города Омска // *Вопросы биологии*. Томск: 15-18.

Морозов А.А. 1898. Список птиц Акмолинской области и прилегающих местностей Тобольской и Томской губерний // *Зап. Зап.-Сиб. отд. Рус. геогр. общ-ва* **24**: 1-16.

Одинцев О.А., Колпакова Т.Ю., Одинцева А.А., Синенко Н.Н. 2013. К биологии зимородка (*Alcedo atthis* Linnaeus, 1758) Омского Прииртышья // *Естественные науки и экология* **17**: 95-99.

Одинцев О.А., Колпакова Т.Ю. 2015. Новые данные об особенностях репродуктивного периода зимородка в Омском Прииртышье // *Естественные науки и экология* **19**: 62-63.

Рябицев В.К.. 2001. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-608.

Соловьёв С.А. 2005. *Птицы Омска и его окрестностей*. Новосибирск: 1-296.

Якименко В.В. 1998. Материалы к распространению птиц в Омской области // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 192 - 221.

Finsch O. 1909. Vogelarten, welche sowohl in West-Sibirien als in Afrika beobachtet wurden // *Aquila* **16**: LXXIX - LXXXVIII.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1574**: 989-995*

О зимовке камышницы *Gallinula chloropus*, чирка-свистунка *Anas crecca* и серой утки *Anas strepera* в Санкт-Петербурге

Ю.Б.Ашмарина, А.В.Бардин

Юлия Борисовна Ашмарина. ООО «Геофизпоиск». Санкт-Петербург. E-mail: ashju@mail.ru
Александр Васильевич Бардин. SPIN-код: 5608-1832. Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034 Россия. E-mail: ornis@mail.ru

Поступила в редакцию 12 февраля 2018

Как редкая птица окрестностей Санкт-Петербурга камышница *Gallinula chloropus* известна с конца XIX века, но заметное увеличение её численности стало происходить лишь с конца 1960-х годов (Иовченко 2015). При этом у камышницы наблюдается всё более выраженная синантропизация, она часто живёт и размножается на водоёмах города и пригородов. В этом отношении она сходна с другим водоплавающим видом пастушковых птиц – лысухой *Fulica atra*.

Наличие в городе незамерзающих участков водоёмов и водотоков, а также привыкание к питанию хлебом, которым горожане регулярно подкармливают уток, способствовали тому, что некоторая часть лысух

и камышниц стала оставаться в городе на зиму. Зимовка лысухи впервые наблюдалась на озёрах в парке Гатчины в 2005/06 году (Чиринскайте 2007). В последующие годы эти птицы зимовали здесь уже постоянно (Нецепляева 2007; Ингинен и др. 2010). Позднее зимующие лысухи стали отмечаться и в разных частях Петербурга (Богуславский 2010; Храбрый 2015). Зимующая камышница впервые была найдена в нашем городе в 2008/09 году на речке Красненькой (Иовченко 2015). Второй раз две зимующие камышницы обнаружены К.Д.Мильто (2017) в 2016/17 году в Красносельском районе города – в начале Дудергофского канала, наполняемого тёплыми сточными водами. На этом незамерзающем участке ежегодно зимуют водяные птицы.

Рис. 1. Место зимовки уток и камышниц в начале Дудергофского канала.

В эту зиму начало Дудергофского канала в Полежаевском парке было обследовано 16 и 26 января и 8 февраля 2018 (рис. 1). Здесь канал заболочен, обрамлён зарослями тростника и ив. По берегам часто гуляют люди, подкармливающие зимующих птиц. Больше всего здесь крякв *Anas platyrhynchos* и сизых чаек *Larus canus*. Примерно там же, где и зимой 2016/17 года (Мильто 2017), держалась одна взрослая камышница (рис. 2, 5) и две молодых, видимо, из позднего выводка (возможно, молодых было больше). Взрослая и одна молодая птицы в основном скрывались в зарослях тростника (рис. 3), хотя к людям относились спокойно. Вторая молодая часто посещала место прикормки уток на северном берегу канала (рис. 4). Схватив кусочек хлеба, она спешила к остальным камышницам. Интересно, что взрослая птица часто выпрашивала корм у молодой, бегая за ней. Было замечено, что молодая камышница кормила взрослую, а также чистила её оперение. Когда бросали хлеб в тростники, то взрослая и молодая камышницы быстро его находили и съедали, опережая подплывающих крякв.

Рис. 2. Взрослая камышница *Gallinula chloropus* в начале Дудергофского канала. 16 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной.

Рис. 3. Молодая камышница *Gallinula chloropus* скрывается в тростниках. Начало Дудергофского канала. 8 февраля 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной.

Кроме крякв, сизых чаек и камышниц, здесь держались пара чирков-свистунков *Anas crecca* (только 26 января, рис. 6) и селезень серой утки *Anas strepera* (рис. 7). Свистунок встречается зимой в Петербурге редко (Богуславский 2011; Храбрый 2015), поэтому данная встреча за-

Рис. 4. Молодая камышница *Gallinula chloropus* спешит к месту, где люди кормят крякв. Начало Дудергофского канала. 8 февраля 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной.

Рис. 5. Взрослая камышница *Gallinula chloropus* кормится на мелководье рядом с самкой кряквы *Anas platyrhynchos*. Начало Дудергофского канала. 16 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной.

служивает упоминания. Серая утка начала заселять Ленинградскую область и территорию Санкт-Петербурга примерно 20 лет назад, резко увеличив в эти годы свою численность (Иовченко и др. 2013; Иовченко

2014). Впервые на зимовке в Петербурге она отмечена в 2013/14 году на речке Красненькой (Строилов 2014), а зимой 2015/16 года – на реке Фонтанке (Богуславский 2016). Зимой 2016/17 года К.Д.Мильто (2017) наблюдал самца серой утки в начале Дудергофского канала.

Рис. 6. Пара чирков-свистунков *Anas crecca*. Начало Дудергофского канала. 26 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной.

Рис. 7. Самец серой утки *Anas strepera*. Начало Дудергофского канала. 16 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной.

Рис. 8. Селезень, предположительно гибрид кряквы *Anas platyrhynchos* и серой утки *Anas strepera*. Начало Дудергофского канала. 16 января 2018. Фото Ю.Б.Ашмариной.

В заключение отметим, что среди уток встречен селезень, который был, предположительно, гибридом кряквы и серой утки (рис. 8).

Литература

Богуславский А.В. 2010. Зимующие лысуха *Fulica atra* и морская чернеть *Aythya marila* в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* **19** (559): 545.

Богуславский А.В. 2011. Встреча зимующего чирка-свистунка *Anas crecca* в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* **20** (647): 730-731.

Богуславский А.В. 2016. Зимующие свиязь *Anas penelope* и серая утка *Anas strepera* в центре Санкт-Петербурга // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1239): 218-221.

Ингинен М.П., Борель И.В., Нецепляева И.С. 2010. Птицы Гатчинского ландшафтного парка (по наблюдениям 2008-2009 годов) // *Рус. орнитол. журн.* **19** (541): 6-14.

Иовченко Н.П. 2014. Пространственно-временное распределение серой утки *Anas strepera* на Северо-Западе России в конце XIX – начале XXI веков: основные этапы и способы экспансии, современное состояние популяции и прогноз // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1080): 3897-3920.

Иовченко Н.П. 2015. Современное распространение и новые данные по размножению и миграциям камышницы *Gallinula chloropus* у северной границы ареала на Северо-Западе России // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1144): 1763-1769.

Иовченко Н.П., Рычкова А.Л., Смирнов О.П. 2013. Стремительное освоение водоёмов Санкт-Петербурга серой уткой *Anas strepera* в начале XXI века // *Рус. орнитол. журн.* **22** (916): 2440-2441.

Мильто К.Д. 2017. Зимовка водоплавающих птиц на Дудергофском канале в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1448): 2103-2104.

Нецепляева И.С. 2007. О зимовке лысухи *Fulica atra* в Гатчине // *Рус. орнитол. журн.* **16** (375): 1183-1184.

Строилов О.А. 2014. Зимующая серая утка *Anas strepera* на реке Красненькой (Санкт-Петербург) // *Рус. орнитол. журн.* **23** (965): 378-379.

Храбрый В.М. 2015. *Птицы Петербурга: Иллюстрированный справочник*. СПб.: 1-463.

Чиринскайте Л.И. 2007. Лысуха *Fulica atra* в Гатчинском парке // *Рус. орнитол. журн.* **16** (375): 1182-1183.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1574**: 995-996*

Кормёжка большой синицы *Parus major* на трупе сизого голубя *Columba livia*

Н.Н.Березовиков, А.Н.Филимонов

Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.
E-mail: berezovikov_n@mail.ru
Александр Николаевич Филимонов. Алакольский государственный природный заповедник, г. Ушарал, Алакольский район, Алматинская область, 060200, Казахстан.
E-mail: alexandr.filimonov.2012@mail.ru

Поступила в редакцию 14 февраля 2018

Во время 30-градусных морозов 30 января 2018 один из сизых голубей *Columba livia* var. *domestica*, живущих на чердаке двухэтажного офиса Алакольского заповедника в городе Ушарал Алматинской обла-

сти, был обнаружен замёрзшим на металлическом корпусе кондиционера с наружной стороны стены здания. Вскоре заметили, что к нему прилетела большая синица *Parus major* и после осмотра принялась расклёвывать бока его головы, начав с глаз. Весь следующий день она периодически кормилась на нём, переключившись с головы на спину, на которой вначале выщипала перья, а затем расклевала кожу. В первой половине дня 1 февраля она продолжала кормиться, выклевав на спине значительный участок тканей вплоть до костей. Утром 5 февраля при 20-градусном морозе на голубе кормилось уже две больших синицы, также на его спине, основная часть которой была ощипана от перьев и расклёвана. В последующие три дня они продолжали появляться и кормиться вдвоём. 9 февраля труп голубя упал в сугроб и его утащила собака. После этого синицы перестали посещать это место.

В литературе имеются указания, что большие синицы в зимнее время охотно кормятся на трупах погибших животных и используют остатки добычи хищников (Бардин 1983). В годы работы в Маркакольском заповеднике один из авторов был свидетелем, когда большие синицы совместно с седым дятлом *Picus canus* кормились на ободранной туше рыси *Lynx lynx*, лежавшей около недели в сугробе около Музея природы.

Литература

Бардин А.В. 1983. Род Синицы - Paridae // А.С.Пукинский, Ю.Б.Мальчевский. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана.* Л., **1**: 269-298.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1574**: 996-999*

Ещё раз о встрече «колибри» в Южном Приморье

В.А.Харченко, Л.А.Федина

Виктория Анатольевна Харченко, *Любовь Александровна Федина*. ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. Владивосток, Россия. E-mail: bax_3468@list.ru

Поступила в редакцию 9 февраля 2018

Осенью 2017 года в научный отдел Уссурийского заповедника обратились жители Владивостока, утверждавшие, что им удалось наблюдать в одном из городских скверов колибри и даже с помощью смартфона сделать видеозапись этой экзотической птицы. Со слов очевидцев, птица совершенно не боялась людей, зависая напротив головок цветов, длинным клювом собирала нектар. Она находилась на расстоянии вытянутой руки и можно было разглядеть перья на хвосте (рис. 1).

Рис. 1. Языкан обыкновенный *Macroglossum stellatarum*. Владивосток. 2 октября 2017. Кадры из видеоролика Е.Свиновой.

Нам уже приходилось сталкиваться с заявлениями о встречах колибри и в Уссурийске, но видео- или фотоматериалы в качестве доказательств наблюдатели предъявить не могли. Обсуждая ранее этот вопрос с коллегами из лаборатории орнитологии Биолого-почвенного института (Владивосток), которые также не первый год слышали такие заявления, мы пришли к выводу, что это – языкан обыкновенный, или большехоботник звездчатый *Macroglossum stellatarum* – бабочка из семейства бражников Sphingidae.

В отличие от большинства бражников, которые являются ночными бабочками, обыкновенный языкан активен днём и в сумерках. Предпочитает пасмурную и прохладную погоду, так как плохо переносит жару, раннее утро и вечер. Это крупные насекомые с большим, веретенообразным телом и узкими крыльями. Длина тела бабочки составляет всего 2-2.5 см, размах крыльев – 4-5 см. Передние крылья, длинные и узкие, тёмного цвета – серые или коричневые. Задние крылья и нижняя сторона передних – оранжевые (рис. 2).

Рис. 2. Языкан обыкновенный *Macroglossum stellatarum*.
По: Гомыранов, Полевод 2016.

Бражник летает с высокой скоростью – до 50 км/ч – с низким гудением. Как и колибри, не садится на цветок, а зависает над ним в воздухе. При этом тело бабочки замирает в неподвижности, а крылья работают с такой огромной скоростью, что человеческому глазу сложно уследить за их движением. Чёрные волоски на конце туловища бражника очень напоминаю птичий хвост, что придаёт ещё большее сходство с птицей. Привлекают языкана растения с сильным ароматом и большим количеством нектара. Бабочка встречается в хорошо прогреваемых биотопах, по опушкам лесов, может залетать в сады, городские парки. Вид способен к дальним миграциям. Развиваются два поколения в год. Первое поколение языканов (лёт проходит с начала мая до середины июля) состоит в основном из особей, прилетающих с юга, а часть бабочек второго поколения (лёт – с конца августа до конца октября) осенью мигрирует на юг.

Обыкновенный языкан – теплолюбивая бабочка, но адаптировалась и к более умеренным условиям. Распространение вида: вся Европа (кроме севера), Северная Африка, Северная Индия, Монголия, весь Корейский полуостров, Северо-Восточный Китай, Японские острова. В Юго-Восточной Азии отсутствует. В европейской части России доходит на севере до Карелии и Коми. Отмечены популяции в Крыму, на Кавказе. В азиатской части России обитает на Алтае, на юге Сибири, Якутии и Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях, на острове Сахалин. В северных регионах встречаются только мигрирующие особи, залёты отмечены до Якутска (Бражник... 2017; Семейство... 2017; Языкан... 2017; Pittaway, Kitching 2018).

Выражаем искреннюю благодарность Е.Свиновой за предоставленный видеоматериал.

Литература

Бражник языкан – «колибри» на дачном участке [Электронный ресурс] // Beetlestop.ru. Все о борьбе с насекомыми-вредителями. 2017. URL: http://beetlestop.ru/brazhnik-yazyikan/ (дата обращения: 06.02.2017).

Гомыранов И.А., Полевод В.А. 2016. *Насекомые России. Определитель*. Москва: 1-142.

Семейство бражники (Sphingidae) [Электронный ресурс] // ButterflyLib.ru: Бабочки, 2017. URL: http://butterflylib.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st039.shtml (дата обращения: 06.02.2017).

Языкан обыкновенный [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия, 2017. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/языкан_обыкновенный (дата обращения: 06.02.2017).

Pittaway A.R., Kitching I.J. *Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) – Eurasian hummingbird hawkmoth* [Электронный ресурс] // Sphingidae of the Eastern Palaearctic (including Siberia, the Russian Far East, Mongolia, China, Taiwan, the Korean Peninsula and Japan), 2018. URL: http://tpittaway.tripod.com/china/china.htm (дата обращения: 06.02.2017).

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1574**: 999-1000*

Новые находки куликов в Запорожской области

В.И.Лысенко

*Второе издание. Первая публикация в 1983**

Исландский песочник *Calidris canutus*. Встречен на отмелях Молочного лимана. Добыт 22 сентября 1976 из стайки в 8 особей у села Кирилловка Акимовского района.

Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria*. На осеннем пролёте золотистая ржанка встречается на побережье Молочного лимана и устье

* Лысенко В.И. 1983. Новые находки куликов в Запорожской области // *Орнитология* **18**: 168.

балки Атманай. Добыта 18 октября 1976 у села Кирилловка Акимовского района.

Хрустан *Eudromias morinellus*. Добыт 18 октября 1976 у села Кирилловка Акимовского района. Небольшие стайки этих птиц ежегодно встречаются в октябре на лугах у села Солёное Акимовского района.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1574****: 1000-1001*

Розовая чайка *Rhodostethia rosea* на северо-востоке СССР

В.А.Остапенко, С.Ф.Бегунов, Г.Н.Фомичёва

*Второе издание. Первая публикация в 1983**

Тяжёлая ледовая обстановка сложилась в восточной части Арктики осенью 1979 года. Это, вероятно, и повлияло на возникновение скоплений розовых чаек *Rhodostethia rosea* в несвойственных им ранее местах. В первых числах октября розовые чайки появились у города Певека. Они держались на ещё не замёрзших полыньях, опоясывающих Певекский полуостров, а также у пирса морского порта, где ещё маневрировали суда. Основная масса птиц находилась здесь в течение первых двух декад октября, и лишь единичные особи отмечены в конце месяца. Максимальная численность чаек приближалась к 150 экз. Судя по окраске, здесь были особи всех возрастов – от сеголеток до половозрелых. У некоторых розовых чаек ещё не закончилась послебрачная линька.

Чайки были чрезвычайно доверчивы к людям и подпускали к себе наблюдателя на расстояние до 1 м, много двигались, плавая в поисках корма. Большую часть дня они проводили в кормлении с короткими перерывами на 15-20 мин. Наблюдались постоянные территориальные конфликты на местах кормления, прослеживалось иерархическое соподчинение особей в отдельных полыньях. При сильном ветре чайки выстраивались на льду у кромки воды цепочками по 6-7 птиц, ориентируясь головами против ветра.

В первой половине октября несколько стай розовых чаек наблюдали местные оленеводы в верховьях реки Анадырь (О.П.Зайченко, устн. сообщ.). Птицы летели в сторону города Анадыря, т.е. на юго-восток. В это же время розовых чаек видели в посёлке Биллингс, а также значи-

* Остапенко В.А., Бегунов С.Ф., Фомичёва Г.Н. 1983. Розовые чайки на северо-востоке СССР // *Орнитология* **18**: 199.

тельно севернее – на дрейфующей станции «Северный Полюс – 22», примерно на 75° с.ш. В 20-х числах октября розовых чаек вновь наблюдали в 150 км от берега моря, в районе поселков Майский и Комсомольский. Нескольких птиц видели сидящими на обочине автотрассы Певек–Комсомольский примерно 15 ноября. Интересно отметить, что местные жители материковой части Чукотки, сообщившие нам о своих наблюдениях, ранее не встречали розовых чаек в этих районах.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1574****: 1001-1003*

Распространение поганок в Московской области в 1977-1981 годах

А.Л.Мищенко, Е.Н.Букварёва

*Второе издание. Первая публикация в 1983**

В результате исследования в 1977-1981 годах ряда водоёмов Московской области был собран материал о распространении и гнездовании пяти видов поганок.

Чомга *Podiceps cristatus*. Сейчас чомга – обычный гнездящийся вид Теряевских прудов в Волоколамском районе (Бутьев 1978) и на прудах всех рыбхозов Московской области, за исключением прудов ВНИИПРХ (Дмитровский район). Большинство гнёзд располагалось в колониях озёрной чайки *Larus ridibundus*. На прудах рыбхозов «Егорьевский», «Сенеж», «Клинский» и «Ленинский» (Пушкинский район) летом 1980 года, по приблизительным оценкам, гнездилось соответственно 15, 15, 20 и 1 пара. На озере Карасово (Шатурский район) 21 мая 1977 было найдено свежее, но ещё пустое гнездо; в тот же день на озере наблюдалось 6 чомг. На озере Нерское (Дмитровский район) 4 июня 1981 найдены 4 гнезда с неполными кладками. Таким образом, в настоящее время в Московской области гнездится не менее 400 пар чомги.

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis*. В 1979 году на заполненном водой старом торфяном карьере близ посёлка Вождь Пролетариата (Егорьевский район) 25-27 мая наблюдали 6 поганок, а с 11 по 18 июня ежедневно отмечали 3 птиц в крупной (более 2000 пар) колонии озёрной чайки, причём 2 из них имели по 1 птенцу. 28 мая 1980 18 птиц наблюдали в колонии озёрной чайки (примерно 600 пар) на одном из прудов рыбхоза «Бисерово», в 5 проверенных гнёздах было 4,

* Мищенко А.Л., Букварёва Е.Н. 1983. Современное распространение поганок в Московской области // *Орнитология* **18**: 169-170.

4, 4, 2 и 4 слабо насиженных яйца. 5 июня 1981 мы нашли здесь 10 гнёзд с ненасиженными кладками.

В рыбхозе «Егорьевский» на небольшом пруду 1 июня 1980 было найдено гнездо черношейной поганки с 4 яйцами, расположенное по соседству с гнездом малой чайки *Larus minutus* и 2 гнёздами речной крачки *Sterna hirundo*. В рыбхозе «Нара» в 1980 году гнездилась пара этих поганок на сильно заросшем пруду в колонии озёрной чайки (более 400 пар). В 1981 году на этом пруду благополучно вывели птенцов уже 3 пары поганок. На одном из прудов рыбхоза «Лотошинский» в 1980 году гнездились 2-3 пары черношейных поганок (в колонии озёрной чайки, насчитывавшей более 300 пар). 19 августа встречены взрослая птица с птенцом и ещё 4 птицы. 24 июня 1981 здесь отмечено 8 пар, 2 из которых уже имели выводки. Взрослая поганка с крупным, но ещё нелётным птенцом встречена 27 июля на другом пруду, также в колонии озёрных чаек. В рыбхозе «Осенка» 30 июня 1980 в районе колонии озёрной чайки (примерно 500 пар) В.А.Зубакиным встречены 3 одиночные поганки, пара и пара с 2 птенцами.

Красношейная поганка *Podiceps auritus*. 21 июня 1980 гнездо с 5 слабо насиженными яйцами найдено на пруду Дятловского участка рыбхоза «Клинский» в небольшой колонии чёрных крачек *Chlidonias niger*. 22 июня гнездо с 4 яйцами обнаружено на пруду участка «Яуза» того же рыбхоза в смешанной колонии чайковых птиц. В этот же день здесь были встречены 3 одиночные красношейные поганки и пара с 3 пуховичками. 20 июня 1981 мы встретили на этом пруду 3 поганок и нашли гнездо с 3 ненасиженными яйцами. На одном из прудов рыбхоза «Лотошинский» 19 июля 1980 было насчитано 19 красношейных поганок. Всего здесь в 1980 году, вероятно, гнездилось 4-5 пар красношейных поганок. 27 июля 1981 мы учли на этом пруду 5 выводков: в 4 было по 1 птенцу, в 1 – 2 птенца.

Серощёкая поганка *Podiceps grisegena*. 25 мая 1981 мы встретили одиночную птицу на пруду рыбхоза «Лотошинский». 2 августа 1981 взрослая серощёкая поганка с 2 пуховичками была отмечена на пруду рыбхоза «Бисерово» в небольшой колонии озёрных чаек. 14 июля мы наблюдали, как она носила корм в одну и ту же куртину тростников.

Малая поганка *Tachybaptus ruficollis*. 3 июля 1981 гнездо малой поганки с 2 ненасиженными яйцами найдено в крупной разреженной колонии чёрных крачек на одном из прудов рыбхоза «Клинский».

Обращает на себя внимание тесная связь мест гнездования всех видов поганок с колониями чайковых птиц.

Авторы благодарны В.А.Зубакину, любезно предоставившему собственные неопубликованные данные, а также Е.А.Шварцу, Е.Э.Стоцкой и другим членам сектора «Фауна» дружины биофака МГУ по охране природы, принимавшим участие в работе.

Литература

Бутьев В.Т. 1978. Птицы Теряевских прудов // *Растительность и животное население Москвы и Подмосковья*. М.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1574****: 1003*

Некоторые черты поведения бекаса *Gallinago gallinago* в период размножения

А.Мачикунас

*Второе издание. Первая публикация в 1983**

Во время токования самцов бекаса *Gallinago gallinago* наряду с характерным полётом наблюдалось продолжение токования на земле, возле самки. Самец после активного токования в воздухе планирующим полётом опускался на землю, в 2-3 м от самки. Самец приближался к ней, издавая громкие звуки *«так-так-так-так»*. Самка в это время ведёт себя спокойно, а самец за все случаи наблюдения ни разу не приблизился к ней вплотную. После этого ритуала обе птицы иногда улетали, но чаще всего самка оставалась.

Во время насиживания самец держится поблизости от гнезда, хотя и не участвует в насиживании. В этих случаях он замечает опасность и взлетает значительно раньше, нежели вспугнутый на кормёжке, где бекасы подпускают наблюдателя на расстояние 1 м и ближе. Потревоженный у гнезда самец в полете издаёт резкий тревожный звук *«тэк-тэк»*. Услышав тревожный звук самца, самка беспокоится, но продолжает оставаться в гнезде. Когда наблюдатель обнаруживает гнездо с насиженными яйцами или только что вылупившимися птенцами и вспугивает самку, самец чередует токовой полёт с полётом, явно выражающим тревогу. Птица, издавая тревожный звук *«тэк-тэк»*, с высоты устремляется вниз, почти достигая поверхности земли, и опять взлетает. Наиболее чётко вышеописанная реакция самца наблюдается при 2-3-дневном возрасте птенцов.

* Мачикунас А. 1983. Некоторые черты поведения бекаса в период размножения // *Орнитология* **18**: 198-199.