ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1586
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XXVII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1586

СОДЕРЖАНИЕ

1433-1444 Интересные находки зимующих птиц в Тюмени. М.Ю.ЛУПИНОС, Е.С.БАЯНОВ, С.Л.БОЛДЫРЕВ, В.В.ВЕЙЦЕЛЬ, Н.А.КИСКИНА, А.Н.ЛЮЦ, В.М.МАЛЫШКИН, Р.И.МАНСУРОВ, П.Е.ПОКАЗАНЬЕВА, Е.С.ПОЛЯКОВА, В.Г.ШВЕЦОВА

1444-1446 Серые журавли *Grus grus* в Ростове-на-Дону. А.В.ЗАБАШТА

1446-1448 Залёты саджи *Syrrhaptes paradoxus* на Дальний Восток. Л.В.КУЛЕШОВА

1448-1450 Первая регистрация каменки-плясуньи *Oenanthe isabellina* в Московской области. С.В.РОМАНОВ

1450-1452 Подвиды дубровника *Ocyris aureolus*. Я.А.РЕДЬКИН

1452-1453 Дубровник *Ocyris aureolus* на Камчатке. Ю.Н.ГЕРАСИМОВ, Н.Н.ГЕРАСИМОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования: 9 марта 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1586

CONTENTS

1433-1444 Interesting finds of wintering birds in Tyumen. M.Yu.LUPINOS, E.S.BAYANOV, S.L.BOLDYREV, V.V.VEITSEL, N.A.KISKINA, A.N.LYUTZ, V.M.MALYSHKIN, R.I.MANSUROV, P.E.POKAZANIEVA, E.S.POLYAKOVA, V.G.SHVETSOVA

1444-1446 The common crane *Grus grus* in Rostov-on-Don. A.V.ZABASHTA

1446-1448 Invasions of the Pallas's sandgrouse *Syrrhaptes paradoxus* to the Far East. L.V.KULESHOVA

1448-1450 The first registration of the isabelline wheatear *Oenanthe isabellina* in the Moscow Oblast. S.V.ROMANOV

1450-1452 Subspecies of the yellow-breasted bunting *Ocyris aureolus*. Ya.A.RED'KIN

1452-1453 The yellow-breasted bunting *Ocyris aureolus* in Kamchatka. Yu.N.GERASIMOV, N.N.GERASIMOV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St.-Petersburg University
St.-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1586**: 1433-1444*

Интересные находки зимующих птиц в Тюмени

М.Ю.Лупинос, Е.С.Баянов, С.Л.Болдырев, В.В.Вейцель, Н.А.Кискина, А.Н.Люц, В.М.Малышкин, Р.И.Мансуров, П.Е.Показаньева, Е.С.Полякова, В.Г.Швецова

Мария Юрьевна Лупинос, *Евгений Сергеевич Баянов*, *Степан Леонидович Болдырев*, *Владимир Владимирович Вейцель*, *Наталья Андреевна Кискина*, *Александр Николаевич Люц*, *Василий Матвеевич Малышкин*, *Руслан Ильдарович Мансуров*, *Полина Евгеньевна Показаньева*, *Елена Силиверстовна Полякова*, *Вера Геннадьевна Швецова*. Тюменский государственный университет, Институт биологии, кафедра зоологии и эволюционной экологии животных, Тюменское отделение Союза охраны птиц России, ул. Пирогова, д. 3, Тюмень, 625043, Россия.
E-mail: mariya_lupinos@mail.ru

Поступила в редакцию 3 марта 2018

История изучения орнитофауны города Тюмени начинается с работы И.Я.Словцова (1892), который проводил свои наблюдения в 1884-1888 годах. В 1926 году фауну птиц Тюмени описывал В.Ф.Ларионов (1927). Из 203 видов птиц отмеченных на территории Тюменского округа, в городе им было зарегистрировано 18 видов. После этого на протяжении очень длительного промежутка времени исследования, посвящённые птицам Тюмени, не проводились.

В дальнейшем птиц Тюмени и её окрестностей эпизодически изучали А.Д.Шаронов (1963), А.М.Гынгазов и С.П.Миловидов (1977), С.Н. Гашев (1997). В конце 1990-х годов была опубликована крупная сводка по орнитофауне Тюмени и Тюменского района, которую тюменские орнитологи используют и поныне (Граждан 1998).

Начиная с 2009 года фаунистические и мониторинговые исследования орнитофауны Тюмени с группой студентов и единомышленников проводит М.Ю.Лупинос. За это время в пределах административных границ города Тюмени выявлено обитание 217 видов птиц (Лупинос 2013, 2015; Лупинос и др. 2018).

Необходимо отметить, что в последнее время большой объём орнитологических данных мы получаем от любителей птиц при проведении разнообразных мероприятий и акций, инициированных Тюменским отделением Союза охраны птиц России, а также во время бёрдинга и фотографирования птиц, при проведении экскурсий, прогулок и соревнований по спортивной орнитологии. Значительная часть этих данных не обнародована, или публикуется многими биологами на Всероссийских конференциях по динамике численности птиц с явными ошибками и искажением общей орнитологической ситуации. Поэтому во избежание ряда неточностей и в дополнение к ранее опубликованному

материалу (Гашев 1997; Граждан 1998; Лупинос 2013, 2015; Халитов, Лупинос 2014; Лупинос и др. 2017, 2018; Митропольский, Мардонова 2017) в данном сообщении мы приводим новую информацию о зимовках отдельных видов птиц в Тюмени далеко за пределами их обычных областей зимовки.

Тюмень – это один из крупных городов Западной Сибири, столица Тюменской области. Современная площадь города составляет 235 км^2, общая численность населения – около 680 тыс. человек. Город расположен на Туринской низменности по берегам реки Туры. Территория города имеет геоморфологию речной долины, а также небольших увалов и грив. Правый берег Туры высокий и обрывистый, а левый представляет собой заозёренную низкую пойму (Бакулин, Козин 1996).

Тюмень располагается в умеренном широтном поясе в центре Евразийского материка вдали от океанов и морей. Климат города характеризуется суровой, длительной и снежной зимой, тёплым продолжительным летом, короткими переходными сезонами – весной и осенью, с частыми волнами холода и возвратами тепла. Среднегодовая температура воздуха +0.3°C, средняя температура января -17.8°C, июля – +17.2°C. Годовая сумма осадков около 457 мм. 75% этого количества приходится на тёплый период. Колебания суммы осадков по годам велики, от 200 до 600 мм, особенно летом, для первой половины которого характерны засухи. Летом преобладают осадки ливневого характера, зимой – обложные и моросящие. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября, разрушается в первой декаде апреля. Наибольшая высота снежного покрова на открытых участках достигает 60 см при средней многолетней 30-40 см (Иваненко, Булатов 1998).

Ниже представлена информация о новых и интересных находках зимующих птиц на территории Тюмени. Границы города в последние годы значительно расширились за счёт пригородов, особенно в северной части. Поэтому в настоящем сообщении границы города Тюмени будем очерчивать условно от аэропорта Рощино до посёлка Боровского и от озера Липовое до деревни Патрушева. Номенклатура птиц соответствует «Списку птиц Российской Федерации» (Коблик и др. 2006).

Кряква *Anas platyrhynchos*. Многочисленный вид речных уток города Тюмени. Гнездится на многих водоёмах, в том числе в застроенной части города (Граждан 1998). Летом 2015 года на ручье Ключи в лесопарке «Гилевская роща» Е.С.Баянов отмечал гнездование 2 пар крякв. 25 мая 2016 в зарослях малины в непосредственной близости от асфальтированной дорожки этого же лесопарка П.Е.Показаньева и М.Ю.Лупинос обнаружили кладку кряквы из 10 яиц. К настоящему времени на территории Тюмени сформировалась оседлая популяция крякв, которые не улетают на места зимовок, а в течение всей зимы держатся на незамерзающих водоёмах города. Выявлению мест кон-

центрации и численности птиц на местах зимовок способствует проведение ежегодной экологической акции по учёту зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка» под эгидой Союза охраны птиц России (рис. 1). Так, например, Е.С.Баяновым в рамках проведения этой акции 17 января 2016 удалось зафиксировать одно из самых крупных мест концентрации крякв на зимовке. На незамерзающем ручье от очистных сооружений, впадающем в реку Тура в 2.2 км на северо-восток от деревни Зайково, отмечено 62 кряквы, которые продержались на водоёме в течение всей зимы, а уже в 2017 году в этом же районе было отмечено 132 птицы (рис. 1, 2).



Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных крякв *Anas platyrhynchos*, зимующих на водоёмах города Тюмени.

Рис. 2. Зимующие кряквы *Anas platyrhynchos*. Озеро Оброчное. 21 января 2018. Фото П.Е.Показаньевой.

20 января 2018 при проведении акции «Серая шейка», помимо большого скопления крякв (276 особей: 141 ♂ и 135 ♀), на озере Оброчное, которое представляет собой водоём-охладитель ТЭЦ-1, впервые на зимовке в наших условиях удалось зарегистрировать **красноголового нырка** *Aythya ferina* (рис. 3). Самка нырка охотно принимала угощения от жителей города, одной из первых подплывая к корму. В этот же день при обследовании ручья вблизи деревни Зайково зарегистрировали самку **чирка-свистунка** *Anas crecca*. Птица плавала на открытом участке реки и изредка выходила на лёд, отдыхая и приводя оперение в порядок.

Рис. 3. Красноголовый нырок *Aythya ferina* на зимовке. Озеро Оброчное. 20 января 2018. Фото А.Н.Люц.

Большой крохаль *Mergus merganser*. Редкий пролётный вид города Тюмени и Тюменского района (Граждан 1998). Впервые на зимовке в Тюмени три больших крохаля были обнаружены В.М.Малышкиным и С.Л.Болдыревым на озере Оброчное 27, 30 января и 3 февраля 2018 (имеются видеозаписи). Птицы держались в одном из заливов озера и иногда совершали курсирующие полёты среди основной массы крякв.

Зимняк *Buteo lagopus*. Редкий пролётный и зимующий вид (Граждан 1998). 30 января 2016 года в Тюменское отделение Союза охраны птиц России поступила информация от М.Боевой, которая отмечала в утреннее время районе Тюменского завода железобетонных изделий взрослого зимняка, отдыхающего на балконном выступе 5-го этажа. Эта встреча ещё раз подтверждает статус данного вида птиц в Тюмени – пролётный и зимующий, хотя многие исследователи, видимо в силу

недостаточной проработки имеющегося материала и кратковременного изучения населения птиц Тюмени, отмечают зимняка только в статусе мигрирующего вида (Митропольский, Мардонова 2017).

Сапсан *Falco peregrinus*. Молодого сапсана в Тюмени обнаружила М.Боева 16 ноября 2015. Сапсан сидел на балконе одного из жилых домов города. Птица была ослаблена и взята на содержание-передержку, но при очередной тренировочной прогулке сапсан вырвался из опутинок и улетел. К сожалению, найти птицу не удалось. Остаётся не ясным характер пребывания этой особи на территории города.

15 января 2017 при проведении акции СОПР по учёту водоплавающих птиц «Серая шейка» И.З.Халитов зарегистрировал на незамерзающем водоёме вблизи села Зайково сапсана, охотящегося на крякв (Лупинос и др. 2017).

Дербник *Falco columbarius*. Обычен. Вероятно, гнездится (Граждан 1998). Одиночный дербник зафиксирован М.Боевой в центре города (у цирка и Администрации города) в период с 7 декабря 2015 по 26 февраля 2016. Птица охотилась за домовыми воробьями *Passer domesticus*, большими синицами *Parus major* и свиристелями *Bombycilla garrulus* на центральной площади города. Дербник успешно зимует в Тюмени три зимы подряд.

Рис. 4. Дербник *Falco columbarius*. Центральная площадь Тюмени. 28 января 2017. Фото П.Е.Показаньевой.

Серая куропатка *Perdix perdix*. Редкий вид. Встречается преимущественно в осенне-зимний период (Граждан 1998). Ранее С.Н.Гашев регулярно отмечал отдельных куропаток возле озера Цимлянское и в районе аэропорта «Рощино» (Гашев и др. 2013). 17 января 2016 в

районе деревни Копытова на заброшенных отстойниках возле очистных сооружений Е.С.Баянов отметил небольшую группу серых куропаток, состоящую из 13 особей. 23 января 2016 в том же районе видели 40 птиц. В январе 2017 года наблюдались многочисленные следы серых куропаток в пойме реки Туры в 2.2 км на северо-восток от деревни Зайково.

Филин *Bubo bubo*. Редкий вид (Граждан 1998). Занесён в Красную книгу Тюменской области (II категория – вид, сокращающий свою численность) (2004). В ноябре 2012 года филин отмечен А.Макаровым на жилом доме в центре Тюмени, сидящим на балконе 8-го этажа (рис. 5). Зарегистрирован Е.С.Баяновым 26 января 2013 в 1 км на север от деревни Плеханово. По сведениям А.Ознобихина, 20 ноября 2017 филин наблюдался в районе озера Круглое. Птица пролетала от старого заброшенного элеватора по направлению к парку им. Ю.А.Гагарина.

Рис. 5. Филин *Bubo bubo*, отдыхающий на балконе многоэтажного жилого дома в Тюмени. Ноябрь 2012 года. Фото А.Макарова.

Болотная сова *Asio flammeus*. Гнездящийся вид (Граждан 1998). Однако нами болотная сова отмечена в пределах административных границ Тюмени в ином статусе – зимующей. С 25 января 2017 в Восточном микрорайоне Тюмени впервые на зимовке зарегистрирована одиночная болотная сова. Птица обосновалась в одном из дворов среди жилых многоэтажных домов (рис. 6). В сумерках и ночью сова охотилась за синантропными грызунами на пустыре и детской площадке, а утро и фактически весь день проводила, сидя на подоконнике первого этажа. Болотная сова успешно перезимовала в Тюмени в 2017 году и вновь отмечена в этом же районе Р.И.Мансуровым 15 февраля 2018.

Рис. 6. Болотная сова *Asio flammeus* на месте днёвки вблизи детской площадки. Тюмень. Январь 2017 года. Фото Р.И.Мансурова.

Рис. 7. Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis* позавтракала серой вороной *Corvus cornix*. Тюмень. 15 февраля 2017. Фото Р.И.Мансурова.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. Редка (Граждан 1998). Возможно, гнездится, однако в последнее время чаще других сов встречается в городе во внегнездовой период (рис. 7). Зимой 2014-2016 годов

длиннохвостая неясыть многократно отмечалась в лесопарке «Гилевская роща». В октябре 2015 года залетевшая в район Парфеново сова с признаками травмы была найдена жительницей города. После реабилитации птица выпущена Р.И.Мансуровым в районе Плеханово. 15 февраля 2017 длиннохвостая неясыть зарегистрирована в Восточном микрорайоне города. Сова вызвала неподдельный интерес у местных жителей, и они обратились к орнитологам с просьбой спасти птицу от нападения группы серых ворон *Corvus cornix*. Орнитологам пришлось очень долго объяснять тюменцам, что «окрикивание» сов и других хищных птиц врановыми – это обычное явление.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. Гнездящийся вид Тюмени (Граждан 1998). 5 января 2018 в Восточном микрорайоне города среди группы рябинников *Turdus pilaris* Е.С.Полякова наблюдала и обыкновенного скворца (рис. 8). Он ел плоды садовых яблонь, а также корма антропогенного происхождения на расположенной вблизи теплотрассе. По полученным фотографиям любители птиц также обнаружили, что кончик клюва у скворца во время зимовки несколько деформировался.

Рис. 8. Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris* впервые отмечен на зимовке в Тюмени. 5 января 2018. Фото Е.С.Поляковой.

Восточная чёрная ворона *Corvus (corone) orientalis*. В пределах административной границы Тюмени чёрная ворона является единично зимующим видом птиц. Первые встречи чёрных ворон зафиксированы в период с октября 2014 по январь 2016 года преимущественно в

районах многоэтажной застройки Тюмени (сообщения В.В.Синицына, А.Д.Парфёнова) (Митропольский и др. 2016). 28 января 2016 М.Ю.Лупинос и П.Е.Показаньева сфотографировали чёрную ворону, державшуюся в непосредственной близости от мусорных баков в центре Тюмени (Показаньева, Лупинос 2017).

Белобровик *Turdus iliacus*. Отмечается К.В.Гражданом (1998) в качестве обычного гнездящегося вида. В.В.Вейцелем в районе многоэтажной застройки Тюмени 9 февраля 2017 отмечен одиночный белобровик. Птица держалась в посадках яблонь близ здания СибНИПИ-Газстрой и на свободном от снега участке около канализационного люка. Белобровик вёл себя весьма активно и успешно перезимовал в Тюмени в 2016/17 году в компании с рябинниками (рис. 9).

Рис. 9. Белобровик *Turdus iliacus* кормится упавшими яблоками.
Тюмень. 19 февраля 2017. Фото М.Ю.Лупинос.

Зяблик *Fringilla coelebs*. Гнездящийся вид (Граждан 1998). В среднем зяблики улетают на зимовку во второй декаде октября. Однако и из этого правила есть исключения. 27 ноября 2017 в лесопарке «Гилевская роща» Е.С.Полякова наблюдала самку зяблика, которая спокойно собирала на снегу семена сорных трав (рис. 10).

Юрок *Fringilla montifringilla*. Встречается на пролёте и гнездится (Граждан 1998). Обычно отлёт этого вида птиц из Тюмени приходится на конец сентября – начало октября. Юрок отмечен В.Г.Швецовой в районе Плеханово в самый разгар зимы – 20 декабря 2017. Птица держалась около кормушки и питалась семенами подсолнечника вме-

сте с синицами и воробьями (рис. 11). 14 января 2018 при проведении наблюдения за зимующими птицами Тюмени Е.С.Баянов наблюдал пару юрков близ лесопарка «Затюменский».

Рис. 10. Самка зяблика *Fringilla coelebs*. Лесопарк «Гилевская роща». 27 ноября 2017. Фото Е.С.Поляковой.

Рис. 11. Юрок *Fringilla montifringilla* вблизи птичьей кормушки. Тюмень. 20 декабря 2017. Фото В.Г.Швецовой.

В заключении следует подчеркнуть, что зимовка таких новых, «нетрадиционных» для Тюмени птиц наблюдалась на фоне последних тёплых и затяжных осенних сезонов. Благоприятные погодные усло-

вия, обилие доступных кормов, позднее установление снежного покрова, сравнительно мягкие зимы провоцируют долгую задержку отлёта некоторых птиц и их зимовку в Тюмени.

Несмотря на спорадический характер зимних встреч, приведённые в данном сообщении материалы корректируют статус рассмотренных видов птиц в Тюмени и общие представления о границах районов их зимовок.

Литература

Бакулин В.В., Козин В.В. 1996. *География Тюменской области*. Екатеринбург: 1-240.

Гашев С.Н. 1997. Интересные орнитологические находки в г. Тюмени и окрестностях // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* **2**: 43-44.

Гашев С.Н., Климов Ю.П., Низовцев Д.С., Парфёнов А.Д., Раененко И.М., Синицын В.В., Шаповалов И.С., Шарафутдинов И.Г. 2013. О новых встречах редких видов наземных позвоночных животных на территории юга Тюменской области // *Материалы ко второму изданию Красной книги Тюменской области*. Тюмень: 52-70.

Граждан К.В. 1998. Птицы Тюмени и Тюменского района // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* **3**: 47-55.

Гынгазов А.М., Миловидов С.П. 1977. *Орнитофауна Западно-Сибирской равнины*. Томск: 1-352.

Иваненко А.С., Булатов К.В. 1998. *Окрестности Тюмени*. Тюмень: 1-240.

Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-256.

Красная книга Тюменской области. 2004. Екатеринбург: 1-352.

Ларионов В.Ф. 1927. Перечень птиц Тюменского округа // *Изв. Томск. ун-та* **77**, 3: 185-196.

Лупинос М.Ю. 2013. *Антропогенная трансформация фауны и населения гнездящихся птиц на территории лесной зоны Тюменской области*. Дис. …канд. биол. наук. Пермь: 1-270 (рукопись).

Лупинос М.Ю. 2015. Антропогенная трансформация фауны и населения гнездящихся птиц в процессе урбанизации (на примере города Тюмени) // *14-я Международ. орнитол. конф. Сев. Евразии. I. Тезисы*. Алматы: 311-312.

Лупинос М.Ю., Халитов И.З., Показаньева П.Е., Раененко И.М. 2017. Новые сведения о редких видах птиц, обитающих на территории юга Тюменской области // *Вестн. Тамбов. ун-та*. Сер. естеств. и техн. науки 22, 5: 945-948.

Лупинос М.Ю., Кискина Н.А., Показаньева П.Е., Тырин Н.Е. 2018. Птицы города Тюмени: история изучения, анализ современного видового разнообразия, эколого-этологические адаптации // *1-й Всерос. орнитол. конгресс: Тез. докл*. Тверь: 191-192.

Митропольский М.Г., Лупинос М.Ю., Показаньева П.Е., Мардонова Л.Б. 2016. Новые данные по встречам восточной чёрной вороны *Corvus orientalis* в Западной Сибири и Приуралье // *Чтения имени эколога и зоолога, профессора Виктора Алексеевича Попова. Материалы 15-17-х Чтений*. Казань: 70-73.

Митропольский М.Г., Мардонова Л.Б. 2017. Птицы города Тюмени: состав фауны, характер пребывания // *Динамика численности птиц в наземных ландшафтах. 30-летие программы мониторинга зимующих птиц России и сопредельных регионов. Материалы Всерос. науч.-практ. конф*. М.: 326-334.

Показаньева П.Е., Лупинос М.Ю. 2017. Распространение восточной чёрной вороны *Corvus orientalis* в Тюменской области // *Экология врановых птиц в естественных и антропогенных ландшафтах Северной Евразии*. Казань: 167-169.

Словцов И.Я. 1892. Позвоночные Тюменского округа и их распределение в Тобольской губернии // *Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи*. Отд. зоол. 1: 187-264.

Халитов И.З., Лупинос М.Ю. 2014. Некоторые наблюдения за зимующими птицами в Тюмени // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* **19**: 168-169.

Шаронов А.Д. (1963) 2013. Из орнитологических наблюдений в окрестностях Тюмени // *Рус. орнитол. журн.* **22** (866): 919-920.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1586**: 1444-1446*

Серые журавли *Grus grus* в Ростове-на-Дону

А.В.Забашта

Алексей Владимирович Забашта, ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Проспект Шолохова, д. 270/1, Ростов-на-Дону, 344009, Россия. E-mail: zabashta68@mail.ru

Поступила в редакцию 7 марта 2018

Через низовья Дона и восточное Приазовье проходит миграция серых журавлей *Grus grus*. Стаи этих птиц, летящие в вышине, можно наблюдать ежегодно. Пролетают они и над Ростовом-на-Дону. На пролёте журавли останавливаются вдали от населённых пунктов, в местах, где их менее всего могут потревожить люди. Птицы в этот время кормятся и отдыхают перед новым миграционным броском. Для остановки журавли выбирают преимущественно открытые места с хорошим обзором, что позволяет издалека обнаружить приближающуюся опасность. Но иногда небольшие группы журавлей, наоборот, выбирают укрытые участки. Например, 23 сентября 2017 в дельте Дона неподалёку от посёлка Тополькы 4 серых журавля отдыхали на грязи почти высохшей старой протоки (музги) около 15 м шириной, окружённой стеной тростника. Стоя в центре музги, птицы спали. Три из них спрятали головы под крылья. Один из журавлей, который, очевидно, «стоял на страже», тоже спал, но не пряча голову под крыло, а наклонив её почти до земли. Именно сон «охранника» позволил подойти по дамбе к самой музге и наблюдать спящих журавлей. Чуть позже он встрепенулся, увидев человека, подал тревожный звук и все журавли улетели.

Транзитный полёт над Ростовом-на-Дону стаи журавлей совершают на высоте 200 м и выше. Направление весной – север и северо-восток. Количество птиц в стаях 10-80. Находящимся на большой высоте пролётным журавлям, очевидно, уже безразличен ландшафт, расстилающийся под ними, в том числе и территории крупных городов.

Но снижающиеся и завершающие миграционный бросок стаи, подыскивающие себе подходящие места для остановок, могут совершать посадку и среди крупных мегаполисов. Например, 16 марта 2011 около 8 ч стая из 9 серых журавлей, огибая район многоэтажной застройки «Александровка», залетела со стороны пойменного левобережья Дона над небольшой «городской» речкой Кизитеринкой на территорию Ростовского аэродрома. В утренние часы совершались вылеты воздушных судов, но это не испугало летевших птиц и они всей стаей сели на грунтовую часть лётного поля примерно в 300 м от взлётно-посадочной полосы. Так как полёты самолётов завершились, то журавли, успокоившись, начали кормиться (см. рисунок).

Серые журавли *Grus grus* на Ростовском аэродроме. 16 марта 2011. Фото автора.

К пасущимся журавлям можно было подъезжать на 80-100 м, после чего птицы начинали проявлять беспокойство, прекращали кормёжку и настороженно смотрели на движущийся автомобиль, очевидно, готовые взлететь. Если он не приближался, птицы успокаивались и снача-

ла отдельные особи продолжали кормиться, а затем и все остальные переставали обращать на автомобиль внимание. Кормёжка продолжалась около часа. За это время один самолёт совершил вылет, но журавли остались на лётном поле. При разбеге воздушного судна по взлётно-посадочной полосе они только прекратили кормиться, подняли головы и наблюдали за разбегающимся и взлетающим самолётом. По истечении часа журавли, очевидно, насытившись, стали проявлять больше беспокойства, быть более осторожными и тревожно поднимали головы на направляющийся в их сторону автомобиль. К 9 ч движение машин аэропортовых служб на аэродроме усилилось. Некоторые водители пытались подъехать поближе посмотреть на редких птиц. По-видимому, это беспокойство заставило журавлей сместиться ближе к взлётно-посадочной полосе, а затем и вовсе покинуть лётное поле.

До того, как попасть на аэродром, журавли летели над поймой Дона, где достаточно подходящих мест для остановки, но проигнорировав их, остановились на непродолжительную кормёжку на территории города. В утренние часы на аэродроме была дымка, над низменным левобережьем переходящая в слабый туман. Но он не мог препятствовать выбору безопасного места среди обширных лугов на левом берегу Дона. Однако журавли остановились на небольшом участке лётного поля аэродрома, окружённом со всех сторон многоэтажной застройкой. Шум и движение воздушных судов по взлётно-посадочной полосе вызывали только настороженность этих птиц, и лишь повышенное внимание со стороны людей к ним заставило птиц покинуть эту территорию. Взлетевшие журавли стали медленно набирать высоту и улетели в северном направлении.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1586**: 1446-1448*

Залёты саджи *Syrrhaptes paradoxus* на Дальний Восток

Л.В.Кулешова

Второе издание. Первая публикация в 1968[*]

В литературных источниках имеются указания на залёты саджи *Syrrhaptes paradoxus* в Приморье в 1907, 1913, 1922-1923, 1933-1934 годах (Дементьев 1951; Воробьёв 1938). В названные годы эти птицы наблюдались в Приморье в зимние или позднеосенние месяцы. В 1966

[*] Кулешова Л.В. 1968. Залёты саджи на Дальний восток // *Орнитология* **9**: 354.

году в разных пунктах Приморья и Приамурья прослежен ранневесенний залёт саджи (см. рисунок; Потороча 2018; Шибаев 2018; Яхонтов 2018).



Картосхема встреч залётных садж *Syrrhaptes paradoxus*.
1 – пункты встреч; 2 – государственная граница/

В 1966 году весна на побережье моря (бухта Терней) была ранней – уже в первых числах марта появились проталины. Необычно ранними сроками отличался и прилёт ряда птиц: скворцов, овсянок, жаворонков и др. 11 марта в 5 км от побережья на аэродромной площадке (долина реки Сицы [ныне Тигровая]) наблюдалась стая из 43 садж. Птицы держались на участках, освободившихся от снега. 12 марта несколько десятков птиц этого вида были обнаружены в бухте Благодатное (16 км южнее Тернея). Два самца, добытые из этой стаи лесником В.П.Воровым, весили 302.3 г (семенники 12 мм) и 289.0 г (семенники 11 мм). Птицы были средней упитанности; желудки и зобы наполнены семенами леспедецы. В окрестностях Тернея саджи держались немногим больше недели – последний раз они отмечены 19 марта у посёлка Терней.

Литература

Воробьёв К.А. 1938. К орнитофауне Дальнего Востока // *Тр. Сихотэ-Алинского заповедника* **2**: 27-56.

Дементьев Г.П. 1951. Отряд рябки Pterocletes или Pterocletiformes // *Птицы Советского Союза*. М., **2**: 71-91.
Потороча В.И. 2018. Залёт саджи *Syrrhaptes paradoxus* в Амурскую область весной 1966 года // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1585): 1429 [1968].
Шибаев Ю.В. 2018. Залёт саджи *Syrrhaptes paradoxus* в Приморье в 1966 году // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1584): 1393 [1968].
Яхонтов В.Д. 2018. Залёты саджи *Syrrhaptes paradoxus* в окрестности Хабаровска // *Рус. орнитол. журн.* 27 (1583): 1347-1348 [1968].

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1586**: 1448-1450*

Первая регистрация каменки-плясуньи *Oenanthe isabellina* в Московской области

С.В.Романов

Сергей Викторович Романов. Улица Пушкина 51/30, г. Ступино, Московская область, 142803, Россия. E-mail: sergeich.r@yandex.ru

Поступила в редакцию 8 марта 2018

Каменка-плясунья *Oenanthe isabellina* гнездится в Евразии от востока Балканского полуострова до Центральной Азии. В России встречается по югу страны от Приазовья к востоку до Большого Хингана. Населяет пустынные и степные ландшафты с плотным грунтом и разреженной травянистой растительностью. Охотно селится в местах колониальных поселений грызунов, таких как песчанки и суслики (Иванов 1976; Степанян 2003). На местах гнездования появляется в конце периода схода снега. Зимует в Восточной Африке, на Аравийском полуострове и северо-западе Индостана. Перелёт на зимовку начинается в середине августа – начале сентября.

Наиболее северные места гнездования каменки-плясуньи известны в Башкирии, где в мае 1974 года были обнаружены гнёзда этих птиц в Хайбуллинском районе в окрестностях села Акъяр, посёлка Подольск и деревни Ишкулово (Ильичёв, Фомин 1988). Кроме того, залёты каменки-плясуньи отмечены в районе Уфы в 1977 и 2013 годах (Ansorge *et al*. 1980; Валуев 2014) и в Башкирском заповеднике в 1981 году (Лоскутова 1983)

В Московской области каменки-плясуньи впервые встречены мной 27 августа 2017 на лугу в окрестностях Свято-Троицкого Белопесоцкого женского монастыря в городском округе Ступино (54°51'02" с.ш., 38° 08'24" в.д.). Это была группа птиц из 5-6 особей, рассредоточенных на просёлочной дороге. Расстояние до птиц было примерно 8-9 м и их удалось сфотографировать и хорошо рассмотреть (см. рисунок).

Каменка-плясунья *Oenanthe isabellina*. Московская область,
городской округ Ступино. 27 августа 2017. Фото С.В.Романова.

Выражаю благодарность Ольге Волцит за помощь в определении вида.

Литература

Валуев В.А. 2014. Самая северная регистрация каменки-плясуньи *Oenanthe isabellina* на Южном Урале // *Рус. орнитол. журн.* **23** (970): 513-514.

Иванов А.И. 1976. *Каталог птиц СССР*. Л.: 1-276.

Ильичёв В.Д., Фомин В.Е. 1988. *Орнитофауна и изменение среды (на примере Южно-Уральского региона)*. М.: 1-247.

Лоскутова Н.М. 1983. Современное состояние редких видов птиц Башкирского заповедника // *Практическое использование и охрана птиц Южно-Уральского региона*. М.: 63-66.

Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области)*. М.: 1-808.

Ansorge H., Balschun D., Donle H.-J., Kock U. 1981. Beitrag zur Avifauna der Baschkirischen ASSR // *Wiss. Z. Univ. Halle* **3**: 83-95.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1586**: 1450-1452*

Подвиды дубровника *Ocyris aureolus*

Я.А.Редькин

*Второе издание. Первая публикация в 2018**

Географическая изменчивость дубровника *Ocyris (Emberiza) aureolus* (Pallas, 1773) изучена нами преимущественно на материалах коллекции Зоологического музея Московского университета, дополненных экземплярами из некоторых других орнитологических собраний. В общей сложности просмотрено 519 особей. Результаты исследования указывают на существование по крайней мере 4 подвидов (географических рас), что в целом согласуется с данными проведённых ранее ревизий (Станчинский 1929; Мальцев 1938; Портенко 1939, 1960, 1962), принятыми нами в Списке птиц Российской Федерации (Коблик и др. 2006). Наиболее надёжные признаки для диагностики подвидов – детали окраски оперения брачного наряда старых самцов (в возрасте не менее 3 лет). Существующие различия отчасти маскируются индивидуальной изменчивостью, однако не вызывают сомнений при сравнении серийных материалов.

Большую часть ареала вида, к востоку до западного Забайкалья, северной Монголии, гор системы Станового хребта и бассейна Анадыря населяет *O. a. aureolus*, обладающий красновато-каштановой окраской верхней стороны тела с чёрными наствольными штрихами в центральной части спины. В гнездовой период на перьях спины в большей степени сохраняются следы светлых краевых каёмок, обнашивающихся у птиц этой расы позже, чем у самцов других подвидов. Верх головы, поясок на груди и пестрины на боках нижней стороны тела коричневые с черноватым оттенком. Окраска низа лимонно-жёлтая, в среднем бледнее, чем у других подвидов.

Камчатку и юго-западную оконечность Корякского нагорья населяет *O. a. kamtschatica* (Stantchinsky, 1929), отличающийся более чистой и наиболее светлой каштановой окраской верхней стороны тела. Чёрные штрихи на спине отсутствуют или выражены минимально. Верх-

* Редькин Я.А. 2018. Подвиды дубровника Ocyris aureolus (Pallas, 1773) // *1-й Всероссийский орнитол. конгресс*. Тверь: 274.

няя сторона головы и поясок на груди практически без примеси черноватого оттенка. Пестрины на боках тела черновато-коричневые или чисто коричневые. Жёлтая окраска низа ярче, чем у номинативной расы. Размеры в среднем крупнее, чем у других подвидов.

O. a. ornatus (Shulpin, 1928) – наиболее тёмноокрашенный подвид, населяющий восточную часть Забайкалья, Приамурье, Приморье, северо-восточный Китай и Северную Корею. Чёрный цвет в окраске оперения развит больше, чем у других форм. Лоб и темя часто полностью чёрные. Пестрины в центральной части спины широкие, иногда перья этой партии целиком чёрные. В окраске пояска и боков груди чёрный оттенок обычно преобладает над коричневым. Пестрины на боках живота целиком чёрные. Коричневый цвет верха темнее, чем у всех прочих подвидов. Жёлтая окраска нижней стороны тела очень насыщенная.

Островной подвид *O. a. insularis* (Portenko, 1960) отличается от соседнего материкового *ornatus* значительно меньшим развитием чёрной окраски. Пестрины на спине более узкие, у некоторых особей отсутствуют. Черноватый оттенок выражен только на лбу и обычно не заходит на темя. Поясок и бока груди в основном коричневые с небольшой примесью чёрного цвета. Пестрины на боках живота черновато-коричневые. Коричневая окраска верхней стороны тела светлее и ярче, чем у *ornatus*, но при этом темнее, чем у *aureolus* и *kamtschatica*. Нижняя сторона ярко-жёлтая. Населяет Сахалин, Хоккайдо и южные острова Курильской гряды.

Ещё одна форма, *O. a. suschkini* (Stantchinsky, 1929), описана из северо-западной части Монголии. Самцы этой расы отличаются от птиц номинативного подвида более яркой и однотонной окраской верхней стороны тела, с меньшим развитием чёрных продольных пестрин, но большей шириной черноватого поля на лбу, коричневыми пестринами на боках и очень яркой жёлтой окраской нижней стороны тела. Гнездовой ареал расы охватывает большую часть котловины Больших Озёр и Хангай. Для подтверждения реальности и уточнения пределов распространения *O. a. suschkini* необходимо привлечение дополнительных коллекционных материалов.

Литература

Коблик Е.Ф., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-279.

Мальцев В.В. 1938. Материалы к изучению изменчивости дубровника *Emberiza aureola* Pall. // *Бюл. МОИП*. Нов. сер. Отд. биол. **47**, 5/6: 374-382.

Портенко Л.А. 1939. Фауна Анадырского края. Птицы. Ч. 1 и 2 // *Тр. Науч.-исслед. ин-та полярного земледелия, животноводства и промысл. хоз-ва*. Сер. Промысл. хоз-во **5**: 5-211, 6: 4-198.

Портенко Л.А. 1960. *Птицы СССР (Воробьиные)*. Ч. 4. М.; Л.: 1-415 (Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР. Вып. 69).

Портенко Л.А. 1962. Новые подвиды воробьиных птиц (Aves, Passeriformes). 2 // *Тр. Зоол. ин-та АН СССР* **30**: 385-394.
Станчинский В.В. 1929. Географическая изменчивость и распространение дубровника, *Emberiza aureola* Pall. // *Ежегодник Зоол. музея АН СССР* **29**: 243-265.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1586**: 1452-1453*

Дубровник *Ocyris aureolus* на Камчатке

Ю.Н.Герасимов, Н.Н.Герасимов

*Второе издание. Первая публикация в 2018**

Исследования динамики численности и биологии дубровника *Ocyris aureolus* на Камчатке проводили в 1976-2017 годах параллельно с изучением других воробьиных птиц. С учётами в период гнездования пройдено около 3000 км. Собраны сведения о сроках миграции и особенностях размножения.

На Камчатке дубровник продолжает оставаться обычным видом, хотя численность его уменьшилась. Основными его местообитаниями являются надпойменные террасы, поросшие разреженным белоберёзняком, заросли кустарников, чередующиеся с луговыми полянами, зарастающие молодыми деревьями брошенные сельскохозяйственные поля. В горы дубровник поднимается до высоты 1000 м н.у.м., где населяет лиственничные редколесья и заболоченную горную тундру с кустарником. Как и в других регионах, на Камчатке отмечено снижение численности дубровников. Однако в типичных местообитаниях он продолжает оставаться обычным, а на отдельных участках – даже многочисленным видом. Так, по материалам учётов 2014-2016 годов в белоберезняках центральных районов полуострова плотность населения составила 14.0-20.7 пары на 1 км^2. Лишь в предгорьях на высотах от 500 м н.у.м она ниже – 1.2-3.8 пар/км^2. Самая высокая плотность населения отмечена на зарастающих молодыми деревьями полях. На юго-западном побережье в 2016 году она составила 14.8-29.6 пар/км^2 (третий по численности вид), а в центре полуострова в окрестностях села Эссо в 2014 году – до 57.7 пар/км^2 (самый многочисленный вид).

На двух мониторинговых площадках в 2008-2014 годах произошло снижение плотности населения дубровника в несколько раз. Однако на одной из этих площадок, расположенной в кустарниковых зарослях восточного побережья полуострова, за последние 3 года численность

* Герасимов Ю.Н., Герасимов Н.Н. 2018. Дубровник на Камчатке // *1-й Всероссийский орнитол. конгресс*. Тверь: 73-74.

дубровников существенно возросла, и в итоге тренд изменения плотности населения за период с 2011 по 2017 год оказался положительным.

Весной дубровники прилетают на Камчатку в период с 27 мая по 2 июня; миграция продолжается до 10-15 июня. Самцы поют до конца июля, изредка и в первой декаде августа. К строительству гнёзд самки приступают с конца первой декады июня. Откладка яиц происходит со второй декады июня. Насиживают кладку оба партнёра. Некоторые дубровники откладывают две кладки за сезон. Кладки второго цикла размножения, состоящие из 3-4 яиц, появляются во второй – начале третьей декады июля.

Все найденные гнёзда располагались на земле. Большинство из них были устроены в небольших углублениях в почве, 2 – в углублении, сделанном птицами в зелёном мху, 1 – в ямке, вырытой в слое вулканического пепла. Большинство (63%) гнёзд было сделано полностью из травы, снаружи более толстой. В 11% случаев во внешней конструкции гнезда, помимо травы, содержалось немного зелёного мха. В подстилке, кроме тоненьких травинок, отмечены чёрные нитевидные гифы грибов (16% найденных гнёзд), спорогонии мхов (16%), крупные белые перья (11%) и шерсть собаки (6%). Размеры гнёзд, мм: внешний диаметр 85-146, в среднем 105±15; диаметр лотка 45-93, в среднем 62±10; глубина лотка 30-57, в среднем 47±9 (n = 17). Полная кладка состоит из 5-6, в среднем из 5.3 яйца (n = 13). Размеры яиц, мм: 17.9-22.8×14.2-16.9, в среднем 20.3±0.9×15.2±0.6 (n = 71); вес яиц, г: 2.3-2.5, в среднем 2.4 (n = 6).

Осенняя миграция дубровников проходит в августе, самые поздние регистрации (птицы были отловлены) – 3 сентября 1993, 3 сентября 1996 и 9 сентября 2016.