ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1633
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1633

СОДЕРЖАНИЕ

3149-3160 Материалы к фауне птиц юго-восточного Алтая. Н.В.ЦАПКО, Д.Э.АБИБУЛАЕВ

3160-3164 О распространении серого гуся *Anser anser* в Закарпатской области. В.Н.ГЛЕБА

3164-3169 Новые места и случаи размножения большого крохаля *Mergus merganser* в Псковской области. Г.Л.КОСЕНКОВ, С.А.ФЕТИСОВ

3169-3170 Ходулочник *Himantopus himantopus* в Магаданской области. А.Я.КОНДРАТЬЕВ

3170-3171 Необычная находка среднего кроншнепа *Numenius phaeopus* в Кировской области. В.Н.СОТНИКОВ, С.Ф.АКУЛИНКИН

3171-3172 Уникальное сообщество куликов на севере Западной Сибири. В.Г.ВИНОГРАДОВ, В.Г.КРИВЕНКО, А.Д.ПАРФЁНОВ

3173 Расширение ареала американского бекасовидного веретенника *Limnodromus scolopaceus:* размножение на Восточном Таймыре. И.И.ЧУПИН

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования 28 июня 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1633

CONTENTS

3149-3160 Materials on the fauna of birds of the southeastern Altai. N.V.TSAPKO, D.E.ABIBULAEV

3160-3164 On distribution of the greylag goose *Anser anser* in the Transcarpathian Oblast. V.N.GLEBA

3164-3169 New places and events of breeding of the goosander *Mergus merganser* in the Pskov Oblast. G.L.KOSENKOV, S.A.FETISOV

3169-3170 The black-winged stilt *Himantopus himantopus* in the Magadan Oblast. A.Ya.KONDRATIEV

3170-3171 An unusual find of the whimbrel *Numenius phaeopus* in the Kirov Oblast. V.N.SOTNIKOV, S.F.AKULINKIN

3171-3172 A unique community of waders in the north of Western Siberia. V.G.VINOGRADOV, V.G.KRIVENKO, A.D.PARFENOV

3173 Expansion of the long-billed dowitcher *Limnodromus scolopaceus:* breeding on eastern Taimyr. I.I.CHUPIN

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1633****: 3149-3160*

Материалы к фауне птиц юго-восточного Алтая

Н.В.Цапко, Д.Э.Абибулаев

Николай Владимирович Цапко. Ставропольский противочумный институт, ул. Советская, 13/15, Ставрополь, 355009, Россия. E-mail: capko-1982@yandex.ru
Дилявер Энверович Абибулаев. Алтайская противочумная станция, ул. Заводская, д. 2, г. Горно-Алтайск, 649002, Россия. E-mail: vargafrost@mail.ru

Поступила в редакцию 14 июня 2018

Территория юго-восточной части Республики Алтай в пределах Кош-Агачского района представляет собой уникальный регион России как с точки зрения геоморфологии, так и с точки зрения состава флоры и фауны. Пестрота ландшафтов, где горные тундры соседствуют с каменистыми полупустынями, а заболоченная долина реки Чуя с многочисленными пойменными озёрами сменяется горными озёрами в альпийском поясе (рис. 1), способствует формированию своеобразной и специфической фауны птиц. Здесь гнездятся представители как таёжной или тундрово-лесной зоны, так и южные по происхождению виды, характерные для пустынной или степной зоны. Большая часть юго-востока Алтая безлесна, вследствие чего фауна птиц зональных ландшафтов представлена преимущественно кампофилами и склерофилами. Обилие грызунов (серый сурок *Marmota baibacina*, длиннохвостый суслик *Spermophilus undulatus*, полёвки) и зайцеобразных (монгольская *Ochotona pallasi*, даурская *O. dauurica* и алтайская *O. alpina* пищухи, толай *Lepus tolai)* способствует поддержанию плотной и довольно разнообразной гнездовой группировки хищных птиц. Данная территория издавна привлекала орнитологов, что и нашло отражение в большом объёме публикаций (Лоскот 1986; Нейфельд 1986; Ирисов 2009; Грибков и др. 2010; Эбель и др. 2012; Архипов и др. 2014, 2015; Гричик 2016).

В настоящем сообщении приведены материалы по фауне птиц Чуйской степи и прилежащих хребтов (Сайлюгем, Южно-Чуйский, Чихачёва), собранные за период кратковременного пребывания здесь в третьей декаде августа 2017 года. В Чуйской степи наблюдения велись в окрестностях посёлка Ташанта и села Кош-Агач, откуда проводились радиальные маршруты по прилежащим хребтам и ущельям рек: 17 и 23 августа – в долину реки Елангаш, 18 и 22 августа – на реку Богуты и озеро с одноименным названием, 21 августа – в долину реки Сербисту, 24 августа – в долину реки Юстыд и озеро Киндыктыкуль, 25 августа – в долину реки Бар-Бургазы, 19 и 27-29 августа – в долину реки Уландрык с притоками. В статью также включены наблюдения одного из авторов, проведённые в предыдущие годы.

Рис. 1. Опустыненные склоны предгорий в долине реки Уландрык и озера Богуты. Фото Н.В.Цапко.

Чернозобая гагара *Gavia arctica*. Встречается на высокогорных озёрах, в частности на озере Киндыктыкуль (рис. 2). Мы наблюдали одиночную птицу здесь 24 августа. Очевидно, что гагары гнездятся на этом озере, о чём свидетельствует наблюдение пары птиц в гнездовой период (Эбель и др. 2012).

Рис. 2. Чернозобая гагара *Gavia arctica*. Озеро Киндыктыкуль, 31 июля 2015. Фото Д.Э.Абибулаева.

Рис. 3. Черный аист *Ciconia nigra*. Пойма реки Чуя, 18 сентября 2015. Фото: Д.Э.Абибулаева.

Серая цапля *Ardea cinerea*. На окружающих село Кош-Агач озёрах цапли были довольно обычны и достаточно часто встречались поодиночке и небольшими группами. Несколько птиц наблюдалось на озере Киндыктыкуль.

Чёрный аист *Ciconia nigra*. Регулярно встречается только в долине реки Чуя (рис. 3). У южной окраины села Кош-Агач 23 августа по-

одиночке встречены 4 птицы, державшиеся неподалёку друг от друга. Аисты кормились на небольших пойменных озерцах, многочисленных в пойме Чуи. Возможно, встреченные птицы были парой со слётками, гнездовой участок которых выявлен неподалёку в 2013 году (Гричик 2016).

Колпица *Platalea leucorodia*. Редкий залётный вид. Две колпицы встречены 23 августа на небольшом озере в окрестностях села Кош-Агач. Практически все немногочисленные регистрации этих птиц в Республике Алтай приходятся на август (Эбель, Беляев 2015).

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. На озёрах у села Кош-Агач птицы встречались регулярно. Несколько больших бакланов наблюдалось на озере Киндыктыкуль.

Рис. 4. Выводки горных гусей *Eulabeia indica*. Озеро Киндыктыкуль, 24 августа 2017. Фото Д.Э.Абибулаева.

Рис. 5. Горные гуси *Eulabeia indica*. Озеро Адай, 26 августа 2016. Фото Д.Э.Абибулаева.

Горный гусь *Eulabeia indica*. В третьей декаде августа птицы регулярно отмечались на небольшом озерце в окрестностях села Кош-Агач, где в разные дни учитывалось от 6 до 10 птиц. Гуси кормились совместно с огарями, доставая что-то со дна озера, и практически всегда держались обособленными парами. Дважды горные гуси встречены на небольшом озерце в долине реки Юстыд северо-восточнее посёлка Ташанта. На озере Киндыктыкуль 24 августа учтено 5 пар с выводками (3, 4, 4, 4 и 5 птенцов одинакового возраста). Горные гуси держались двумя группами в разных частях озера. В одной группе две пары водили 9 птенцов (рис. 4), а в другой – 11. При этом пары с птенцами держатся несколько обособленно друга от друга, что позволяет без труда оценить величину выводка у отдельной пары. Молодые гуси были уже довольно крупные и достигали 3/4 размера взрослых. Помимо Киндыктыкуля, на котором размножение горных гусей было известно ранее (Архипов и др. 2015), выявлено ещё одно место гнездования этого вида. На озере Богуты (нижнее) 22 августа встречены 4 пары горных гусей. У трёх из них были выводки по 3, 3 и 4 гусят такого же воз-

раста, как и на Киндыктыкуле. Птицы также водили объединённый выводок, а пара без птенцов держалась отдельно. Крупная стая держалась на озере Адай по реке Богуты 26 августа 2016 (рис. 5). На сделанных фотоснимках удалось насчитать более 70 горных гусей. Это одно из самых крупных скоплений этого вида, зафиксированное в пределах российской части ареала.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Над посёлком Ташанта 17 августа в северном направлении пролетел один лебедь-кликун. Позже одна птица встречена на небольшом озере южнее села Кош-Агач, на котором ранее отмечалось размножение. В апреле 2015 года здесь найдено гнездо с насиживающей птицей (рис. 6).

Рис. 6. Гнездо лебедя-кликуна *Cygnus cygnus*.
Чуйская степь, 20 апреля 2015.
Фото: Д.Э.Абибулаева.

Рис. 7. Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*.
Чуйская степь, 21 мая 2015.
Фото Д.Э.Абибулаева.

Огарь *Tadorna ferruginea*. Характерная птица Чуйской степи. В пойме Чуи гнездится в дуплах тополей, а в прилежащих горах устраивает гнёзда в нишах под камнями или на скалах (Лоскот 1986; Нейфельд 1986; Гричик 2016). В конце лета крупные стаи наблюдались нами на озёрах в окрестностях села Кош-Агач.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Встречалась на степных озёрах у села Кош-Агач.

Серая утка *Anas strepera*. Пара серых уток встречена 24 августа на небольшом озерце у озера Киндыктыкуль.

Шилохвость *Anas acuta*. На одном из небольших озёр в котловине Киндыктыкуля 24 августа держались 2 самки.

Чирок-трескунок *Anas querquedula*. Нам эти птицы встретились однажды (2 самца) на небольшом озерце у села Кош-Агач. Некоторые авторы (Грибков и др. 2010) указывают на редкость этой утки в юго-восточном Алтае.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. Обычна и широко распространена на юго-востоке Алтая. Поселяется как на равнинных озёрах в долине Чуи (рис. 7), так и на высокогорных. На последних гнездование

установлено на озёрах Богуты и Киндыктыкуль. На первом 22 августа в небольшом заливчике, заросшем подводной растительностью, держалась одна самка с выводком из 6 утят в возрасте 7-10 дней. Один выводок 24 августа наблюдался на Киндыктыкуле. На расположенном несколько севернее соседнем небольшом озерце держалось ещё 3 выводка (по 3, 3 и 4 птенца) и около 20 взрослых уток.

Гоголь *Bucephala clangula*. На озере Богуты 22 августа держалась стайка из 8 птиц.

Чёрный коршун *Milvus migrans*. Фоновый вид хищных птиц Чуйской степи. Гнездится плотными поселениями в тополевниках по реке Чуя (Гричик 2016). Стаями держится в населённых пунктах, питаясь на свалках и скотных дворах. В посёлке Ташанта в некоторые дни мы учитывали до 50 коршунов. Одиночные птицы часто встречаются в соседних ущельях, где питаются остатками со стола падальщиков.

Мохноногий курганник *Buteo hemilasius*. В юго-восточном Алтае это обычная гнездящаяся птица. Мохноногие курганники регулярно встречались как в самой степи, так и прилежащих ущельях. Несколько гнездовых построек, располагавшихся на скалах, осмотрены нами в долинах рек Уландрык и Бар-Бургазы.

Степной орёл *Aquila nipalensis*. В прилежащих к степи ущельях изредка отмечались одиночные птицы. Чаще орлы встречались в ущелье Уландрыка, где совместно с другими падальщиками кормились на павших сурках.

Беркут *Aquila chrysaetos*. Эти орлы встречены нами только в ущелье реки Уландрык, где практически всегда вместе с грифами кормились на тушках погибших от чумы сурков. Две птицы совместно с чёрными грифами кормились на павшей корове в низовьях ущелья.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Редкий вид. На юго-востоке Алтая белохвост известен по единичным встречам (Архипов и др. 2014). Нами один взрослый орлан-белохвост наблюдался 24 августа на озере Киндыктыкуль.

Бородач *Gypaetus barbatus*. Одна молодая птица 17 августа держалась в ущелье Елангаша у животноводческой стоянки. Несколько чаще бородачи встречались в ущелье Уландрыка и его притоков. 26 августа здесь встречен слёток в сопровождении взрослых птиц. Возможно, это были птицы от гнезда, найденного здесь в начале июня 2017 года (Чупин и др. 2017). Птицы держались совместно с другими падальщиками.

Чёрный гриф *Aegypius monachus*. Характерный вид падальщиков юго-восточного Алтая. Гнездование установлено для северной части Чуйской степи в низовьях реки Чаган-Узун (Шнайдер 2015). Встречается регулярно (рис. 8). Три птицы поодиночке встречены в ущелье реки Елангаш 17 августа. Обычны грифы были в долине реки Уланд-

рык с притоками, где в это время наблюдалась эпизоотия чумы среди сурков, на трупах которых и кормились падальщики. В связи с небольшими размерами грызунов и как следствие их быстрой утилизацией на трупах сурков скапливалось не более 8-10 птиц. Обычно же около одной тушки держалось 3-5 грифов. Крупное скопление, в котором насчитывалось более 50 чёрных грифов, наблюдалось в низовьях ущелья Уландрыка 26 августа. Падальщики кормились на павшей корове, и при этом постоянно подлетали новые птицы.

Балобан *Falco cherrug*. Редкий вид. Встречен единожды. 26 августа одна самка сидела в степи недалеко от въезда в ущелье Уландрыка.

Дербник *Falco columbarius*. Довольно обычная птица Чуйской степи и прилежащих хребтов (рис. 9). Чаще всего дербник встречался у животноводческих стоянок и пограничных застав, где охотился на многочисленных здесь воробьиных птиц.

Рис. 8. Черные грифы *Aegypius monachus*.
Долина реки Большие Шибеты, 19 августа 2016.
Фото Д.Э.Абибулаева.

Рис. 9. Дербник *Falco columbarius*.
Озеро Киндыктыкуль, 24 августа 2017.
Фото Д.Э.Абибулаева.

Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus*. Широко распространённый вид. Птицы встречались по скалам в ущельях рек, а также в равнинной степи в окрестностях населённых пунктов.

Бородатая куропатка *Perdix dauurica*. В придорожных зарослях караганы *Caragana* sp. южнее села Кош-Агач 21 августа держалась стайка из 10 куропаток (возможно, пара с молодыми птицами).

Красавка *Anthropoides virgo*. Обычный вид по щебнистым и каменистым участкам Чуйской степи. Практически все встреченные в степи птицы держались семьями. Во всех парах (n = 7) было по 2 птенца размером немного меньше взрослых журавлей.

Лысуха *Fulica atra*. Гнездится на озёрах в Чуйской степи. Обычна в районе села Кош-Агач.

Малый зуёк *Charadrius dubius*. Одиночные зуйки встречались по галечниковым берегам рек в равнинной степи.

Чибис *Vanellus vanellus*. Несколько птиц 23 августа держались на берегу небольшого озера у села Кош-Агач.

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*. Относительно недавно начала встречаться на водоёмах северной части Чуйской степи (Эбель и др. 2012; Архипов и др. 2014), а вскоре здесь было отмечено её гнездование (Архипов и др. 2015). Нами шилоклювки наблюдались в мае 2015 года. Пять птиц держались на одном из озёр в Чуйской степи (рис. 10).

Рис. 10. Шилоклювки *Recurvirostra avosetta*. Чуйскай степь, 23 мая 2015. Фото: Д.Э.Абибулаева.

Рис. 11. Озёрные чайки *Larus ridibundus* на гнёздах. Чуйскай степь, 21 мая 2015. Фото Д.Э.Абибулаева.

Черныш *Tringa ochropus*. На берегу одного из озёр у села Кош-Агач 23 августа кормились две птицы.

Травник *Tringa totanus*. Гнездовая пара с двумя слётками держалась у небольшого пересыхающего озерца в котловине озера Киндыктыкуль. Взрослые птицы тревожились и пытались отводить от кормившихся на водоёме молодых травников. Активному нападению подвергался и чёрный коршун, пролетавший над озером.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Один кулик встречен 22 августа на берегу озера Богуты.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. На небольшом озерце южнее села Кош-Агач 21 августа наблюдалась одна птица. А 23 августа здесь держалось уже более 100 плавунчиков.

Кулик-воробей *Calidris minuta*. Около 10 птиц кормилось на небольшом водоёме у озера Киндыктыкуль совместно с травниками.

Белохвостый песочник *Calidris temminckii*. Один пролётный белохвостый песочник встречен на озерце в долине реки Чуя 23 мая 2015.

Бекас *Gallinago* sp. В долине реки Бар-Бургазы 25 августа на обочине полевой дороги встречена одна птица.

Озёрная чайка *Larus ridibundus*. Обычный вид. Гнездится на озёрах в окрестностях села Кош-Агач (рис. 11).

Монгольская чайка *Larus mongolicus*. Вид достаточно часто отмечался как в открытой равнинной степи, так и на озере Киндыктыкуль, где чайки гнездятся на острове в центре водоёма.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Гнездится на озёрах в Чуйской степи. Но в конце лета речные крачки здесь были уже редки. Нам встретилась всего одна птица в долине реки Богуты.

Саджа *Syrrhaptes paradoxus*. Характерный гнездящийся вид Чуйской степи. Иногда встречается стайками в несколько десятков особей (рис. 12). Две саджи встречены нами 17 августа в степи у обочины дороги.

Рис. 12. Стая саджи *Syrrhaptes paradoxus*. Чуйская степь, 24 апреля 2010.
Фото Д.Э.Абибулаев

Сизый голубь *Columba livia*. В небольшом числе гнездится в посёлке Ташанта и селе Кош-Агач.

Скальный голубь *Columba rupestris*. Стайка из 10 птиц встречена в окрестностях Ташанты. Дважды наблюдался у села Кош-Агач.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*. На окраине села Кош-Агач 23 августа у озера, наполовину заросшего тростником, встречена одна кукушка.

Домовый сыч *Athene noctua*. В ущелье реки Малые Шибеты 28 августа в небольшом скальнике отмечен одиночный сыч.

Чёрный стриж *Apus apus*. Наблюдался однажды. В равнинной степи в окрестностях посёлка Ташанта 21 августа в северном направлении пролетела стайка из 5 чёрных стрижей.

Удод *Upupa epops*. Встречается достаточно часто. Тяготеет к местам поселений человека: населённым пунктам, животноводческим стоянкам, пограничным заставам.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Обычный гнездящийся вид в населённых пунктах Чуйской степи.

Воронок *Delichon urbica*. Гнездится в Ташанте. В осмотренных гнёздах в третьей декаде августа воронки докармливали уже взрослых птенцов.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*. Фоновый вид как в равнинной каменистой, так и в высокогорной степи. В конце августа рогатые жаворонки встречаются стаями от нескольких десятков до сотен особей. Дважды встречены пары, докармливающие ещё не самостоятельных молодых (возможно, из повторных кладок).

Полевой конёк *Anthus campestris*. В конце августа небольшие стайки полевых коньков регулярно наблюдались в Ташанте, где кормились по выгонам и на территории подворий.

Горный конёк *Anthus spinoletta*. Встречался только в горной степи, явно тяготея к выходам скал и каменистым осыпям.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. Встречалась редко. Несколько одиночных горных трясогузок отмечено в долинах рек Богуты и Елангаш.

Маскированная трясогузка *Motacilla personata*. Обычная и широко распространённая гнездящаяся птица. Встречается в населённых пунктах, у животноводческих стоянок, а также в естественных местообитаниях у различного рода водотоков.

Рыжехвостый жулан *Lanius isabellinus*. Встречался только в равнинной степи. Несколько раз одиночные птицы, державшиеся в зарослях караганы, наблюдались в окрестностях села Кош-Агач. Один жулан 21 августа держался в посёлке Ташанта.

Скворец *Sturnus vulgaris*. Небольшие стайки и одиночные птицы встречались только на окраине села Кош-Агач.

Сорока *Pica pica*. Довольно обычна по долинам рек.

Клушица *Pyrrhocorax pyrrhocorax*. Обычная птица. Встречается повсеместно, явно тяготея к поселениям человека. Постоянно держится в посёлке Ташанта, где гнездится на чердаках частных домов. Одно гнездо, располагавшееся на копне сена под навесом, найдено на одной из погранзастав в долине реки Уландрык. В естественных местообитаниях гнездится на скалах, крутых осыпях, высоких останцах. В долине реки Бар-Бургазы 25 августа гнездо клушицы найдено на невысоком скальном останце. На этом же останце располагалось гнездо мохноногого курганника.

Грач *Corvus frugilegus*. Довольно редкий вид, лишь в последние годы начавший заселять Чуйскую степь. Впервые взрослые грачи от-

мечены здесь 24 апреля 2010 в посёлке Ташанта. В последующие годы стал отмечаться регулярно. Очевидно, что грачи размножаются в долине Чуи, так как в послегнездовой период в стаях отмечаются молодые птицы.

Даурская галка *Corvus dauuricus*. Встречалась только в населённых пунктах северной части Чуйской степи (Кош-Агач, Ортолык, Чаган-Узун).

Чёрная ворона *Corvus orientalis*. Встречается небольшими стаями и одиночками в степи. Чаще наблюдалась в северной части Чуйской степи в районе и непосредственно в самих населённых пунктах.

Ворон *Corvus corax*. Распространён широко и в некоторых местах обычен. Один ворон, клевавший труп сурка, встречен в долине реки Елангаш. В равнинной степи в окрестностях села Кош-Агач 21 августа наблюдались 1 и 2 птицы. Часто вороны встречались в долине Уландрыка, где вместе с другими падальщиками кормились на погибших от чумы сурках.

Оляпка *Cinclus cinclus*. Редкий вид, встреченный единожды. Одиночная птица наблюдалась 19 сентября 2015 на берегу реки Чуя.

Бледная завирушка *Prunella fulvescens*. Обычный вид. Чаще всего птицы отмечались на животноводческих стоянках по долине реки Уландрык. Большей частью встреченные птицы держались парами.

Тусклая зарничка *Phylloscopus humei*. Интенсивный пролёт протекал в конце августа. Несколько десятков пеночек совместно с другими воробьиными держались в кустарниковых зарослях в долине реки Малые Шибеты. Несколько одиночных птиц встречено 24 августа на одной из животноводческих стоянок у озера Киндыктыкуль.

Серая мухоловка *Muscicapa striata*. Одиночная пролётная птица несколько дней держалась в посёлке Ташанта.

Азиатский черноголовый чекан *Saxicola maurus*. Одиночные чеканы встречались регулярно как в равнинной степи, так и по шельфам хребтов, примыкающих к Чуйской котловине.

Большой чекан *Saxicola insignis*. Два самца встречены недалеко друг от друга 19 августа в одном из левых притоков реки Уландрык в точке с координатами 49.634541° с.ш., 89.030242° в.д.. Чеканы наблюдались непродолжительное время, постоянно перелетая с места на место и досконально рассмотреть их не удалось. Но было явственно заметно, что эти птицы несколько крупнее черноголовых чеканов, наблюдавшихся в это же время в равнинной степи.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Обычный вид. Встречается в окрестностях населённых пунктов и животноводческих стоянок, где гнездится. В естественных местообитаниях населяет каменистые россыпи, места выхода скал, останцы в открытой местности.

Каменка-плясунья *Oenanthe isabellina*. Обычный и широко рас-

пространённый вид, встречающийся как в равнинной степи, так и на выровненных участках шлейфов хребтов, примыкающих к Чуйской степи. Гнездится в норах пищух и сусликов.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus*. Явно пролётные птицы отмечены только в Ташанте.

Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros*. Одиночная птица встречена 29 августа в скалах ущелья реки Малые Шибеты.

Красноспинная горихвостка *Phoenicurus erythronotus*. В Ташанте наблюдалась одна птица.

Краснобрюхая горихвостка *Phoenicurus erythrogaster*. На одной из животноводческих стоянок в верховьях реки Елангаш 17 августа держалась пара краснобрюхих горихвосток. При этом одна из них постоянно преследовала маскированную трясогузку.

Соловей-красношейка *Luscinia calliope*. В низовьях Уландрыка на одной из животноводческих стоянок 26 августа встречена одна пролётная птица.

Варакушка *Luscinia svecica*. Одиночная птица наблюдалась в долине реки Малые Шибеты.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Гнездится в населённых пунктах.

Полевой воробей *Passer montanus*. Встречался реже предыдущего вида. Один воробей 26 августа встречен в долине реки Уландрык.

Каменный воробей *Petronia petronia*. Гнездится в Ташанте под крышами строений. В августе в гнёздах ещё были птенцы. Помимо этого, гнездо каменного воробья найдено в заброшенной постройке в верховьях Бар-Бургазы и ещё одно гнездо – в трещине стены заброшенной стоянки в долине реки Уландрык. В обоих случаях в гнёздах находились мёртвые птенцы, запутавшиеся в конском волосе.

Снежный воробей *Montifringilla nivalis*. Дважды пары снежных воробьёв отмечены в низовьях Уландрыка в нагорной степи. Одиночная птица встречена 27 августа в долине реки Малые Шибеты.

Горная чечётка *Acanthis flavirostris*. Обычный гнездящийся вид. Крупные стаи горных чечёток постоянно встречались в нагорной степи у животноводческих стоянок, где кормились на сорной растительности и в местах скопления навоза.

Чечевица *Carpodacus erythrinus*. Одна чечевица наблюдалась 29 августа в кустарниковых зарослях по реке Малые Шибеты.

Садовая овсянка *Emberiza hortulana*. Одиночные птицы встречались в долинах рек Сербисту, Малые Шибеты и в посёлке Ташанта.

Литература

Архипов В.Ю., Беляев И.А., Кондрашов Ф.А., Михайлов К.Е., Писаревский С.В., Шнайдер Е.П., Эбель А.Л. 2014. К распространению и фенологии некоторых неворобьиных птиц Горного Алтая // *Рус. орнитол. журн.* **23** (972): 563-576.

Архипов В.Ю., Мурашёв И.А., Эбель А.Л. 2015. Сведения о современном состоянии некоторых видов птиц Красной Книги Республики Алтай и предложения по дополнению этого перечня // *Исчезающие, редкие и слабо изученные виды животных и их отражение в Красной книге Республики Алтай прошлых и будущего изданий (критика и предложения)*. Горно-Алтайск: 76-81.

Грибков А.В., Гармс О.Я., Рябицев В.К., Рябицев А.В. 2010. К фауне птиц хребта Сайлюгем и его окрестностей (Юго-Восточный Алтай) // *Рус. орнитол. журн.* **19** (593): 1515-1561.

Гричик В.В. 2016. Материалы к распространению и биологии птиц юго-восточного Алтая (неворобьиные) // *Орнитология* **40**: 46-61.

Ирисов Э.А. 2009. *Птицы Юго-Восточного Алтая*. Барнаул: 1-180.

Лоскот В.М. 1986. Материалы по птицам окрестностей Ташанты (Юго-Восточный Алтай) // *Распространение и биология птиц Алтая и Дальнего Востока*. Л.: 44-56.

Нейфельдт И.А. 1986. Из результатов орнитологической экспедиции на Юго-Восточный Алтай // *Распространение и биология птиц Алтая и Дальнего Востока*. Л.: 7-43.

Чупин И.И., Ходукин Е.Н., Кужлеков А.О., Маликов Д.Г. 2017. О гнездовании бородача *(Gypaetus barbatus)* в Юго-Восточном Алтае // *Алтай. зоол. журн.* **13**: 49-54.

Шнайдер Е.П. 2015. Новые данные о гнездящихся чёрных грифах в Республике Алтай, Россия // *Пернатые хищники и их охрана* **31**: 153-155.

Эбель А.Л., Елисеев С.Л., Уколов И.И., Чернышев О.Г., Вурман Д.Э. 2012. К фауне птиц Горного Алтая // *Рус. орнитол. журн.* **21** (766): 1367-1380.

Эбель А.Л., Беляев И.А. 2015. О новых залётах обыкновенной колпицы *Platalea leucorodia* в Республику Алтай // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1184): 3155-3156.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1633**: 3160-3164*

О распространении серого гуся *Anser anser* в Закарпатской области

В.Н.Глеба

Василий Николаевич Глеба. Украинское общество охраны птиц, ул. Центральная, д. 148, пгт. Королёво, Виноградовский район, Закарпатская область, 90332, Украина.
E-mail: glebasileus@mail.ru

Поступила в редакцию 19 июня 2018

Согласно последней орнитологической сводке, серый гусь *Anser anser* является сейчас только пролётным видом птиц в Закарпатской области Украины (Потіш 2009). За данными А.Грабара, серый гусь гнездился здесь в XIX веке в большом числе, но после осушительных работ он, как и другие виды птиц водно-болотного комплекса, постепенно начал снижать численность (Грабар 1997). И если во времена А.Грабара, проводившего свои исследования в первой трети XX века, гуси ещё гнездились кое-где в местах, пригодных для этого, то уже через 30 лет они стали встречаться только на пролёте (Страутман 1963, Талпош 1969). При этом первый из авторов отмечает уменьшение чис-

ленности серого гуся на гнездовании не только в западных областях Украины, но и в Центральной Европе (Страутман 1963).

Орнитологи, изучавшие миграции гусей рода *Anser* в восточных Карпатах, отмечают, что среди трёх видов этого рода, постоянно мигрирующих здесь, серые гуси составляют меньшинство (Луговой, Потиш 1996). Причиной этого, по мнению авторов, является то, что серые гуси из ближайших гнездовых популяций (в Венгрии, Чехии, Румынии) облетают Карпаты южнее и западнее, не попадая в Закарпатье.

В связи с вышесказанным интересным явлением оказалось обнаружение нами гнездовой группы серых гусей на одном из рыборазводных прудов Закарпатской области. С 2013 по 2018 год мы проводили наблюдения на пруду «Сальва» возле города Виноградов. Особенностью этой небольшой группы гусей стало то, что они вели оседлый образ жизни. В указанные годы наблюдались довольно мягкие зимы, что давало возможность птицам перезимовывать. Иногда, когда водоём полностью замерзал на короткое время, гуси всё равно оставались здесь, не отлетая южнее. Они кормились растениями на берегу.

Когда серые гуси впервые появились на пруду, точно неизвестно, возможно, это произошло после 2008 года, когда в апреле одна пара гусей задержалась здесь на длительное время (Потіш 2009).

Первых серых гусей на Сальве мы отметили 11 апреля 2013. Пара птиц кормилась на дамбе, окружающей пруды. При приближении наблюдателя гуси взлетели и перелетели на противоположную сторону водоёма. 22 ноября 2013 здесь отмечена стая из 11 гусей, которая здесь перезимовала.

Рис. 1. Зимующая группа серых гусей *Anser anser* на прудах Сальва. Виноградов, Закарпатская область. 24 декабря 2014. Фото автора.

В 2014 году на прудах отметили группу из 12 гусей, которые держались здесь весь год (рис. 1). Из них две пары вывели птенцов. Так, 24 апреля мы наблюдали две семьи гусей, кормящиеся вместе. На сделанных нами видеоматериалах видны 4 взрослые птицы и около 10 птенцов (рис. 2).

Рис. 2. Две семьи серых гусей *Anser anser*, кормящиеся вместе на Сальве. Виноградов, Закарпатская область. 5 мая 2014. Фото автора.

Рис. 3. Группа серых гусей *Anser anser*, совершающая облёт вокруг прудов Сальвы. Виноградов, Закарпатская область. 6 ноября 2015. Фото автора.

В 2015 году приблизительно такое же количество взрослых серых гусей держались на прудах целый год (рис. 3). 5 марта отмечено 10 разбившихся на пары гусей, плавающих на центральном секторе прудов вместе с парой шипунов *Cygnus olor*. 27 апреля у одной пары гусей отмечен лишь единственный птенец. 7 мая здесь кормилась стая из 12 взрослых гусей.

В 2016 году с десяток гусей продолжали держаться до осени. Хотя гуси были разбиты на пары ещё с весны, птенцов увидеть не удалось. Причиной тому стало сильное зарастание тростником и рогозом той

части прудов, где гуси предположительно устраивали гнёзда. Осенью, того же года (1 октября) на центральном обмелевшем секторе прудов нами наблюдалась группа из 34 взрослых гусей (рис. 4). А 28 ноября здесь отдыхала стая из 49 птиц. Возможно, что число гусей возросло за счёт пролётных особей, которые могли услышать отдыхающих местных гусей на Сальве и подсесть к ним.

Рис. 4. Часть группы серых гусей *Anser anser*, отдыхающих вместе с кряквами *Anas platyrhynchos* на Сальве. Виноградов, Закарпатская область. 1 ноября 2016. Фото автора.

В 2017 году до осени здесь продолжало держаться 5-6 пар гусей. В конце сентября (26 сентября) на водоёме отмечено около 30 гусей. А уже 7 октября здесь мы насчитали 115 серых гусей. Птицы летали над водоёмом, потом приводнились на середине центрального сектора. Эти птицы явно были мигрантами, остановившимися на отдых во время перелёта, так как в ноябре (15 ноября) здесь осталось 69 гусей, которые в декабре уже не отмечались.

В первой половине 2018 года серые гуси продолжали держаться на водоёме в количестве нескольких пар.

Таким образом, исходя из представленных данных, можно говорить о появлении серого гуся на гнездовании в Закарпатской области в небольшом числе (5-6 пар) с оседлым характером пребывания на этой территории.

Литература

Грабар А. 1997. Птицы Подкарпатской Руси (Avifauna Carpatorossica) // *Беркут* **6**, 1/2: 91-102.

Луговой А.Е., Потиш Л.А. 1996. Миграции гусей рода Anser в регионе Восточных Карпат // *Беркут* **5**, 1: 71-78.

Потіш Л.А. 2009. *Птахи Закарпатської області (анотований список)*. Львів. 1-124.

Страутман Ф.И. 1963. Птицы западных областей УССР. Львов, **1**: 1-199, **2**: 1-187.

Талпош В.С. 1969. *Птицы Закарпатской низменности*. Автореф. дис. … канд. биол. наук. Киев: 1-22.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1633****: 3164-3169*

Новые места и случаи размножения большого крохаля *Mergus merganser* в Псковской области

Г.Л.Косенков, С.А.Фетисов

Геннадий Леонидович Косенков, *Сергей Анатольевич Фетисов*. Национальный парк «Себежский», ул. 7 Ноября, 22, Себеж, Псковская область, 182250, Россия. E-mail: kraeved09@yandex.ru

Поступила в редакцию 16 июня 2018

До 1970-х годов южная граница гнездового ареала номинативного подвида большого крохаля *Mergus merganser merganser* проходила по Псковской области в направлении «от Прибалтики к водоразделу Северной Двины и Волги» (Иванов 1976). Детали распространения оставались в этом регионе неизвестными. Позднее границу ареала стали проводить несколько южнее Псковской области: от Прибалтики по северной Белоруссии, в частности Витебской области*, нередко по Минской и Гомельской областям (Никифоров и др. 1997; Никифоров, Павлющик 2002; Никифоров, Самусенко 2003; и др.). Наряду с этим, выявлено гнездование большого крохаля в северо-западной части Смоленской области (Те и др. 2006), разных районах Псковской области (Яблоков 2004а,б; Фетисов, Дроздецкий 2005; Яблоков, Васильев 2006) и на водоразделе Волги и Западной Двины в Тверской области (Николаев 1998, 2000). К западу от Псковского Поозерья известны отдельные случаи гнездования большого крохаля в восточной части Латвии (Приедниекс и др. 1989).

В Псковской области большой крохаль известен давно, но прежде всего как пролётная птица, причём на Псковско-Чудском озере он бывает довольно обычен как весной, так и осенью (Зарудный 1910; Бианки 1922; Леус 1961; Каменев 1962; Мешков 1963; Урядова, Щеблыкина 1993). Случаи же его гнездования на псковских водоёмах до сих пор весьма редки и малоизвестны. Двумя основными причинами, препятствующими гнездованию этого вида в области, служат, по-видимому,

* После критического пересмотра опубликованных ранее сведений выяснилось, что на начало 2000-х годов достоверно известно всего несколько мест гнездования большого крохаля в Белоруссии, причём 3 из них – в Витебской области. Так, 15-20 пар гнездилось на озёрах национального парка «Браславские озёра», 5-10 пар зарегистрировано на озёрах группы «Синьша», а один выводок наблюдали в Россонском районе в 13 км от деревни Юховичи, близ границы с национальным парком «Себежский» (Никифоров 2001; Бирюков 2010, 2014; Гричик, Парейко, Яминский 2004).

фактор беспокойства птиц со стороны человека и дефицит естественных убежищ для гнездования. Так или иначе, но с 2013 года большой крохаль внесён в Красную книгу Псковской области (Приказ… 2013), хотя в соседнем с ней Белорусском Поозерье наблюдается прямо противоположная картина: из категории исключительно редких видов большой крохаль переведён в группу редких или малочисленных птиц (Дорофеев, Кузьменко 2000). Стабилизация и увеличение численности большого крохаля зарегистрированы и в национальном парке «Смоленское Поозерье» (Те и др. 2000).

По сведениям, изложенным в региональной Красной книге (Яблоков 2014), большой крохаль встречается в период гнездования и размножается лишь в 3 районах Псковской области: Плюсском, Порховском и Локнянском (рис. 1). В частности, дважды (8 июля 1999 и 12 июля 2000) самок с выводками наблюдали в среднем течении Плюссы между деревнями Малое Захонье и Кошелевицы (Яблоков 2004а,б), а третий выводок М.С.Яблоков и С.Н.Васильев (2006) встретили 30 июня 2002 в среднем течении Шелони, примерно в 3 км выше деревни Боровичи в Порховском районе. Кроме того, несомненный интерес представляет встреча самки большого крохаля 15 июня 2003 в самой южной части реки Локни, где она проявляла беспокойство возле определённого участка берега, но обнаружить выводок, к сожалению, не удалось (Яблоков 2004а,б).



Рис. 1. Места летних встреч и размножения большого крохаля в Псковской области.
а – по: Яблоков 2014; б – по данным, известным авторам статьи:
○ – места пребывания крохалей в гнездовой период; ● – места встреч выводков.

Наши наблюдения за последние 35 лет показали, что большой крохаль распространён в Псковской области значительно шире, чем об этом сообщается в Красной книге Псковской области.

Первым местом, где доказано размножение большого крохаля на Псковщине, является озеро Большой Иван в Невельском районе. Ещё в 1925 году А.И.Аверкович добыл там самку и птенца в пуховом наряде из выводка в 13 особей (Федюшин 1926), что дало основание внести большого крохаля в список гнездящихся птиц Псковской области.

После этого в период гнездования одиночных крохалей и стайки, насчитывающие до 5 особей и состоявшие чаще из самок, регистрировали: в июле 1996 – на озере Уклейно в Себежском районе (Фетисов и др. 2002); в июле 1997 – в залитом водой щебёночном карьере на левом берегу реки Великой в урочище Выбутские пороги в Псковском районе (Фетисов и др. 1997); в июле 1998 – на пруду в деревне Борки в Псковском районе и на Петровском озере в Дедовичском районе (Тарасов 2005); в 2000 году – на озере Вятитерьво в национальном парке «Себежский» (Потебня, Тарасов 2001).

В 1999 году в Псковской области, наконец, стали встречаться самки большого крохаля с выводками. В 1999-2000 годах было, как указано выше, 3 встречи самок с выводками в Плюсском и Порховском районах и встреча самки в 2002 году на гнездовом участке в Локнянском районе (Яблоков 2014). В 2005 году отмечено не менее 5 самок и более 30 птенцов на отрезке реки Великой между деревней Заозерье, расположенной перед впадением реки в озеро Езерище в Пустошкинском районе и деревней Холое в Себежском районе (Фетисов, Дроздецкий 2005; Фетисов 2009). В 2015 году выводок из 6 птенцов держался на Себежском озере в национальном парке «Себежский» (Фетисов 2015).

Помимо того, высказывались предположения о возможности гнездования большого крохаля на побережье Псковско-Чудского озера (Каменев 1962), в том числе в низовьях рек Пимжа и Обдёх, впадающих в юго-западную часть Псковского озера (Бардин 2000), а М.М. Мешков (1974) сообщал о гнездовании этого вида в Псковской области, но полученные им данные нуждались, по его мнению, в проверке. Тем не менее, в 2006 году большого крохаля вновь включили в группу водоплавающих птиц, размножающихся на восточном побережье Тёплого и Чудского озёр (Борисов, Урядова, Щеблыкина 2006), правда, без какого-либо фактического тому подтверждения.

В мае-июне 2018 года нам удалось найти ещё 2 выводка большого крохаля: один – на озере Озерявы в национальном парке «Себежский» (в Себежском районе), другой – на реке Великой в урочище Выбутские пороги (в Псковском районе). 29 мая 2018 удалось сфотографировать самку большого крохаля с выводком из 8 пуховичков (рис. 2), державшихся на втором (центральном) плёсе озера Озерявки. Несмотря на

регулярную развеску в национальном парке гоголятниц, поблизости от места, где держался выводок, искусственных гнездовий не было.



Рис. 2. Самка большого крохаля *Mergus merganser* с птенцами на озере Озерявы в национальном парке «Себежский». 29 мая 2018. Фото авторов.

Рис. 3. Выводок большого крохаля *Mergus merganser* на реке Великой в урочище Выбутские пороги. 6 июня 2018. Фото авторов.

Другой выводок большого крохаля (рис. 3) удалось наблюдать 6 и 7 июня 2018 на реке Великой примерно в 8 км выше Пскова. Вечером самка с 8 пуховичками (рис. 3) – возможно, вынужденно – плыла вниз по течению, скорее всего, избегая встреч с рыбаками-любителями, входившими в воду на мелководьях в урочище Выбутские пороги. За время наблюдений самка с выводком спустились по реке от погоста до деревни Ерусалимки; один птенец отстал от выводка, и его дальнейшая судьба неизвестна.

Литература

Бардин А.В. 2000. *Инвентаризация орнитофауны Печорского района для составления видового кадастра птиц и формирования кадастра ООПТ Псковской области*. Отчёт по договору № 510 между Комитетом природных ресурсов по Псковской области и Балтийским фондом природы. СПб.: 1-69 (рукопись).

Бианки В.Л. 1922. Распространение птиц в северо-западной части Европейской России // *Ежегодник Зоол. музея Акад. наук* **23**, 2: 97-128.

Бирюков В.П. 2010. Материалы по гнездованию большого крохаля *Mergus merganser* на озёрах бассейна Западной Двины (в пределах Белоруссии) // *Рус. орнитол. журн.* **19** (546): 156-158.

Бирюков В.П. 2014. К биологии гнездования большого крохаля *Mergus merganser* в национальном парке «Браславские озёра» // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1073): 3706-3709.

Борисов В.В., Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. 2006. Результаты предварительного исследования орнитофауны северной части восточного побережья Тёплого озера и восточного побережья Чудского озера в 2004-2006 гг. // *Рекреационно-туристический потенциал Северо-Запада России. Материалы международ. (рос.-белорус.) обществ.-науч. конф. Статьи и тезисы*. Псков: 131-135.

Гричик В.В., Парейко О.А., Яминский Б.В. 2004. Гнездование большого крохаля *Mergus merganser* в Белоруссии // *Рус. орнитол. журн.* **13** (269): 752-755.

Дорофеев А.М., Кузьменко В.Я. 2000. Ретроспективный обзор фауны гнездящихся птиц Белорусского Поозерья // *Фауна и экология птиц бассейна реки Западная Двина. Материалы международ. научн. конф*. Витебск: 23-25.

Зарудный Н.А. 1910. Птицы Псковской губернии // *Зап. Импер. Акад. наук по физ.-мат. отд*. Сер. 8. **25**, 2: 1-181.

Иванов А.И. 1976. *Каталог птиц СССР*. Л.: 1-276.

Каменев В.М. 1962. *Водоплавающие и болотные птицы Чудского озера (Пейпси)*. Дипломная работа. Л.: 1-78 (рукопись).

Леус С.И. 1961. Общая характеристика миграции водоплавающих птиц на Псковском озере осенью 1956, 1958 и 1959 гг. // *Экология и миграции птиц Прибалтики*. Рига: 207-213.

Мешков М.М. 1963. Осенний пролёт птиц в 1959-1961 гг. на восточном побережье Псковского озера // *Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц* **2**: 43-58.

Мешков М.М. 1974. Развитие орнитофаунистических работ в Псковской области // *Ornitol. kogumik* **7**: 67-77.

Никифоров М.Е. 2001. Белорусская орнито-фаунистическая комиссия: обзор сообщений о наиболее редких находках за 1990-1999 гг. // *Subbuteo* **4**, 1: 25-40.

Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тишечкин А.К. 1997. *Птицы Беларуси на рубеже XXI века: Статус, численность, распространение*. Минск: 1-188.

Никифоров М.Е., Павлющик Т.Е. 2002. Сообщение орнито-фаунистической комиссии (находки и встречи видов птиц, утверждённые Белорусской орнито-фаунистической комиссией в 2002 г.) // *Subbuteo* **5**, 1: 57-62.

Никифоров М.Е., Самусенко И.Э. 2003. Сообщение орнито-фаунистической комиссии: обзор (находки и встречи птиц, утверждённые Белорусской орнито-фаунистической комиссией 14-16.11.2002 г. и 06.03.2003 г.) // *Subbuteo* **6**: 51-61.

Николаев В.И. 1998. *Птицы болотных ландшафтов национального парка «Завидово» и Верхневолжья*. Тверь: 1-215.

Николаев В.И. 2000. *Болота Верхневолжья. Птицы*. М.: 1-216.

Потебня А., Тарасов В.А. 2001. Качественный состав фауны позвоночных животных в районе расположения Псковской областной краеведческой экспедиции «Истоки»-2000 // *Материалы исследований обл. детской комплексной краевед. экспедиции «Истоки»-2000*. Псков: 96-99.

Приедниекс Я., Страздс М., Страздс А., Петриньш А. 1989. *Атлас гнездящихся птиц Латвии. 1980-1984*. Рига: 1-351.

Приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 18.07.2013 г. № 550 «Об утверждении Перечня объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Псковской области».

Тарасов В.А. 2005. Заметки о редких видах птиц Псковской области // *Природа Псковского края* **19**: 16-20.

Те Д.Е., Сиденко М.В., Галактионов А.С., Волков С.М. 2006. *Птицы национального парка «Смоленское Поозерье»*. Смоленск: 1-176.

Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. 1993. Наземные позвоночные животные Псковской области // *Краеведение и охрана природы*. Псков: 137-144.

Федюшин А.В. 1926. Материалы к изучению птиц Белоруссии: О птицах Витебщины // *Бюл. МОИП*. Нов. сер. Отд. биол. **35**, 1/2: 112-168.

Фетисов С.А. 2009. Охраняемые и редкие птицы водно-болотных угодий Псковского Поозерья на границе с Белоруссией // *Рус. орнитол. журн.* **18** (471): 435-459.

Фетисов С.А. 2015. Первый случай размножения большого крохаля *Mergus merganser* в национальном парке «Себежский» (Псковское Поозерье) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1185): 3186-3190.

Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Хааре А.О. 1997. Встречи редких птиц в Псковской области в 1997 году // *Рус. орнитол. журн.* **6** (23): 10-12.

Фетисов С.А., Дроздецкий В.Н. 2005. Новые данные о гнездовании большого крохаля *Mergus merganser* в Псковской области // *Природа Псковского края* **19**: 29-31.

Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2002. *Птицы Себежского Поозерья и национального парка «Себежский»*. СПб., **1**: 1-152. **2**: 1-128.

Яблоков М.С. 2004а. К вопросу о гнездовании большого крохаля *Mergus merganser* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **13** (269): 756-757.

Яблоков М.С. 2004б. Встречи редких и новых видов птиц в Псковской области в 2004 году // *Северо-Западная Россия: проблемы экологии и социально-экономического развития*. Псков: 173-178.

Яблоков М.С. 2014. Большой крохаль – *Mergus merganser* Linnaeus, 1758 // *Красная книга Псковской области*. Псков: 405.

Яблоков М.С., Васильев С.Н. 2006. Птицы среднего течения реки Шелони // *Рус. орнитол. журн.* **15** (315): 327-337.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1633**: 3169-3170*

Ходулочник *Himantopus himantopus* в Магаданской области

А.Я.Кондратьев

*Второе издание. Первая публикация в 1989**

По сообщению И.И. Вашкялиса, два ходулочника *Himantopus himantopus* были добыты группой сотрудников Каунасского зоологиче-

* Кондратьев А.Я. 1989. Ходулочник в Магаданской области // *Информация Рабочей группы по куликам*. Магадан: 61.

ского музея, коллектировавших птиц на территории Магаданской области летом 1967 года. Кулики кормились на берегу Ольского лимана (северная часть охотоморского побережья).

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1633**: 3170-3171*

Необычная находка среднего кроншнепа *Numenius phaeopus* в Кировской области

В.Н.Сотников, С.Ф.Акулинкин

*Второе издание. Первая публикация в 1994**

До последнего времени статус среднего кроншнепа *Numenius phaeopus* в Кировской области оставался неясным. В сводке П.В.Плесского (1976) этот вид отсутствует, хотя имеются публикации о двух встречах вида в первой половине XX века (Круликовский 1913; Ефремов 1935). Нами средний кроншнеп впервые отмечен в середине сентября 1979 года (3 птицы у посёлка Латышинский Опаринского района). В 1990-1993 годах среднего кроншнепа удавалось видеть ежегодно на весеннем пролёте в рыбхозе «Филипповка» в Кирово-Чепецком районе в период с 25 апреля (1992) по 8 июня (1991) и даже 16 июня (1992). Суммарно за эти 4 весенних сезона там отмечены 29 птиц.

Пару средних кроншнепов, из которой добыт самец, наблюдали 7 мая 1993 на поле озимой ржи у деревни Боброво Даровского района. С 23 мая в течение недели там же держалась другая пара, а 11 и 28 июня – 2 пары сильно беспокоившихся и отводивших птиц. Тогда же 11 июня в 300 м у третьей пары средних кроншнепов на поле овса найдено гнездо с 2 птенцами (один ещё не обсох), третий птенец был вне гнезда. 6 июля на первом участке встречена одна молодая птица, подпускавшая человека на несколько метров. Таким образом, две пары средних кроншнепов благополучно вывели потомство на полях наиболее возвышенных и сухих участков водораздела. Анализ литературных данных показал, что эти наблюдения – первые документированные факты гнездования среднего кроншнепа в агроландшафтах. Учитывая упомянутые летние встречи вида в других местах области, можно предположить возможность его гнездования в сельскохозяйственных угодьях также за пределами Даровского района.

* Сотников В.Н., Акулинкин С.Ф. 1994. Необычная находка среднего кроншнепа // *Информ. материалы Рабочей группы по куликам*. М., **7**: 32.

Обращает на себя внимание изменение характера пребывания среднего кроншнепа в Кировской области за последние 10-15 лет: залётный – пролётный – гнездящийся, что, скорее всего, отражает общую тенденцию расширения ареала вида.

Литература

Ефремов П.Г. 1935. Некоторые данные по орнитофауне Кайского района // *Учён. зап. Горьков. ун-та* **4**: 41-47.

Круликовский Л.К. 1913. К сведениям о птицах южных уездов Вятской губернии // *Зап. Урал. общ-ва естествознания* **32**, 2: 1-43.

Плесский П.В. 1976. *Животный мир Кировской области. Класс птицы*. Киров, **3**: 1-140.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1633**: 3171-3172*

Уникальное сообщество куликов на севере Западной Сибири

В.Г.Виноградов, В.Г.Кривенко, А.Д.Парфёнов

*Второе издание. Первая публикация в 1992**

С 5 июня по 5 июля 1990 обследована территория, примыкающая с севера к долине верховьев реки Пур (63°30' с.ш.) от долины реки Сухмитингаягун до поворота Пянупура на север (75° в.д.). Дополнительные наблюдения в центре этого района проведены А.Д.Парфёновым в августе-сентябре 1989 года. Район расположен в полосе северной тайги, но внепойменные части территории заняты обширными открытыми бугристыми болотами с боровыми гривами и обилием озёр.

Там неожиданно удалось обнаружить богатую гнездовую фауну птиц, состоящую как из южных, типично таёжных видов, так и из северных, тундровых. Особенно велико разнообразие куликов: установлено или предполагается размножение 19 видов этих птиц. В районе можно было ожидать и действительно обнаружены галстучник *Charadrius hiaticula*, черныш *Tringa ochropus*, фифи *Tringa glareola* (самый многочисленный – местами до 10.4 пар/км^2), перевозчик *Actitis hypoleucos*, мородунка *Xenus cinereus*, турухтан *Philomachus pugnax*, гаршнеп *Lymnocryptes minimus*, бекас *Gallinago gallinago*, азиатский бекас *Gallinago stenura*, средний *Numenius phaeopus* и большой *N. arquata* кроншнепы. Вместе с тем там оказались на гнездовании такие виды, как тулес *Pluvialis squatarola* (до 7 пар/км^2 на крупнокочкарных

* Виноградов В.Г., Кривенко В.Г., Парфёнов А.Д. 1992. Уникальное сообщество куликов на севере Западной Сибири // *Информация Рабочей группы по куликам*. Новосибирск: 63-65.

влажных болотах центра района), щёголь *Tringa erythropus* (до 1.8 пар на 1 км^2 в некоторых местах), круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus* и длиннопалый песочник *Calidris subminuta* (каждый максимум 4.5 пар/км^2 в центре района), грязовик *Limicola falcinellus* (0.8 пар/км^2 в центре района), чернозобик *Calidris alpina* (до 2.4 пар/км^2 на востоке района), малый веретенник *Limosa lapponica* (там же до 3.2 пар/км^2). Из этих куликов находками кладок доказано гнездование для тулеса, щёголя, круглоносого плавунчика и длиннопалого песочника. Поведение, крупные гонады и наличие больших наседных пятен у добытых чернозобиков и грязовика также указывают на размножение этих куликов. Встречен, но вряд ли гнездится, белохвостый песочник *Calidris temminckii*. Интересно, что грязовик обнаружен на тех же болотах, что и длиннопалый песочник; это единственное известное место совместного обитания этих двух видов. Необходимо отметить принадлежность добытого экземпляра грязовика к европейскому подвиду. То же самое относится и к чернозобику, у которого, однако, размеры птиц попадают в нижний предел изменчивости номинативного подвида: длина крыла добытых самцов – 109, 109, 111 мм, самок – 110, 116, 116 мм, длина клюва самцов – 26, 29, 30 мм, самок – 32, 34, 36 мм.

Существенно подчеркнуть, что на болотах верховьев Пура популяция чернозобика обитает в отрыве от основного тундрового ареала, не захватывающего, например, Южный Ямал. Тулес редок в лесотундре и южных тундрах и обычен севернее. При этом удивительно отсутствие в районе исследований золотистой ржанки *Pluvialis apricaria* и большого улита *Tringa nebularia*, поискам которых мы уделяли специальное внимание.

Очаг тундровой фауны (помимо куликов, включающий уток, поморников, лапландского подорожника *Calcarius lapponicus)* в пределах таёжной зоны, по-видимому, является реликтовым участком. Разные виды птиц, возможно, в разной степени изолированы от своих тундровых популяций. Полная изоляция чернозобика может исчисляться тысячелетиями.

Уникальность обнаруженного реликтового «осколка» тундровой фауны несомненна. Вместе с тем, существование естественных природных комплексов в регионе находится под большой угрозой, поскольку территория интенсивно и бесхозяйственно осваивается нефтяниками. Сохранить природу части региона удастся, если там будет организована зона особого природопользования с соблюдением хозяйственной системы проживающей там уникальной группировки хантов и лесных ненцев.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1633****: 3173*

Расширение ареала американского бекасовидного веретенника *Limnodromus scolopaceus:* размножение на Восточном Таймыре

И.И.Чупин

*Второе издание. Первая публикация в 1994**

Известный ареал американского бекасовидного веретенника *Limnodromus scolopaceus* расположен значительно восточнее полуострова Таймыр. Ближайшее к Таймыру место регистрации этого кулика – низовье реки Анабар, где была добыта самка с наседным пятном (Гладков, Залетаев 1964).

Впервые американский бекасовидный веретенник найден на Таймыре в урочище Ары-Мас, где 2 августа 1981 пара этих куликов проявляла беспокойство вблизи птенцов возле небольших озёр в пойме реки Новой (Чупин 1987). 24 июня 1991 ещё два американских бекасовидных веретенника встречены нами в 20 км выше устья реки Большая Балахня. Птиц удалось наблюдать несколько минут с расстояния 10 м отдыхавшими на небольшом возвышении в тундре, после чего они улетели в юго-восточном направлении. В устье реки Блудной вблизи посёлка Новорыбный 22 июля 1993 встречена беспокоившаяся птица и найден пуховой птенец американского бекасовидного веретенника. Птенец обнаружен на торфяном болотце размерами 3×5 м близ пойменного озера, заросшего осокой. Этот факт свидетельствует о продолжении расширения ареала вида на запад.

Литература

Гладков Н.А., Залетаев В.С. (1964) 2014. Наблюдения над птицами Анабарских тундр (Заполярная Якутия, северо-запад) // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1057): 3119-3139.

Чупин И.И. 1987. Птицы лесного острова Ары-Мас (Восточный Таймыр) // *Фауна и экология птиц и млекопитающих Средней Сибири*. М.: 39-53.

* Чупин И.И. 1994. Расширение ареала американского бекасовидного веретенника: размножение на восточном Таймыре // *Информ. материалы Рабочей группы по куликам*. М., **7**: 34-35.