ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1645
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1645

СОДЕРЖАНИЕ

3551-3559 Зимовка лебедей-кликунов *Cygnus cygnus* в Приозерске (Карельский перешеек). И.Б.СКВОРЦОВА, А.В.БАРДИН

3559-3562 Первая документированная встреча одуэновой чайки *Larus audouinii* в России. А.М.НАУМОВ

3562-3566 Орнитофауна памятника природы «Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс» (Печенгский район, Мурманская область). И.В.ЗАЦАРИННЫЙ, У.Ю.ШАВРИНА, М.П.ЛУКЬЯНОВ

3566-3567 О колониальном гнездовании степного луня *Circus macrourus* в Нижегородской области. П.М.ШУКОВ

3567-3569 Гнездо горной трясогузки *Motacilla cinerea* в чайнике. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ

3569-3571 Первая зимняя встреча серого журавля *Grus grus* в Краснодарском крае. Ю.В.ЛОХМАН, А.В.СОЛОХА

3571-3578 Редкие виды птиц в нижнем течении реки Клязьмы во Владимирской области. О.Н.ВОЛОШИНА

3578-3581 О пролёте гаршнепа *Lymnocryptes minimus* в Нижнем Поволжье. В.П.БЕЛИК, В.Н.ПИМЕНОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования: 21 июля 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1645

CONTENTS

3551-3559 Wintering of whooper swans *Cygnus cygnus* in Priozersk (Karelian Isthmus). I. B. SKVORTSOVA, A. V. BARDIN

3559-3562 The first documented registration of the Audouin's gull *Larus audouinii* in Russia. A. M. NAUMOV

3562-3566 Ornithofauna of the nature monument «Geological and geophysical polygon Shuoni-Kuets» (Pechenga Raion, Murmansk Oblast). I. V. ZATSARINNY, U. Yu. SHAVRINA, M. P. LUKYANOV

3566-3567 On the colonial nesting of the pallid harrier *Circus macrourus* in the Nizhny Novgorod Oblast. P. M. SHUKOV

3567-3569 Nest of the grey wagtail *Motacilla cinerea* in a kettle. N. N. BEREZOVIKOV

3569-3571 The first wintering sighting of the Eurasian crane *Grus grus* in the Krasnodar Krai. Yu. V. LOKHMAN, A. V. SOLOKHA

3571-3578 Rare bird species of the Klyazma River valley in the Vladimir Oblast. O. N. VOLOSHINA

3578-3581 On passage of the jack snipe *Lymnocryptes minimus* in Lower Volga Area. V. P. BELIK, V. N. PIMENOV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1645**: 3551-3559*

Зимовка лебедей-кликунов *Cygnus cygnus* в Приозерске (Карельский перешеек)

И.Б.Скворцова, А.В.Бардин

Ирина Борисовна Скворцова. Приозерск, Ленинградская область, Россия.
E-mail: ira-vesta@yandex.ru
Александр Васильевич Бардин. SPIN-код: 5608-1832. Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034 Россия. E-mail: ornis@mail.ru

Поступила в редакцию 16 июля 2018

В 1983 году А.С.Мальчевский и Ю.Б.Пукинский (1983) писали, что лебедь-кликун *Cygnus cygnus*, по-видимому, совсем перестал гнездиться в Ленинградской области, и их прогноз относительно будущего этого вида в регионе был весьма пессимистичным. Однако уже в конце 1990-х годов появились сообщения о находках гнездящихся кликунов на Ладожском озере (Михалёва 1997; Высоцкий 1998) и на озере Вялье (Головань, Кондратьев 1999). В 1999 году кликуны пытались гнездиться на Раковых озёрах на Карельском перешейке, а в 2004 году там зарегистрировано их успешное размножение (Иовченко 2011). Всё это свидетельствует о том, что вид, если и исчезал, то вновь появился на гнездовании в области, лежащей, как считалось, на южной границе гнездовой части ареала вида в северо-западной России (Иванов 1976).

В 1970-е годы очаги размножения лебедя-кликуна весьма неожиданно появились в прибалтийских станах, постепенно захватывая всё новые территории (Snow *et al*. 1998; Brazil 2010). В 1973 году гнездование кликуна впервые обнаружено в Восточной Польше (Kawenczynski *et al*. 1976; Sikora *et al*. 2012), Литве (Švažas *et al*. 1997) и Латвии (Бауманис, Липсберг 2014; Boiko, Kampe-Persson 2010; Boiko *et al*. 2014), в 1979 году – в Эстонии (Luigujõe *et al*. 2002). С 2002 года лебедь-кликун известен на гнездовании в Брестской области Белоруссии, с 2008 года – в Витебской (Абрамчук и др. 2003; Винчевский, Ясевич 2014; Богданович 2015). Из Псковской области первые сведения о возможном гнездовании кликуна появились в 1990-е годы, но достоверно зарегистрированные случаи размножения известны только с начала XXI века (Фетисов 2005, 2014). В Полистовском заповеднике его гнездование наблюдается с 2010 года (Шемякина, Яблоков 2013), а в сопредельном Рдейском заповеднике на территории Новгородской области выводок был встречен в 2004 году, а первое гнездо найдено в 2010 (Зуева 2011; Архипов и др. 2015). В Себежском национальном парке выводок наблюдался в 2011, а первое гнездо найдено в 2012 году (Фетисов 2014). В 2018 году гнездо лебедя-кликуна найдено в Новоржевском районе

(Григорьев 2018). Неуклонное увеличение численности лебедей-кликунов прибалтийской гнездовой группировки позволяет предполагать возможность проникновения их в будущем и в Ленинградскую область с юго-запада. Примечательно, что в это же время, с 1980-х годов, происходило заселение Псковской и Ленинградской областей ещё одним видом лебедя – шипуном *Cygnus olor* (Бузун, Мераускас 1993; Фетисов и др. 1998; Бузун, Храбрый 2017; Фетисов и др. 1998; Коузов 2016).

Севернее Ленинградской области, в Карелии, также наблюдается рост численности гнездящихся лебедей-кликунов и заселение ими всё более южных районов (Hokhlova, Artemyev 2002; Яковлева 2008). Восточнее, в Дарвинском заповеднике на северо-западном берегу Рыбинского водохранилища, кликуны начали гнездиться в 1983 году. Сейчас там сформировался очаг высокой численности вида, откуда лебеди расселяются и на другие территории (Кузнецов, Бабушкин 2012). Таким образом, можно ожидать пополнения группировки гнездящихся кликунов Ленинградской области также с севера и востока

Как хорошо видно на примере заселение лебедем-кликуном Псковской области, в эти годы, кроме регулярного появления этих птиц на весеннем и осеннем пролёте, резко возросло число летующих не размножающихся особей, а также зимующих лебедей (Фетисов 2005, 2014, 2016). Эпизодические зимовки отдельных кликунов на незамерзающих участках водоёмов были известны давно. Однако в настоящее время в Псковской области стали формироваться их регулярные зимовки. Например, одним из таких мест является незамерзающая благодаря впадению ключей часть Городищенского озера в Изборске (Андреев 2014; Бардин 2015, 2016). Лебеди-шипуны начали гнездиться здесь в 1984 году и сразу же стали оставаться на зиму вместе с многочисленными кряквами *Anas platyrhynchos*. С зимы 2011/12 года здесь вместе с шипунами стали регулярно зимовать и лебеди-кликуны.

В Ленинградской области отдельные случаи зимовок кликуна также отмечались издавна, но всегда были редким событием (Мальчевский, Пукинский 2007). Поэтому образование регулярной зимовки лебедей-кликунов в городе Приозерске на Карельском перешейке заслуживает особого внимания.

Через Приозерск из озера Вуокса в Ладожское озеро течёт северный рукав реки Вуоксы. У моста рядом с крепостью Корела (61°01'45" с.ш., 30°07'15" в.д.) он имеет бурное течение и зимой не замерзает даже в сильные морозы. Лебеди-кликуны начали зимовать здесь около 10 лет назад. Сначала их было 6-10, но с каждым годом становилось всё больше. Зимой 2017/18 года в Приозёрске держалось более 30 лебедей. Это были и белые взрослые птицы, часто державшиеся парами, и молодые с серым оперением. Место, где обычно держатся лебеди, находится между двух мостов: пешеходным и автомобильным, набережной

и островками Вуоксы. Интенсивная городская жизнь, видимо, не смущает лебедей и в сильные морозы можно постоянно наблюдать, как они добывают со дна реки водные растения или сидят группами на льду (рис.1-4). В отличие от крякв, которые назойливо выпрашивают у людей пищу, лебеди ведут себя более осторожно, не подплывают близко к берегу и сторонятся людей.

Рис. 1. Зимующие лебеди-кликуны *Cygnus cygnus* на реке Вуоксе в Приозерске. 22 февраля 2018. Фото И.Б.Скворцовой.

Рис. 2. Зимующие лебеди-кликуны *Cygnus cygnus* на реке Вуоксе в Приозерске. 22 февраля (верхний снимок) и 23 января 2018. Фото И.Б.Скворцовой.

Кликуны держатся на Вуоксе с декабря по март. Летом их не видно. Осенью и весной над городом пролетают стаи мигрирующих лебедей.

Зимой 2017/18 года произошёл такой случай. В начале марта стояли очень сильные морозы, и один из лебедей во время отдыха примёрз ко льду маховыми перьями и оперением груди. Птица вторые сутки находилась льдине далеко от берега и обессилела, пытаясь оторваться ото льда и отбиваясь от нападавших воронов *Corvus corax*. Неравнодушные местные жители не смогли оставить птицу в беде. Один из них на байдарке добрался до льдины и освободил пленницу. Лебедь (это оказалась самка) настолько ослаб в борьбе со льдом, что пришлось его взять домой, накормить, обогреть, а затем переправить в Центр помощи диким животным «Велес».

Рис. 3. Зимующие лебеди-кликуны *Cygnus cygnus* на реке Вуоксе в Приозерске. 23 января (верхний снимок) и 4 марта 2018. Фото И.Б.Скворцовой.

Рис. 4. Зимующие лебеди-кликуны *Cygnus cygnus* на реке Вуоксе в Приозерске. 22 февраля (верхний снимок) и 23 января 2018. Фото И.Б.Скворцовой.

В заключение добавим, что зимой 2017/18 года на реке Вуоксе в Приозерске среди лебедей держался один большой баклан *Phalacrocorax carbo* (рис. 5). Прежде зимние встречи бакланов отмечались на реке Бурной, соединяющей озеро Суходольское с Ладогой (Стариков 2009), а также на реке Свири в Лодейном Поле (Ковалев 2010).

Рис. 5. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на реке Вуоксе в Приозёрске.
4 марта 2018. Фото И.Б.Скворцовой.

Литература

Абрамчук А.В., Абрамчук С.В., Прокапчук В.В. 2003. Лебедь-кликун *Cygnus cygnus* новый гнездящийся вид на территории Беларуси // *Subbuteo* **6**: 6-9.

Архипов В.Ю., Завьялов Н.А., Завьялова Л.Ф. 2015. Редкие виды птиц в окрестностях Рдейского заповедника и города Холма в 2013-2014 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1117): 853-858.

Андреев В.А. 2014. Зимовка гусеобразных на Городищенском озере в Старом Изборске (Псковская область) // *Рус. орнитол. журн.* **23** (997): 1405-1408.

Бардин А.В. 2015. Зимовка лебедей – шипунов *Cygnus olor* и кликунов *C. cygnus* – на Городищенском озере в Старом Изборске // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1096): 207-212.

Бардин А.В. 2016. Зимующие лебеди *Cygnus olor* и *C. cygnus* в Старом Изборске в 2015/16 году // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1246): 457-459.

Бауманис Я.А., Липсберг Ю.К. 2014. Изменения в орнитофауне Латвии в 1965-1980 годах // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1030): 2371-2374.

Богданович И.А. 2015. Численность и распределение лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* в Белоруссии // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1162): 2385-2387.

Бузун В.А., Мераускас П. 1993. Орнитологические находки в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **2**, 2: 253-259.

Бузун В.А., Храбрый В.М. 2017. История появления лебедя-шипуна *Cygnus olor* на гнездовании в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1483): 3321-3323.

Винчевский А.Е., Ясевич А.М. 2014. Первые факты гнездования лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* в Гродненской и Минской областях Белоруссии // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1072): 3681-3686.

Высоцкий В.Г. 1998. Случай гнездования лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* на южном берегу Ладожского озера // *Рус. орнитол. журн.* **7** (33): 10-11.

Головань В.И., Кондратьев А.В. 1999. Гнездование лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **8** (86): 11-12.

Григорьев Э.В. 2018. Гнездование лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* в Новоржевском районе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1626): 2911-2915.

Зуева Н.В. 2011. Лебедь-кликун *Cygnus cygnus* в Рдейском заповеднике // *Рус. орнитол. журн.* **20** (623): 43-47.

Иванов А.И. 1976. *Каталог птиц СССР*. Л.: 1-276.

Иовченко Н.П. 2011. Птицы // *Экосистемы заказника «Раковые озёра»: история и современное состояние*. СПб.: 76-190.

Ковалев В.А. 2010. Зимняя встреча большого баклана *Phalacrocorax carbo* на реке Свири // *Рус. орнитол. журн.* **19** (573): 942-943.

Коузов С. А. 2016. Лебедь-шипун (*Cygnus olor* Gmelin 1789) в восточной части Финского залива: история расселения, распределение размножающихся птиц и биология размножения // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3. Биол.) 2: 38-69.

Кузнецов А.В., Бабушкин М.В. 2012. Лебедь-кликун *Cygnus cygnus* в Дарвинском заповеднике // *Рус. орнитол. журн.* **21** (761): 1233-1234.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 1-480.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 2007. Лебеди, гуси и казарки в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **16** (343): 141-156.

Михалёва Е.В. 1997. Попытка гнездования лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* на Валаамском архипелаге (Ладожское озеро) в июне 1997 года // *Рус. орнитол. журн.* 6 (25): 19-20.

Стариков Ю.В. 2009. Зимовка большого баклана *Phalacrocorax carbo* на Карельском перешейке // *Рус. орнитол. журн.* **18** (480): 707-708.

Фетисов С.А. 2005. Современный статус и экология лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **14** (293): 615-626.

Фетисов С.А. 2014. Расселение и начало размножения лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* в Псковском Поозерье // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1011): 1817-1830.

Фетисов С.А. 2016. Зимовки лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1268): 1119-1127.

Фетисов С.А., Сагитов Р.А., Иванов С.Ю., Леонтьева А.В. 1998. Лебедь-шипун *Cygnus olor* в Псковской области: процесс расселения и современное состояние // *Рус. орнитол. журн.* **7** (32): 9-19.

Яковлева М.В. 2008. О росте численности лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* в заповеднике «Кивач» // *Рус. орнитол. журн.* **17** (409): 483-484.

Boiko D., Kampe-Persson H. 2010. Whooper Swans *Cygnus cygnus* in Latvia,1973-2009 // *Wildfowl* **60**: 168-177.

Boiko D., Kamp-Persson H., Morkŭnas J. 2014. Breeding Whooper Swans *Cygnus cygnus* in the Baltic states, 1973–2013: result of a re-colonization // *Wildfowl* **64**: 207–216.
Brazil M. 2010. *The Whooper Swan*. Bloomsbury Publishing: 1-511.
Haapanen A. 1991. Whooper Swan *Cygnus c. cygnus* population dynamics in Finland // *Wildfowl*, suppl. 1: 137-141.
Kawenczyński K., Koźniewski P., Luniak M. 1976. Lęg łabędzia krzykliwego *Cygnus cygnus* (L.) na Bagnie Ławki // *Przegl. Zool*, **20**, 1: 109-115.
Hokhlova T.Y., Artemyev A.V. 2002. Reassessment of the southern limit for whooper swans breeding in Northwest Russia // *Waterbirds* **25** (Special Publication 1): 67-73.
Luigujõe L., Kuresoo A., Leivits A. 2002. Numbers and distribution of Whooper Swans breeding, wintering and on migration in Estonia, 1990-2000 // *Waterbirds* **25** (Special Publication 1): 61-66.
Sikora A., Wieloch M., Chylarecki P. 2012. Stan populacji lęgowej łabędzia krzykliwego *Cygnus cygnus* w Polsce // *Ornis polonica* **53**: 69-85.
Snow D.W., Perrins C.M., Gillmor R., Hillcoat B., Roselaar C.S., Vincent D., Wallace D.I., Wilson M.G. 1998. *The birds of the Western Palearctic*. Concise ed. Oxford Univ. Press: 1-1008.
Švažas S., Stanevičius V., Čepulis M. 1997. The status, numbers and distribution of swans and geese in Lithuania // *Acta zool. lituanica*, *Ornithologia* **6**: 66-78.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1645**: 3559-3562*

Первая документированная встреча одуэновой чайки *Larus audouinii* в России

А.М.Наумов

Александр Михайлович Наумов. E-mail: machaon74@mail.ru

Поступила в редакцию 19 июля 2018

Одуэнова чайка, или чайка Одуэна *Larus audouinii* Payraudeau, 1826 – редкий вид, гнездящийся только на островах Средиземного моря и, за исключением атлантического побережья Марокко, не покидающий средиземноморскую акваторию на кочёвках. До настоящего времени в территориальных водах и на побережьях России эта чайка достоверно не зарегистрирована. На сопредельных территориях орнитологами зафиксированы две единичные встречи данного вида: на черноморском побережье у Батуми в Грузии (3 октября 1984) и на каспийском побережье в Азербайджане (23 октября 2007), а также одна неподтверждённая регистрация на южном берегу Крыма зимой 1979/80 года (Зубакин 1990; Heiss, Gauger 2011).

Встретить чайку Одуэна мне посчастливилось 16 апреля 2018 в Адлеровском районе города Сочи (Краснодарский край). Во время обследования дельты реки Мзымта я заметил на мелководной части русла в 100 м от моря группу молодых хохотуний *Larus cachinnans* и хо-

дулочников *Himantopus himantopus*. Первоначальный осмотр скопления чаек не выявил ничего интересного. Однако пока производилась фотосъёмка ходулочников, состав этой группировки чаек менялся. Одни птицы улетали в сторону моря, другие, подлетев, опускались на отмель (рис. 1).

Рис. 1. Одуэнова чайка *Larus audouinii* и морской голубок *Larus genei* среди чаек-хохотуний *Larus cachinnans*. Устье Мзымты. Сочи. 16 апреля 2018. Фото автора.

Рис. 2. Одуэнова чайка *Larus audouinii*. Устье Мзымты. Сочи. 16 апреля 2018. Фото автора.

В 12 ч 10 мин одна из чаек немного отделилась от основной группы. По размерам она выглядела примерно в полтора раза меньше хохотуньи и чуть крупнее сизой чайки (рис. 2). Чисто-белая голова с тёмными глазами и мощный темно-красный клюв с чёрной перевязью и светлой вершиной сразу заставили обратить на неё пристальное внимание. Чайка сидела на одном месте около 10 мин, лишь изредка поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. В последние минуты к необычной чайке присоединился морской голубок *Larus genei*, что позволило сделать фотографии птиц в сравнении (рис. 3). Затем эта необычная чайка издала негромкий сигнал *«кьяу»* или *«кья»*, подняла крылья, вытянув шею параллельно воде, и через секунду взлетела вместе со всеми чайками. Длительность наблюдения составила около 14 мин с расстояния 60-70 м, при переменной облачности и хорошем освещении.

Рис. 3. Одуэнова чайка *Larus audouinii* (слева) и морской голубок *Larus genei*.
Устье Мзымты. Сочи. 16 апреля 2018. Фото автора.

Сделанные фотографии были направлены в Северокавказскую орнитофаунистическую комиссию, а также в Фаунистическую комиссию Мензбировского орнитологического общества. Члены обеих комиссий сошлись во мнении, что описанная и сфотографированная птица – одуэнова чайка в наряде, предшествующем окончательному взрослому (3-й год жизни). Таким образом, это первая документально зарегистрированная встреча вида на территории Российской Федерации.

Литература

Зубакин В.А. 1989. Дополнение к тому «Птицы СССР. Чайковые». Одуэнова чайка // *Птицы СССР. Чистиковые*. М.: 199-204.

Heiss M., Gauger K. 2011. Coastal Bird Migration at the Caspian Shore of the Azerbaijan Republic in October 2007 // *Podoces* **6**, 1: 59-71.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1645**: 3562-3566*

Орнитофауна памятника природы «Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс» (Печенгский район, Мурманская область)

И.В.Зацаринный, У.Ю.Шаврина, М.П.Лукьянов

Иван Викторович Зацаринный. Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина. Ул. Свободы, д. 46, Рязань, Рязанская область, 390000, Россия. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова, площадь генерала армии В.Ф.Маргелова, д. 1, Рязань, Рязанская область, 390031, Россия. E-mail: zatsarinny@mail.ru
Ульяна Юрьевна Шаврина, *Максим Павлович Лукьянов*. Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина. Ул. Свободы, д. 46, Рязань, Рязанская область, 390000, Россия

Поступила в редакцию 20 июля 2018

Памятник природы регионального значения «Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс» является одним из шести памятников природы, входящих в мурманскую часть Зелёного пояса Фенноскандии. Он образован в 1980 году и располагается в Печенгском районе Мурманской области на территории от озера Шуониярви практически до озера Куэтсярви, занимая участок по 200 м по обе стороны от автодороги Никель – Приречный между 3-м и 16-м километрами. Общая площадь памятника природы – 300 га. Преобладающими типами ландшафтов его территории являются восточноевропейские лесотундровые равнинные и северотаёжные восточноевропейские равнинные (Геолого-геофизический… 2018). Полигон предназначен для детального картирования геологических горизонтов известными и вновь разрабатываемыми методами, проверки новых методических разработок и новых макетов геофизической аппаратуры (Доклад… 2015). На территории памятника природы представлены участки смешанных сосново-берёзовых и чистых берёзовых лесов, разные типы болот и небольшие водоёмы, а также различные трансформированные территории: песчаные карьеры, грунтовые дороги, зарастающие сельскохозяйственные территории. Территория памятника природы пересекает участок долины реки Шуониойки.

Целью исследования было описание современного состава фауны птиц памятника природы.

Полевые исследования были выполнены в июне 2018 года. Выполнены маршрутные учёты птиц на всём протяжении памятника природы (13 км). Птиц учитывали методом маршрутного учёта без ограничения полосы обнаружения (Равкин, Челинцев 1999). В качестве меры количественного обилия использовался показатель «встречаемость» (для поющих самцов и пар – пар/км). В ходе выполнения работ было принято допущение, что каждый поющий самец имеет пару.

Птицы памятника природы регионального значения
«Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс»

Вид	Статус	Вид	Статус
Gavia stellata	мл.?гн.	*Limosa lapponica*	ред.?гн.
Gavia arctica	мл.пр.	*Larus minutus*	ред.?гн.
Anser anser *	ред.пр.	*Larus ridibundus*	ред.?гн.
Anser fabalis	ред.гн.	*Larus argentatus*	ред.?гн.
Cygnus cygnus *	мл.гн.	*Larus canus*	об.?гн.
Anas platyrhynchos	мл.гн.	*Sterna paradisaea*	мл.?гн.
Anas crecca	мл.гн.	*Columba palumbus*	ред.?гн.
Anas penelope	мл.гн.	*Columba oenas*	ред. зал.
Anas acuta	ред.зал.	*Columba livia*	ред. зал.
Anas clypeata	ред.зал.	*Cuculus canorus*	об.гн.
Aythya fuligula	об.гн.	*Asio flammeus*	ред.гн.
Clangula hyemalis	ред.зал.	*Aegolius funereus*	ред.?гн.
Bucephala clangula	об.гн.	*Glaucidium passerinum*	ред.?гн.
Melanitta nigra	ред.пр.	*Surnia ulula*	ред.гн.
Melanitta fusca	ред.пр.	*Strix nebulosa* *	ред. зал.
Mergellus albellus *	мл.гн.	*Dryocopus martius*	ред.гн.
Mergus serrator	об.гн.	*Dendrocopos major*	мл.гн.
Mergus merganser	мл.гн.	*Dendrocopos minor*	ред.?гн.
Pandion haliaetus *	ред.?гн.	*Picoides tridactylus*	мл.гн.
Accipiter gentilis	ред.гн.	*Riparia riparia*	об.гн.
Accipiter nisus	ред.гн.	*Delichon urbica*	мл.?гн.
Buteo lagopus	об.гн.	*Anthus trivialis*	мл.гн.
Aquila chrysaetos *	ред.зал.	*Anthus pratensis*	мл.гн.
Haliaeetus albicilla *	ред.гн.	*Motacilla flava*	об.гн.
Falco peregrinus *	ред.зал.	*Motacilla alba*	об.гн.
Falco columbarius	мл.гн.	*Lanius excubitor* *	ред.?гн.
Falco tinnunculus *	ред.?гн.	*Perisoreus infaustus*	об.гн.
Lagopus lagopus	об.гн.	*Garrulus glandarius*	ред.?гн.
Lyrurus tetrix	ред.?гн.	*Pica pica*	мл.гн.
Tetrao urogallus	ред.?гн.	*Corvus cornix*	об.гн.
Tetrastes bonasia	ред.гн.	*Corvus corax*	мл.гн.
Grus grus *	ред.зал.	*Bombycilla garrulus*	мл.гн.
Pluvialis apricaria	ред.гн.	*Cinclus cinclus* *	об.гн.
Charadrius hiaticula	ред.?гн.	*Prunella modularis*	ред.?гн.
Tringa glareola	об.гн.	*Acrocephalus schoenobaenus*	ред.гн.
Tringa nebularia	об.гн.	*Sylvia borin*	ред.?гн.
Tringa totanus	ред.?гн.	*Phylloscopus trochilus*	об.гн.
Tringa erythropus	ред.?гн.	*Phylloscopus collybita*	ред.?гн.
Actitis hypoleucos	об.гн.	*Phylloscopus sibilatrix*	ред.зал.
Philomachus pugnax	мл.гн.	*Phylloscopus borealis*	ред.?гн.
Gallinago gallinago	об.гн.	*Regulus regulus*	ред.зал.
Numenius phaeopus	мл.гн.	*Ficedula hypoleuca*	мл.гн.

Продолжение таблицы

Вид	Статус	Вид	Статус
Muscicapa striata	ред.гн.	*Fringilla coelebs*	ред.?гн.
Saxicola rubetra	ред.?гн.	*Fringilla montifringilla*	об.гн.
Oenanthe oenanthe	ред.?гн.	*Chloris chloris*	ред.?гн.
Phoenicurus phoenicurus	об.гн.	*Spinus spinus*	мл.гн.
Erithacus rubecula	ред.?гн.	*Acanthis flammea*	об.гн.
Luscinia svecica	мл.гн.	*Acanthis hornemanni*	ред.пр.
Turdus pilaris	мл.гн.	*Pinicola enucleator*	ред.?гн.
Turdus iliacus	об.гн.	*Loxia pytyopsittacus*	ред.гн.
Turdus philomelos	мл.гн.	*Loxia curvirostra*	ред.гн.
Turdus viscivorus	ред.?гн.	*Loxia leucoptera*	ред.зал.
Aegithalos caudatus	ред.?гн.	*Pyrrhula pyrrhula*	ред.гн.
Parus montanus	мл.гн.	*Emberiza citrinella*	ред.?гн.
Parus cinctus	об.гн.	*Schoeniclus schoeniclus*	об.гн.
Parus caeruleus	ред.зал.	*Ocyris rusticus*	ред.?гн.
Parus major	об.гн.	*Ocyris pusillus*	ред.гн.
Passer domesticus	ред. зал.	*Calcarius lapponicus*	ред.пр.
Passer montanus	ред.зал	*Plectrophenax nivalis*	ред.пр.

* – виды, включённые в Красную книгу Мурманской области (2014);
об. – обычный, мл. – малочисленный, ред. – редкий, гн. – гнездящийся, ? гн. – возможно, гнездящийся, пр. – пролетный, зал. – залётный.

Результаты исследования (см. таблицу) показывают, что структура населения птиц здесь типична для ряда коренных экосистем. Среди воробьиных птиц наиболее обычны пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus* (4.5 пар/км), юрок *Fringilla montifringilla* (1.7), обыкновенная чечётка *Acanthis flammea* (1.3), обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus* (0.8). Относительно реже встречаются белобровик *Turdus iliacus* (0.6), береговушка *Riparia riparia* (0.5), серая ворона *Corvus cornix* (0.4), ворон *Corvus corax* (0.4), белая трясогузка *Motacilla alba* (0.3), варакушка *Luscinia svecica* (0.3), лесной конёк *Anthus trivialis* (0.2), жёлтая трясогузка *Motacilla flava* (0.2), мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca* (0.2), певчий дрозд *Turdus philomelos* (0.2), чиж *Spinus spinus* (0.2). Малочисленны – луговой конёк *Anthus pratensis* (0.1), луговой чекан *Saxicola rubetra* (0.1), кукша *Perisoreus infaustus* (0.1), свиристель *Bombycilla garrulus* (0.1), серая мухоловка *Muscicapa striata* (0.1), зяблик *Fringilla coelebs* (0.1) и камышовая овсянка *Schoeniclus schoeniclus* (0.1). Среди неворобьиных наиболее часто встречаются бекас *Gallinago gallinago*, перевозчик *Actitis hypoleucos* и сизая чайка *Larus canus*, реже – большой улит *Tringa nebularia*, золотистая ржанка *Pluvialis apricaria*, пустельга *Falco tinnunculus*, гоголь *Bucephala clangula*, чирок-свистунок *Anas crecca* и чернозобая гагара *Gavia arctica*.

Анализ полученных результатов, а также материалов исследований, ранее выполненных на территориях, примыкающих к различным участкам памятника природы «Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс» (Зацаринный и др. 2016а,б,в,г,д, 2017а,б.в.г, 2018а,б,в), по-

казывает, что здесь могут встречаться не менее 118 видов птиц, из которых 12 включены в Красную Книгу Мурманской области, в том числе 5 видов включённых в Красную книгу России (таблица).

Авторы выражают благодарность руководству и коллективу заповедника «Пасвик» за помощь в организации и выполнении работ. Работы выполнены при поддержке Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина, Государственного природного заповедника «Пасвик», частично, при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Мурманской области в рамках научного проекта № 17-44-510841 «р_а».

Литература

Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс // http://oopt.aari.ru (Дата обращения: 18.07.2018)

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2014 году. 2015. Мурманск: 1-177.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Булычева И.А., Варюхин В.С., Макарова О.А., Бычков Ю.М. 2016а. К орнитофауне горных территорий заповедника «Пасвик» // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1258): 817-824.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Булычева И.А., Варюхин В.С., Ефремова Е.С. 2016б. Современный видовой состав и население птиц березняков зоны берёзовых лесов и редколесий северо-запада Мурманской области в гнездовой период // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1317): 2795-2805.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Варюхин В.С., Ефремова Е.С. 2016в. Фауна и население птиц в долинах малых рек северо-запада Мурманской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1315): 2727-2741.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Булычева И.А., Варюхин В.С., Ефремова Е.С. 2016г. Современный видовой состав и население птиц болот и небольших водоёмов северо-запада Мурманской области в гнездовой период // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1329): 3149-3156.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Варюхин В.С., Ефремова Е.С. 2016д. К орнитофауне зоны берёзовых лесов и редколесий северо-запада Мурманской области в осенний период // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1318): 2821-2824.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Варюхин В.С. 2017а. Осенняя орнитофауна трансформированных территорий зоны берёзовых лесов и редколесий северо-запада Мурманской области // *Биология – наука XXI века*. Пущино: 283-284.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Варюхин В.С. 2017б. Фауна и население птиц долин малых рек северо-запада Мурманской области в осенний период // *Папанинские чтения – 2017*. Архангельск: 36-40.

Зацаринный И.В., Грибова М.О., Варюхин В.С. 2017в. К орнитофауне поселка Никель и его окрестностей (Мурманская область) // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1510): 4257-4260.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Варюхин В.С., Ефремова Е.С., Гаськова А.С. 2017г. К осенней орнитофауне отдельных районов северо-запада Мурманской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1524): 4718-4721.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Варюхин В.С. 2018а. Редкие виды птиц в долинах малых рек северо-запада Мурманской области // *Биоразнообразие экосистем Крайнего Севера: инвентаризация, мониторинг, охрана.* Сыктывкар: 180-188.

Зацаринный И.В., Собчук И.С., Большаков А.А., Булычева И.А., Макарова О.А., Поликарпова Н.В., Варюхин В.С., Грибова М.О., Шаврина У.Ю. 2018б. Птицы заповедника «Пасвик» и прилегающих территорий // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1625): 2829-2908.

Зацаринный И.В., Шаврина У.Ю., Лукьянов М.П. 2018в. Птицы посёлка Никель и прилегающих территорий // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1644): 3526-3530.

Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. 1999. Методические рекомендации по маршрутному учету населения птиц в заповедниках // *Организация научных исследований в заповедниках и национальных парках*. М.: 143-155.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1645**: 3566-3567*

О колониальном гнездовании степного луня *Circus macrourus* в Нижегородской области

П.М.Шуков

Павел Михайлович Шуков. Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина. Ул. Ульянова, д. 1, Нижний Новгород, 603002, Россия.
E-mail: shukov.pm@gmail.com

Поступила в редакцию 17 июля 2018

Степной лунь *Circus macrourus* является глобально редким видом, занесенным в Красные Книги МСОП, России и Нижегородской области (Красная Книга… 2014). До 2014 года в регионе было найдено только 2 гнезда степного луня (Бакка, Киселёва 2016). Первое из них было обнаружено в июне 2002 года в Краснооктябрьском районе (Бакка, Киселёва 2007), второе – в мае 2009 года в Богородском районе (Левашкин 2009). В 2014-2016 годах мною были найдены ещё 7 гнёзд; 5 – в Починковском, 1 – в Лукояновском и 1 – в Спасском районах области (Шуков 2017).

Одно из обнаруженных в 2016 году гнёзд располагалось у деревни Пеля-Казённая Починковского района в крупной колонии лугового луня *Circus pygargus* (9 пар), образовавшейся на заросших бурьяном развалинах фермы. 20 июня 2017 при проверке этой территории было обнаружено 2 гнезда степных луней, располагавшихся в 150 м друг от друга. Одно гнездо было устроено на сухом участке в зарослях крапивы в центре колонии, второе – в осоке у реки, на окраине территории колонии. В обоих гнёздах находилось по 4 птенца в возрасте 13-15 дней. Неоднократно удавалось видеть, как самцы передавали добычу самкам над участками и при этом все 4 взрослые птицы наблюдались одновременно, что позволяет говорить о принадлежности описанных гнёзд двум парам степных луней.

Это первый описанный случай колониального гнездования степного луня в средней полосе России. Возможно, что в годы с более высокой численностью мышевидных грызунов это явление шире распространено в регионе.

Литература

Бакка С.В., Киселёва Н.Ю., Левашкин А.П. 2016. Луни в Нижегородской области (распространение, численность, проблемы охраны) // *Луни Палеарктики. Систематика, распространение и особенности экологии в Северной Евразии*. Ростов-на-Дону: 11- 20.

Красная Книга Нижегородской области. Том 1. Животные. 2014. 2-е изд. перераб. и доп. Нижний Новгород: 1-448.

Левашкин А.П. 2009. Вторая находка гнезда степного луня в Нижегородской области, Россия // *Пернатые хищники и их охрана* **16**: 158-159.

Шуков П.М. 2017. Новые данные о гнездовании степного луня в Нижегородской области, Россия // *Пернатые хищники и их охрана* **34**: 96-99.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1645**: 3567-3569*

Гнездо горной трясогузки *Motacilla cinerea* в чайнике

Н.Н.Березовиков

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 20 июля 2018

Горная трясогузка *Motacilla cinerea melanope* Pallas, 1776 на Алтае, в Саур-Тарбагатае, Джунгарском Алатау и Тянь-Шане обычно устраивает свои гнёзда в пустотах под камнями, кочками, корягами, выворотнями, среди корней деревьев, в нишах обрывов по берегам рек и ручьёв, иногда в конструкциях мостов, плотин, постройках человека, поленницах дров, скалах и на деревьях (Гаврилов 1970; Ковшарь 1979; Кучин 1982; Березовиков 1989; Ирисова 2002; Рябицев 2008). Известны единичные факты их устройства в горизонтальной металлической трубе и внутри железной бочки, лежащей на земле и в машине (Ковшарь 1979; Березовиков 1989). В последнем случае пара горных трясогузок поселилась на раме разукомплектованного большегрузного лесовоза «КРАЗ», стоявшего в одной из усадеб села Урунхайка на озере Маркаколь.

Ещё один случай необычного гнездования горной трясогузки отмечен в среднем течении Убы между селом Карагужиха и устьем Становой Убы в горно-лесной части Западного Алтая, где на левом берегу реки среди берёзового леса находится туристическая стоянка с бревенчатой избушкой и баней (рис. 1, 2). Это место известно под названием «приют водников», так как используется для отдыха любителями рафтинга после сплава через опасные пороги и скальные теснины на Убе.

Рис. 1. Характерные места обитания горной трясогузки *Motacilla cinerea* в среднем течении Убы. Западный Алтай. 21 июня 2013. Фото А.Ларионова.

Рис. 2. Избушка с баней на берегу реки Убы выше Карагужихи. 16 августа 2011. Фото И.Иванченко.

При посещении этого приюта группой туристов 12 июля 2014 в прихожей бани в старом закопчённом чайнике, висевшем на стене, было обнаружено жилое гнездо горной трясогузки. Дно чайника было целиком заполнено толстым слоем растительных стеблей и корешков, сбоку у стенки находился лоток с 3 пуховыми птенцами (рис. 3).

Выражаю искреннюю признательность Н.Н.Балацкому (Новосибирский краеведческий музей) за подтверждение видовой принадлежности птенцов.

Рис. 3. Гнездо горной трясогузки *Motacilla cinerea* в чайнике на стене бани. Река Уба выше Карагужихи. 12 июля 2014. Фото М.Тихомирова.

Литература

Березовиков Н.Н. 1989. *Птицы Маркакольской котловины (Южный Алтай)*. Алма-Ата: 1-200.

Гаврилов Э.И. 1970. Семейство Трясогузковые – Motacillidae // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **3**: 286-362.

Ирисова Н.Л. 2002. *Воробьиные птицы высокогорий Алтая*. Барнаул: 1-215.

Ковшарь А.Ф. 1979. *Певчие птицы в субвысокогорье Тянь-Шаня (Очерки летней жизни фоновых видов)*. Алма-Ата: 1-310.

Кучин А.П. 1982. *Птицы Алтая. Воробьиные*. Барнаул: 1-208.

Рябицев В.К. 2008. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Справочник-определитель*. Екатеринбург: 634.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1645**: 3569-3571*

Первая зимняя встреча серого журавля *Grus grus* в Краснодарском крае

Ю.В.Лохман, А.В.Солоха

Второе издание. Первая публикация в 2018[*]

Серый журавль *Grus grus* в Краснодарском крае – пролётный и нерегулярно встречающийся летом вид (Лохман, Тильба 2009), по данным других исследователей – пролётный (Мнацеканов 2007).

[*] Лохман Ю.В., Солоха А.В. 2018. Первая зимняя встреча серого журавля в Краснодарском крае // *Информ. бюл. Рабочей группы по журавлям Евразии* **14**: 44-45.

Серого журавля иногда отмечают зимой в сопредельных регионах. На юге Украины на Сиваше 19-23 января 2001 учтено 13 птиц, в зональных ландшафтах в период с 8 по 15 февраля 2001 по одной особи встречено на Центральном и Восточном Сиваше и две птицы – на озере Сасык (Андрющенко, Олейник 2000; Андрющенко и др. 2003, 2006). На юге Крыма серые журавли отмечены 20 февраля 2000 и 15 декабря 2001 (Бескаравайный 2008). Одна особь встречена 7 декабря 1998 в Аджарии (Грузия) южнее Батуми на берегу Чёрного моря (Абуладзе 2002). Зимовку серых журавлей в Закавказье отмечал Г.И.Радде, описывая, как в декабре на Тифлисский базар неоднократно приносили журавлей с нижнего течения реки Храми (Ильяшенко и др. 2008). Серый журавль включён в фауну птиц Ставропольского края со статусом «зимующий» (Хохлов, Ильюх 2009).

В период проведения ежегодных зимних учётов водяных птиц в Краснодарском крае один серый журавль встречен 15 января 2014 в Восточном Приазовье (окрестности посёлка Голубая Нива, Славянский район). Птица кормилась на жнивье среди стогов соломы. Первая половина зимы 2013/14 года была сравнительно мягкой и малоснежной. Погода в день встречи стояла безоблачная, температура воздуха около +4°С, ветер восточный 2 м/с, в ночное время заморозки до -4°С.

Находка серого журавля в середине января 2014 года в Славянском районе – первая зимняя встреча вида в Краснодарском крае.

Литература

Абуладзе А.В. 2002. Первая зимняя встреча серого журавля в Грузии // *Журавли Евразии (распределение, численность, биология)*. М., **1**: 12-13.

Андрющенко Ю.А., Олейник Д.С. 2000. О некоторых птицах, зимующих на юге Украины // *Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий: Материалы юбилейной. Международ. конф., посвящ. 20-летию Азово-Черноморской орнитологической группы*. Одесса: 8.

Андрющенко Ю.А., Попенко В.М., Черничко И.И., Арсиевич Н.Г., Олейник Д.С. 2003. Результаты среднезимних учётов птиц на Сиваше в 2001 году // *Бранта* **6**: 173-178.

Андрющенко Ю.А., Черничко И.И., Кинда В.В., Попенко В.М., Арсиевич М.Г., Вацке Х., Гавриленко В.С., Горлов П.И., Гринченко А.Б., Думенко В.П., Кириченко В.Е., Кошелев А.И., Кошелев В.А., Лопушанский Е.А., Олейник Д.С., Подпрядов А.А., Прокопенко С.П., Стадниченко И.С., Сиренко В.А., Товпинец Н.Н., Фишер Т., Черничко Р.М. 2006. Результаты первого большого учёта зимующих птиц в зональных ландшафтах юга Украины // *Бранта* **9**: 123-149.

Ильяшенко В.Ю., Касабян М.Г, Маркин Ю.М. 2008. Морфологическая изменчивость серого журавля – *Grus grus* (Linnaeus, 1758) (Aves: Gruidae) // *Журавли Евразии (биология, распространение, миграции)*. М., **3**: 51-83.

Бескаравайный М.М. 2008. *Птицы морских берегов южного Крыма*. Симферополь: 1-160.

Лохман Ю.В., Тильба П.А. 2009. Список видов птиц административных регионов. Краснодарский край // *Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе*. М.: 274-292.

Мнацеканов РА. 2007. Серый журавль // *Красная книга Краснодарского края (животные)*. Краснодар: 390-391.

Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2009. Список видов птиц административных регионов. Ставропольский край // *Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе*. М.: 274-292.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1645**: 3571-3578*

Редкие виды птиц в нижнем течении реки Клязьмы во Владимирской области

О.Н.Волошина

*Второе издание. Первая публикация в 2008**

Территория на северо-востоке Владимирской области до сих пор мало изучена орнитологами, а между тем пойма реки Клязьмы от Коврова до устья предложена для включения в список водно-болотных угодий международного значения (Пойма реки Клязьма... 2000). Клязьма – равнинная река с незарегулированным стоком, в своём нижнем течении имеет хорошо выраженную пойму, кое-где шириной до 3-4 км, с обилием старичных озёр и заводей, заболоченных и влажных лугов и зарослей кустарников, пойменных дубрав и черноольшаников. На террасах низменного левого берега Клязьмы и на водоразделе расположен обширный лесо-болотный массив, простирающийся из Владимирской в Ивановскую область (Балахнинская низина). От устья реки Уводи до устья реки Тезы на протяжении 45.5 км на северном берегу Клязьмы располагается Клязьминский республиканский боброво-выхухолевый заказник (КОТР ИВ-007 международного значения).

Орнитофауна Клязьминского заказника, большая часть которого находится в Ивановской области, изучена хорошо, а современных сведений о птицах владимирской части Клязьминско-Балахнинской низины очень мало и они относятся в основном к областному Клязьминско-Лухскому заказнику в Вязниковском районе (Конторщиков и др. 1996; Соболев, Руссо 1998; Фокин 2000). По результатам этих работ во Владимирской области Б.Ю.Руссо выделила КОТР ВЛ-001 «Вязниковско-Гороховецкая пойма реки Клязьмы с прилегающими лесными массивами» площадью 100000 га.

* Волошина О.Н. 2008. Редкие виды птиц в нижнем течении реки Клязьмы во Владимирской области // *Фауна и экология птиц Подмосковья*. М., **3**: 88-93.

Мы ставили задачу восполнить пробелы в изучении орнитофауны нижнего течения Клязьмы. Материал собирали на территории Ковровского, Вязниковского и Гороховецкого районов Владимирской области. В долине Клязьмы 21 июня – 1 июля 2003 автор участвовал в комплексной экспедиции эколого-биологического Союза «Чилим» (Гороховец), во время которой был пройдён на байдарке участок Клязьмы общей протяжённостью 66 км от города Коврова до устья реки Мстёрки и посёлка Мстёра; ежедневно совершали также пешие маршруты по берегам. Кроме того, 9-11 июля 2001 пройдён лодочный маршрут общей протяжённостью 27.5 км от Гороховца до устья реки Суворощи вместе в О.В.Герасимовой и П.В.Басихиным.

Некоторые данные были получены во время учёта гусей 10-11 и 17-18 апреля 2004. Кроме того, в мае-августе 2003 года исследовали орнитофауну обширных переходных болот и их окрестностей на юге Гороховецкого лесничества (в левобережной части Гороховецкого района). Часть материала была собрана также во время лодочной экспедиции по реке Суворощи 5-13 мая 2004 от деревни Успенский Погост до деревни Лыкшино (к югу от станции Гороховец). Река Суворощь, правый приток Клязьмы, течёт среди низких заболоченных берегов с обилием черноольшаников, местами сильно меандрирует. Встречаются участки, где река широко разливается и образует тростниковые крепи с сетью проток и стариц, сплавинами и куртинами кустарников среди открытого пространства. На маршрутах фиксировали все встречи видов птиц, включённых в Список редких птиц Нечерноземья.

Кроме оригинальных материалов приводятся данные биологов, посещавших район исследований и любезно предоставивших автору свои неопубликованные материалы: Ю.В.Краснова, А.А.Могильнер, Г.С.Ерёмкина, О.В.Герасимовой, Н.А.Соболева, И.А.Липилиной, П.В.Басихина, И.В.Вахромеева, А.К.Благовидова, а также гороховецкого школьника С.Басюла. Всем им автор выражает свою искреннюю благодарность.

Лебедь-шипун *Cygnus olor*. Пару шипунов О.В.Герасимова видела на Клязьме на северо-западной окраине Гороховца 12 июня 2008.

Большой крохаль *Mergus merganser*. Взрослая птица, окрашенная как самка, 25 июня 2003 отдыхала на песчаной отмели Клязьмы в 1 км ниже по течению от пристани Венец (к западу от деревни Юдиха Ковровского района). Улетела на левый берег Клязьмы в Клязьминский заказник.

Скопа *Pandion haliaetus*. Скопу изредка, но регулярно отмечают в гнездовой период, однако характер её пребывания в обсуждаемом районе не ясен. Ботаник И.В.Вахромеев встретил одну птицу в Ковровском районе на правом берегу Клязьмы у пристани Венец, ещё одна птица, по его наблюдениям, 25 августа 2002 охотилась на озере Большой Печкур в левобережной части Гороховецкого района.

Змееяд *Circaetus gallicus*. Территориальная пара змееядов весной и летом 2003 года отмечалась автором в Гороховецком лесничестве (см. подробнее: Волошина 2005).

Большой подорлик *Aquila clanga*. В левобережной части Гороховецкого района одну птицу видела А.А.Могильнер в последней декаде июня 2001 года, другую Н.А.Соболев встречал в августе в востоку от озера Печхар в левобережной части Вязниковского района. Во время учёта гусей вечером 17 апреля 2004 с высокого правого берега Клязьмы у деревни Станки Г.С.Ерёмкин видел ещё одну пару, токующую на левом берегу над лесом и пойменными лугами к северу-северо-востоку от точки наблюдения, примерно в районе озера Суземское. Утром 18 апреля 2004 там же он видел одного подорлика, который токовал и вступал в конфликт с парой чёрных коршунов. Автор во время учёта гусей утром 11 апреля 2004 от деревни Ильина Гора видел крупного тёмного орла в районе устья реки Лух – примерно там, где 20 августа 1993 встречали большого подорлика (Соболев, Руссо 1998). Таким образом, на левобережье Клязьмы в Гороховецком районе можно предполагать обитание как минимум одной пары больших подорликов, а в Вязниковском районе – не менее 2-3 пар.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Молодую птицу 11 мая 2003 П.В.Басихин и С.Басюл видели парящей над лесным массивом и поймой Клязьмы в 4 км к северо-западу от города Гороховца. Биолог А.К. Благовидов вместе с охотоведом В.Поспеловым летом 2005 года нашли обитаемое гнездо орлана на левом берегу Клязьмы примерно в 2 км выше по течению от устья реки Лух в пойменном вязовнике с высокоствольной сосной. В 1 км от первого, выше по течению Клязьмы, на правом берегу в сосняке ими было найдено второе гнездо (эти данные нуждаются в проверке).

Степной лунь *Circus macrourus*. Отмечен Г.С.Ерёмкиным 18 апреля 2004 на лугу около деревни Княжская (в 2 км от Клязьмы) в Ковровском ррайоне.

Луговой лунь *Circus pygargus*. Дважды встречен в пойме реки Суворощи в Гороховецком районе в 2004 году: 12 мая самец охотился над прибрежным лугом в 1 км к югу от места впадения в Суворощь реки Важня; ещё один самец в тот же день охотился у деревни Юрятино.

Чеглок *Falco subbuteo*. Вид, включённый в Красную книгу Владимирской области, по нашим данным, нередок в поймах рек Клязьмы и Суворощи. Одна пара, вероятно, регулярно гнездится на окраине Гороховца на высоком правом берегу Клязьмы в сосняке и иногда охотится в городском парке. Жилое гнездо найдено 11 июля 2001 в Гороховецком районе в излучине Клязьмы в 4.5 км к северо-востоку от железнодорожной станции «Галицкая» в островке разреженной пойменной дубравы среди заливных лугов, примерно в 0.5 км от берега Клязь-

мы. Гнездо располагалось в верхней четверти кроны на боковой ветви дуба в развилке на высоте примерно 15 м в старом и ветхом гнезде серой вороны. Обе птицы беспокоились неподалёку. Другое жилое гнездо чеглока найдено 8 мая 2004 в Гороховецком районе в старом сосняке на высоком левом берегу Суворощи на границе кварталов 105 и 106 Чулковского лесничества (в 2 км к северо-западу от деревни Гришино); рядом беспокоились обе птицы. Гнездо располагалось в верхней части кроны сосны высотой примерно 20 м, почти у вершины, у ствола.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus longipes*. Учёты встреченных куликов-сорок проводили во время лодочных экспедиций по Клязьме, когда 9-11 июля 2001 был пройдён участок реки длиной 27.5 км от Гороховца до устья Суворощи, а 21 июня – 1 июля 2003 – от Коврова до посёлка Мстёра (66 км, из них 45.5 км по южной границе Клязьминского заказника от устья Уводи до устья Тезы). Птицы либо кормились или отдыхали на песчаных пляжах у уреза воды на Клязьме, либо летели вдоль русла Клязьмы.

В 2003 году было учтено всего 26-27 взрослых птиц и 3 птенца одного выводка (в среднем 4.0 взрослых птицы на 10 км маршрута). На участке Клязьмы от Коврова до пристани Бережковской и деревни Ширилиха куликов-сорок не обнаружено. Летящими встречены 13 птиц, из них одна группа из 4 особей летела вниз по течению, а остальные – вверх. Три птицы летели поодиночке, 2 группы состояли из 3 птиц. Вероятно, это были кочующие особи. Кроме них, 13-14 взрослых птиц кормились или отдыхали на берегах, из них 4 поодиночке, остальные – парами. Одна из этих пар с 3 пуховыми птенцами величиной в 2/3 взрослой птицы встречена на песчаном берегу с белокрыльником перед густой полосой низких пойменных ивняков на левом берегу Клязьмы в 1.2 км к западу от северного края деревни Глушицы. Одна птица беспокоилась на левом берегу у устья Тезы. Во время стоянки экспедиции на Клязьме у деревни Глушицы с 28 по 30 июня 2003 замечено, что в этом месте на берегах Клязьмы держатся две птицы и одиночка, вероятно, не имевшие птенцов. На том же маршруте от Коврова до Мстёры в 2003 году неделей позже В.Н.Мельников (устн. сообщ.) со студентами и аспирантами Ивановского университета учёл 3 выводка кулика-сороки.

На маршруте по Клязьме ниже Гороховца, пройдённом 9-11 июля 2001, кулики-сороки стали встречаться начиная от устья Люлиха (притока Клязьмы); большая часть их была учтена на участке от моста у деревни Мячково до окрестностей посёлка Галица. Птицы держались в основном поодиночке (11 особей) или парами без птенцов (6 особей). Семья из двух взрослых птиц с лётным птенцом величиной со взрослую особь, но с более коротким клювом, пролетела 11 июля 2001 вниз по течению Клязьмы у устья реки Суворощи; птенец при этом пищал.

Всего же на маршруте от Гороховца до устья Суворощи встречены 20-23 взрослые птицы и одна молодая, т.е. 8.2 взрослых птиц на 10 км маршрута. Плотность населения на этом участке Клязьмы, по сравнению с Ковровским участком, вдвое выше, и это, на наш взгляд, можно объяснить не только тем, что учёт проводили в другой год и месяц, но и большим числом мест, пригодных для кулика-сороки – песчаных пляжей, защищённых от берега ивняками, обилием старичных озёр с песчаными берегами, а также малонаселённостью и низким уровнем беспокойства птиц.

Протяжённость береговой линии Клязьмы от Коврова до устья составляет примерно 170 км, из них нами были обследованы 93.5 км (т.е. 55%), на которых учтены не менее 46 взрослых птиц. Можно предположить, что на участках Клязьмы, оставшихся необследованными – между посёлком Мстёра и Гороховцом, а также в Гороховецком районе ниже устья Суворощи до места впадения Клязьмы в Оку (общей протяжённостью 76.5 км) – кулик-сорока также встречается повсеместно, а часть популяции гнездится. Так, Ю.В.Краснов 16 и 17 июля 2001 встречал выводок кулика-сороки (2 взрослые птицы и 2 лётных птенца) в пойме Клязьмы у деревни Малая Липка (в 2 км к северо-западу от города Вязники); позже выводок исчез. А 18 апреля 2004 Г.С.Ерёмкин видел на Клязьме в Вязниковском районе одну особь около деревни Станки и одиночку и токовавшую пару – на песчаной косе у деревни Неслёсино. Кроме того, по наблюдениям О.В.Герасимовой и гороховецких юннатов, одна пара регулярно гнездится в песчаном карьере в окрестностях города Гороховца.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Одна птица встречена автором 9 июля 2001 на пойменном лугу на левом берегу Клязьмы в 2.5 км ниже по течению от моста через Клязьму в Гороховце. А.А.Могильнер наблюдала одного кроншнепа на берегу пойменного озера Карашово в левобережной части Гороховецкого района 17 июня 2001.

Большой улит *Tringa nebularia*. Во время экспедиции по Клязьме от Коврова до Мстёры в 2003 году был встречен в 7 точках. Беспокоящаяся пара найдена 29 июня 2003 на берегу пойменного озерка с берегами, поросшими лесом, расположенного к югу от озера Вичехра, на границе Ивановской и Владимирской областей, в 2.5 км к западу от деревни Пустынь. Остальные 6 находок относятся к встречам одиночных птиц на берегу реки Клязьмы: 23 июня 2003 одна особь встречена на песчаной косе на участке Клязьмы к северу от деревни Репники; 25 июня птица отмечена на Клязьме в окрестностях деревни Юдиха; 28 июня улит кормился на песчаной косе у полосы ивняка на левом берегу в месте впадения Тезы; ещё одна птица в тот же день кормилась на песчаной отмели у левого берега Клязьмы в 2 км к западу от северного края деревни Глушицы; 30 июня одна особь кормилась на песчаном

мысу на правом берегу, бегая вдоль кромки воды в 1 км ниже по течению от деревни Никулиха (на территории Ивановской области). Другая птица 30 июня 2003 встречена на берегу Клязьмы в 2 км к северо-западу от деревни Добрицы.

В 2001 году на участке Клязьмы от Гороховца до устья Суворощи были учтены 8 птиц в 4 точках. Одна птица 10 июля отдыхала на песчаной косе в 1 км выше по течению от устья Люлиха; 11 июля две птицы и одиночка встречены на песчаном пляже в группе чаек с птенцами и куликов на правом берегу Клязьмы рядом с пойменными озёрами Гороховое и Старица в 1.5 км к западу от железнодорожной станции «Галицкая»; 11 июля три птицы отдыхали и кормились на берегу в 2 км ниже деревни Соловьёво, а одна особь отмечена на песчаной отмели у левого берега Клязьмы недалеко от железнодорожного моста в посёлке Галицы вместе с озёрными *Larus ridibundus* и сизыми *L. canus* чайками, речными крачками *Sterna hirundo*, чернышами *Tringa ochropus* и перевозчиками *Actitis hypoleucos*.

Турухтан *Philomachus pugnax*. И.А.Липилина во время лодочного маршрута 9 мая 2000 на участке Клязьмы от моста в Вязниках до деревни Щёкино насчитала на правом низком берегу 5 стай турухтанов величиной от 30 до 200 особей, всего 400-450 птиц. Они держались в прибрежной полосе не далее чем в 10 м от реки мелкими группами, самцы токовали. Вокруг каждого самца находились по 3-4 самки. Ниже Щёкино на берегах Клязьмы турухтаны встречались единично.

Большой веретенник *Limosa limosa*. Группа из 5 веретенников встречена 11 июля 2001 в группе чаек и куликов на песчаном пляже на берегу Клязьмы в 1.5 км к западу от железнодорожной станции «Галицкая», недалеко от пойменных озёр Гороховое и Старица.

Малая чайка *Larus minutus*. Одна птица встречена 30 июня 2003 летящей над Клязьмой в 4 км к северо-востоку от посёлка Мстёра.

Халей *Larus heuglini*. Две чайки (вероятно, пара) размером с серебристую, с тёмно-сизой мантией, определённые нами как *L. heuglini*, встречены 30 июня 2003 в группе с 4 сизыми и 2 озёрными чайками; птицы отдыхали на песчаной косе с ивняком на левом берегу Клязьмы напротив деревни Пустынь (в Ивановской области).

Зимородок *Alcedo atthis*. В 2003 году во время лодочной экспедиции по Клязьме зимородки были встречены в 5 точках на участке от села Глебово до посёлка Мстёра (протяжённость 57 км). Одну птицу видели вечером 23 июня на левом берегу Клязьмы на участке реки к северу от деревни Ширилиха, другую птицу О.В.Герасимова видела над Клязьмой 27 июня близ 76-го квартала Клязьминского лесничества, в 2.5 км выше устья Тезы. Жилое гнездо зимородка обнаружили 29 июня 2003 в обрывистом правом берегу реки Клязьмы напротив села Глушицы. Ещё одну жилую нору глубиной не менее 48 см нашли

29 июня в 3 км ниже по течению в обрывистом правом берегу среди корней деревьев около деревни Никулиха; 30 июня птица держалась там же. Ещё один зимородок охотился с присады утром 30 июня на Клязьме в 1 км ниже по течению от Никулихи.

В 2001 году во время лодочной экспедиции по Клязьме от Гороховца до устья Суворощи (27.5 км) зимородок был встречен трижды. Одну птицу 10 июля 2001 П.В.Басихин видел в устье реки Люлих, на границе Владимирской и Нижегородской областей, другую 11 июля спугнули с присады на кусте ивы на левом берегу Клязьмы около железнодорожного моста рядом с посёлком Галицы. Ещё одного зимородка П.В.Басихин видел 12 июля над водой на реке Суворощи в 200 м от устья. Кроме того, о гнездовании зимородка на участке Клязьмы около деревни Кондюрино сообщает зоолог А.В.Муханов.

Седой дятел *Picus canus*. Две птицы встречены 11 июля 2001 на высоком правом берегу Клязьмы в полосе пойменного леса в 0.5 км ниже устья Суворощи; в 50 м от них отмечена также лётная молодая птица.

Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola*. Обнаружена только на заболоченных берегах реки Суворощи в трёх местах Гороховецкого района во время экспедиции 2004 года: 6 мая самец сидел на кустике ивы у воды к северу от деревни Федорково; 9 мая в 1.5 км к северо-востоку от деревни Чудская другой самец сидел над водой на стебле тростника; третий самец встречен 12 мая на кусте ивы над рекой среди открытого заболоченного пойменного луга.

Обыкновенный сверчок *Locustella naevia*. Поющий самец встречен 30 июня 2003 в пойме Клязьмы на границе Ивановской и Владимирской областей в ивняке на берегу водоёма Старица в 3 км к западу-юго-западу от деревни Пустынь. Не менее 4 поющих самцов отмечены 9 мая 2004 в обширных тростниковых крепях на реке Суворощи в 1.5 км к северо-востоку от деревни Чудская, ещё один самец пел в тростниках в месте впадения в Суворощь речки Илинды. Всего на участке реки Суворощи, идущем в северо-восточном направлении в 1-2 км к северо-востоку от деревни Гончары, 10 мая 2004 в тростниках учтены 6 поющих самцов*.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Пара каменок 25 июня 2003 собирала корм около лесопилки в деревне Дорониха Ковровского района, ещё пара – там же около водокачки. В деревне Пантелеево на развалинах кирпичного дома 27 июня 2003 встречен самец каменки с кормом.

Дубровник *Emberiza aureola*. Вечером 30 июня 2003 три самца дубровника пели на кустах ив на заливных лугах с мокрыми пониже-

* Нужно отметить, что для тростниковых крепей более характерно обитание соловьиного сверчка *Locustella luscinioides – прим. ред.*

ниями и куртинами ивняка у посёлка Мстёра примерно в 1 км к северу от устья реки Мстёрки. Ю.В.Краснов в 20-х числах июля 2003 года видел самца с кормом на сенокосном заливном лугу в пойме Клязьмы севернее города Вязники.

Литература

Волошина О.Н. 2005. Наблюдения за змееядом во Владимирской области // *Орнитология* **32**: 117-119.

Конторщиков В.В., Зубакин В.А., Плец М.Ю., Смирнова Е.В. 1996. Места концентрации гусей на реке Клязьме в период весеннего пролёта // *Казарка* **2**: 249-252.

Соболев Н.А., Руссо Б.Ю. 1998. Редкие виды птиц Владимирской области, отмеченные на территории заказника «Клязьминско-Лухский» // *Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России*. М.: 132-134.

Фокин С.Ю. 2000. Коростель в пойме Клязьмы // *Коростель в Европейской России. Численность и распространение*. М.: 105-110.

Пойма реки Клязьма от города Ковров до устья. 2000 // *Водно-болотные угодья России. Т.3. Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции*. М.: 98-101.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1645**: 3578-3581*

О пролёте гаршнепа *Lymnocryptes minimus* в Нижнем Поволжье

В.П.Белик, В.Н.Пименов

Второе издание. Первая публикация в 2013[*]

Судя по всем литературным данным, гаршнеп *Lymnocryptes minimus* в Нижнем Поволжье является очень редким пролётным видом. Лишь В.Ф.Чернобай (2004а,б) указывает этот вид в качестве малочисленного мигранта Волгоградской области и редкой пролётной птицы в северных (волгоградских) районах Волго-Ахтубинской поймы, не приводя, однако, каких-либо фактических данных о его встречах. Нами же в течение 2007-2012 годов гаршнеп здесь в пойме Волги ни разу не регистрировался (Белик, Гугуева, Махмутов 2014), хотя это могло быть обусловлено сравнительно небольшим объёмом полевых работ в период миграций данного вида и его особой скрытностью.

Но в XX веке гаршнепа ни разу не встречали и в дельте Волги (Воробьёв 1936; Луговой 1963; Русанов 2011; и др.). На миграциях в Нижнем Поволжье он отмечался лишь в XIX веке Н.Арцибашевым (Artzibascheff 1859), В.Яковлевым (1872) и В.А.Хлебниковым (1890, 1928).

[*] Белик В.П., Пименов В.Н. 2013. О пролёте гаршнепа в Нижнем Поволжье // *Стрепет* **11**, 2: 106-109.

Последний встречал гаршнепа на весеннем и осеннем пролёте, добывал птиц, но в каких районах Астраханской губернии – не указывал. В фондах Харьковского музея природы хранится тушка гаршнепа, добытого В.А.Хлебниковым 18 сентября 1882 (ст. ст.) в Астраханской губернии, но тоже без указания места (Девятко, Джамирзоев 2012).

Кроме того, в начале XX века гаршнеп встречался на весеннем и осеннем пролёте (в апреле и августе) в окрестностях Сарепты у Волгограда (Лорец 1928). Сроки пролёта были приведены автором, активно коллектировавшим птиц для зарубежных музеев, возможно, по старому стилю, поскольку весь материал был собран им до 1914 года.

Позже на Сарпинских озерах в Калмыкии гаршнепа уже не встречали (Демьянова 1987). Не нашли его там и А.О.Шубин с коллегами (2001), специально изучавшие миграции куликов с 15 по 20 сентября 1999 на трёх озёрных системах Сарпинской низменности. Редок гаршнеп был и на Манычских водоёмах Калмыкии, где его изредка отмечали лишь на осеннем пролёте с 4 сентября по 20 октября (Демьянова, Кукиш 1990).

Более обычен гаршнеп в Среднем Поволжье – в Саратовской области и Волжско-Камском крае (Плесский 1977; Завьялов и др. 2007; и др.). Он встречен также 14 апреля 1950 в низовьях реки Еруслан у границы с Саратовской областью, на самом севере Волгоградского Заволжья (Юдин 1952).

В связи с этим определённый интерес представляют наши небольшие материалы по миграциям гаршнепа, собранные в Волгоградской области в последнее время. Впервые одиночная птица встречена нами 5 мая 2013 на заболоченном берегу большого пруда у хутора Ромашки на севере Палласовского района в полупустынном Заволжье. А 25 сентября 2013 гаршнеп был обнаружен в Волго-Ахтубинской пойме близ посёлка Кировец Среднеахтубинского района против Волгограда. Он держался на небольшом заболоченном илистом участке в понижении возле берега Волго-Ахтубинского канала, среди разреженных зарослей макрофитов (рогоз, тростник, кусты ивы) у ручья. При регулярной проверке этого места в период с 5 по 15 октября там практически ежедневно вспугивали от 1 до 3 гаршнепов, причём максимум был отмечен 6 октября, что свидетельствует, возможно, о прохождении пика пролёта этого вида, приуроченного в Среднем Поволжье к концу сентября – началу октября (Богданов 1871; Плесский 1977; Завьялов и др. 2007). Исчезли гаршнепы у посёлка Кировец лишь к 17 октября 2013. Безрезультатными оказались их поиски и в последующие дни.

Примерно в эти же сроки, в конце сентября – начале октября, гаршнепы отмечались здесь и в 2011-2012 годах, но специальных наблюдений за ними тогда не проводили. А в 2013 году, по опросным данным, в первой половине октября они несколько раз встречались и в со-

седних районах Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, профессиональный птицелов А.В.Жменя 12 октября 2013 наблюдал до 10 гаршнепов на правобережье Волги – по заболоченному днищу балки Царица у западной окраины Волгограда.

Судя по литературным данным, весной в Поволжье первые гаршнепы появляются в середине апреля (12 апреля 1937; 14 апреля 1950 – Козловский 1949; Юдин 1952), а последние пролётные птицы задерживаются до конца мая (30 мая 1913 – Завьялов и др. 2007). Осенний же пролёт начинается в конце августа (20 августа 1868; 20 августа 1926 – Богданов 1871; Завьялов и др. 2007). Более активные миграции наблюдаются с середины сентября до начала октября, а последние птицы встречаются до морозов в ноябре (7 ноября 1938; 23 ноября 19… – Плесский 1977). На незамерзающих ручьях иногда они могут, вероятно, зимовать, как это отмечается на Донбассе (Белик 1990) и в Предкавказье (Казаков и др. 1983; Комаров 1988; Хохлов и др. 1988, 1991).

Гаршнепы, кормящиеся в заболоченных зарослях макрофитов, взлетают обычно лишь при подходе к ним вплотную. Они поднимаются молча, иногда издавая тихие хлопки крыльями, и сравнительно медленно пролетев 20-30 м вновь садятся на землю. При повторных попытках обнаружить их птицы затаиваются и подпускают человека на 1 м и ближе. Наши встречи гаршнепов в Волго-Ахтубинской пойме подтверждены фотографиями птиц в полёте, позволяющими достаточно чётко идентифицировать данный вид.

Литература

Белик В.П. 1990. Миграции куликов в степной части бассейна Дона // *Тр. Тебердинского заповедника* **11**: 67-90.

Белик В.П., Гугуева Е.В., Махмутов Р.Ш. 2014. Материалы к фауне куликов северной части Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области // *Кулики в изменяющейся среде Северной Евразии: Материалы 9-й международ. науч. конф.* М.: 113-118.

Богданов М.Н. 1871. Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья и долины Средней и Нижней Волги (биогеографические материалы) // *Тр. Общ-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те* **1**, 1: 1-226.

Воробьёв К.А. 1936. Материалы к орнитологической фауне дельты Волги и прилежащих степей // *Тр. Астраханского заповедника* **1**: 1-60.

Девятко Т.Н., Джамирзоев Г.С. 2012. *Каталог орнитологической коллекции Музея природы Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина (Кавказ, южные регионы России и Украины, Средняя Азия, Казахстан).* Харьков: 1-398.

Демьянова О.М. 1987. Численность и размещение водоплавающих и околоводных птиц Калмыкии // *Животные водных и околоводных биоценозов полупустыни*. Элиста: 45-55.

Демьянова О.М., Кукиш А.И. 1990. Сезонные миграции куликов в Калмыкии // *Миграции и зимовки птиц Северного Кавказа*. Ставрополь: 59-66.

Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г. и др. 2007. *Птицы севера Нижнего Поволжья*. Кн.3. Состав орнитофауны. Саратов: 1-328.

Казаков Б.А., Пекло А.М., Тильба П.А., Белик В.П. 1983. Кулики (Aves, Charadriiformes) Северного Кавказа. Сообщение 4 // *Вестн. зоол.* 2: 47-54.

Козловский П.Н. 1949. К орнитофауне Саратовской области // *Учён. зап. Саратов. пед. ин-та.* Фак. естествозн. **13**: 55-126.

Комаров Ю.Е. 1988. К фауне куликов Северной Осетии // *Ресурсы животного мира Сев. Кавказа: Тез. докл. науч.-практ. конф.* Ставрополь: 82-85.

Лорец В.Ф. 1928. Список птиц окрестностей Сарепты // *Изв. Саратов. общ-ва естествоиспыт.* **3**, 1: 73-95.

Луговой А.Е. 1963. Птицы дельты Волги // *Тр. Астраханского заповедника* **8**: 9-185.

Плесский П.В. 1977. Отряд куликообразные Charadriiformes // *Птицы Волжско-Камского края: Неворобьиные*. М.: 159-199.

Русанов Г.М. 2011. *Птицы Нижней Волги*. Астрахань: 1-390.

Хлебников В.А. 1890. Список птиц Астраханской губернии // *Протокол заседаний Общ-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те*. **22**, прил. 121: 1-32.

Хлебников В.А. 1928. Список птиц Астраханского края с распределением их по характеру пребывания в крае // *Материалы к познанию природы Астраханского края* **1**, 3: 1-39.

Хохлов А.Н., Комаров Ю.Е., Бичеров А.П. (1988) 2016. Зимующие кулики Ставропольского края и Северной Осетии // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1311): 2603-2604.

Хохлов А.Н., Тельпов В.А., Битаров В.Н. 1991. Зимняя авифауна г. Кисловодска и его окрестностей // *Фауна, население и экология птиц Северного Кавказа*. Ставрополь: 123-125.

Чернобай В.Ф. 2004а. *Птицы Волгоградской области*. Волгоград: 1-287.

Чернобай В.Ф. 2004б. Наземные позвоночные природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» // *Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»: Природно-ресурсный потенциал*. Волгоград: 130-141.

Шубин А.О., Иванов А.П., Касаткина Ю.Н. 2001. Предварительный анализ размещения скоплений мигрирующих куликов в Калмыкии // *Достижения и проблемы орнитологии Сев. Евразии на рубеже веков*. Казань: 412-428.

Юдин К.А. 1952. Характеристика фауны птиц района Валуйской опытно-мелиоративной станции (Сталинградская обл.) // *Тр. Зоол. ин-та АН СССР* **11**: 235-264.

Яковлев В. 1872. Список птиц, встречающихся в Астраханской губернии // *Bull. de la Societe Imperiale des Naturalists de Moscou* **43**, 4: 323-361.

Artzibascheff N. 1859. Excursions et observations ornithologiques sur les bords de la Sarpa en 1858 // *Bull. de la Societe Imperiale des Naturalists de Moscou* **32**, 3: 1-108.