ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1652

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1652

СОДЕРЖАНИЕ

3861-3885 О встречах и гнездовании некоторых птиц на Витязевском лимане и в окрестностях Анапы. И.В.КУЗИКОВ

3886-3889 К орнитофауне верховий реки Чоны (Катангский район, Иркутская область). В.В.ПОПОВ, А.А.СЕРЫШЕВ

3889-3890 Первая регистрация белопоясного стрижа *Apus pacificus* в Омской области. А.А.НЕФЁДОВ

3890-3896 Летняя орнитофауна озера Маныч (северное Ставрополье). Н.В.ЦАПКО

3897-3900 К биологии обыкновенной кукушки *Cuculus canorus* в западном Забайкалье. Ц.З.ДОРЖИЕВ, Г.М.ХАБАЕВА

3901-3905 Авдотка *Burhinus oedicnemus* на Северо-Западном Кавказе. П.А.ТИЛЬБА, Ю.А.АНДРЮЩЕНКО, Р.А.МНАЦЕКАНОВ, М.А.ДИНКЕВИЧ

3906-3907 О характере пребывания соловьиной широкохвостки *Cettia cetti* в восточном Предкавказье. И.И.ГИЗАТУЛИН, А.Н.ХОХЛОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования 6 августа 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1652

CONTENTS

3861-3885 The sightings and nest records of some birds on the Vityazevsky Liman and in the vicinity of Anapa. I.V.KUZIKOV

3886-3889 To the avifauna of the upper reaches of the Chona River (Katanga Raion, Irkutsk Oblast). V.V.POPOV, A.A.SERYSHEV

3889-3890 The first registration the Pacific swift *Apus pacificus* in Omsk Oblast. A.A.NEFEDOV

3890-3896 Summer avifauna of Lake Manych (northern Stavropol Krai). N.V.TSAPKO

3897-3900 To the biology of the cuckoo *Cuculus canorus* in western Transbaikalia. Ts.Z.DORZHIEV, G.M.KHABAEVA

3901-3905 The Eurasian stone curlew *Burhinus oedicnemus* in the North-Western Caucasus. P.A.TILBA, Yu.A.ANDRYUSCHENKO, R.A.MNATSEKANOV, M.A.DINKEVICH

3906-3907 On the status of the Cetti's warbler *Cettia cetti* in the eastern Ciscaucasia. I.I.GIZATULIN, A.N.KHOKHLOV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1652****: 3861-3885*

О встречах и гнездовании некоторых птиц на Витязевском лимане и в окрестностях Анапы

И.В.Кузиков

Игорь Викторович Кузиков. Москва, Россия. E-mail: kuzikov-y@mail.ru

Поступила в редакцию 3 августа 2018

Значительное число работ, посвящённых орнитофауне крупных регионов Северо-Западного Предкавказья и Причерноморья, частично касаются окрестностей Анапы (Птушенко 1939; Волчанецкий и др. 1962; Очаповский 1973; Казаков и др. 1981, 2004; Емтыль и др. 1993; Тильба, Мнацеканов 2005; Шариков и др. 2006; Белик 2010; Белик, Бабкин 2010). Однако орнитофауна города изучена недостаточно. Ей посвящены лишь несколько работ (Зинякова, Камаева 1989; Зинякова и др. 1991; Тильба, Мнацеканов 2006). Бо́льшее внимание в последнее время уделялось лишь изучению фауны птиц заповедника «Утриш» и его ближайшего окружения (Сара 2007; Лохман, Быхалова 2012, 2018; Кузиков 2013а; Лохман 2013; Лохман и др. 2013, 2015; Джамирзоев и др. 2014; Рудовский 2014; Мнацеканов, Тильба 2014, 2015; Рупасов 2018; Barabashin 2006 –цит. по: Мнацеканов, Тильба 2015). Хорошо изучена также фауна птиц, в основном водоплавающих и околоводных, прилежащих к Анапе северных территорий, в частности, расположенного на северо-западе Кизилташского лимана и Таманского полуострова (Кищинский 1960; Тильба 1983а,б; Тильба и др. 1990, 1995; Лохман, Емтыль 2000; Емтыль и др. 2001; Тильба и др. 2002; Лохман 2004а,б; Лохман 2017; Лохман и др. 2004, 2005, 2006, 2008; Мнацеканов и др. 2007; Динкевич и др. 2008; Белик и др. 2009; Пекло, Тильба 2013).

2-20 мая 2018 мною обследованы южная часть побережья Витязевского лимана, Чембуркское озеро и плавни реки Анапки, а также долина реки Сукко. Проведённые наблюдения позволили получить новые дополнительные материалы по фауне, пролёту и гнездованию некоторых видов птиц этого региона. Во время экскурсий в окрестностях Анапы и Витязевского лимана учётов птиц не проводилось из-за невозможности точного подсчёта многих хаотично перемещавшихся особей. Количество встреченных особей приведено в соответствии с имевшимися наблюдениями, сделанными во время экскурсий, протяжённость которых составляла от 6 до 12 км, с использованием 10-кратного бинокля, а также на основе фотоснимков стай и скоплений пролётных и кормящихся видов птиц.

Фазан *Phasianus colchicus*. В окрестностях Анапы 1-2 пары птиц держались постоянно 2-19 мая на пустыре в районе Джемете. Одиночных фазанов я вспугивал во время экскурсий в редколесье на Витязев-

ской косе 7 и 10 мая, а также 5 мая в заброшенном винограднике в окрестностях хутора Чембурка.

Лебедь-шипун *Cygnus olor*. Скопления шипунов до 30 особей были обычны на Витязевском лимане и Чембуркском озере. Рассредоточенные особи и группы 3 мая кормились на лимане вблизи побережья, у тростниковых зарослей в селе Витязево. Стая шипунов, насчитывавшая 31 особь, 16 и 19 мая держалась у центрального песчаного пляжа Анапы, подкармливаемая отдыхающими (рис. 1). По словам гида, проводящего экскурсии по городу, стая лебедей постоянно держится на этом месте и служит своеобразной визитной карточкой Анапы.

Рис. 1. Лебеди-шипуны *Cygnus olor* у центрального пляжа Анапы. 16 мая 2018. Фото автора.

На Чембуркском озере скопление шипунов более чем из 30 особей учтено 11 мая, а 16 мая там же была встречена пара взрослых птиц с 6 подросшими пуховыми птенцами (рис. 2). Возможно, выводки шипунов, скрытые густыми высокими зарослями тростника, были и в обширных плавнях реки Анапки. На одном доступном для обзора участке реки 5 мая были обнаружены три молодых лебедя, отдыхавших на берегу и подпустивших наблюдателя на 5-10 м.

Пеганка *Tadorna tadorna*. Пары и группы пеганок – до 16 особей за экскурсию – постоянно встречались 4-20 мая при посещении Витязевской косы, берегов и островов лимана.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Стайка из 9 селезней встречена мною 7 мая на небольшом озере на песчаной косе у Витязевского лимана. В

другие дни 4-20 мая отмечались в основном пары крякв: в устье реки Анапки, на Чембуркском озере, на протоке, впадающей в лиман на Витязевской косе, у хутора Капустин, а также на берегах лимана.

Свиязь *Anas penelope*, **шилохвость** *Anas acuta*. Пара свиязей и самец шилохвости встречены на пролёте 15 мая на острове Витязевского лимана.

Рис. 2. Самка лебедя-шипуна *Cygnus olor* с птенцами. Чембуркское озеро, 16 мая 2018. Фото автора.

Чирок-трескунок *Anas querquedula*. Две стайки из 7-8 трескунков отмечены 5 мая и 11 мая на Чембуркском озере. Гнездование чирков, установленное по обнаруженной 18 мая скорлупе одного яйца (45.2× 34.6 мм), расклёванного, вероятно, вороной, предполагается на берегу Витязевского лимана вблизи хутора Песчаного.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. Пролётный самец хохлатой чернети держался 19 мая в устье реки Анапки.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. Большой баклан регулярно гнездился на Кизилташском и Витязевском лиманах (Лохман 2004; Динкевич и др. 2008; Лохман и др. 2008). Вблизи Анапы баклан отмечался на черноморском побережье от Малого Утриша до Сукко (Сара 2007; Кузиков 2013а). Мною группа бакланов из 15 особей, которая отдыхала на мачте в 200 м от берега, отмечена 19 мая вблизи центрального пляжа Анапы. Одиночная особь встречена 20 мая на острове Витязевского лимана.

Кваква *Nycticorax nycticorax*. На берегах Витязевского лимана одиночную квакву я наблюдал 4 мая между хуторами Песчаный и Капустин. Ещё 4 особи встречены 11 мая над Чембуркским озером.

Жёлтая цапля *Ardeola ralloides*. Одиночная жёлтая цапля обнаружена 18 мая на песчано-ракушечном острове в южной части Витязевского лимана.

Малая белая цапля *Egretta garzetta*. Одиночная особь встречена 10 мая на Витязевской косе на протоке между морем и лиманом (рис. 3).

Рис. 3. Малая белая цапля *Egretta garzetta*. Витязевская коса. 10 мая 2018. Фото автора.

Большая белая цапля *Casmerodius albus*. Большая белая цапля прежде была встречена мною вблизи Большого Утриша (Кузиков 2013а). Стаю из 8 этих цапель на пролёте я наблюдал 5 мая над плавнями реки Анапки.

Серая цапля *Ardea cinerea*. Одна особь поднята 12 мая на протоке вблизи Витязевского лимана.

Рыжая цапля *Ardea purpurea*. Из цапель, отмеченных во время экскурсий в окрестностях Анапы, рыжая цапля встречалась чаще других. Её видели у берегов Витязевского лимана 3-5 мая, в окрестностях Чембуркского озера и в плавнях реки Анапки – 11 и 16 мая.

Чомга *Podiceps cristatus*. Пара чомг отмечена 5 мая на озере среди плавней Анапки в подходящем для гнездования месте. На Чембуркском озере от 1 до 3 особей встречены 5, 11 и 16 мая, где, возможно, гнездились.

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis*. Ранее была обнаружена мною во второй половине мая 2013года на озере Сукко (Кузиков 2013а). На Витязевском лимане стайки из 8 и 6 черношейных поганок встречены 4 и 10 мая.

Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus*. В окрестностях Анапы пустельгу прежде отмечали весной и осенью на пролётах на Кизилташских лиманах и летом в предгорьях (Тильба 1983; Емтыль и др.

Рис. 4. Кладка пустельги *Falco tinnunculus* в гнезде сороки Pica pica.
Витязевская коса. 10 мая 2018. Фото автора.

Рис. 5. Кладка яиц светлой морфы пустельги *Falco tinnunculus* в гнезде серой вороны *Corvus cornix*. Витязевская коса. 12 мая 2018. Фото автора.

1993). Пустельга была встречена также мною в низовьях реки Сукко в середине мая (Кузиков 2013а). В черте города Анапы 2-7 мая 2018 я несколько раз встречал пустельгу на пустыре в районе Джемете, а 16

мая наблюдал с набережной её успешную охоту на ящерицу *Darevskia* sp. на крутом склоне у моря. Гнездование пустельги установлено в редколесье из лоха узколистного *Elaeagnus angustifolia* на Витязевской песчаной косе между морем и лиманом, а также на берегу Чембуркского озера. На Витязевской косе найдено три гнезда. Гнёзда располагались в кронах лоха: 10 мая – в старом гнезде сороки на высоте 2.4 м; 12 и 15 мая – в гнёздах серой вороны на высоте 3.0 м. В двух гнёздах 10 и 12 мая были полные насиженные кладки из 6 яиц, в третьем – 5 яиц (рис. 4, 5). Размеры яиц (n = 12) из двух кладок, обнаруженных: 10 мая – 40.0×31.6, 39.3×31.5, 39.8×31.4, 39.0×31.7, 39.4×31.7, 38.8×31.9 мм; 12 мая – 40.4×32.8, 40.1×32.0, 40.7×32.4, 40.8×32.2, 40.7×32.5, 40.3×31.6 мм. Гнездо, найденное 11 мая на берегу Чембуркского озера, располагалось в кроне лоха узколистного на высоте около 6 м и было устроено в гнезде вороны. Осмотреть гнездо не удалось, но, предположительно, оно содержало кладку, которую крепко насиживала птица.

Кобчик *Falco vespertinus*. Самец встречен 14 мая в высоком ленточном тополёвнике в долине реки Сукко.

Чеглок *Falco subbuteo*. Одна пара чеглоков и одиночные особи встречались мне четырежды с 10 по 20 мая в редколесье из лоха узколистного на песчаной косе между морем и Витязевским лиманом. Другая пара этих птиц 17 мая проявляла беспокойство и, возможно, гнездилась на крутом берегу лимана у хутора Песчаного.

Болотный лунь *Circus aeruginosus*. Одиночные птицы, барражировавшие над берегами Витязевского лимана, Чембуркского озера и плавнями реки Анапки, встречались 4-18 мая. Во время посещения мною колонии хохотуний с её периферии 10 мая была поднята самка болотного луня, привлечённая, по-видимому, лёгкой добычей. Интересно, что она, находясь на земле, не вызывала беспокойства у гнездящихся чаек, но, потревоженная мною, была атакована ими в воздухе.

Канюк *Buteo buteo*. Встречен 14 мая 2018 в долине реки Сукко, где прежде неоднократно отмечался как довольно обычный вид (Белик, Бабкин 2010; Кузиков 2013а).

Камышница *Gallinula chloropus*. В низовьях реки Анапки 19 мая отмечено строительство гнезда камышницей в небольшой куртине рогоза. Гнездо строилось из листьев рогоза, которые она носила в клюве с противоположного берега.

Лысуха *Fulica atra*. Одна и четыре особи были встречены на Чембуркском озере 11 и 16 мая.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Гнездование кулика-сороки отмечалось на Кизилташских лиманах (Тильба и др. 1990). В южной части Витязевского лимана со стороны косы 3-7 мая держалось до 10 куликов-сорок, кормившихся на топких берегах. Позднее, 10-20 мая, одиночные кулики-сороки и территориальные пары встречались на

Рис. 6. Гнездо кулика-сороки *Haematopus ostralegus* на острове в Витязевском лимане. 15 мая 2018. Фото автора.

Рис. 7. Кладка кулика-сороки *Haematopus ostralegus* на острове в Витязевском лимане. 15 мая 2018. Фото автора.

песчано-ракушечных островах возле гнездовий. Всего обнаружено четыре гнезда. Два из них найдены 15 мая: в песчаной ямке диаметром 180×170 мм и глубиной 20 мм, расположенной в 2 м от воды, с кладкой из 1 яйца (51.2×38.2 мм); в 1.5 м от уреза воды, на ракушечном наносе,

закреплённом песком и корнями растений, с полной кладкой из 4 яиц (55.8×36.9, 52.2×38.3, 52.6×38.0, 53.1×38.3 мм), диаметр гнездовой лунки 200 мм, глубина 55 мм (рис. 6, 7). Два других гнезда обнаружены 18 и 20 мая с кладками из 3 яиц. Размеры яиц из кладок: 18 мая – 58.0×40.4, 57.3×39.8, 55.1×39.6 мм; 20 мая – 54.1×40.7 (измерено одно яйцо). На берегу Витязевской косы между селом Витязево и станицей Благовещенской 12 мая найдено разорённое гнездо с разбитой скорлупой одного яйца (56.9×41.5 мм).

Ходулочник *Himantopus himantopus*. От 1 до трёх 4 и стайка из 9 ходулочников 4-5 и 15-20 мая держались на берегах в разных частях Витязевского лимана. Над небольшим озером в плавнях реки Анапки 7 мая встречены 3 летевшие особи.

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*. Группы и стаи шилоклювок от 6 до 30 особей встречались 7-20 мая на островах в Витязевском лимане и берегах в низовьях широкой протоки.

Рис. 8. Гнездо шилоклювки *Recurvirostra avosetta* с полной кладкой.
Остров в Витязевском лимане. 18 мая 2018. Фото автора.

По одним данным, гнездовья шилоклювки и хохотуньи, например, на косе Голенькой, разделены во времени (Лохман 2004а), по другим – их поселения взаимно исключают друг друга, если они расположены на одном и том же озере (Тильба и др. 2002). Мною небольшая колония шилоклювок, обнаруженная 15 мая на песчано-ракушечном острове в Витязевском лимане, была расположена недалеко, в 200 м, от колонии

хохотуний, что не мешало успешному гнездованию обоих видов. В их колониях в это время шли откладка и насиживание яиц, происходило вылупление птенцов. Совместно с шилоклювками гнездились малые крачки, начавшие строительство гнёзд и откладку яиц. При осмотре колонии 15 мая в гнёздах шилоклювок были обнаружены неполные и полные кладки, содержавшие от 1 до 4 яиц. Из 14 гнёзд, найденных и осмотренных 18 мая, 13 были с кладками: из 2 яиц (3 гнезда), из 3 яиц (2 гнезда), из 4 яиц (8 гнёзд), а в одном гнезде обнаружены 3 птенца и наклюнутое яйцо (рис. 8, 9).

Рис. 9. Гнездо шилоклювки *Recurvirostra avosetta* с 3 птенцами и наклюнутым яйцом. Остров в Витязевском лимане. 18 мая 2018. Фото автора.

Часть гнёзд представляла собой углубления в грунте без выстилки, другие были скудно или обильно выстланы стеблями растений. Исходя из срока инкубации кладки, составляющим 22-24 дня (Козлова 1961), откладка первого яйца в этой колонии началась 21-23 апреля. Примечательно, что при подходе наблюдателя к колонии и во время её осмотра 15-20 мая шилоклювки незаметно покидали гнёзда и не проявляли беспокойства или агрессии, не отводили от гнёзд, что обычно отмечали в их поведении (Гладков 1951; Козлова 1961). Размеры гнёзда, обнаруженного 15 мая в колонии: диаметр 140 мм, глубина 20 мм. Размеры яиц (мм) и их масса (г, в скобках): 47.9×34.9 (30); 49.8×35.6 (32); 49.9×35.5 (32); 48.4×35.3 (31). На берегу лимана между селом Ви-

тязево и станицей Благовещенской в 1.5-2 м от уреза воды 12 мая найдено несколько гнёзд, разорённых, предположительно, серой вороной, с остатками скорлупы. Размеры двух наименее разбитых яиц, мм: 51.0×34.4 и 52.3×35.0.

Чибис *Vanellus vanellus*. Одна особь была встречена 7 мая на Витязевской косе.

Тулес *Pluvialis squatarola*. Группы и стайки до 20 тулесов встречались на пролёте с 7 по 20 мая вместе с другими куликами на берегах и островах Витязевского лимана.

Галстучник *Charadrius hiaticula*. Одиночная особь встречена на пролёте 10 мая на берегу Витязевского лимана.

Малый зуёк *Charadrius dubius*. Территориальные пары малых зуйков встречены 10 и 15 мая на острове в Витязевском лимане и на песчаных берегах протоки.

Морской зуёк *Charadrius alexandrinus*. Одна-две пары морских зуйков 4 мая кормились на песчано-ракушечном побережье лимана у села Витязево. На берегах острова в Витязевском лимане зуйки отмечались с 7 по 20 мая.

Большой веретенник *Limosa limosa*. Пять особей совместно с другими куликами (тулес, чернозобик, кулик-воробей, камнешарка) встречены на берегу Витязевского лимана 12 мая.

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*. Прежде среднего кроншнепа в исследуемом районе встречали на пролёте с августа по сентябрь, также в конце июля 1973 года (Пекло, Тильба 2013). Мною одна особь отмечена на пролёте 7 мая на берегу острова в Витязевском лимане.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Одиночные пролётные особи, от 1 до 3 за одну экскурсию, встречены 3-18 мая на берегах Витязевского лимана и его островов.

Травник *Tringa totanus*. Одиночная особь и пара пролётных птиц отмечены на берегу Витязевского лимана 7 и 15 мая.

Большой улит *Tringa nebularia*. 15 мая встречена одиночная птица в устье протоки, впадающей в Витязевский лиман.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Пара перевозчиков встречена 7 мая на берегу протоки в 0.5 км от Витязевского лимана.

Камнешарка *Arenaria interpres*. Одиночки и стайки камнешарок из 6-8 и 21 особей в сообществе с другими куликами наблюдались 12, 15-20 мая на берегах песчано-ракушечного острова в Витязевском лимане.

Кулик-воробей *Calidris minuta*. В окрестностях Анапы отмечался мною на пролёте в устье реки Сукко (Кузиков 2013а). На берегах Витязевского лимана 3 и 15 особей держались 7 и 12 мая вместе с тулесами, чернозобиками и большими веретенниками.

Чернозобик *Calidris alpina*. Крупная стая из 44 особей и мелкие группы куликов встречены 7 мая на берегу Витязевского лимана.

Хохотунья *Larus cachinnans*. Обычный вид, встречавшийся во все дни экскурсий в окрестностях Анапы. Колония хохотуний численностью приблизительно 150 особей обнаружена и осмотрена 10 и 15 мая на одном из островов Витязевского лимана (рис. 10).

Рис. 10. Колония хохотуний *Larus cachinnans*. Остров в Витязевском лимане. 15 мая 2018. Фото автора.

Остров образован ракушечно-песчаными отложениями, местами закреплёнными редкой травянистой растительностью и низкорослым тростником по берегам. Длина острова, вытянутого дугообразной полосой, составляет 2.5 км, ширина от 40 до 200 м. Гнёзда хохотуний располагались на наиболее удалённой от берега восточной части острова. Гнёзда 10-15 мая содержали неполные и полные кладки из 1-3 яиц, в некоторых из них происходило вылупление птенцов и были найдены наклюнутые яйца, в других – пуховые птенцы. В нескольких гнёздах или поблизости от них были замечены мёртвые птенцы, причина гибели которых не установлена. Они могли погибнуть из-за переохлаждения или могли быть задушены бродячими собаками, три из которых были обнаружены в первый день посещения колонии. Два осмотренных 10 и 15 мая гнезда имели следующие размеры, мм: 1) диаметр гнезда 350×400, диаметр лотка 240, глубина лотка 80; 2) диаметр гнезда 300, диаметр лотка 200. Размеры (мм) содержавшихся в них яиц и их масса (г, в скобках): 10 мая – 63.1×45.9 (70); 62.8×46.0 (69); 68.9×45.7 (70); 15 мая – 68.4×45.6 (73), 69.3×46.5 (76). В одном из гнёзд коло-

нии, содержавшим кладку из 3 яиц, 15 мая было обнаружено аномально малое яйцо (рис. 11). Оно имело форму правильного овала и, как выяснилось при его выдувании, не содержало желтка. Его размеры 48.6×35.2 мм, масса 33 г, масса скорлупы 3.03 г. По сравнению с другими яйцами, измеренными в этой колонии, оно в 2.2 раза меньше по массе и в 1.3-1.4 раза меньше по размерам.

Рис. 11. Гнездо хохотуньи *Larus cachinnans* с яйцом аномально малого размера. Остров в Витязевском лимане. 15 мая 2018. Фото автора.

У птиц нашей фауны яйца аномально малого размера изредка находили в гнёздах кряквы *Anas platyrhynchos*, обыкновенной гаги *Somateria millissima*, серебристой *Larus argentatus* и морской *L. marinus* чаек, моевки *Rissa tridactyla*, полярной крачки *Sterna paradisaea*, морского песочника *Calidris maritima*, краснозобого конька *Anthus cervinus*, камышевки-барсучка *Acrocephalus schoenobaenus* (Татарникова, Шкляревич 1981), серой цапли *Ardea cinerea*, вертишейки *Jynx torquilla*, чёрного дрозда *Turdus merula*, жулана *Lanius collurio*, обыкновенного канюка *Buteo buteo* (Кныш и др. 1984), тундрового лебедя *Cygnus bewickii*, серого журавля *Grus grus* (Винтер 2008), лысухи *Fulica atra* (Кошелев 1984) и речной крачки *Sterna hirundo* (Вишневский 2011). Мною аномально малое яйцо было обнаружено в 2006 году в неполной кладке горной трясогузки *Motacilla cinerea* (Кузиков 2013б). Карликовые яйца в гнёздах хохотуний прежде не отмечались. Находки аномальных яиц представляют интерес, т.к. позволяют оценить частоту

патологических явлений в половой системе самок в репродуктивный период (Кныш и др. 1984).

Кроме необычно малого яйца, в другом гнезде в колонии хохотуньи было обнаружено яйцо аномальной цианической окраски (рис. 12). Кладки с яйцами такой необычной ярко-голубой окраски с редуцированным рисунком очень редко находили у озёрных чаек *Larus ridibundus* в Нидерландах и Белоруссии (Гричик, Пышко 2017).

Рис. 12. Гнездо хохотуньи *Larus cachinnans* с яйцом аномальной цианической окраски. Остров в Витязевском лимане. 15 мая 2018. Фото автора.

Черноголовая чайка *Larus melanocephalus*. На небольшом острове Витязевского лимана, наблюдаемом с берега из села Витязево, 4 мая отмечено совместное скопление или, возможно, гнездовье 6-8 черноголовых чаек и около 50 морских голубков. Осмотреть остров из-за его труднодоступности не удалось. Одиночная черноголовая чайка встречена 10 мая на острове Витязевского лимана.

Морской голубок *Larus genei*. От 4 до 30 особей держались 4-20 мая на островах и на берегу Витязевского лимана вблизи хутора Песчаного. Около 50 морских голубков, наблюдаемых издали 4 мая на небольшом острове, удалённом на 550 м от берега лимана, возможно, гнездились вместе с черноголовыми чайками.

Чайконосая крачка *Gelochelidon nilotica*. По данным литературы, на одном из островов Витязевского лимана крачки этого вида гнездились в 1958 и 1990 годах (Кищинский 1960; Лохман, Емтыль 2000). Позднее там отмечали только летующих особей, а их гнездование было

зарегистрировано в 1998 году поблизости, в Кизилташском лимане на косе «Голенькой» (Лохман 2017). Мною на острове в Витязевском лимане 7 мая была встречена группа из 10 чайконосых крачек, а также 20 мая – одиночная, возможно, гнездившаяся особь в составе стаи малых крачек, беспокоившихся возле колонии.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Одиночная особь встречена 15 мая на острове в Витязевском лимане.

Малая крачка *Sterna albifrons*. Малая крачка на берегах Витязевского лимана и на островах встречалась постоянно с 3 по 20 мая. Одиночных особей, занятых ловлей небольших рыбок, которых они носили на берег своему партнёру, можно было наблюдать на широкой протоке вблизи её впадения в лиман.

Рис. 13. Гнездо малой крачки *Sterna albifrons* с полной кладкой. Остров в Витязевском лимане. 20 мая 2018. Фото автора.

Колония малых крачек была обнаружена 15 мая на песчано-ракушечном острове в Витязевском лимане. По-видимому, эти крачки недавно подселились к расположенной здесь небольшой колонии шилоклювок, в которой были уже полные кладки разной степени насиженности. При обследовании 15 мая этой совместной колонии среди гнёзд шилоклювок было обнаружено несколько гнездовых ямок в грунте без выстилки и одно гнездо малых крачек с неполной кладкой из 2 яиц (31.4×24.5, 30.6×23.5 мм). Гнездо представляло собой углубление в песке диаметром 100 мм и глубиной 25 мм. При следующих осмотрах в

колонии были найдены: 18 мая – 3 гнезда малых крачек, 2 из которых содержали по 1 яйцу (измерено 1 яйцо – 32.4×24.1 мм) и одно гнездо – 2 яйца, а также несколько пустых гнездовых ямок; 20 мая – 7 гнёзд малых крачек, содержавших по одному яйцу (3 гнезда), по 2 яйца (1 гнездо) и полные кладки из 3 яиц (3 гнезда). Размеры яиц одной кладки, обнаруженной 20 мая в гнездовой ямке диаметром 100 мм: 32.6×24.7, 34.7×24.4, 32.1×24.1 мм (рис. 13). С 15 по 20 мая численность малых крачек в колонии постепенно возрастала с 25 до 40-50 особей.

Вяхирь *Columba palumbus*. Пары и одиночные, в том числе токовавшие особи встречались 2-20 мая в санаторно-курортной зоне города Анапы и, гораздо реже, в лесопосадках и редколесье из лоха узколистного в окрестностях Витязевского лимана. Гнездо с 2 птенцами обнаружено 17 мая в густой кроне куста боярышника, одиночно стоявшего среди пустыря на окраине села Витязево у хутора Песчаного, на высоте 1.7 м в (рис. 14).

Рис. 14. Гнездо вяхиря *Columba palumbus* с птенцами. Пустырь на окраине села Витязево у хутора Песчаного. 17 мая 2018. Фото автора.

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto*. Пары и одиночные токующие особи постоянно наблюдались 2-20 мая в санаторно-курортной зоне города Анапы.

Кукушка *Cuculus canorus*. От 1 до 4 особей за экскурсию отмечались мной визуально и по голосу 2-17 мая в санаторно-курортной зоне в районе Джемете, а также в окрестностях Чембуркского озера. Куку-

ющие самцы регулярно встречались на окраине села Витязево у хутора Песчаного и в окружающем лиман редколесье. На Витязевской косе 12 мая была обнаружена кукушка, рядом с которой, вероятно, у гнезда, беспокоился самец черноголового чекана (рис. 15).

Рис. 15. Кукушка *Cuculus canorus* и западный черноголовый чекан *Saxicola rubicola*. Анапский район, Витязевская коса. 12 мая 2018. Фото автора.

Домовый сыч *Athene noctua*. Гнездился по береговым обрывам Кизилташского лимана на Таманском полуострове (Тильба, Мнацеканов 2005). Мною домовый сыч встречен 18 мая на окраине села Витязево, в хуторе Песчаный.

Ушастая сова *Asio otus*. Гнёзда ушастой совы прежде находили на полуострове Абрау, в районе Новороссийска и Темрюка (Волчанецкий и др. 1962; Тильба, Мнацеканов 2005). На берегу Витязевского лимана на невысоком усыхающем лохе узколистном на высоте 2.5 м 17 мая в старой сорочьей постройке найдено гнездо ушастой совы с 2 начавшими оперяться птенцами и 1 яйцом (рис. 16, 17).

Козодой *Caprimulgus europaeus*. Прежде козодой отмечался мною в окрестностях Большого Утриша (Кузиков 2013а). В посёлке Сукко на границе пойменного ленточного леса на земле у огородов 14 мая наблюдалась одиночная особь.

Чёрный стриж *Apus apus*. Встречался постоянно в санаторно-курортной зоне Анапы. В селе Витязево (хутор Песчаный) отмечено гнездование под крышами некоторых домов.

Рис. 16. Ушастая сова *Asio otus* в гнезде в старой постройке сороки *Pica pica*..
Анапский район. Окраина села Витязево. 17 мая 2018. Фото автора.

Рис. 17. Гнездо ушастой совы *Asio otus* с птенцами и яйцом.
Анапский район. Окраина села Витязево. 18 мая 2018. Фото автора.

Золотистая щурка *Merops apiaster*. Стайки щурок из 6-15 особей отмечены 17 мая на строительной площадке в селе Витязево и 19 мая над пустырём в районе Джемете.

Удод *Upupa epops*. Одна-две токовавшие особи визуально или по голосу постоянно отмечались 3-20 мая в редкостойном лесу из лоха узколистного на Витязевской косе, расположенной между морем и лиманом.

Малый пёстрый дятел *Dendrocopos minor*. Встречен мною 14 мая в посёлке Сукко вблизи Кипарисовой рощи.

Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus*. По данным литературы, встречи и гнездование сирийского дятла зарегистрированы в центральной и северной частях Краснодарского края (Короткий и др. 2004; Найданов 2008). Зимой 2004 года сирийского дятла наблюдали у посёлка Малый Утриш (Шариков и др. 2006). В окрестностях Анапы этот вид прежде в гнездовой период не отмечался. Мною сирийский дятел впервые встречен 16 мая в центральной части города Анапы в сквере имени И.В.Гудовича. Вблизи от места этой встречи в сквере были обнаружены дупла, возможно, прежде принадлежавшие сирийскому дятлу, одно из которых в тот момент было занято парой скворцов *Sturnus vulgaris*. Вторая встреча сирийского дятла произошла 17 мая в окрестностях хутора Капустин, где дятел обследовал основания толстых ракит в поисках корма (рис. 18).

Рис. 18. Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* в окрестностях хутора Капустин. 17 мая 2018. Фото автора.

Хохлатый жаворонок *Galerida cristata*. От 1 до 4 хохлатых жаворонков за экскурсию учтено 7-15 мая на Витязевской косе вблизи слабо закреплённых песков на окраине села Витязево.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Одиночная птица встречена 15 мая на Витязевской косе вместе с хохлатым жаворонком вблизи строительной площадки на границе с редколесьем.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Встречалась повсюду и постоянно 2-20 мая как в санаторно-курортной зоне, так и по берегам Витязевского лимана одиночно и малыми группами до 10 особей за одну экскурсию.

Воронок *Delichon urbica*. В отличие от посёлка Сукко, где воронки гнездились на многих строениях (Кузиков 2013а), в санаторно-курортной зоне Анапы в 2018 году воронок встречался редко. Единичные особи отмечены 3-4 и 20 мая вместе с деревенскими ласточками у берегов Витязевского лимана.

Полевой конёк *Anthus campestris*. Одиночные особи отмечены на Витязевской косе 7 и 10 мая в редколесье.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. Встречалась 2-20 мая повсеместно в окрестностях Анапы, за исключением редколесья на Витязевской косе.

Крапивник *Troglodytes troglodytes*. В заповеднике «Утриш» и его ближайших окрестностях крапивник – редкий зимующий, не отмечавшийся на гнездовании вид (Мнацеканов, Тильба 2015). Ранней весной и осенью 2017 года крапивника наблюдали в пойме реки Сукко, там же отмечали активную вокализацию самцов в конце марта (Рупасов 2018). При посещении долины реки Сукко 14 мая 2018 мною вблизи «Кипарисовой рощи» был встречен выводок из 5 хорошо летавших, но ещё желторотых слётков, что косвенно, свидетельствует о гнездовании здесь этого вида (рис. 19).

Рис. 19. Слёток крапивника *Troglodytes troglodytes* в окрестностях озера Сукко. 14 мая 2018. Фото автора.

Чёрный дрозд *Turdus merula*. Встречен 14 мая в долине реки Сукко. В мутовке ветвей молодого дерева, густо обвитого плющом, на высоте около 2 м обнаружено гнездо с начатой кладкой из 1 яйца.

Горихвостка-лысушка *Phoenicurus phoenicurus*. Пару горихвосток-лысушек, гнездящуюся под крышей технического строения, я обнаружил 3 мая на территории санатория «Анапа».

Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros ochruros*. Самца на протяжении нескольких дней со 2 мая отмечали на недостроенном здании санатория в районе Джемете, где, предположительно, находилось гнездо.

Южный соловей *Luscinia megarhynchos*. Отмечен по голосу 2-4 мая в санаторно-курортной зоне Анапы и 14 мая в посёлке Сукко.

Западный черноголовый чекан *Saxicola rubicola*. На пустыре в районе Джемете черноголовый чекан встречался постоянно с первых дней наблюдений. На площади около 10 га здесь, по-видимому, гнездились две пары чеканов. Появление первых птенцов в гнёздах, установленное по встрече самки с кормом, произошло 13 мая. Расчётная дата появления первого яйца в гнезде, исходя из 13 дней насиживания (Дементьев и др. 1954) и ежедневной откладки самкой по одному яйцу – 26 апреля. Одиночные особи и пары встречены также 12 мая на Витязевской косе (рис. 15) и 18 мая – на пустыре в окрестностях хутора Песчаного.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Встречена дважды 15 мая на берегу и на острове Витязевского лимана.

Серая мухоловка *Muscicapa striata*. Отмечена на Витязевской косе 15 мая. В последующие дни 17-18 мая там же встречалось до 3 серых мухоловок за экскурсию.

Дроздовидная камышевка *Acrocephalus arundinaceus*. 19 мая я наблюдал активно певшего самца в зарослях тростника на берегу реки Анапки вблизи её впадения в море.

Садовая славка *Sylvia borin*. От 1 до 3 садовых славок за экскурсию встречено 7-15 мая на Витязевской косе в редколесье.

Серая славка *Sylvia communis*. Одиночные особи и изредка пары серых славок отмечены 2-4 мая на пустыре в районе Джемете. В редколесье на Витязевской косе с 12 по 18 мая встречались 1-3 особи.

Усатая синица *Panurus biarmicus*. 5 мая отмечено строительство гнезда усатыми синицами в труднопроходимых плавнях реки Анапки. Несколько раз птицы перелетали с одного берега озера на другой с гнездовым материалом и скрывались в густых зарослях камышей. На берегу Чембуркского озера 16 мая были встречены 4 молодые усатые синицы, которые кормились на метёлках тростника.

Ремез *Remiz pendulinus*. Одиночные особи и пары ремезов отмечены 4 мая на берегу Витязевского лимана в хуторе Песчаный, 15 мая –

у протоки, впадающей в лиман, и 16 мая – на Чембуркском озере. Недостроенное гнездо с тонким просвечивающим дном найдено 11 мая на берегу Чембуркского озера. Оно было устроено в ветвях лоха узколистного, висевшего над дренажной канавой на высоте 3.0 м. Второе толстостенное гнездо с полной кладкой из 7 свежих яиц обнаружено 17 мая вблизи Витязевского лимана у хутора Капустин под нависшими кронами нескольких деревьев сливы-алычи *Prunus cerasifera*, в 2.5 м над землёй. Интересно, что жилое гнездо ремезов располагалось в 1 м от старого гнезда (рис. 20). Размеры яиц, мм: 16.1×11.2, 16.2×11.2, 16.0 ×11.0, 15.7×11.1, 16.3×10.8, 16.5×11.2, 15.6×10.9.

Рис. 20. Гнездо ремеза *Remiz pendulinus*. Анапский район. Окрестности хутора Капустин. 17 мая 2018. Фото автора.

Жулан *Lanius collurio*. Обычный вид, отмечавшийся в окрестностях Анапы в количестве 1-3 особей за экскурсию. На Витязевской косе 12 мая найдено почти полностью законченное гнездо в кроне лоха узколистного на высоте 1.8 м, возле которого держалась самка.

Чернолобый сорокопут *Lanius minor*. Регулярно с 4 по 18 мая мне встречались одиночные особи в редколесье на Витязевской косе между морем и лиманом.

Иволга *Oriolus oriolus*. Отмечена по голосу 13 мая в санатории в районе Джемете.

Сойка *Garrulus glandarius*. Гнездо соек, устроенное в развилке ветвей на пирамидальном тополе на высоте около 10 м, обнаружено 2 мая на территории санатория в районе Джемете. Птиц неоднократно замечали поблизости от гнезда, которое они активно защищали от ворон.

Сорока *Pica pica*. Гнездится в густых кронах деревьев, в основном на пустырях по периферии санаторно-курортной зоны, по соседству с жилыми домами у хуторов и в редколесье на Витязевской косе.

Галка *Corvus monedula*. Несколько галок встречены 3 мая на окраине Анапы у железобетонных столбов ЛЭП, где, вероятно, гнездились в их пустотелых торцах.

Грач *Corvus frugilegus*. Обычные и местами многочисленные стаи грачей регулярно встречались 13 мая по дороге из Анапы в Тамань. В санаторно-курортной зоне Анапы, а также в окрестностях Витязевского лимана грачи практически не встречались. Группа из 7 особей, летевшая над Витязевской косой, была отмечена 12 мая.

Серая ворона *Corvus cornix*. Обычная малочисленная птица Анапы и её окрестностей. Гнёзда ворон, многие из которых нежилые, – весьма характерный и заметный элемент, формирующий облик редколесья из лоха узколистного на Витязевской косе. Мною 10 и 12 мая осмотрены два жилых гнезда серых ворон в кронах лоха на высоте 4.0 и 3.0 м; в первом было 4 голых, недавно вылупившихся птенца и 1 яйцо, во втором – кладка из 4 яиц. Ещё одно гнездо с насиживающей птицей обнаружено, но не осмотрено в лесополосе у дороги вблизи хутора Чембурка.

Скворец *Sturnus vulgaris*. Стаи скворцов до 20-30 особей и группы птиц, собиравших насекомых для кормления птенцов, встречались на пустырях в районе Джемете, у хутора Капустин и в окрестностях села Витязево. Две пары скворцов, гнездившихся в дуплах дятлов, обнаружены 16 мая в сквере имени И.В.Гудовича в Анапе и в санатории в районе Джемете. В обоих гнёздах, устроенных, соответственно, в дуплах акации на высоте 4 м и тополя пирамидального на высоте 9 м, находились подросшие птенцы.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Обычный вид. Отмечено гнездование 2-7 мая под крышами домов в санаторно-курортной зоне Анапы.

Полевой воробей *Passer montanus*. Встречен в санаторно-курортной зоне Анапы и окрестностях Витязевского лимана вблизи хуторов.

Щегол *Carduelis carduelis*, **коноплянка** *Acanthis cannabina*. 3 мая

встречены пары щеглов и коноплянок на водопое на берегу реки Можепсин на окраине Анапы.

Просянка *Miliaria calandra*. Одна-две пары просянок 2-19 мая, вероятно, гнездились на пустыре в районе Джемете совместно с черноголовыми чеканами. Судя по поведению птиц, в их предполагаемых гнёздах были насиженные кладки. Примечательно, что в расположенном рядом посёлке Сукко приблизительно в это же время, 21 мая 2013, в гнезде просянки уже были взрослые птенцы (Кузиков 2013б). Просянка встречена также 13 мая на пустыре вблизи хутора Песчаного и 10 мая на Витязевской косе.

Камышовая овсянка *Schoeniclus schoeniclus*. Самец камышовой овсянки встречен 11 мая вблизи Апапских плавней у хутора Чембурка.

Литература

Белик В.П. 2010. Гнездование змееяда на Абрауском полуострове (Краснодарский край) // *Стрепет* **8**, 1: 125-127.

Белик В.П., Бабкин И.Г. 2010. К распространению и численности хищных птиц на полуострове Абрау // *Бранта* **13**: 68-75.

Белик В.П., Ветров В.В., Милобог Ю.В. 2009. Материалы к орнитофауне Таманского полуострова // *Бранта* **12**: 7-26.

Вишневский В.А. 2011. *Птицы европейской части России*. М.: 1-272.

Волчанецкий И.Б., Пузанов И.И., Петров В.С. 1962. Материалы по орнитофауне Северо-Западного Кавказа // *Тр. Науч.-исслед. ин-та биол. и биол. фак-та Харьков. ун-та* **32**: 7-72.

Гладков Н.А. 1951. Отряд кулики Limicolae или Charadriiformes // *Птицы Советского Союза*. М., **3**: 3-372.

Гричик В.В., Пышко А.С. 2017. Гнездящиеся водоплавающие и околоводные птицы отработанных торфоразработок на ранних стадиях ренатурализации // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1515): 4415-4422.

Дементьев Г.П., Гладков Н.А., Благосклонов К.Н., Волчанецкий И.Б., Мекленбурцев Р.Н., Птушенко Е.С., Рустамов А.К., Спангенберг Е.П., Судиловская А.М., Штегман Б.К. 1954. *Птицы Советского Союза*. М., **6**: 1-792.

Динкевич М.А., Мнацеканов Р.А., Короткий Т.В., Найданов И.С. 2008. Большой баклан на Северо-Западном Кавказе // *Бранта* **11**:126-158.

Джамирзоев Г.С., Перевозов А.Г., Комаров Ю.Е., Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Караваев А.А., Букреев С.А., Пшегусов Р.Х., Гизатулин И.И., Поливанов В.М., Витович О.А., Хубиев А.Б. 2014. Птицы заповедников и национальных парков Северного Кавказа // *Тр. заповедника «Дагестанский»* **8**, 1: 1-428.

Емтыль М.Х., Лохман Ю.В., Мнацеканов Р.А., Иваненко А.М., Тильба П.А., Шестибратов К.А., Пекло А.М. 1993. Предварительные сведения по летней орнитофауне предгорий Западного Кавказа // *Кавказ. орнитол. вестн.* **5**: 55-61.

Емтыль М.Х., Лохман Ю.В., Емтыль А.М. 2001. Экология пестроносой крачки в Восточном Приазовье и Северо-Западном Причерноморье // *Биологическое разнообразие Кавказа*. Нальчик: 93-95.

Зинякова М.П., Камаева Л.Б. 1989. Распределение и численность кольчатой горлицы в г. Анапе // *Синантропизация животных Северного Кавказа*. Ставрополь: 42-44.

Зинякова М.П., Камаева Л.Б., Платицин В.П. 1991. Орнитофауна города Анапы // *Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья*. Краснодар, 1: 168-172.

Казаков Б.А., Белик В.П., Пекло А.М., Тильба П.А. 1981. Кулики (Aves, Charadriiformes) Северного Кавказа // *Вестн. зоол.* 5: 41-46.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П., Хохлов А.Н., Тильба П.А., Пишванов Ю.В., Прилуцкая Л.И., Комаров Ю.Е., Поливанов В.М., Емтыль М.Х., Бичеров А.П., Олейников Н.С., Заболотный Н.Л., Кукиш А.И., Мягкова Ю.Я., Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И., Витович О.А., Динкевич М.А. 2004. *Птицы Северного Кавказа (гагарообразные, поганкообразные, трубконосые, веслоногие, аистообразные, фламингообразные, гусеобразные).* Ростов-на-Дону, **1**: 1-398.

Кищинский А.А. 1960. Современная авифауна лиманов северо-восточного Причерноморья и биология гнездящихся здесь чайковых птиц // *Охрана природы и озеленение* **4**: 69-75.

Кныш Н.П., Серобаба С.А., Любивый Н.П. 1984. Аномально малые и безжелтковые яйца птиц // *Орнитология* **19**: 201.

Козлова Е.В. 1961. *Ржанкообразные. Подотряд Кулики.* М.; Л.: 1-501 (Фауна СССР. Птицы. Т. 2, вып. 1, ч. 2).

Короткий Т.В., Мнацеканов Р.А., Найданов И.С. (2004) 2017. О находках сирийского дятла *Dendrocopos syriacus* в Краснодарском крае и Республике Адыгея // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1545): 5481-5482.

Кошелев А.И. 1984. *Лысуха в Западной Сибири (экология, поведение и хозяйственное значение).* Новосибирск: 1-175.

Кузиков И.В. 2013а. К орнитофауне окрестностей посёлка Сукко (Анапский район, Краснодарский край) // *Рус. орнитол. журн.* **22** (897): 1855-1876.

Кузиков И.В. 2013б. Орнитофауна низовий реки Усьвы (Пермский край). Ч. 1 // *Рус. орнитол. журн.* **22** (840): 163-207.

Лохман Ю.В., 2004а. Состояние гнездовых популяций птиц островных экосистем косы «Голенькая» // *Кавказ. орнитол. вестн.* **16**: 91-97.

Лохман Ю.В. 2004б. Численность и распределение чайковых (Lari) Таманского полуострова // *Экологические проблемы Таманского полуострова.* Краснодар: 115-121.

Лохман Ю.В. 2013. К орнитофауне заповедника «Утриш» и полуострова Абрау // *Биоразнообразие государственного природного заповедника «Утриш».* Анапа, **1**: 186-194.

Лохман Ю.В. (2004) 2017. Чайконосая крачка *Gelochelidon nilotica* в Западном Предкавказье // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1549): 5642-5644.

Лохман Ю.В., Емтыль М.Х., Фадеев И.В. и др. 2005. Орнитофауна Черноморских лиманов России и прилегающих территорий // *Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитол. территорий России.* М., **5**: 72-96.

Лохман Ю.В., Фадеев И.В., Нестеров Е.В., Дровецкий С.В. 2006. Дополнения к орнитофауне Таманского полуострова // *Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия.* Ростов-на-Дону: 301-303.

Лохман Ю.В., Быхалова О.Н. 2012. Население птиц полуострова Абрау в осенний период // *Горные экосистемы и их компоненты.* Нальчик: 109-110.

Лохман Ю.В., Быхалова О.Н. (2013) 2018. Зимовка птиц-лимнофилов в заповеднике «Утриш» (северо-восточное Причерноморье) зимой 2011/12 года // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1551): 37-39.

Лохман Ю.В., Емтыль М.Х. 2000. Современное состояние редких чайковых в Западном Предкавказье // *Редкие, исчезающие и малочисленные птицы России.* М.: 140-144.

Лохман Ю.В., Емтыль М.Х., Донец И.И. 2008. Большой баклан в Западном Предкавказье (распространение, численность и её динамика, современное состояние) // *Бранта* **11**: 169-180.

Лохман Ю.В., Емтыль М.Х., Фадеев И.В. и др. 2004. К орнитофауне Таманского полуострова // *Экологические проблемы Таманского полуострова.* Краснодар: 89-102.

Лохман Ю.В., Лохман А.О., Быхалова О.Н. 2013. Редкие и охраняемые птицы заповедника «Утриш» и сопредельной территории // *Биоразнообразие государственного природного заповедника «Утриш».* Анапа, **1**: 195-202.

Лохман Ю.В., Солоха А.В., Быхалова О.Н. 2015. Зимняя фауна морских, околоводных и водоплавающих птиц заповедника «Утриш» и сопредельной территории // *Охрана биоты в государственном природном заповеднике «Утриш»*. Майкоп, **3**: 297-306.

Мнацеканов Р.А., Андрющенко Ю.А., Динкевич М.А., Короткий Т.В. 2007. Новые сведения о некоторых редких видах птиц Таманского полуострова // *Беркут* **16**, 2: 177-183.

Мнацеканов Р.А., Тильба П.А. 2014. Редкие и охраняемые виды заповедника «Утриш» // *Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий*. Сочи: 54-63.

Мнацеканов Р.А., Тильба П.А. 2015. Орнитофауна заповедника «Утриш» и его ближайших окрестностей // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1113): 754-763.

Найданов И.С. (2008) 2014. Новые сведения о гнездовании сирийского дятла *Dendrocopos syriacus* в Краснодарском крае // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1028): 2304-2305.

Очаповский В.С. 1973. Кулики в Краснодарском крае // *Фауна и экология куликов*. М., **2**: 67-69.

Пекло А.М., Тильба П.А. (1978) 2013. О пролётных куликах северо-восточного Причерноморья // *Рус. орнитол. журн.* **22** (926): 2746-2747.

Птушенко Е.С. 1939. О некоторых новых и редких птицах северной части черноморского побережья Кавказа // *Сб. тр. Зоол. музея Моск. ун-та* **5**: 33-42.

Рудовский В.С. 2014. Гнездование сапсана в районе посёлка Малый Утриш (Краснодарский край) в 2012-2013 гг. // *Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных территорий: Распространение, экология, динамика популяций, охрана*. Ростов-на-Дону: 276-281.

Рупасов С.В. 2018. Материалы к орнитофауне заповедника «Утриш» и прилегающих территорий в весенний и осенний периоды 2017 года // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1641): 3420-3428.

Сара М. 2007. Предварительный обзор авифауны в районе пос. Малый Утриш // *Ландшафтное и биологическое разнообразие Северо-Западного Кавказа*. М.: 90-99.

Тильба П.А. 1983а. Кулики Западного Причерноморья Кавказа // *Орнитология* **18**: 181-182.

Тильба П.А. 1983б. Орнитофауна Северо-Западного Причерноморья // *Охрана реликтовой растительности и животного мира Северо-Западного Кавказа*. Л.: 75-83.

Тильба П.А., Емтыль М.Х., Плотников Г.К. Лохман Ю.В., Иваненко А.М. 1995. Авифауна Таманского полуострова // *Актуальные вопросы экологии и охраны природы водных экосистем и сопредельных территорий*. Краснодар, 1: 120-128.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. 2005. Совообразные Краснодарского края и Республики Адыгея // *Совы Евразии*. М.: 269-276.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. 2006. Анапские плавни // *Водно-болотные угодья России. 6. Водно-болотные угодья Северного Кавказа*. М.: 74-76.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Емтыль М.Х., Плотников Г.К., Соловьёв С.А., Иваненко А.М. 1990. О редких птицах Восточного Приазовья // *Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Северного Кавказа*. Ставрополь: 91-96.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Емтыль М.Х., Плотников Г.К., Соловьёв С.А., Иваненко А.М. 2002. Шилоклювка в Восточном Приазовье // *Изучение куликов Восточной Европы и Северной Азии на рубеже столетий*. М.: 168-169.

Шариков А.В., Шитиков Д.А., Захаров Р.А., Федчук Д.В., Бабушкин М.В. 2006. К зимней орнитофауне Черноморского побережья Краснодарского края // *Орнитология* **33**: 189-190.

Barabashin T.O. 2006. Seabird and waterfowl population on the peninsula B. Utrish // *1st Biannual Sci. Conf. «Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond»*. Istambul,: 54-55.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1652****: 3886-3889*

К орнитофауне верховий реки Чоны (Катангский район, Иркутская область)

В.В.Попов, А.А.Серышев

Виктор Васильевич Попов. Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии». Иркутск. E-mail: vpopov2010@yandex.ru
Александр Анатольевич Серышев. Гимназия № 3, Иркутск, Россия

Поступила в редакцию 30 июля 2018

В данном сообщении приведены результаты наших наблюдений за птицами во время проведения обследования участка проектируемой дороги в юго-восточной части Катангского района на правобережье в верхнем течении реки Чоны между рекой и границей с Якутией в долинах её притоков Бирая, Зимовейная и Ложа в период с 24 по 28 июня 2018. Большая часть маршрутов (около 150 км) была проведена на вездеходе, частично вдоль зимника Усть-Кут–Мирный и по трансектам. На отдельных участках пройдены пешеходные маршруты общей длиной около 25 км.

Ранее орнитологами этот участок не посещался. Река Чона – правый приток Вилюя, впадает в Вилюйское водохранилище. На обследованном участке отмечены как низкая численность птиц, так и невысокий уровень видового разнообразия. Нами в 2008 году в долине Чоны был обследован участок, расположенный несколько севернее (Попов, Серышев, Куницын 2009), на котором видовой состав и разнообразие птиц были заметно выше. Всего за период наблюдений зарегистрировано 40 видов птиц, в том числе 2 вида, включённых в Красную книгу Иркутской области – восточный болотный лунь и дербник.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Встречена 25 июня на озере в окрестностях вахтового посёлка.

Гоголь *Bucephala clangula*. Выводок из 5 птенцов с самкой отмечен 26 июня на реке Чоне.

Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus*. Пара встречена 25 июня в районе зимника в долине реки Зимовейная и одна птица на 27 июня зимнике в верховьях реки Бирая.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. 27 июня самка встречена на верховом болоте вдоль зимника в верховьях реки Бирая.

Восточный болотный лунь *Circus spilonotus*. 27 июня самец встречен на болоте вдоль зимника.

Дербник *Falco columbarius*. 27 июня дербник встречен на болоте вдоль зимника в верховьях реки Бирая

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. 24 июня встречена на трассе

Талакан – ВЧНГ (Верхнечонскнефтегаз) Верхнечонское нефтяное месторождение

Обыкновенный глухарь *Tetrao urogallus*. 27 июня двух глухарей наблюдали на зимнике между реками Зимовейная и Бирая. 28 июня выводок (2 птенца и самка) встретили на трассе Талакан – ВЧНГ.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Выводок встречен 25 июня на зимнике.

Черныш *Tringa ochropus*. Наблюдали всего один раз – 27 июня пару с гнездовым поведением на болоте около озера в долине реки Бирая.

Фифи *Tringa glareola*. 25 июня в общей сложности 2 птицы встретили на заболоченных участках вдоль зимника. 27 июня отмечен выводок на болоте по зимнику в долине реки Зимовейная.

Большой улит *Tringa nebularia*. 25 июня встречен на верховом болоте в долине реки Зимовейная.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. 25 июня встречен на берегу озера около вахтового посёлка. На следующий день видели пару на гнездовом участке на берегу реки Чона. 27июня по одной особи отмечено на реке Бирая и на озере в долине этой реки. 28 июня перевозчик отмечен на озерке вдоль трассы Талакан – ВЧНГ.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. 25-26 июня вечером отмечена тяга около зимовья в долине безымянного ручья южнее реки Ложа.

Большая горлица *Streptopelia orientalis*. 27 июня встречена на территории вахтового посёлка.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*. 24 июня кукование слышали около вахтового посёлка и 26 июня – голос около зимовья.

Глухая кукушка *Cuculus optatus*. 25 июня слышали голоса в долине реки Зимовейной и около зимовья.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. 25 и 27 июня встречен в долине реки Бирая. 26 июня двух дятлов наблюдали в окрестностях зимовья, дупло обнаружено в смешанном лесу в долине Чоны.

Зелёный конёк *Anthus hodgsoni*. По несколько зелёных коньков регулярно в период наблюдений встречали вдоль зимника и трассы Талакан – ВЧНГ.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. Ежедневно встречали как на территории вахтового посёлка, так и в долинах рек и на заболоченных участках с водяным зеркалом вдоль зимника.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. В сумме около 10 белых трясогузок, в том числе с кормом в клюве, отмечено на территории вахтового посёлка. 27 июня трясогузка встречена на берегу озера в долине реки Бирая. 28 июня 3 птицы наблюдались в аэропорту Талакана.

Сибирский жулан *Lanius cristatus*. 25 июня встречен на болоте около зимника.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes*. 25 июня пару кедровок встретили в темнохвойном лесу к югу от реки Бирая и слышали голос в до-

лине этой реки. На следующий день слышали голоса и встретили одну птицу в долине реки Чона. 27 июня кедровку наблюдали в долине реки Зимовейная.

Восточная чёрная ворона Corvus orientalis. 25 июня голоса слышали в вахтовом посёлке.

Ворон *Corvus corax*. 24 июня трёх воронов наблюдали в аэропорту Талакана. 25 июня пара встречена на трассе Талакан – ВЧНГ около вахтового посёлка.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. 25 июня трёх свиристелей наблюдали в долине реки Ложа. На следующий день три птицы встречены в долине реки Чона и одна вечером около зимовья.

Певчий сверчок *Locustella certhiola*. 25 июня слышали песню в долине реки Зимовейная.

Весничка *Phylloscopus trochilus*. 26 июня эта пеночка встречена в долине реки Чона.

Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides*. 25 июня слышали песню в долине реки Бирая.

Зарничка *Phylloscopus inornatus*. 26 июня песни двух зарничек слышали в сосновом лесу в долине безымянного ручья и песню одной особи – в смешанном лесу вблизи реки Чона.

Корольковая пеночка *Phylloscopus proregulus*. 25 июня слышали голоса в темнохвойном лесу севернее реки Ложа и песни двух птиц в долине реки Ложа. На следующий день слышали песню корольковой пеночки в долине реки Чона.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus*. В вахтовом посёлке встречены самец 24 июня и самка 28 июня.

Соловей-красношейка *Luscinia calliope*. 25 июня вечером и 26 июня утром слышали песню соловья-красношейки в долине безымянного ручья южнее реки Ложа.

Синий соловей *Luscinia cyane*. 25 июня вечером слышали песню в долине безымянного ручья южнее реки Ложа.

Синехвостка *Tarsiger cyanurus*. 26 июня слышали песню в долине реки Чона и на следующий день – песни трёх синехвосток в долине реки Зимовейная.

Краснозобый дрозд *Turdus ruficollis*. 27 июня самец встречен на зарастающей гари около озера в долине реки Бирая.

Пухляк *Parus montanus*. 25 июня голоса слышали в долине реки Бирая и на следующий день – в окрестностях зимовья.

Юрок *Fringilla montifringilla*. В период наблюдений ежедневно наблюдали и слышали голоса юрков около вахтового посёлка, в долинах рек Бирая, Ложа и Зимовейная, а также вдоль зимника.

Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus*. 25 июня слышали голос чечевицы в кустарниках вдоль реки Бирая.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula*. 27 июня встретили снегиря на зимнике в долине реки Бирая.

Литература

Попов В.В., Серышев А., Куницын А.А. 2009. Заметки по летней орнитофауне верхнего течения р. Чоны (Катангский район Иркутской области) // *Байкал. зоол. журн.* 1: 69-75.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1652****: 3889-3890*

Первая регистрация белопоясного стрижа *Apus pacificus* в Омской области

А.А.Нефёдов

Александр Алексеевич Нефёдов. Омский отдел Русского географического общества.
E-mail: anefyodov2007@mail.ru

Поступила в редакцию 29 июля 2018

В Омской области регистрации белопоясного стрижа *Apus pacificus*, кроме неопределённого сообщения «Встречается южнее Горькой линии»* (Словцов 1881), неизвестны.

13 июля 2018 в Омске на пересечении улиц Куйбышева и Успенского около 9 ч я сфотографировал чёрных стрижей *Apus apus*. Птицы летали вдоль и над пятиэтажным зданием поликлиники № 12. Я спешил и задержался для фотографирования только на несколько минут, так как понимал, что качественную фотографию летавших на высоте от 4-го этажа и выше стрижей с земли сделать сложно. При просмотре получившихся фотографий среди чёрных стрижей мной был обнаружен белопоясный стриж. На фотографии у птицы была видна белая полоса выше надхвостья. Это первая достоверная регистрация белопоясного стрижа в Омской области.

Второй раз я наблюдал белопоясного стрижа в Омске 26 июля 2018 в 10 ч 10 мин на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Чокана Валиханова. В одной из многочисленных стаек кормящихся чёрных

* Созданная в XVIII веке система оборонительных сооружений Тоболо-Ишимской укреплённой линии проходит с запада на восток по территории современной Омской области. Линия стала называться Горькой по причине солёности воды большинства расположенных здесь озёр Камышловского лога. Укрепления противостояли Джунгарскому ханству и Среднему казахскому жузу. В конце XVIII века утратили своё военное значение. Камышловский лог – древняя долина реки Камышловки, ныне представляющая собой цепь солёных и пресных озёр. Начинается небольшой речкой Камысакты, стекающей с Кокчетавской возвышенности и впадающей в озеро Большой Тарангул, от которого Камышловский лог прослеживается цепью озёр до Иртыша на протяжении почти 500 км.

стрижей я заметил белопоясного стрижа. До 10 ч 35 мин стайки стрижей многократно пролетали среди 5-этажных домов на высоте от 3-го этажа и выше. Одиночные белопоясные стрижи пролетали более 10 раз, при этом была хорошо видны их белая поясница. Общее число увиденных белопоясных стрижей определить было сложно. По-видимому, их было несколько среди многочисленных чёрных стрижей.

В предыдущие годы мои многократные специальные наблюдения в бинокль за стрижами, летающими над спортивно-концертным комплексом имени В.Блинова не выявили присутствия среди них белопоясных. В 2018 году я таких наблюдений с 21 мая не делал, попытки разглядеть *A. pacificus* вечером 26 и 27 июля успехом не увенчались.

Описанные встречи белопоясного стрижа произошли примерно на 600 км западнее мест его известных встреч в Томской и Новосибирской областях. Они интересны и тем, что произошли в период размножения, который, согласно В.К.Рябицеву (2001), длится у этого вида 68-75 дней. В 2018 году из-за затянувшейся холодной погоды весной первые стрижи в Омске отмечены мной только 21 мая, что позже обычного. Статус белопоясного стрижа в Омской области не ясен.

Литература

Рябицев В.К. 2001. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-608.

Словцов И. 1881. Путевые записки, ведённые во время поездки в Кокчетавский уезд, Акмолинской области, в 1878 г. // *Записки Зап.-Сиб. отд. Импер. Рус. геогр. общ-ва*. Омск, **3**: 1-152.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1652**: 3890-3896*

Летняя орнитофауна озера Маныч (северное Ставрополье)

Н.В.Цапко

*Второе издание. Первая публикация в 2006**

Материал собран в период с 16 по 22 мая 2005 на южном берегу озера Маныч в пределах Ставропольского края, в основном в трёх пунктах: село Манычское (до 196 года – село Киста) и его окрестностях, урочище Дунда, озеро Маныч с островами и прилежащей степью. Природные условия обследованного района кратко описаны Л.В.Маловичко

* Цапко Н.В. 2006. Летняя орнитофауна озера Маныч (северное Ставрополье) // *Кавказ. орнитол. вестн.* **18**: 302-308.

с соавторами (2002). Некоторые материалы по орнитофауне этого региона опубликованы ранее (Хохлов, Куликов 1991; Ильюх и др. 2005; Маловичко и др. 2005). Всего в течение периода наших исследований было отмечено 98 видов птиц, значительная часть которых характеризует летнюю орнитофауну региона (80 гнездящихся или возможно гнездящихся видов). Ввиду краткосрочности наблюдений этот список далеко не полный, многие виды, вероятно, были упущены. Ниже приведены повидовые очерки в соответствии с таксономической схемой Л.С.Степаняна (2003).

Чомга *Podiceps cristatus*. Отмечалась в урочища Дунда и по кромке тростников по Манычу, где гнездится.

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis*. 6 птиц кормились на мелководье озера Маныч 21 мая.

Розовый пеликан *Pelecanus onocrotalus*. 22 мая на реке Дунда в общей сложности встречена 51 птица. Розовые пеликаны встречались как отдельными стаями, так и в стаях с кудрявым пеликаном. Гнездится в устье реки Дунда на острове Большой Лопиловский и, вероятно, на Кистинских островах.

Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus*. 17 мая на одном из Кистинских островов, удалённом от берега на 1 км, в бинокль наблюдалось около 8 птиц, сидящих на гнёздах. Рядом с островом на воде держалось ещё 7 птиц. 21 мая в балке Киста держалось 34 пеликана. 22 мая на реке Дунда встречены стаи по 3, 10 и 24 птицы.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. 22 мая на Дунде отмечались одиночки и небольшие стайки. Гнездится на островах Маныча.

Малая белая цапля *Egretta garzetta*. Обычна на реке Дунде. 22 мая здесь на 5-километровом маршруте отмечено 35 птиц.

Серая цапля *Ardea cinerea*. Одиночные птицы отмечались в балке Киста и на реке Дунде, где вероятно гнездятся.

Колпица *Platalea leucorodia*. 17 мая на Кистинских островах наблюдались птицы, вероятно гнездящиеся. 21 мая 1 птица отмечена в балке Киста и 25 птиц встречено на Дунде 22 мая.

Каравайка *Plegadis falcinellus*. 12 птиц отмечены 21 мая летящими над степью в сторону озера Маныч.

Серый гусь *Anser anser*. 1 птица встречена на небольшой луже у Маныча 21 мая. На Дунде 7 птиц и пара с 5 птенцами недельного возраста встречены 22 мая.

Лебедь-шипун *Cygnus olor*. 10 лебедей кормились на маленьком озерце у Маныча 17 мая. Стаи по 20, 20 и 8 птиц встречены в центре озера Маныч 21 мая, 6 птиц отмечены на Дунде 22 мая.

Огарь *Tadorna ferruginea*. 17 мая одна пара встречена у гнезда на крутом склоне озера Маныч. Здесь же встречена одиночка. Ещё одна пара встречена на лужице у Маныча 21 мая.

Пеганка *Tadorna tadorna*. 17 мая на береговом обрыве встречена беспокоящаяся у гнезда пара. 21 мая на пересыхающем ручье в степи встречены 24 птицы, ещё 30 отдыхали на берегу Маныча.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Самая обычная из уток. Пары встречались по всему берегу озера, на речушках в степи, на Дунде.

Серая утка *Anas strepera*. 17 мая пара птиц кормилась в балке Киста, пара на Маныче. 21 и 22 мая птицы отмечались также в устье балки Киста, на лужах и озерцах по Манычу и на Дунде.

Шилохвость *Anas acuta*. 17 мая над балкой Киста в восточном направлении пролетела 1 птица.

Чирок-трескунок *Anas querquedula*. 21 мая на пересыхающей речушке в степи кормился 1 самец, 10 птиц держалось на луже у Маныча. Птицы также отмечались на Дунде и в балке Киста.

Красноносый нырок *Netta rufina*. Пара встречена 17 мая в балке Киста. 22 мая 2 пары и 24 самца отмечены на реке Дунде.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina*. 17 мая в балке Киста держались 2 пары.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. Пара встречена по кромке зарослей тростников 21 мая в балке Киста. Одиночный самец наблюдался в устье Дунды 22 мая.

Луговой лунь *Circus pygargus*. Самка, вероятно, этого вида встречена охотящейся в степи у реки Дунда 22 мая.

Болотный лунь *Circus aeruginosus*. Гнездится в тростниковых зарослях по Дунде и в балке Киста.

Европейский тювик *Accipiter brevipes*. Неожиданным оказалось отсутствие этого ястреба в окрестностях села Манычское, несмотря на целенаправленные поиски и наличие подходящих гнездовых стаций, хотя в 20 км отсюда, в окрестностях села Дивное, сохранилась сравнительно крупная его группировка (около 25 пар) (Ильюх и др. 2005).

Обыкновенный канюк *Buteo buteo*. 17 мая в лесополосе у села Манычское встречена одна, вероятно, ещё пролётная птица. Один канюк встречен охотящимся у реки Дунда 22 мая.

Чеглок *Falco subbuteo*. 18 и 21 мая в лесополосах у села Манычское найдены 2 гнездовые пары. Расстояние между парами около 5 км. 21 мая у одной из пар наблюдалось спаривание.

Кобчик *Falco vespertinus*. Обычный гнездящийся вид лесополос.

Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus*. Обычный гнездящийся вид лесополос. Гнездится также по береговым обрывам Маныча, где 17 и 20 мая встречены гнездовые пары.

Перепел *Coturnix coturnix*. 21 мая на посевах пшеницы отмечены токовавшие птицы. Одна птица встречена также на Дунде.

Красавка *Anthropoides virgo*. На берегу небольшой пересыхающей речки 21 мая в 200 м от кошары найдено гнездо красавки с 2 яйцами.

Здесь же по руслу реки встречена стая из 24 журавлей-красавок.

Лысуха *Fulica atra*. 17 мая в балке Киста найдено 4 гнезда со свежими кладками и несколько погибших кладок, которые были подтоплены вследствие сильных дождей.

Тулес *Pluvialis squatarola*. Оказался вполне обычен. Птицы встречались стаями по 20-80 птиц по всему берегу озера Маныч. Одиночки встречены также на Дунде.

Галстучник *Charadrius hiaticula*. Стайка из 10 птиц наблюдалась на берегу Маныча 21 мая.

Морской зуёк *Charadrius alexandrinus*. 21 мая на солонце у пересыхающей речушки встречены 3 пары.

Чибис *Vanellus vanellus*. 22 мая небольшие стайки держались на Дунде.

Камнешарка *Arenaria interpres*. 1 птица держалась на берегу Маныча в стайке с другими куликами 21 мая.

Ходулочник *Himantopus himantopus*. Встречены в балке Киста, по мелким речушкам в степи, на Дунде, где гнездятся.

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*. Пара наблюдалась на мелководье пересыхающей речушки 21 мая.

Фифи *Tringa glareola*. Одиночки отмечены на Дунде 22 мая.

Травник *Tringa totanus*. Вероятно, гнездится по Дунде, где птицы отмечены 22 мая.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. 21 мая на луже в русле пересохшей речки отдыхали 3 птицы.

Турухтан *Philomachus pugnax*. 3 птицы держались в стае с другими куликами на берегу речки в степи 21 мая.

Кулик-воробей *Calidris minuta*. 21 и 22 мая небольшие стайки до 20 птиц отмечались по Манычу и на Дунде.

Краснозобик *Calidris ferruginea*. Стайки по 4-20 птиц встречены кормящимися на мелководьях Маныча и по Дунде.

Черноголовый хохотун *Larus ichthyaetus*. Одиночные хохотуны встречены кормящимися в степи и над озером.

Черноголовая чайка *Larus melanocephalus*. Обычный вид, эти чайки постоянно встречаются в степи и над озером. 21 мая около 200 птиц держалось у небольших островков в устье реки Мачок. При осмотре колонии на одном из островов во всех 20 гнёздах черноголовых чаек находились расклёванные кладки.

Озёрная чайка *Larus ridibundus*. Немногочисленный вид. 21 мая на небольшом островке отдыхало около 60 птиц.

Морской голубок *Larus genei*. Мёртвая птица найдена на берегу Маныча 21 мая.

Хохотунья *Larus cachinnans*. Гнездится на островах Маныча. Самая многочисленная из чайковых.

Белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus*. 25 птиц встречено на Дунде 22 мая.

Чайконосая крачка *Gelochelidon nilotica*. Одиночки и стайки постоянно наблюдались над озером.

Чеграва *Hydroprogne caspia*. 20 и 22 мая на Маныче и на Дунде встречено по 2 птицы.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Обычный вид. Пары и стайки постоянно наблюдались на Маныче и на Дунде.

Малая крачка *Sterna albifrons*. 22 мая 1 птица охотилась на Дунде.

Вяхирь *Columba palumbus*. Обычный гнездящийся вид лесополос. 18 мая на 10-км маршруте вдоль лесополос встречено 6 пар. В одном гнезде было 2 ненасиженных яйца.

Сизый голубь *Columba livia*. Гнездится в селе Манычское, на кошарах.

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto*. Гнездится в населённых пунктах. Также отмечена в лесополосах в нескольких километрах от населённых пунктов.

Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur*. Оказалась редка. Одна птица встречена 17 мая в разрушенном пионерлагере на берегу Маныча.

Кукушка *Cuculus canorus*. Пара птиц держалась на берегу Маныча 17 мая. Обычна в тростниках по Дунде.

Ушастая сова *Asio otus*. 18 мая в лесополосе встречена одна птица.

Домовый сыч *Athene noctua*. 17 мая на паровом поле наблюдалась отдыхавшая на фрегате (оросительная система) птица.

Сизоворонка *Coracias garrulus*. Гнездится в береговых обрывах по Манычу, где вполне обычна. В подходящих гнездовых условиях пары встречаются на каждые 300-350 м.

Золотистая щурка *Merops apiaster*. Гнездится в обрывах по Манычу. Около 50 пар гнездилось на крутом берегу по Дунде.

Удод *Upupa epops*. Встречается в степи у кошар. Гнездится на охотничьей базе.

Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus*. 16 мая в селе Манычское встречена одна птица.

Береговая ласточка *Riparia riparia*. 20 мая у обрывистого берега Маныча наблюдались 2 пары.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Гнездится в постройках человека.

Хохлатый жаворонок *Galerida cristata*. Держится на выгонах у животноводческих стоянок.

Малый жаворонок *Calandrella brachydactyla*. Относительно редок. Чаще встречается у Дунды.

Степной жаворонок *Melanocorypha calandra*. Обычный гнездя-

щийся вид в степи. Самый многочисленный из жаворонков.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Немногочисленный вид. В гнезде, найденном 17 мая, было 5 птенцов 5-6-дневного возраста.

Луговой конёк *Anthus pratensis*. 17 мая в заболоченной низине у Маныча держалась 1 птица.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. Встречается у жилья человека.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio*. 20 мая в балке по берегу Маныча встречена пара, державшаяся в густом кустарнике.

Чернолобый сорокопут *Lanius minor*. Гнездится в лесополосах и населённых пунктах.

Иволга *Oriolus oriolus*. Гнездится в селе Манычское и густых лесополосах, где 18 мая наблюдались 2 птицы и встречен поющий самец.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. 20 мая на береговом обрыве Маныча отмечена птица у гнезда.

Розовый скворец *Sturnus roseus*. Кормящиеся стаи отмечены на Дунде.

Сойка *Garrulus glandarius*. 18 мая в лесополосе встречены 2 птицы.

Сорока *Pica pica*. Гнездится в лесополосах и в балках по Манычу.

Галка *Corvus monedula*. 5-6 пар гнездилось в береговых обрывах в окрестностях пионерлагеря.

Грач *Corvus frugilegus*. Многочисленный гнездящийся вид лесных полос.

Серая ворона *Corvus cornix*. Обычный гнездящийся вид лесополос.

Ворон *Corvus corax*. 18 мая в лесополосе в окрестностях села Манычское наблюдался выводок из 3 птиц, державшийся в районе гнезда. Гнездо располагалось на 23-метровом вязе в центре густой 8-рядной лесополосы с густым подлеском. Размещалось гнездо у главного ствола на высоте 20 м. Под гнездом находились многочисленные погадки, состоящие из шерсти и костей грызунов. К этому времени гнездо воронов уже заняли чеглоки.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. 3 свиристеля наблюдались в селе Манычское 16 мая. Птицы пролетели на небольшой высоте в северном направлении. Следует отметить, что свиристель регистрировался в Предкавказье в мае и другими исследователями (Белик 1997).

Тростниковая камышевка *Acrocephalus scirpaceus*.17 мая в заболоченной низине у Маныча в густых зарослях тростника активно пели 2 самца.

Дроздовидная камышевка *Acrocephalus arundinaceus*. Обычный вид в тростниковых зарослях по Дунде.

Серая славка *Sylvia communis*. Изредка встречается в лесополосах и других лесопосадках, где гнездится.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*. Пролётные птицы отмечались с 17 по 19 мая.

Серая мухоловка *Muscicapa striata*. Была обычна в лесополосах, где, вероятно, гнездится.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. 16 мая самец наблюдался в селе Манычское.

Каменка-плешанка *Oenanthe pleschanka*. 17 мая пара наблюдалась у гнезда в береговом обрыве Маныча.

Каменка-плясунья *Oenanthe isabellina*. Птицы отмечались вдоль дорог в степи.

Большая синица *Parus major*. 18 мая в лесополосе наблюдалась птица с кормом в клюве.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Обычный гнездящийся вид поселений человека.

Полевой воробей *Passer montanus*. Самый многочисленный гнездящийся вид береговых обрывов Маныча.

Зеленушка *Chloris chloris*. Гнездится в селе Манычское.

Щегол *Carduelis carduelis*. Гнездится в селе Манычское.

Просянка *Emberiza calandra*. Встречается по Дунде и по зарастающим балкам в степи.

Черноголовая овсянка *Emberiza melanocephala*. Обычный гнездящийся вид. Встречается по окраинам лесополос и в бурьянистых балках в степи.

Литература

Белик В.П. 1997. Зимовки свиристеля на юге России // *Научное наследие Н.Я.Динника и его роль в развитии современного естествознания: Материалы межреспубликанской науч.-практ. конф.* Ставрополь: 26-28.

Ильюх М.П., Хохлов А.Н., Цапко Н.В., Ашибоков УМ. 2005. О хищных птицах Юго-Западной Калмыкии // *Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кавказе: Материалы 50-й науч. конф. «Университетская наука – региону».* Ставрополь: 140-143.

Маловичко Л.В., Федосов В.Н., Мосейкин Е.В., Рожков П.С. 2002. Авифауна степного урочища «Дунда» // *Кавказ. орнитол. вестн.* **14**: 63-76.

Маловичко Л.В., Федосов В.Н., Плеснявых А.С. 2005. Некоторые особенности динамики авифауны степного урочища «Дунда» // *Фауна Ставрополья* **13**: 50-62.

Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).* М.: 1-808.

Хохлов А.Н., Куликов В.Т. 1991. Летняя орнитофауна северного Ставрополья // *Фауна, население и экология птиц Северного Кавказа: Материалы науч.-практ. конф.* Ставрополь: 107-122.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1652****: 3897-3900*

К биологии обыкновенной кукушки *Cuculus canorus* в западном Забайкалье

Ц.З.Доржиев, Г.М.Хабаева

*Второе издание. Первая публикация в 1984**

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus* в западном Забайкалье обычный гнездящийся вид. Прилетает она сравнительно поздно. Первое появление этих птиц по кукованию зарегистрировано в окрестностях Улан-Удэ 23 мая 1963, 26 мая 1964, 28 мая 1967 (Измайлов, Боровицкая 1973), в 1978-1981 годах соответственно 26, 23, 29 и 26 мая. В 1977 году кормящуюся на земле стайку из семи кукушек отметили на окраине соснового леса в ветреную погоду 23 мая, а кукование самцов услышали только 25 мая.

Обыкновенная кукушка в исследуемом регионе населяет различные лесные биотопы, часто появляется на опушках, полянах, лугах около леса и в степи. Численность вида сравнительно низкая. По данным И.В.Измайлова и Г.К.Боровицкой (1973), плотность кукушки лишь в приручейных смешанных лесах достигала 2 особей на 1 км^2, во всех других биотопах она не превышала 0.9 ос./км^2. По данным наших учётов, в июне-июле 1978-1981 годов в Гусиноозерской котловине и на восточных отрогах хребта Хамар-Дабан плотность кукушки в лесных биотопах колебалась в пределах 0.1-0.4 ос./км^2.

В течение периода гнездования, по-видимому, кукушки связаны с определённой территорией. Так, в июне 1966 года в долине реки Баргузин самец, который легко отличался от других по своеобразному трёхслоговому кукованию *«ку-ку-ку»*, почти ежедневно фиксировался на территории примерно 3 км^2. При посещении этого места через год, в июне 1967 года, мы слышали такое же трёхслоговое кукование. Этот факт, возможно, свидетельствует об определённой развитости территориального консерватизма у взрослых обыкновенных кукушек.

На одной территории чаще встречаются самец и самка. В одном случае на опушке соснового леса отметили трёх кукушек. Птицы со своеобразной «трелью», «хохотом» и кукованием довольно активно преследовали друг друга. В литературе известно об образовании кукушками в брачный период небольших групп, состоящих из двух или нескольких самцов и одной самки (Корелов 1970; Дерим-Оглу, Леонов 1974; и др.).

---

* Доржиев Ц.З., Хабаева Г.М. 1984. К биологии обыкновенной кукушки в западном Забайкалье // *Тр. Окского заповедника* **15**: 194-198.

Гнездовой период обыкновенной кукушки в западном Забайкалье весьма растянут. Брачные игры и крики их отмечаются с начала июня до середины июля. И.В.Измайлов и Г.К.Боровицкая (1973), основываясь на активности кукования, указывают на наличие здесь у кукушек двух кладок: первая кладка в конце мая – первой половине июня, вторая – в первой декаде июля. Нами в разные годы (1975-1981) отмечены яйца кукушки 10, 13 и 19 июня, гнездовые птенцы – 4 и 16 июля.

За 1975-1981 годы в западном Забайкалье, несмотря па сравнительно многочисленные встречи обыкновенных кукушек и обследование в местах их обитания около 500 гнёзд 39 видов воробьиных птиц (полевого жаворонка *Alauda arvensis* – 9 гнёзд, рогатого жаворонка *Eremophila alpestris* – 11, деревенской ласточки *Hirundo rustica* – 63, воронка *Delichon urbica* – 4, береговой ласточки *Riparia riparia* – 21, белой трясогузки *Motacilla alba* – 28, желтоголовой трясогузки *Motacilla citreola* – 1, степного конька *Anthus richardi* – 13, забайкальского конька *Anthus godlewskii* – 14 и пятнистого конька *Anthus hodgsoni* – 3; сибирского жулана *Lanius cristatus* – 2, обыкновенной каменки *Oenanthe oenanthe* – 16, каменки-плясуньи *Oenanthe isabellina* – 19, плешанки *Oenanthe pleschanka* – 2, обыкновенной горихвостки *Phoenicurus phoenicurus* – 24, сибирской горихвостки *Phoenicurus auroreus* – 17, синего соловья *Luscinia cyane* – 1, бурой пеночки *Phylloscopus fuscatus* – 5, серой славки *Sylvia communis* – 9, малой мухоловки *Ficedula parva albicilla* – 1, большой синицы *Parus major* – 8, буроголовой гаички *Parus montanus* – 7, московки *Parus ater* – 2, обыкновенного поползня *Sitta europaea* – 2, белошапочной овсянки *Emberiza leucocephalos* – 30, красноухой овсянки *Emberiza cioides* – 3, дубровника *Emberiza aureola* – 16, обыкновенной чечевицы *Carpodacus erythrinus* – 2, каменного воробья *Petronia petronia* – 14, домового воробья *Passer domesticus* – 36, полевого воробья *Passer montanus* – 58, обыкновенного скворца *Sturnus vulgaris* – 2, майны *Acridotheres tristis* – 3, сойки *Garrulus glandarius* – 1, голубой сороки *Cyanopica cyanus* – 16, сороки *Pica pica* – 30, даурской галки *Corvus dauuricus* – 14, грача *Corvus frugilegus* – 65, чёрной вороны *Corvus corone orientalis* – 8), яйца и птенцы кукушки отмечены в гнёздах только трёх видов: степного конька, полевого жаворонка и каменки-плясуньи. А у таких сравнительно многочисленных в регионе видов, как белая трясогузка и обыкновенная горихвостка, которые в других частях ареала относятся к числу обычных воспитателей кукушки (Мальчевский 1958; Корелов 1970; Гаранин 1977; Нумеров 1978, 1980; Haartman 1981; и др.), «паразитирование» обыкновенной кукушки не наблюдалось.

Яйца и птенцы кукушки отмечены нами в 3 гнёздах **степного конька** из 13 осмотренных.

Гнездо степного конька, найденное 13 июня 1978 на сыром лугу в

Гусиноозерской котловине, содержало 3 собственных и 1 яйцо кукушки. 21 июня в гнезде сидел только один кукушонок.

19 июня 1978 под кустом караганы мы нашли второе гнездо степного конька с яйцом кукушки, которое лежало среди 2 яиц хозяев. При повторном посещении через 2 дня гнездо оказалось разорённым. В обеих кладках яйца кукушки отличались от яиц хозяев: у последних они были немного темнее и по размерам чуть меньше – длина 18.1-22.8 мм и диаметр 14-16.9 мм, а размеры 2 яиц кукушек соответственно равнялись 22.9×16.8 и 23.2×17.0 мм.

Третье гнездо степного конька, найденное 16 июля 1980 в этом же районе, было с одним подросшим кукушонком. 19 июля его с приёмными родителями встретили в 40 м в ивняке. Кукушонок уже хорошо перепархивал с ветки на ветку.

Полевой жаворонок в западном Забайкалье неизвестен как воспитатель птенцов обыкновенной кукушки. 10 июня 1978 в окрестностях Улан-Удэ на сухом лугу с очень низким травостоем нами было найдено гнездо жаворонка с 1 яйцом хозяина и 2 яйцами кукушки. Гнездо располагалось в углублении в почве, верхний край лотка был на её уровне. Все 3 яйца по окраске были очень похожими: фон грязно-белый (у кукушки чуть светлее) и на нём расплывчатые бурые пятна, сгущающиеся на тупом конце. Несколько отличались размеры яиц: у жаворонка – 22.5×14.6 мм, у кукушки оба яйца были одинаковыми и имели размеры 23.1×16.8 мм. Очевидно, последние принадлежали одной самке. Вылупление кукушат наблюдалось 14 июня. 15 и 17 июня оба птенца были на месте, и под ними лежало единственное яйцо жаворонка. В первые 3 дня наблюдений один кукушонок был более активным и немного крупнее второго. При следующем посещении гнезда 22 июня кукушата выглядели одинаково по размерам и развитию, были обильно покрыты развивающимся коричневатого цвета пером, на крыльях и хвосте отчётливо виднелись ещё не лопнувшие трубочки. В гнезде они не помещались и сидели над ним, тесно прижавшись друг к другу. По размерам они заметно превосходили своих приёмных родителей. 23 июня птенцы исчезли, гнездо осталось невредимым с одним яйцом-задохликом. Взрослых жаворонков около гнезда не было. Причину исчезновения кукушат нам не удалось выяснить. Однако совместное развитие этих птенцов до 9-дневного возраста (у кукушат в этом возрасте не проявляется инстинкт выбрасывания) позволяет сказать, что они, если бы не гибель от внешних факторов, безусловно, были бы выкормлены.

4 июля 1980 в степи Гусиноозерской котловины в гнезде **каменки-плясуньи** отмечен подросший птенец кукушки. Гнездо располагалось в расширенном входе норы длиннохвостого суслика *Spermophilus undulatus*. При осмотре кукушонок пытался скрыться в нору, но её узкий

проход не давал ему уйти далеко, и из хода виднелся его короткий хвост. Вытащенный оттуда, кукушонок неуклюжими прыжками сравнительно быстро передвигался по земле. 5 июля произвели тщательный осмотр норы. Гнездо каменок находилось в 65 см от входа, наименьший диаметр хода к нему равнялся 7 см. Оно было пустым. Такое устройство гнезда и особенно узкий ход норы ставят под сомнение возможность проникновения туда взрослой кукушки для откладки яйца. Возможно, что птенец вылупился в другой норе, а затем перешёл в соседнюю, которых в радиусе 30 м было около десяти. За дальнейшей жизнью кукушонка наблюдения не проведены.

Таким образом, из приведённых наблюдений видно, что в западном Забайкалье видами-воспитателями обыкновенной кукушки являются в основном наземногнездящиеся виды воробьиных птиц открытых ландшафтов. По окраске (грязно-белые с бурыми пятнами) яйца кукушек региона более близки к яйцам видов указанной группы. Сказанное позволяет предположить существование в исследуемом регионе расы обыкновенной кукушки, специализированной на видах открытых ландшафтов. Возможно, что в Забайкалье проходит лишь северная граница этой расы, более многочисленной в открытых ландшафтах соседней Монголии, где, вероятно, она и формировалась.

Литература

Гаранин В.И. 1977. Отряд кукушкообразные Cuculiformes // *Птицы Волжско-Камского края: Неворобьиные*. М.: 234-239.

Дерим-Оглу Е.Н., Леонов Е.А. 1974. К гнездовой биологии обыкновенной кукушки Владимирской области // *География и экология наземных позвоночных*. Владимир, **2**: 14-22.

Измайлов И.В., Боровицкая Г.К. 1973. *Птицы юго-западного Забайкалья*. Владимир: 1-315.

Корелов М.Н. 1970. Отряд кукушки // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **3**: 9-21.

Мальчевский А.С. 1958. О биологических расах обыкновенной кукушки (*Cuculus canorus* L.) на территории европейской части СССР // *Зоол. журн*. **32**, 2: 277-282.

Нумеров А.Д. 1978. Биология и взаимоотношения белой трясогузки и обыкновенной кукушки в Окском заповеднике // *Тр. Окского заповедника* **14**: 141-168.

Нумеров А.Д. 1980. Значение некоторых видов птиц как воспитателей обыкновенной кукушки на территории европейской части СССР // *Тез. докл. 7-й Всесоюз. зоогеогр. конф*. М.: 250-251.

Haartman L., von. 1981. Co-evolutuon of the cuckoo *Cuculus canorus* and a regular cuckoo host // *Ornis fenn*, **58**, 1: 1-10.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1652****: 3901-3905*

Авдотка *Burhinus oedicnemus* на Северо-Западном Кавказе

П.А.Тильба, Ю.А.Андрющенко,
Р.А.Мнацеканов, М.А.Динкевич

*Второе издание. Первая публикация в 2007**

Авдотка *Burhinus oedicnemus* относится к одним из наиболее редких, малоизученных, спорадично распространённых видов Северо-Западного Кавказа. На гнездовании этот вид встречается в пределах Таманского полуострова, а во время миграций – вдоль побережий Чёрного и Азовского морей, а также в горных районах региона.

Сведения о распространении авдотки на Северо-Западном Кавказе были собраны в 1972-2007 годах во время общего изучения авифауны разных районов этого региона. Кроме того, в 2007 году проведены специальные обследования приморской и степной частей Таманского полуострова с целью поиска подходящих местообитаний и гнёзд авдотки. В частности, осмотрена прибрежная полоса от Порт-Кавказа до посёлка Гаркуша, район горы Круглая, урочище Козловые Балки, участок берега Азовского моря между мысом Пеклы и мысом Каменный, степные участки Тамани от Карабетовой горы до горы Боюр-Гора, гора Цымбалы, окрестности кургана Воеводина Могила, гор Костенкова, Поливадина, Макотра и Лысой горы.

В юго-восточной части Краснодарского края авдотка на весеннем пролёте регистрировалась в третьей декаде апреля. Особи этого вида встречены на береговой полосе Чёрного моря у устья реки Мзымта 21 апреля 1988 (В.В.Никитин, устн. сообщ.). В конце апреля 2006 года на территории Адлерского аэродрома отмечены 4 птицы. Северо-восточнее, у посёлка Малый Утриш, группа из 3 авдоток встречена на морском каменистом пляже 27 апреля 1996. В период весенних миграций авдотки могут пересекать Главный Кавказский хребет, о чём свидетельствует встреча двух особей 20 апреля 1982 в посёлке Гузерипль (бассейн реки Белой).

Таким образом, весенний пролёт авдотки достаточно выражен вдоль Черноморского побережья западной части Кавказа. От основного причерноморского миграционного потока, по-видимому, отделяются более мелкие потоки, направление которых – по долинам рек к перевалам Главного Кавказского хребта. Такая региональная особенность миграции

* Тильба П.А., Андрющенко Ю.А., Мнацеканов Р.А., Динкевич М.А. 2007. Авдотка на Северо-Западном Кавказе // *Птицы Кавказа: Изучение, охрана и рациональное использование*. Ставрополь: 121-125.

ционных направлений характерна и для многих других пролётных видов, связанных с береговой полосой Чёрного моря и горными районами Западного Кавказа (Тильба 2007).

Численность авдотки на миграционных путях в весенний период невысока; в это время регистрируются только одиночные особи и небольшие группы птиц. Однако принадлежность авдотки к ночным мигрантам не позволяет в полном объёме оценить количество пролётных особей.

Гнездовой ареал авдотки на Северо-Западном Кавказе ограничен Таманским полуостровом. Сведения о размножении вида в Восточном Приазовье, в частности, в Славянском районе (Заболотный 1992), в дельте Кубани (Гинеев, Кривенко 1998), на Ейском лимане (Gineev *et al*. 2003) и на Ханском озере (Гинеев, Кривенко, Емтыль 2000; Gineev *et al*. 2003), до настоящего времени не подтверждены находками кладок или выводков.

На Таманском полуострове авдотка распространена в виде отдельных очагов в прибрежной полосе Чёрного моря и в степных районах. В прошлом в приморской полосе вид был обычен среди дюн, расположенных между Кубанским (Витязевским) лиманом и морем (Птушенко 1939), а также встречался у посёлка Джемете (Волчанецкий и др. 1962). В настоящее время авдотки продолжают регулярно отмечаться в этом же районе на Витязевской косе. Так, 3 мая и 8 июня 1998 у посёлка Витязево на песчаной косе с редкими кустарниками регистрировались пары авдоток и одиночные особи. 9 июня 1989 на Витязевской косе обнаружена пара этих птиц и найдено их гнездо. Оно располагалось на выровненном участке песчано-ракушечного грунта, лишённого растительности, в 200 м от берега моря. Кладка из 2 свежих яиц находилась в углублении песка, без какой либо подстилки. Яйца по размерам не отличались друг от друга: 54.0×38.2 мм. Витязевская коса, по-видимому, наиболее плотно заселена авдотками, где их численность в конце 1990-х годов оценивалась в 5-7 пар (Емтыль и др. 2000), в настоящее время здесь гнездится 8-10 пар (Лохман и др. 2005). Кроме того, имеются сведения о гнездовании 2 пар авдоток по берегу лимана Цокур у посёлка Виноградный и 1-2 пар на Бугазской косе (Лохман и др. 2005). Необходимо подчеркнуть, что в 1970-е годы во время наших регулярных обследований Бугазской косы зарегистрировать пребывание авдотки не удалось (Тильба 1983).

Гнездование авдотки в степной зоне Таманского полуострова было установлено в 2007 году. Присутствие птиц (по голосу и следам) зарегистрировано 6 мая 2007 северо-западнее посёлка Виноградный у подножья горы Чиркова. 7 мая 2007 на восточном склоне горы Кирпина найдено гнездо авдотки. Оно располагалось на щебнистом участке, площадью 6 м^2, в верхней части длинного солонца (около 30×100 м),

полого спускающегося со склона каменистой гряды. Травостой на солонце практически отсутствовал, а гнездо находилось на его краю у кромки степной растительности. Диаметр лотка 190×170 мм, глубина 30 мм. Гнездо, лоток и его края выложены камешками (около 100), размером до 3.5 см^3. В гнезде находилась свежая кладка из 2 яиц, вероятно, отложенная 2-3 мая. Размеры яиц: 53.7×36.6 мм (масса 35.2 г) и 49.4×36.7 мм (масса 33.1 г).

Гнездование авдотки достаточно вероятно и в других степных урочищах Таманского полуострова. Нами ночью 22 апреля 2006 две птицы определены по голосу вдали от водоёмов между железнодорожным полотном и северо-западной подошвой горы Карабетова. Осмотр биотопов горы Карабетова, включающих участки с сильно разреженным угнетённым травостоем или полностью лишённые растительности, указывал на наличие необходимых условий для гнездования вида в этом районе Таманского полуострова. Позже, 30 июля 2006, на юго-восточном склоне горы Карабетова была отмечена ещё одна пара авдоток (наблюдения проводились совместно с И.С.Найдановым). В аналогичном биотопе двух птиц наблюдали 12 июня 2003 в районе горы Поливадина (В.И.Щуров, устн. сообщ.). 23-24 августа 2003 авдотки отмечались у села Гаркуша (Белик 2004). Кроме того, подходящие гнездовые местообитания вида обнаружены в урочище Козловые Балки на участках территории от горы Карабетова до горы Боюр-Гора, на горе Цымбалы.

Общая численность авдотки в Краснодарском крае до 2000 года оценивалась в 20 гнездящихся пар (Лохман 2000). Позднее прослежено её снижение до 12 пар (Лохман, Емтыль 2004а). В одной из гнездовых группировок на Кизилташских лиманах насчитывалось 8-15 пар, в другой – на потенциальной КОТР международного значения «Озеро Маркитанское, г. Карабетова, г. Комендантская, г. Чиркова, озёра у пос. Приморский» – 2-5 пар (Лохман, Емтыль 2007).

Учитывая новые сведения о гнездовом пребывании авдотки в степной части Таманского полуострова, общую современную численность вида в регионе можно оценить в 25-30 пар.

Осенний пролёт авдотки достаточно заметен на Черноморском побережье. Иногда птицы появляются также в Приазовье. На Черноморском побережье, в юго-восточной части Краснодарского края, пролёт авдоток проходит в течение сентября-октября. 26 августа 1914 (по старому стилю) авдотка отмечалась у устья реки Кудепста (Кудашев 1917). В сентябре 1986 года одна птица была добыта в окрестностях Адлера (Пекло и др. 1992), 20 сентября 2004 две травмированные особи подобраны на взлётной полосе Адлерского аэродрома. Одиночные птицы регистрировались на вспаханных полях Имеретинской низменности 6 октября 1986 и 22 октября 2001 (Тильба 1999). В октябре присутствие

авдоток обнаружено в речных прибрежных долинах Сочи-Мацестинского курортного района (Строков 1960).

В других районах Черноморского побережья Краснодарского края авдотка отмечалась у Новороссийска на Суджукской косе 13 сентября 1921 (Птушенко 1939).

На побережье Азовского моря авдотка появляется гораздо реже, где наблюдалась только один раз – две птицы отмечены 15 сентября 2005 на высохших маршах Камышеватской косы (Ейский район Краснодарского края).

Ограниченный объём сведений о распространении и экологии авдотки на Северо-Западном Кавказе, связанный со скрытным образом жизни этого вида, не позволяет в полном масштабе и однозначно оценить современное состояние её популяции. Неоднократно высказывалось мнение о сокращении численности и отрицательных популяционных трендах авдотки в регионе (Лохман, Емтыль 2004а,б; Тильба, Мнацеканов 2004). С другой стороны, сохранившаяся с 1920-х годов её гнездовая группировка на Витязевской косе, обнаружение птиц на Бугазской косе, у берега лимана Цокур могут свидетельствовать об элементах стабилизации и даже локального расширения ареала вида. Этот вывод согласуется с мнением некоторых авторов (Белик и др. 2003), которые считают, что на косах Причерноморья отмечается увеличение численности авдотки.

Остаётся пока открытым вопрос о гнездовании авдотки в Восточном Приазовье, где имеются подходящие для гнездования вида местообитания, аналогичные стациям степной части Таманского полуострова (солончаки). Не исключено, что более детальное обследование ландшафтов Восточного Приазовья позволит выявить новые места гнездования авдотки в пределах Северо-Западного Кавказа.

Стабильно повышенной была, по-видимому, в прошлом, и остаётся сейчас уязвимость авдотки. Это связано с наземным типом гнездования, небольшим ареалом, невысокой её численностью. Повышенная уязвимость авдотки, возможно, препятствует образованию новых устойчивых гнездовых группировок, появление которых могло бы происходить в результате локальной пульсации ареала вида.

Литература

Белик В.П., Поливанов В.М, Тильба П.А., Джамирзоев Г.С., Музаев В.М., Букреева О.М., Русанов Г.М., Реутский Н.Д., Мосейкин В.Н., Чернобай В.Ф., Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Мнацеканов Р.А., Комаров Ю.Е. 2003. Современные популяционные тренды гнездящихся птиц Южной России // *Стрепет* **3**: 10-30.

Белик В.П. 2004. Некоторые дополнения к орнитофауне Таманского полуострова // *Экологические проблемы Таманского полуострова*. Краснодар: 102-105.

Волчанецкий И.Б., Пузанов И.И., Петров В.С. 1962. Материалы по орнитофауне Северо-Западного Кавказа // *Тр. Науч.-исслед. ин-та биол. и биол. ф-та Харьков. ун-та* **32**: 7-72.

Гинеев А.М., Кривенко В.Г. 1998. Дельта Кубани // *Водно-болотные угодья России. Водно-болотные угодья международного значения*. М., **1**: 106-122.

Гинеев А.М., Кривенко В.Г., Емтыль М.Х. 2000. Бейсугский лиман и озеро Ханское // *Водно-болотные угодья России. Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции*. М., **3**: 167-174.

Емтыль М.Х., Лохман Ю.В., Герасимова О.В. 2000. Распространение и численность некоторых видов куликов в Краснодарском крае // *Редкие, исчезающие и малоизученные птицы России*. М.: 157-160.

Заболотный Н.Л. 1992. Заметки о редких и малочисленных птицах западной части Краснодарского края // *Кавказ. орнитол. вестн.* **3**: 80.

Кудашев А.Е. 1917. Предварительный список птиц, наблюдавшихся мною в Сочинском округе Черноморской губернии // *Орнитол. вестн.* 1: 20-36.

Лохман Ю.В. 2000. Результаты первой инвентаризации КОТР международного значения в Европейской России. Краснодарский край // *Ключевые орнитологические территории России. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России*. М., **1**: 322-325.

Лохман Ю.В., Емтыль М.Х. 2004а. Редкие и охраняемые птицы отряда Ржанкообразные Западного Предкавказья // *Современное состояние и проблемы охраны редких и исчезающих видов позвоночных животных Южного федерального округа Российской Федерации*. Ставрополь: 59-65.

Лохман Ю.В., Емтыль М.Х. 2004б. Редкие и исчезающие виды птиц (Aves) Таманского полуострова // *Экологические проблемы Таманского полуострова*. Краснодар: 188-193.

Лохман Ю.В., Емтыль М.Х., Фадеев И.В., Нестеров Е.В., Дровецкий С.В., Карагодин И.Ю. 2005. Орнитофауна Черноморских лиманов России и прилегающих территорий // *Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России*. М., **5**: 72-96.

Лохман Ю.В., Емтыль М.Х. 2007. *Ключевые орнитологические территории международного значения Краснодарского края*. Краснодар: 1-62.

Пекло А.М., Казаков Б.А., Тильба П.А. 1992. О питании птиц Черноморского побережья Кавказа // *Кавказ. орнитол. вестн.* **4**, 2: 200-208.

Птушенко Е.С. 1939. О некоторых новых и редких видах птиц северной части Черноморского побережья Кавказа // *Сб. тр. Зоол. музея Моск. ун-та* **5**: 33-42.

Строков В.В. 1960. Птицы наземных ландшафтов Сочи-Мацестинского курортного района // *Охрана природы и озеленение* **4**: 121-133.

Тильба П.А. 1983. Орнитофауна северо-западного Причерноморья // *Охрана реликтовой растительности и животного мира Северо-Западного Кавказа*. Л.: 75-83.

Тильба П.А. 1999. Авифауна Имеретинской низменности. Сообщение 1. Неворобьиные // *Кавказ. орнитол. вестн.* **11**: 166-204.

Тильба П.А. 2007. К вопросу изучения миграций птиц в юго-восточной части Российского Причерноморья // *Докл. Сочинского отд. Рус. геогр. общ-ва* **4**: 65-77

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. 2004. Состояние популяций редких видов птиц в Краснодарском крае // *Современное состояние и проблемы охраны редких и исчезающих видов позвоночных животных Южного федерального округа Российской Федерации*. Ставрополь: 89-91.

Gineev A.M., Belik V.P., Kazakov BA. 2003. Russia // *Directory of Azov-Black Sea Coastal Wetlands*. Kyiv: 114-154.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1652**: 3906-3907*

О характере пребывания соловьиной широкохвостки *Cettia cetti* в восточном Предкавказье

И.И.Гизатулин, А.Н.Хохлов

*Второе издание. Первая публикация в 2001**

По материалам исследований в южной части Терско-Кумской низменности (Чечня) с 1981 по 1997 год, широкохвостая камышевка, или соловьиная широкохвостка *Cettia cetti* населяет околоводные биотопы поймы реки Терек и прилегающих водоёмов всех типов – старичные озёра, пруды и каналы. Характерными гнездовыми стациями этого вида здесь являются тростниковые крепи, часто с подростом ежевичников и травяном ярусом. В гнездовом населении лимнофильного комплекса птиц эта камышевка входит в ядро фоновой группы. Её относительная численность в тростниках озёр Будары составляет в среднем 6.8 особей на 3 км маршрута (Точиев, Гизатулин 1987). В таксономическом отношении в Восточном Предкавказье обитает подвид *Cettia cetti orientalis* Tristram, 1867 (Степанян 1990). Добытый нами 31 мая 1994 экземпляр самца имел морфометрические показатели, несколько превышающие известные литературные данные (Портенко 1960). Длина крыла добытой птицы составила 69.5 мм, хвоста – 70.8 мм, клюва – 12.0 мм, цевки – 24.0 мм. Размеры левого семенника были 5.7 мм, правого – 4.6 мм. Тушка хранится в музее кафедры зоологии Ростовского государственного университета.

По известным литературным данным, соловьиная широкохвостка указывается для данного региона как гнездящийся перелётный вид. Мы же неоднократно отмечали широкохвостку в выше отмеченных биотопах в зимнее время. Зимовка её здесь носит пульсирующий характер. При сильных похолоданиях со снежными заносами птицы временно откочёвывают, видимо, в пределы Закавказья. При потеплении наблюдается обратный процесс. Нужно заметить, что на территории Предкавказья известно появление на зимовке ряда видов, ранее здесь не отмечавшихся: серого журавля *Grus grus* (Хохлов, 1986), ремеза *Remiz pendulinus* (Гизатулин 1989), малой *Tachybaptus ruficollis* и черношейной *Podiceps nigricollis* поганок (Комаров 1989), кваквы *Nycticorax nycticorax* (Бичерев, Хохлов 1990), чёрного коршуна *Milvus migrans* (Хохлов и др. 1999), перепела *Coturnix coturnix* (Хохлов 1990) и

* Гизатулин И.И., Хохлов А.Н. 2001. О характере пребывания широкохвостой камышевки в восточном Предкавказье // Кавказ. орнитол. вестн. 13: 153-155.

некоторых других видов. Появление соловьиной широкохвостки среди зимующих птиц региона, скорее всего, связано с известным явлением глобального потепления климата и антропогенной трансформацией ландшафтов в направлении расширения для ряда видов трофических, защитных и других стаций. Характерной особенностью песни этой камышевки в зимнее время является выпадение колена в окончании позывной песни.

Таким образом, в настоящее время в Восточном Предкавказье соловьиная широкохвостка по статусу пребывания является гнездящимся оседлым видом.

Литература

Бичерев А.П., Хохлов А.Н. 1990. Зимовка голенастых птиц на Ставрополье // *Миграции и зимовки птиц Северного Кавказа*. Ставрополь: 209-214.

Гизатулин И.И. 1989. К фауне воробьиных птиц Чечено-Ингушетии // *Орнитологические ресурсы Северного Кавказа*. Ставрополь: 27-30.

Комаров Ю.Е. 1989. Изменение авифауны Северной Осетии за последние 29 лет // *Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий*. Ставрополь: 216-219.

Портенко Л.А. 1960. *Птицы СССР (Воробьиные)*. Ч. 4. М.; Л.: 1-415 (Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР. Вып. 69).

Степанян Л.С. 1990. *Конспект орнитологической фауны СССР*. М.: 1-727.

Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И. 1987. Летняя орнитофауна Терско-Кумской низменности ЧИАССР // *Материалы по изучению Чечено-Ингушской АССР*. Грозный: 71-78.

Хохлов А.Н. 1990. О зимовке перепела в агроценозах Ставрополья // *Механизмы адаптации животных и растений к экстремальным факторам среды*. Ростов-на-Дону, 1: 102-103.

Хохлов А.Н. 1986. Серый журавль зимует в Ставрополье // *Природа* 10: 21-33.

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Караваев А.А., Комаров Ю.Е., Вилков Е.В., Хохлов Н.А. 1999. Зимнее население птиц свалок городов Северного Кавказа. Сообщение 4 // *Кавказ. орнитол. вестн*. **11**: 208-212.