ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1664
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII
Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1664

СОДЕРЖАНИЕ

4393-4403 Материалы к изучению ястребиных птиц Салаирского кряжа. С.В.ВАЖОВ, В.М.ВАЖОВ, А.А.ЧЕРЕМИСИН

4404-4407 Индийская камышевка *Acrocephalus agricola* – новый гнездящийся вид национального парка «Мещёрский» (Рязанская область). Е.А.ФИОНИНА, Е.В.ВАЛОВА, О.В.НАТАЛЬСКАЯ

4408-4409 Бурокрылая ржанка *Pluvialis fulva* ловит и ест девятииглую колюшку *Pungitius pungitius*. М.А.АНТИПИН

4409-4413 Домовые воробьи *Passer domesticus* кормятся насекомыми на осветительных приборах. А.Г.РЕЗАНОВ, А.А.РЕЗАНОВ

4413-4417 О необычных скоплениях ворон на морском льду. А.П.КРЮКОВ

4418-4421 Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* – новый гнездящийся вид Саратовской области. А.В.БЕЛЯЧЕНКО, Е.Ю.МЕЛЬНИКОВ

4421-4422 Запасание корма желтобрюхим дятлом-сосуном *Sphyrapicus varius*. Р.Н.КОННЕР, Д Ж.К.КРОЛЛ

4422-4423 Каролинский меланерпес *Melanerpes carolinus* переносит яйцо в клюве. Г.К.ХИКМАН

4423 Интересные находки и наблюдения за куликами осенью 1996 года на юго-западе Украины. И.П.ГЕРЖИК, А.И.КОРЗЮКОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования: 6 сентября 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1664

CONTENTS

4393-4403 Materials for the study of hawks of the Salair ridge. S.V.VAZHOV, V.M.VAZHOV, A.A.CHEREMISIN

4404-4407 The paddyfield warbler *Acrocephalus agricola* – new nesting species of the national park «Meschersky» (Ryazan Oblast). E.A.FIONINA, E.V.VALOVA, O.V.NATALSKAYA

4408-4409 A Pacific golden plover *Pluvialis fulva* catches and eats ninespine sticklebacks *Pungitius pungitius*. M.A.ANTIPIN

4409-4413 House sparrows *Passer domesticus* taking insects from lighting fix-tures. A.G.REZANOV, A.A.REZANOV

4413-4417 About unusual concentrations of crows on sea ice. A.P.KRYUKOV

4418-4421 The Syrian woodpecker *Dendrocopos syriacus* – a new breeding bird of the Saratov Oblast. A.V.BELYACHENKO, E.Yu.MELNIKOV

4421-4422 Food-storing by Yellow-bellied Sapsuckers *Sphyrapicus varius*. R.N.CONNER, J.C.KROLL

4422-4423 Egg transport recorded for the Red-bellied Woodpecker *Melanerpes carolinus*. G.C.HICKMAN

4423 Interesting wader records and observations in the South-Western Ukraine in autumn 1996. I.P.GERZHIK, A.I.KORZYUKOV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1664**: 4393-4403*

Материалы к изучению ястребиных птиц Салаирского кряжа

С.В.Важов, В.М.Важов, А.А.Черемисин

Сергей Викторович Важов, *Виктор Маркович Важов*. Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М.Шукшина. Ул. Короленко, 53, Бийск, 659333, Россия. E-mail: vazhov49@mail.ru
Алексей Александрович Черемисин. Алтайский государственный университет, филиал. Ул. Социалистическая, 23/1, Бийск, 659332, Россия

Поступила в редакцию 4 сентября 2018

На территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей России находится особый горный массив – Салаирский кряж (рис. 1, 2), который представляет собой наиболее выдвинутый к северу отрог Алтайской горной системы. Это невысокое (400-450 м н.у.м.) дугообразное горное сооружение, обращённое выпуклой стороной на северо-восток (Малолетко 1972).

Рис. 1. Салаирский кряж, долина реки Чумыш. 13 июля 2017. Фото С.В.Важова.

Салаирский кряж отличается уникальной природой. Здесь сохранились малонарушенные естественные черневые и кедровые леса, а также крайне редкие в Сибири реликтовые экосистемы липовых рощ и исчезающие ландшафты северной лесостепи. На Салаире растёт мно-

жество редких растений (липа сибирская *Tilia sibirica*, копытень европейский *Asarum europaeum*, бруннера сибирская *Brunnera sibirica*, подлесник уральский *Sanicula uralensis*, подлесник европейский *Sanicula europea*, осмориза остистая *Osmorhiza aristata* и др.); обитают такие редкие животные, как эйзения Малевича *Eisenia malevici*, аполлон *Parnassius apollo*, чёрный аист *Ciconia nigra*, сапсан *Falco peregrinus*, балобан *Falco cherrug*, филин *Bubo bubo*, скопа *Pandion haliaetus*, серый сорокопут *Lanius excubitor*, воробьиный сычик *Glaucidium passerinum*, бородатая неясыть *Strix nebulosa*, пёстрый дрозд *Zoothera varia*, летяга *Pteromys volans* (Гармс и др. 2010). Кроме того, здесь обнаружено обитание редких видов летучих мышей.

Рис. 1. Салаирский кряж на схеме орогидрографии Предалтайской части Западной Сибири (по: Малолетко 1972). 1 – Салаирский кряж; 2 – Бийско-Барнаульская впадина; 3 – Солтонская впадина; 4 – Сары-Чумышская впадина; 5 – Предсалаирская депрессия; 6 – Горный Алтай; 7 – Кулундинская впадина.

Однако значительная часть природы Салаирского кряжа практически уже уничтожена. В ходе геологоразведки, добычи полезных ископаемых и лесозаготовки она превратилась в череду карьеров, отвалов и вырубок. По прогнозам учёных, при современном режиме использования природных ресурсов Салаир полностью потеряет природоохранную, научную, эстетическую и рекреационную ценность уже через 10-15 лет (Гармс и др. 2010).

Для сохранения уникальной природы Салаира необходимо создание особо охраняемой территории федерального значения. Эта территория (национальный парк «Тогул») в настоящее время проектируется, но местность является труднодоступной и очень слабо исследованной. Малоизученными на Салаире остаются также фауна и экология птиц семейства ястребиных Accipitridae (Vieillot, 1816), многие из которых являются редкими и исчезающими в масштабе их ареалов.

Чтобы в какой-то степени заполнить этот пробел, мы в течение полевых сезонов 2013-2018 годов изучали территориальное размещение и гнездование ястребиных птиц в условиях Салаира и сопредельных территорий. В данной статье представлены некоторые предварительные результаты этих исследований. Анализ литературных и собственных данных позволяет сделать вывод, что в настоящее время на Салаирском кряже установлено обитание 18 видов ястребиных. Ниже приводится их повидовое описание.

Рис. 3. Обыкновенный осоед *Pernis apivorus*. Алтайский край. 23 мая 2013. Фото С.В.Важова.

Обыкновенный осоед *Pernis apivorus*. Распространение и экология обыкновенного осоеда (рис. 3) на Салаире, как и в целом по Южной Сибири, изучены слабо. Вид включён в Красную книгу Кемеровской области (2012). В пределах Салаира обыкновенный осоед гнездится на территории Кемеровской области (Гагина 1979), отмечен в Тогульском заказнике Алтайского края (Инвентаризация… 1995), где тоже вероятно гнездование. Общая численность осоеда для лесов Салаирского кряжа на территории приобского правобережья в Новосибирской области в 2002 году оценивалась в 78 пар, а в долине реки Бердь это достаточно обычный вид (Карякин и др. 2005).

Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus*. Редкий малоизученный вид, включён в Красные книги Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. На Салаире встречается у западного предела распространения, гнездится (Чунихин 1965; Гагина 1979). Вероятно, Салаирский кряж населяет стабильная популяция, поскольку в ходе полевых обследований этих птиц встречали многократно на разных участках (Материалы… 2018). В отличие от обыкновенного, хохлатый осоед тяготеет к более разреженным и светлым лесам, темнохвойных лесов избегает. Нами найдено жилое гнездо хохлатого осоеда (рис. 4, 5) в конце июля 2017 года на границе Тогульского и Заринского районов Алтайского края на пологом водоразделе двух малых притоков реки Тогул – рек Крутишка и Мочище.

Рис. 4. Самец хохлатого осоеда *Pernis ptilorhynchus* у гнезда. 27 июля 2017. Фото С.В.Важова.

Рис. 5. Жилое гнездо хохлатого осоеда *Pernis ptilorhynchus*.
Водораздел рек Крутишка и Мочище. 27 июля 2017. Фото С.В.Важова

Чёрный коршун *Milvus migrans*. Обычный гнездящийся перелётный вид Салаирских лесов (Гагина 1979; Васильченко 2004; Материалы… 2018). Точное количество гнездовых участков коршуна на Са-

лаирском кряже неизвестно, т.к. основное внимание мы, как и другие исследователи, уделяли поиску гнёзд редких видов пернатых хищников. Однако взрослые коршуны и их жилые гнёзда регулярно встречались здесь в ходе полевых исследований (Важов и др. 2015, 2016).

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Гнездование в пределах Салаира предполагалось Т.Н.Гагиной (1979). Отмечен на территории Тогульского заказника Алтайского края (Инвентаризация… 1995). Нами территориальные пары этих луней (гнездовые участки) неоднократно отмечались в долине реки Чумыш весной и летом 2017 года, поэтому гнездование полевого луня в настоящее время на Салаире не вызывает сомнений.

Луговой лунь *Circus pygargus*. Редкий малоизученный вид. Включён в Красные книги Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. В прошлые годы отмечался на Салаире в пределах Кемеровской области (Гагина 1979). Весьма вероятно его нахождение и гнездование также в Алтайской части Салаира (Материалы… 2018).

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. Раньше встречался по всему Салаирскому кряжу в большом количестве (Хахлов 1937). В настоящее время довольно редок. Не вызывает сомнения его присутствие в Тогульском заказнике (Материалы… 2018). Нами жилые гнёзда и гнездовые участки выявлены весной 2018 года в долине реки Чумыш. Сравнительно небольшое число известных здесь гнездовых участков связано, по нашему мнению, не столько с редкостью вида, сколько с его скрытностью и трудностью выявления.

Перепелятник *Accipiter nisus*. Характерная птица лесных угодий, его гнездование по всему Салаиру несомненно (Гагина 1979; Васильченко 2004; Материалы… 2018). Неоднократно наблюдался нами в гнездовое время 2017 и 2018 годов в долине Чумыша.

Малый перепелятник *Accipiter gularis*. Включён в Красные книги Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016) и Кемеровской области (2012). В восточной части Алтайского края лежит западная граница ареала этого вида. Ранее малый перепелятник приводился для Салаира как гнездящийся (Залесский, Залесский 1931) и здесь же – без указания характера пребывания (Хахлов 1937). В качестве редкого вида приводится для Салаира со стороны Кемеровской области, где встречается преимущественно по елово-пихтовым рединам с плотностью 0.01 ос./км^2 (Васильченко 2004).

Зимняк *Buteo lagopus*. Отмечен на Салаире во внегнездовое время – осенью и зимой (Материалы… 2018). А.А.Васильчено (2004) приводит в качестве пролётного и регулярно зимующего по всей Кемеровской области.

Обыкновенный канюк *Buteo buteo*. Обычный гнездящийся вид на территории Салаирского кряжа (Гагина 1979; Васильченко 2004),

распространён повсеместно (Материалы… 2018). Нами жилые гнёзда и гнездовые участки выявлены в 2017-2018 годах в долине Чумыша.

Змееяд *Circaetus gallicus*. Очень редок, занесён в Красные книги Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016) и Новосибирской области (2008). Алтайская территория Салаира является самой восточной частью ареала, возможно гнездование (Материалы… 2018). Нахождение змееяда отмечено по правому притоку Чумыша – реке Мостовой в Ельцовском заказнике (Инвентаризация… 1995).

Орёл-карлик *Hieraaetus pennatus*. Очень редкая птица, занесённая в Красные книги Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. Жилое гнездо этого орла найдено в пойме реки Бердь ниже села Кинтереп (Карякин и др. 2005). В обском правобережье Новосибирской области предполагается гнездование 10 пар орлов-карликов (Карякин и др. 2005). Нахождение на Салаире известно также в Ельцовском заказнике Алтайского края в бассейне реки Мостовой (Красная книга… 2016). Возможно обитание и в Тогульском заказнике (Материалы… 2018).

Степной орёл *Aquila nipalensis*. Находится на грани исчезновения (Важов и др. 2016а). Занесён в Красные книги Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей, а также других субъектов Российской Федерации в пределах ареала. На Салаире – залётный вид, единственная встреча зафиксирована летом 2017 года на границе Тогульского и Заринского районов Алтайского края в Тогульском заказнике (рис. 6).

Рис. 6. Молодой (во второе лето жизни) степной орёл *Aquila nipalensis*.
Тогульский заказник. 28 июля 2017. Фото С.В.Важова.

Большой подорлик *Aquila clanga*. Глобально редкий вид, занесён в Красные книги Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. В прошлом веке на Салаирском кряже отмечался как обычный гнездящийся вид (Залесский, Залесский 1931; Гагина 1979). Гнездится в лесах Салаира и в настоящее время (Важов, Бахтин 2016). Жилое гнездо (рис. 7) найдено в 2013 году в пойме реки Уксунай на территории Тогульского заказника Алтайского края (Бахтин, Важов 2014; Бахтин, Важов 2016).

Рис. 7. Жилое гнездо большого подорлика *Aquila clanga*.
Пойма реки Уксунай. 13 мая 2013. Фото С.В.Важова.

Могильник *Aquila heliaca*. Редкая птица по всему ареалу, включённая в Красные книги РФ (2001), Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. На Салаирском кряже – очень редкий вид (Васильченко 2004), но в 1930-е годы был обычен в его предгорьях (Хахлов 1937). В настоящее время известно гнездование могильника на южной окраине Бие-Чумышской возвышенности в

юго-западных предгорьях Салаира (Бахтин, Важов 2013). Весьма вероятно гнездование этого орла также в Целинном районе Алтайского края у села Победа, где наблюдались 2 орла (Важов и др. 2016б).

Беркут *Aquila chrysaetos*. Редкий орёл, включённый в Красные книги Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. Со стороны Кемеровской области на Салаире Т.Н.Гагина (1979) приводит беркута в качестве очень редкого гнездящегося вида. В пределах Новосибирской области гнездо найдено в 1995 году в бассейне реки Большой Елбаш (Карякин и др. 2005). Позднее гнездование беркута установлено на северных макросклонах гор Бусандайка и Слизун на территории Маслянинского (2 гнезда) и Искитимского (1 гнездо) районов Новосибирской области. Все гнёзда были многолетними и жилыми (Карякин и др. 2005, 2010). В 2004 году гнездовый участок беркутов выявлен в бассейне реки Чумыш в 8 км западнее села Сары-Чумыш на территории Алтайского края. Также перспективным для беркута является юго-западный макросклон Салаира, в первую очередь, долины двух рек: Тогула и Аламбая (Карякин и др. 2010).

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Редкая птица, включённая в Красные книги России (2001), Алтайского края (2016), Новосибирской (2008) и Кемеровской (2012) областей. На Салаире ранее был отмечен на пролёте со стороны Кемеровской области в качестве редкого вида (Васильченко 2004). Нами орлан-белохвост наблюдался в октябре 2017 года на реке Чумыш в пределах Алтайского края (рис. 8).

Рис. 8. Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Долина реки Чумыш.
11 октября 2017. Фото Р.Ф.Бахтина.

Чёрный гриф *Aegypius monachus*. Редкая птица, включённая в Красные книги Российской Федерации (2001), Алтайского края (2016) и Кемеровской области (2012). На Салаире – очень редкий залётный

вид. По данным Т.Н.Гагиной (Васильченко 2004), изредка встречается в тайге Салаирского кряжа, где кормится внутренностями лосей, оставленными охотниками. Орланы держались парами, такие встречи отмечались весной 1990 года (Васильченко 2004).

Таким образом, на Салаирском кряже отмечено 18 видов ястребиных птиц, достоверно гнездится 11 из них. Гнездование лугового луня, змееяда и могильника не доказано, но если для лугового луня оно очень вероятно, то для могильника и змееяда остаётся под вопросом. Зимняк, степной орёл, орлан-белохвост и чёрный гриф отмечены либо залётными, либо пролётными. Редкими и нуждающимися в охране являются: обыкновенный и хохлатый осоеды, луговой лунь, малый перепелятник, змееяд, орёл-карлик, степной орёл, большой подорлик, могильник, беркут, орлан-белохвост и чёрный гриф. В дальнейшем необходим мониторинг выявленных местообитаний этих видов и состояния их популяций.

Гнездование в малонарушенных экосистемах Салаира таких видов, как обыкновенный и хохлатый осоеды, малый перепелятник, орёл-карлик, большой подорлик и беркут подтверждает необходимость создания особо охраняемой территории федерального значения – национального парка «Тогул». Его основой могут стать существующие особо охраняемые природные территории регионального значения – Тогульский и Ельцовский заказники Алтайского края. Придание местам обитания редких видов птиц особого защитного статуса и включение их в национальный парк позволит по меньшей мере стабилизировать численность популяций, а при прочих благоприятных условиях даст возможность роста их численности.

Авторы выражают благодарность А.В.Грибкову, Л.В.Пожидаевой, Р.Ф.Бахтину, А.А.Чухлову и В.Н.Никулкину за помощь в организации и проведении полевых исследований в Салаирском кряже.

Литература

Бахтин Р.Ф., Важов С.В. 2013. Результаты мониторинга гнездовой группировки могильника в горной части Алтайского края в 2013 г., Россия // *Пернатые хищники и их охрана* **27**: 156-161.

Бахтин Р.Ф., Важов С.В. 2014. О встречах редких хищных птиц на Салаире в 2013 году // *Успехи современного естествознания* **5**, 2:190.

Бахтин Р.Ф., Важов С.В. 2016. Гнездовые находки большого подорлика *Aquila clanga* и сапсана *Falco peregrinus* на Салаире в 2013 году // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1372): 4669-4670.

Важов В.М., Бахтин Р.Ф., Важов С.В. 2015. О гнездовании *Milvus migrans* в селитебных ландшафтах // *Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. Материалы 12-й международ. науч. конф.* Ховд; Томск: 58-59.

Важов В.М., Черемисин А.А., Фефелова А.Ю. 2016. Некоторые данные о гнездовании чёрного коршуна *(Milvus migrans)* в селитебных ландшафтах Алтая // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований* **12**, 8: 1442-1445.

Важов С.В., Бахтин Р.Ф. 2016. Большой подорлик – *Aquila clanga* Pall., 1811 // *Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных*. 3-е изд., переработ. и доп. Барнаул, **2**: 157-159.

Важов С.В., Бахтин Р.Ф., Важов В.М. 2016а. О статусе некоторых видов птиц в Красной книге Алтайского края // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований* **4**, 2: 504-506.

Важов С.В., Бахтин Р.Ф., Петров В.Ю. 2016б. Могильник – *Aquila heliaca* Sav., 1809 // *Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных*. 3-е изд., переработ. и доп. Барнаул, **2**: 159-161.

Васильченко А.А. 2004. *Птицы Кемеровской области*. Кемерово: 1-488.

Гагина Т.Н. 1979. Птицы Салаиро-Кузнецкой горной страны (Кемеровская область) // *Вопросы экологии и охраны природы*. Кемерово: 5-17.

Гармс О.Я., Гармс Е.О., Сухова М.Г. 2010. К вопросу о создании национального парка «Тогул» // *Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее. Материалы 2-1 Международ. конф*. Горно-Алтайск.

Залесский И.М., Залесский П.М. 1931. Птицы Юго-Западной Сибири // *Бюл. МОИП*. Отд. биол. **40**, 3/4: 145-206.

Инвентаризация заказников Алтайского края. 1995 // *Отчёт о научно-исследовательской работе 2*. Барнаул.

Карякин И.В., Рыбенко А.В., Николенко Э.Г. 2005. Новые данные по распространению и численности некоторых хищных птиц и сов в обском правобережье Новосибирской области // *Пернатые хищники и их охрана* **3**: 54-64.

Карякин И.В., Николенко Э.Г., Барашкова А.Н., Смелянский И.Э., Коновалов Л.И., Грабовский М.А., Важов С.В., Бекмансуров Р.Х. 2010. Беркут в Алтае-Саянском регионе, Россия // *Пернатые хищники и их охрана* **18**: 82-152.

Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. 2016. 3-е изд., переработ. и доп. Барнаул, 2: 1-312.

Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. 2012. 2-е изд., перераб. и доп. Кемерово, 2: 1-192.

Красная книга Новосибирской области: Животные, растения и грибы. 2008. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: 1-528.

Красная книга Российской Федерации (животные). 2001. М: 1-863.

Малолетко А.М. 1972. *Палеогеография Предалтайской части Западной Сибири в мезозое и кайнозое*. Томск: 1-230.

Материалы комплексного экологического обследования участков территории Заринского, Тогульского и Ельцовского районов Алтайского края, обосновывающие придание им правового статуса особо охраняемой природной территории федерального значения – национальный парк «Тогул» (Эколого-экономическое обоснование). 2018. Барнаул: 1-159 (рукопись).

Хахлов В.А. 1937. Кузнецкая степь и Салаир (Птицы). Ч. 1, 2 // *Учён. зап. Перм. пед. ин-та* 1: 1-243.

Чунихин С.П. (1965) 2017. Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus* в Кемеровской области // *Рус. орнитол. журн*. **26** (1425): 1324-1325.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1664**: 4404-4407*

Индийская камышевка *Acrocephalus agricola* – новый гнездящийся вид национального парка «Мещёрский» (Рязанская область)

Е.А.Фионина, Е.В.Валова, О.В.Натальская

Елена Александровна Фионина. Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина. Ул. Свободы, д. 46, Рязань, 390000, Россия. E-mail: fionina2005@mail.ru
Елена Викторовна Валова. Союз охраны птиц России, Рязанский клуб «Птицы». E-mail: aino-anele@mail.ru
Ольга Валерьевна Натальская. ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Рязанской области». Московское шоссе, д. 12, Рязань, 390044, Россия. E-mail: natalskaya_olga@mail.ru

Поступила в редакцию 5 сентября 2018

Индийская камышевка *Acrocephalus agricola* в последнее десятилетие значительно расширила ареал в северном и северо-западном направлениях, этот вид впервые был найден в Нижегородской (Левашкин 2008), Ярославской (Симонов, Симонова 2012), Московской (Редькин, Мурашев 2014; Мищенко 2017) областях, отмечены встречи в Воронежской и Белгородской области (Соколов 2012а,б).

Сведений о пребывании индийской камышевки в Рязанской области до недавнего времени не было, и в последней авифаунистической сводке по региону (Иванчев 2005) данный вид не значится. Информация о ней отсутствует и в более поздней региональной фаунистической литературе. По всей видимости, впервые данный вид в регионе обнаружил В.А.Вишневский, проводящий наблюдения за птицами на юге Рязанской области. В окрестностях Новомичуринского водохранилища (Пронский район) он ежегодно, начиная с 2016 года, находил гнёзда *A. agricola* и проводил фото- и видеосъёмку взрослых птиц и птенцов (данные с сайта www.fotoparus.com). В национальном парке «Мещёрский» (север Рязанской области, Клепиковский район) регулярные орнитологические исследования мы вели с 2012 года, однако ранее индийских камышевок здесь не отмечали (Фионина и др. 2013; Горюнов и др. 2015). В Кадастре позвоночных животных национального парка (Ананьева и др. 2009) этот вид не упомянут.

В 2018 году нами были обследованы водно-болотные угодья парка, расположенные в окружении деревень Ершово, Макарово и Макеево (55°05.127' с.ш., 40°09.883' в.д.). Эта территория («урочище Макеевский мыс») представляет собой ряд заброшенных торфяных полей, ныне обводнённых, заросших тростником, рогозом и другой околоводной растительностью. В данном урочище мы проводили поиски тростниковых камышевок *A. scirpaceus* (Фионина и др. 2018). Здесь, наряду с несколькими поющими самцами тростниковых камышевок, были отмечены и

A. agricola. 27 июня 2018 встречена держащаяся вместе группа индийских камышевок, насчитывающая 7-8 особей(рис. 1-3). Птицы отмечены в зарослях тростника и рогоза возле мелиоративной канавы и постоянно перемещались на небольшие расстояния, гоняясь друг за другом.

Рис. 1. Индийская камышевка *Acrocephalus agricola*. Урочище Макеевский мыс близ деревень Макеево и Макарово (национальный парк «Мещёрский, Рязанская область). 27 июня 2018. Фото Е.В.Валовой.

Рис. 2. Индийская камышевка *Acrocephalus agricola*. Урочище Макеевский мыс близ деревень Макеево и Макарово (национальный парк «Мещёрский, Рязанская область). 27 июня 2018. Фото Е.В.Валовой.

Рис. 2. Индийская камышевка *Acrocephalus agricola*. Урочище Макеевский мыс близ деревень Макеево и Макарово. Национальный парк «Мещёрский, Рязанская область. 27 июня 2018. Фото Фото О.В.Натальской

На воспроизведение аудиозаписи пения индийских камышевок птицы данного вида реагировали достаточно интересно. В отличие от обнаруженных здесь же тростниковых камышевок, реагировавших на свою видоспецифичную песню усилением вокальной активности (Фионина и др. 2018), индийские камышевки в ответ на звуковую стимуляцию видоспецифичной песней вокализировать не начинали. Вместо этого, *A. agricola* принимались активно прогонять друг друга, проявляя агрессию, а один из самцов осуществил «насильственное» спаривание с самкой. При этом, в отличие от более скрытных тростниковых камышевок, *A. agricola* часто вылетали из густых зарослей, присаживались на отдельно растущие стебли околоводной растительности и были хорошо доступны для наблюдения и фотографирования.

Помимо данной группы индийских камышевок, в урочище Макеевский мыс 26 июня 2018 отмечен по голосу самец, певший примерно в 500 м от места встречи группы, а также зарегистрирована индийская камышевка с кормом в клюве.

По всей видимости, индийскую камышевку следует считать редким гнездящимся видом национального парка «Мещёрский» и Рязанской области в целом, а для поиска новых мест её гнездования необходимо проведение специальных поисков в подходящих биотопах.

Авторы выражают искреннюю признательность Я.А.Редькину за поддержку в работе и консультации при определении индийских камышевок по фотоматериалам. Неоценимую помощь и поддержку при подготовке к работе авторам оказал В.А.Вишневский. Мы благодарим также любителя птиц Питера Хамфри за помощь при анализе фотоматериалов.

Литература

Ананьева С.И., Бабушкин Г.М., Зацаринный И.В., Лобов И.В., Марочкина Е.А., Фионина Е.А., Чельцов Н.В. 2009. *Кадастр позвоночных животных национального парка «Мещёрский».* Рязань: 1-100.

Вишневский В.А. Камышовка индийская http://www.fotoparus.com/photogalery/animals/wild_animals/aves/21_PASSERIFORMES_SYLVIIDAE_Acrocephalus_agricola/bird.html

Горюнов Е.А., Натальская О.В., Фионина Е.А. 2015. Квадрат 37UEB4. Рязанская, Московская и Владимирская области // *Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник программы «Птицы Москвы и Подмосковья».* М., **5**: 117-122.

Иванчев В.П. 2005. Динамика орнитофауны Рязанской области (с конца XIX до начала XXI вв.) // *Тр. Окского заповедника* **24**: 534-567.

Левашкин А.П. 2008. Первая находка гнезда индийской камышевки *Acrocephalus agricola* в Нижегородской области // *Рус. орнитол. журн.* **17** (437): 1317.

Мищенко А.Л. (2017) 2018. Индийская камышевка *Acrocephalus agricola* в рыбхозе «Бисерово» (Московская область) // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1641): 3438-3439.

Редькин Я.А., Мурашев И.А. (2014) 2015. Гнездовая находка индийской камышевки *Acrocephalus agricola* в Московской области // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1223): 4405-4406.

Симонов В.А., Симонова А.Е. (2012) 2016. Первая встреча индийской камышевки *Acrocephalus agricola* в Ярославской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1298): 2172-2173.

Соколов А.Ю. 2012а. О гнездовании индийской камышевки *Acrocephalus agricola* в центральной части Воронежской области // *Рус. орнитол. журн.* **21** (767): 1405-1407.

Соколов А.Ю. 2012б. Первая регистрация индийской камышевки *Acrocephalus agricola* в Белгородской области // *Рус. орнитол. журн.* **22** (881): 1379-1380.

Фионина Е.А., Валова Е.В., Натальская О.В. 2018. Новая находка тростниковой камышевки *Acrocephalus scirpaceus* в национальном парке «Мещёрский» (Рязанская область) // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1651): 3837-3839.

Фионина Е.А., Заколдаева А.А., Лобов И.В. 2013. Дополнения к кадастру позвоночных животных национального парка «Мещёрский»: редкие и малочисленные виды воробьиных птиц // *Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов: Материалы 2-й Межрегион. науч.-практ. конф.* Владимир, 2: 140-146.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1664**: 4408-4409*

Бурокрылая ржанка *Pluvialis fulva* ловит и ест девятииглую колюшку *Pungitius pungitius*

М.А.Антипин

Максим Александрович Антипин. Национальный парк «Берингия», Набережная Дежнева, д.10, пгт.Провидения, Чукотский АО, Россия, 689251. E-mail: merops@mail.ru

Поступила в редакцию 5 сентября 2018

Факт питания бурокрылой ржанки *Pluvialis fulva* девятииглой колюшкой *Pungitius pungitius* отмечен на побережье озера Найвак в южной части Чукотского полуострова 1 сентября 2018. Молодая бурокрылая ржанка кормилась на обмелевшем участке озера Найвак в группе с перепончатопалыми песочниками *Calidris mauri* и чернозобиками *Calidris alpina*. Автору удалось снять видео*, как бурокрылая ржанка выслеживает, ловит, а затем проглатывает девятииглую колюшку (см. рисунок).

Молодая бурокрылая ржанка *Pluvialis fulva* поймала девятииглую колюшку *Pungitius pungitius* на отмели озера Найвак в южной части Чукотского полуострова.
1 сентября 2018. Фото М.А.Антипина.

Следует отметить, что в публикациях отечественных орнитологов отсутствует информация о питании бурокрылой ржанки рыбой. Однако в австралийском источнике (Higgins, Davies,1993) указывается, что бурокрылая ржанка может использовать в пищу мелкую рыбу.

* https://www.facebook.com/park.beringia/videos/450830038740292

Автор выражает благодарность П.С.Томковичу за консультацию и помощь в поиске литературных источников.

Литература

Higgins P.J., Davies S.J.J.F. (eds.). 1993. *Handbook of Australian, New Zealand and Antarctifc Birds*. Vol. 2, Raptors to Lapwings. Oxford Univ. Press: 1-984

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1664**: 4409-4413*

Домовые воробьи *Passer domesticus* кормятся насекомыми на осветительных приборах

А.Г.Резанов, А.А.Резанов

Александр Геннадиевич Резанов, *Андрей Александрович Резанов*. Кафедра биологии, экологии и методики обучения биологии, Институт естественных наук и спортивных технологий, Московский городской педагогический университет. Ул. Чечулина, д. 1. Москва, 105568, Россия. E-mail: RezanovAG@mail.ru

Поступила в редакцию 30 августа 2018

Поисковое поведение животных отличается значительно более широкой нормой реакции, чем поведение атаки и схватывания добычи, которое достаточно жёстко детерминировано не только по локомоциям и моторным актам, но и по временны́м затратам (Резанов 2000). Особенно наглядно такие различия проявляются при поиске корма в среде, подверженной сильной антропогенной трансформации, в которой наряду с естественными элементами среды присутствуют новые, своим происхождением связанные с хозяйственной деятельностью человека (Резанов 2018). К таким новым элементам среды относятся не только постройки и сооружения человека, транспортные средства, но различные технические устройства, в т.ч. осветительные приборы. Ночная охота птиц на насекомых, привлекаемых осветительными приборами, описана в отдельной публикации (Резанов 2008).

В ночное время работающие осветительные приборы (светильники, прожекторы и пр.) своим светом привлекают большое число насекомых, многие из которых гибнут от высокой температуры, исходящей от ламп, а также в результате проникновения во внутреннее пространство между плафоном и лампой. Таким образом, в подобных «световых ловушках» создаётся определённая концентрация насекомых, и они для целого ряда птиц служат своеобразными кормушками. Естественно ожидать, что такие «кормушки» антропогенного происхождения не могут остаться без внимания синантропных популяций птиц, постоян-

но живущих в непосредственном соседстве с человеком, таких, например, как домовые воробьи *Passer domesticus*.

Кормовое поведение домового воробья отличается высоким разнообразием (Резанов 2000; Барановский 2010), в том числе значительной долей антропогенных модификаций (проанализировано порядка 50 кормовых методов) – более 20% (Резанов, Резанов 2009). Что касается рассматриваемой темы, то ещё в 1955 году на аэродроме в Тайланде зарегистрирована ночная охота домовых воробьёв в свете прожекторов (Broun 1971), однако, мы не нашли никакой информации по осмотру воробьями (и другими видами птиц) выключенных осветительных приборов в светлое время суток. С этой точки зрения приводимые ниже факты по кормовому поведению домового воробья, на наш взгляд, представляют определённый интерес.

Рис. 1. Внутренний двор мечети Зауя Сиди Сахаб (Тунис) и светильники во внутреннем дворе. 5 января 2013. Фото А.А.Резанова.

5 января 2013 (солнечно, температура воздуха +12…+15°С) в городе Кейруан (Тунис) стайка домовых воробьёв (самцы и самки) кормилась во внутреннем дворе мечети Зауя Сиди Сахаб (рис. 1). Птицы кормились не только на мраморном плиточном полу, но и обследовали светильники, развешанные на ажурных металлических цепочках под потолком открытой галереи на высоте не более 4 м над полом. Воробьи садились на металлические крышки в верхней части плафонов и склёвывали оказавшихся там насекомых (рис. 2).

По наблюдениям А.А.Резанова в течение 25 мин (14 ч 55 мин – 15 ч 20 мин) группа из 5-7 птиц (до 5 особей в поле зрения на плафонах) обследовала порядка 6-7 плафонов (из 20) с общим числом до 7-8 посещений. При осмотре плафонов воробьи иногда конфликтовали друг с другом за удобное место, а также слетали вниз за упавшими на пол

насекомыми. Интенсивность сбора корма воробьями на полу мечети варьировалась в широких пределах – от минимальных 4-5 клевков за 30 с до почти 25-30 клевков за 30 с.

Рис. 2. Домовый воробей *Passer domesticus* кормится на светильнике в мечети Зауя Сиди Сахаб. Тунис. 5 января 2013. Фото А.А.Резанова.

Рис. 3. Зелёный островок у отеля «Мираж». Лас-Вегас. 21 июля 2013. Фото А.Г.Резанова.

Другое наблюдение сделано нами в Лас-Вегасе (США). Здесь, в районе отеля «Мираж», расположен своеобразный зелёный островок с прудом, альпийской горкой, водопадами и обильной субтропической

растительностью (рис. 3). По краю «островка» среди травы установлены мощные ландшафтные светодиодные осветители, направленные вверх на невысокую (4-5 м) декоративную скалу с водопадом. Ранним утром 21 июля 2013 самец домового воробья обследовал светильники. Сначала он садился на защитную бленду (рис. 4), окружающую оптическую часть прожектора, затем спрыгивал вниз (внутрь) и склёвывал там погибших насекомых.

Рис. 4. Светодиодный наземный светильник у отеля «Мираж» и обследующий светильник в поисках корма самец домового воробья *Passer domesticus*. Лас-Вегас, США. 21 июля 2013. Фото А.Г.Резанова.

С большой долей определённости, факты осматривания воробьями осветительных приборов можно расценить как антропогенные модификации кормового поведения инновационного характера. Наличие аналогичного поведения можно предположить для урбанизированных популяций белой трясогузки *Motacilla alba*, для которой известно обследование различного рода металлических конструкций (Резанов 2003), большой синицы *Parus major*, выбирающей насекомых, застрявших в двойных металлических оконных сетках (Резанов 2014, 2017), возможно, для серой мухоловки *Muscicapa striata*, скворца *Sturnus vulgaris*. В частности, для серой мухоловки (Cramp *et al*. 1993) и скворца (Харченко 1970) описаны случаи ночной охоты на насекомых, привлекаемых светом уличных фонарей.

Литература

Барановский А.В. 2010. *Механизмы экологической сегрегации домового и полевого воробьёв*. Рязань: 1-192.

Резанов А.Г. 2000. *Кормовое поведение птиц: метод цифрового кодирования и анализ базы данных*. М.: 1-224.

Резанов А.Г. 2003. *Кормовое поведение Motacilla alba L. 1758 (Aves, Passeriformes, Motacillidae): экологический, географический и эволюционный аспекты*. М.: 1-390.
Резанов А.Г. 2008. Кормовое поведение птиц в условиях искусственного ночного освещения // *Рус. орнитол. журн.* **17** (429): 1066-1072.
Резанов А.Г. 2014. Большие синицы *Parus major* кормятся осенью насекомыми, застрявшими в металлической оконной сетке // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1021): 2109-2110.
Резанов А.Г. 2017. Большая синица *Parus major* кормится насекомыми на металлической оконной сетке – ответ на рецензию Мусагитовой Г.А (2014) // *Башкир. орнитол. вестн.* **22**: 54-65.
Резанов А.Г. 2018. Антропогенные модификации кормового поведения синантропных популяций белой трясогузки *Motacilla alba:* анализ явления // *Вестн. МГПУ.* Естеств. науки 2 (30): 8-22.
Резанов А.Г., Резанов А.А. 2009. Сравнительная оценка разнообразия кормового поведения воробьёв *(Passer domesticus*, *P. montanus)* // *Экология, эволюция и систематика животных*. Рязань: 343-344.
Харченко В.И. 1970. Необыкновенное поведение обыкновенного скворца // *Природа* 11: 98-99.
Broun M. 1971. House Sparrows feeding young at night // *Auk* **88**, 4: 924-925.
Cramp S., Perrins C.M., Brooks D.J. (eds.) 1993. *The Birds of the Western Palearctic*. Vol.VII. Flycatchers to Shrikes. Oxford Univ. Press: 1-577.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1664**: 4413-4417*

О необычных скоплениях ворон на морском льду

А.П.Крюков

Второе издание. Первая публикация в 2016[*]

Скопления ворон на ночёвках представляют собой обычное явление. В городах и других населённых пунктах тысячные стаи ворон собираются перед ночёвкой на деревьях или открытых местах, формируя так называемые «клубы» или «планёрки». У А.Брема находим: «... к вечеру [вороны] собираются большими стаями на определённых местах, как бы для того, чтобы сообщить друг другу о событиях дня. Затем они направляются на место ночёвки в известную часть леса, куда слетаются все вороны обширного района. ... На ночлег они прилетают уже после наступления ночи» (Брем 1915, с. 289).

В Харькове, например, серые вороны *Corvus cornix*, грачи *Corvus frugilegus* и галки *Corvus monedula* собираются в нескольких сотнях метров от территории совместной ночёвки и перемещаются на неё через 40-50 мин после захода солнца (Брезгунова 2005).

[*] Крюков А.П. 2016. О необычных скоплениях ворон на морском льду // *Дальневосточный орнитол. журн.* **5**: 68-73.

Во Владивостоке на гнездовье значительно преобладают большеклювые вороны *Corvus macrorhynchos*. Зимой большие стаи ворон, до 5 тыс. птиц (Назаров 2004) собираются на ночёвку на вершинах больших деревьев в определённых местах, причём некоторые из мест ночёвок сохраняются годами. Обычно стаи смешанные и состоят из большеклювых ворон с небольшим участием восточных чёрных ворон *Corvus corone orientalis* (Назаров, 2004). Но с конца ноября по конец апреля это соотношение меняется на обратное за счёт притока зимующих чёрных ворон (Курдюков 1997).

В начале 2015 года ночёвки владивостокских ворон происходили необычно. С первых чисел февраля ежедневно по утрам и вечерам наблюдалось их большое скопление на льду Амурского залива, омывающего город с запада. Залив зимой замерзает, в эту зиму лёд стал раньше обычного, около 15 декабря. Лёд настолько прочен, что по нему в январе-феврале ездят на легковых машинах рыбаки на подлёдный лов, а пешком ходят до начала ледохода в марте.

Наши наблюдения проводились с балкона 8-го этажа жилого дома, расположенного в 200 м от берега моря на холме, так что открывается вид на значительную часть залива. Именно удачное расположение дома позволило сделать описанные ниже наблюдения в глубоких сумерках, хотя получить хорошие фотографии на большом расстоянии и предельном освещении не удалось.

С первых чисел февраля наблюдали лёт вереницы ворон в сторону моря в вечерних сумерках, за 1-1.5 ч до полной темноты. Небольшие группы летели на море и терялись из вида. Некоторые возвращались и собирались на вершинах деревьев, растущих в пределах 0.5-1 км от берега. 7 февраля впервые обнаружили, что вороны рассаживались на льду небольшими группами и оставались там до полной темноты (см. рисунок). Следующим утром, как только стало светать, была обнаружена большая плотная группа в несколько другом месте. Подобное наблюдалось ежедневно, и создалось полное впечатление, что птицы остаются на льду на ночь, чуть смещаясь к утру или оставаясь в исходном месте. Проверка данного предположения была предпринята утром 14 февраля. Ещё затемно, примерно в 1 км от берега, была обнаружена плотная группа. При подходе ближе птицы стали разлетаться. Некоторые подавали голос, причём иногда характерный брачный крик. По голосу и фото установлено, что это группа была образована и исключительно восточной чёрной вороной. Птицы улетали небольшими группами, постепенно, в течение порядка 40 мин. Аналогичный поход на лёд был совершён 16 февраля, и сидящая стая обнаружена на значительном удалении от места вечернего сбора.

Таким образом выяснено, что чёрные вороны собираются на льду вечером перед темнотой, но позже улетают. Реальная ночёвка распо-

ложена недалеко от берега моря. Птицы тысячными стаями кружат над зданиями, присаживаются на крыши домов и кроны деревьев и снова взлетают и, наконец, уже в полной темноте рассаживаются на деревьях. Эти стаи смешанные, состоят из чёрных и большеклювых ворон. Утром, ещё до рассвета, чёрные вороны снова собираются на льду и проводят там от 40 мин до 1.5 ч. В хорошую солнечную погоду отдельные птицы остаются на льду и дольше, греясь на солнце. Интересно, что на местах утренних скоплений почти нет помёта, что ещё раз опровергает предположение о ночёвках на льду.

Примеры предночёвочных скоплений черных ворон *Corvus corone orientalis* на льду Амурского залива. Владивосток.

Описанные предрассветные и послезакатные скопления чёрных ворон на морском льду продолжались ежедневно, за исключением дней с сильным ветром. Слабый ветер на море отмечался почти всегда и не препятствовал этим сборам. Вечером скопления всегда разрозненные, каждая группа насчитывала по несколько десятков или сотен ворон,

суммарная численность порядка 1.5-2 тысяч. Более точный подсчёт по фотографиям дал цифру 1296 птиц (данные за 2 марта).

Лёд в заливе неоднороден, некоторые участки неровные, с небольшими торосами и снегом, и именно на них садятся вороны, избегая более гладкого льда. Птицы перелетают от группы к группе, а в наступающих сумерках постепенно «тянут» на берег для ночёвки на вершинах деревьев. Утренние скопления на льду всегда плотные, в форме правильного овала, если смотреть издалека. В одном из таких скоплений в разные дни было насчитано около 1100 и 1400 птиц. Уходят на рассвете дружно, большими стаями, хотя и не все сразу. Иногда стая снималась, кружилась и снова спускалась, чтобы позже окончательно уйти в сторону города.

Определённое влияние на режим образования скоплений на льду залива оказывает погода. Например, в дни с обильными осадками (21-22 февраля, мокрый снег с дождём) скопления не наблюдались. В первое погожее утро собралось порядка 400 ворон, было видно их отражение на блестящем льду, в последующие дни, 24 и 25 февраля, собирались стаи по 2-2.5 тыс. особей. Очередной снегопад, 26 февраля, дал слой снега в 30 см. Уже следующим утром на снегу собралась большая стая, но вечернего скопления не было. Утром 28 февраля, птицы прилетели в 7 ч 10 мин, но уже с 7 ч 25 мин стали постепенно разлетаться (совсем светло стало в 7 ч 30 мин). К 7 ч 50 мин на льду осталась группа порядка 100 ворон. К 8 ч 20 мин, когда солнце вышло из-за хребта – только 15, отдельные птицы оставались и позже. Вечером этого дня на льду собралась тысячная стая, которая на ночлег улетела на вершины деревьев в нескольких сотнях метров от моря. В период обильных снегопадов, с 9 по 14 марта, регистрировались лишь единичные вороны и после установления хорошей погоды стаи на льду больше не отмечались. Смешанные ночёвки на деревьях переместились на другое место, за пределы зоны наблюдений.

Гнездящиеся в небольшом числе во Владивостоке и окрестностях чёрные вороны начинают движение к югу в конце сентября – октябре и откочёвывают южнее, вероятно, на Корейский полуостров (Курдюков 1997). Но в начале ноября численность этого вида резко увеличивается, по-видимому, за счёт притока с севера. Описанные нами скопления, вероятно, образованы этой категории птицами. Интересно, что погибшая от столкновения с машиной чёрная ворона (3 марта) была очень истощённой. Желудок при вскрытии оказался совершенно пустым, но в брюшной полости находился плотный комок жира весом около 5 г. Весенний пролёт чёрной вороны начинается со второй половины февраля (Тарасов, Глущенко 1995) и продолжается весь март до середины апреля (Назаренко 1971; Панов 1973; Тарасов, Глущенко 1995). Зимовка столь большого числа чёрных ворон в пределах Владивосто-

ка – явление необычное. Вероятно, это связано с общим повышением численности обоих видов ворон. Пред- и постночёвочные скопления на льду ранее также не отмечались. Утренние кратковременные остановки ворон (без уточнения вида) на кромке полыньи в устье городской речки (в январе-феврале) или на отдельных прибрежных льдинах (в конце марта) описаны А.Б.Курдюковым (1997). Характер пребывания птиц в данных скоплениях был несколько иной. Общая продолжительность пребывания группы на льду составляла 1-1.5 ч, но её состав всё время обновлялся: среднее время пребывания отдельных особей составляло 10-40 мин. В Иркутске, в устье Ангары чёрные вороны рассаживались на льду, когда не хватало мест на деревьях близлежащей рощи (Фефелов И., из блога).

Отмеченное нами различие в ночёвочном поведении чёрной и большеклювой ворон может быть связано с общими тенденциями их климатических адаптаций. Известно, что птенцы большеклювой вороны вылупляются голыми, гнёзда их довольно рыхлые, что указывает на относительную теплолюбивость этого вида. У чёрной вороны птенцы сразу покрыты пухом, их гнезда лучше утеплены, и ареал простирается гораздо дальше на север. Склонность к образованию скоплений на льду может отражать лучшую адаптированность чёрной вороны к холодному климату.

Литература

Брезгунова О.А. 2005. Организация коммунальных ночёвок серой вороны *(Corvus cornix)* в г. Харькове // *Вестн. Харьков. ун-та им. В.Н.Каразина*. Сер. биол.: 116-121.

Брем А. 1915. *Жизнь животных*. Т. 9. Птицы. 4-е изд. Петроград: 1-716.

Курдюков А.Б. 1997. *Внегнездовая жизнь ворон в г. Владивосток и его окрестностях*. Дипломная работа. Дальневосточный университет. Владивосток: 1-60 (рукопись).

Назаренко А.А. 1971. Краткий обзор птиц заповедника Кедровая Падь // *Орнитологические исследования на юге Дальнего Востока*. Владивосток: 12-51.

Назаров Ю.Н. 2004. *Птицы города Владивостока и его окрестностей*. Владивосток: 1-276.

Панов Е.Н. 1973. *Птицы южного Приморья (фауна, биология, поведение)*. Новосибирск: 1-376.

Тарасов А.А., Глущенко Ю.Н. 1995. Врановые приханкайской низменности // *Проблемы сохранения водно-болотных угодий международного значения: озеро Ханка*. Спасск-Дальний: 57-68.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1664**: 4418-4421*

Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* – новый гнездящийся вид Саратовской области

А.В.Беляченко, Е.Ю.Мельников

*Второе издание. Первая публикация в 2012**

Ареал сирийского дятла *Dendrocopos syriacus* Hemprich et Ehrenberg, 1833 в последнее столетие в результате различных причин глобального масштаба значительно расширился. С конца XIX века из мест первоначального исторического гнездования в Турции дятел последовательно проник сначала в Ливан и Израиль, а затем на Балканы, в страны Центральной и Восточной Европы (Munteanu, Samwald 1997). Динамика расселения этого вида по Украине, западным, южным и юго-восточным регионам Европейской части России подробно изучена (Белик и др. 2003; Завьялов и др. 2008; Zavialov *et al*. 2008). От западных границ России ареал расширялся в восточном и северо-восточном направлениях: было установлено гнездование сирийского дятла в Брянской (Косенко 1998), Белгородской (Бардин 2005) и Воронежской (Барышников 2001) областях. На территории Нижнего Поволжья сирийский дятел впервые зарегистрирован в сентябре 1993 года в Калмыкии; в 1997 году вид отмечен на гнездовании в городе Элисте (Кукиш, Музаев 2001). В Волгоградской области три особи этого вида были встречены в январе-феврале 1995 года (Завьялов, Альберти 1996), а в следующий полевой сезон регистрации дятлов становятся регулярными (Завьялов и др. 1996). В феврале 2005 года вид встречен в черте города Саратова (Завьялов и др. 2007). Через два года, в ноябре 2007 года, несколько сирийских дятлов наблюдали в окрестностях села Усовка Воскресенского района Саратовской области (Завьялов и др. 2008).

По наблюдениям авторов, сирийский дятел в Саратовской области появился несколько ранее: в зимние периоды 1994-1996 годов одиночные особи держались несколько недель в ольшаниках по берегам ручья у села Вязовка Татищевского района Саратовской области. Возможно, эти встречи объясняются далёкими и нерегулярными трофическими кочёвками птиц, так как в последующие годы, несмотря на периодические зимние учёты дятлов других видов в лесах Саратовского района и ближайших окрестностях г. Саратова, сирийский дятел не встречался.

* Беляченко А.В., Мельников Е.Ю. 2012. Сирийский дятел *(Dendrocopos syriacus)* – новый гнездящийся вид Саратовской области // *Поволжский экол. журн*. 1: 92-94.

Зимой 2010/11 года самка и самец сирийского дятла обитали на территории Городского парка культуры и отдыха Саратова, где держались преимущественно у кормушек. Следует отметить, что в парке зимой дятлы встречались ещё годом ранее: в январе-марте 2009 года (Завьялов и др. 2010). Гнездовое дупло сирийского дятла найдено 15 мая 2011 в лесопарке «Кумысная поляна» в черте города Саратова (51°33'43" с.ш., 45°53'57" в. д.)*. Его гнездовой участок расположен на северо-западном макросклоне водораздельного Лысогорского плато, в низовьях крупного лесного оврага. На пологом склоне оврага северо-восточной экспозиции преобладает осина *Populus tremula*, встречаются клён остролистный *Acer platanoides*, липа сердцелистная *Tilia cordata*, у ручья на дне оврага – ольха клейкая *Alnus glutinosa*.

Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* у гнездового дупла.
Лесопарк «Кумысная поляна». Саратов. Фото Е.Ю.Мельникова.

Дупло устроено в осине, леток находится на высоте 5 м, ориентирован на юг (см. рисунок). В момент обнаружения гнезда дятлы насиживали кладку, сменяясь через каждый час. Выкармливание птенцов, находящихся в гнезде, наблюдалось 30 мая 2011. Взрослые птицы вели себя очень осторожно и подолгу не подлетали к дуплу, если исследователь находился рядом с ним. В результате следующего наблюдения 20 июня установлено, что на гнездовом участке постоянно держалась одна молодая птица, взрослых особей обнаружено не было. К описанным выше фактам следует добавить, что в низовьях оврага, где

* Здесь и далее координаты даны по GPS-навигатору, калиброванному с использованием программы Google Earth 6.0.2.

расположен гнездовой участок сирийского дятла, в непосредственной близости от его границ гнездятся и другие дятлы – желна *Dryocopus martius*, средний пёстрый *Dendrocopos medius* и две пары большого пёстрого *Dendrocopos major* (Мельников, Беляченко 2009); сирийский дятел использовал для гнездования старое дупло, в котором в 2010 году выводил птенцов большой пёстрый дятел.

Вторая пара сирийских дятлов была отмечена 23 апреля 2011 в лесопарке города Энгельса, на левом берегу реки Волги (51°29'30" с.ш., 46°04'10" в.д.). Зафиксировано спаривание, однако гнездового дупла долгое время обнаружить не удавалось. Только 21 июня 2011 по громким крикам двух слётков был найден гнездовой участок сирийского дятла. Взрослый самец с интервалом 15-20 мин кормил третьего птенца, ещё находящегося в гнезде, изредка подлетая к слёткам. Гнездовой участок находится в глубине высокой левобережной поймы Волги, в роще тополя белого *Populus alba* площадью около 2 га. Дупло размещено в стволе тополя на высоте 11-12 м от поверхности земли. На исследованном участке гнездятся также большой пёстрый дятел, 6 пар скворцов *Sturnus vulgaris*, использующих старые дупла большого пёстрого дятла и полости в стволах сухих деревьев.

Таким образом, приведённые факты подтверждают гнездование сирийского дятла в Саратовской области. Птица в значительной степени приурочена к антропогенному ландшафту и к лесным массивам с высокой антропогенной нагрузкой.

Литература

Бардин А.В. 2005. Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* гнездится в окрестностях «Леса на Ворскле» // *Рус. орнитол. журн.* **14** (291): 554-556.

Барышников Н.Д. 2001. Сирийский дятел – новый гнездящийся вид Воронежской области // *Орнитология* **29**: 282.

Белик В.П., Поливанов В.М., Тильба П.А., Джамирзоев Г.С., Музаев В.М., Букреева О.М., Русанов Г.М., Реуцкий Н.Д., Мосейкин В.Н., Чернобай В.Ф, Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Мнацеканов Р.А., Комаров Ю.Е. 2003. Современные популяционные тренды гнездящихся птиц Южной России // *Стрепет* **1**: 10-30.

Завьялов Е.В., Альберти Л.Г. 1996. Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* в Волгоградской области // *Рус. орнитол. журн.* **5** (1): 3-4.

Завьялов Е.В., Капранова Т.А., Альберти Л.Г. 1996. Характеристика зимнего населения птиц юга Волгоградской области // *Кавказ. орнитол. вестн.* **8**: 11-14.

Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Якушев Н.Н., Мосолова Е.Ю., Угольников К.В. 2007. *Птицы севера Нижнего Поволжья*. Кн. 3. Состав орнитофауны. Саратов.

Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Мосолова Е.Ю. 2008. Динамика распространения сирийского дятла *(Dendrocopos syriacus)* в Нижнем Поволжье // *Вестн. Южного научного центра РАН* **4**, 2: 109-112.

Завьялов Е.В, Шляхтин Г.В., Мосолова Е.Ю, Табачишин В.Г. 2010. Экологические аспекты распространения и численности пёстрых дятлов *(Dendrocopos)* на севере Нижнего Поволжья // *Изв. Саратов. ун-та.* Нов. сер. Т. 10. Сер. Химия. Биология. Экология 2: 70-78.

Косенко С.М. (1998) 2005. Гнездование сирийского дятла *Dendrocopos syriacus* в Брянской области // *Рус. орнитол. журн.* **14** (291): 556-557.
Кукиш А.И., Музаев В.М. (2001) 2004. Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* – новый гнездящийся вид Калмыкии // *Рус. орнитол. журн.* **13** (274): 938-939.
Мельников Е.Ю, Беляченко А.В. 2009. Особенности обитания желны (*Dryocopus martius* L., 1758) в пригородном лесу Саратова // *Экология, эволюция и систематика животных*. Рязань: 231-233.
Munteanu D., Samwald O. 1997. Syrian Woodpecker *Dendrocopos syriacus* // *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. London: 450-451.
Zavialov E.V, Tabachishin V.G., Mosolova E.Y. 2008. Expansion of Syrian Woodpecker in European Russia and Ukraine // *Dutch Birding* **30**, 4: 236-238.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1664**: 4421-4422*

Запасание корма желтобрюхим дятлом-сосуном *Sphyrapicus varius*

Р.Н.Коннер, Дж.К.Кролл

*Перевод с английского. Первая публикация в 1979**

Четыре раза в ноябре и декабре в Накодочесе, штат Техас, мы наблюдали, как желтобрюхие дятлы-сосуны *Sphyrapicus varius* запасали пищу. 24 ноября 1977 молодая птица спрятала целый орех пекана обыкновенного *Carya illinoensis* в трещине сухой ветви пекана на высоте около 10 м над землёй. Дятел поместил орех в щель и затем забил её глубже ударом клюва. Перед этим птица осмотрела три других сухих сука и, по-видимому, сочла их непригодными для размещения запаса. При поиске места запасания дятел, держа орех в клюве, несколько раз издал свой мяукающий крик.

8 декабря 1976 взрослый самец извлёк орех пекана из оболочки, перелетел на 15 м на столб и всунул орех в щель возле вершины, в 10 м над землёй. Затем он ещё три раза запасал орехи таким образом.

13 декабря 1976 молодой самец кормился плодами магнолии крупноцветковой *Magnolia grandiflora*, а затем спрятал плод на высоте 14 м в трещине на вязе американском *Ulmus americana*. На следующий день та же птица прятала жёлуди дуба серповидного *Quercus falcata* на том же вязе.

Мы не наблюдали, чтобы дятлы заранее подготавливали места для размещения запасов, а также не видели, чтобы они возвращались к сделанным ранее запасам и использовали их.

---

* Conner R.N., Kroll J.C. 1979. Food-storing by Yellow-bellied Sapsuckers // *Auk* **96**, 1: 195.
Перевод с англ.: А.В.Бардин.

Запасание корма было известно только у 6 видов североамериканских дятлов, 5 из которых относятся к роду *Melanerpes:* красноголовый меланерпес *M. erythrocephalus* (Kilham 1958), каролинский меланерпес *M. carolinus* (Kilham 1963), краснолицый меланерпес *M. lewis* (Bock 1970), желудёвый дятел *M. formicivorus* (MacRoberts 1970) и золотолобый меланерпес *M. aurifrons* (Martin, Kroll 1975). Alderson (1890, Oologist 7: 147) сообщал, что волосатый дятел *Picoides villosus* запасал насекомых в неиспользуемое гнездовое дупло.

Мы считаем, что это первое сообщение о запасании пищи желтобрюхим дятлом-сосуном, и оно представляет особый интерес, потому что род *Sphyrapicus* сближают с родом *Melanerpes* (Short, Morony 1970).

We thank C.Bock and L.Kilham for excellent comments on the manuscript.

Литература

Bock C.E. 1970. The ecology and behavior of the Lewis Woodpecker *(Asyndesmus lewis)* // *Univ. Calif. Publ. Zool*. **92**: 1-100.

Kilham L. 1958. Sealed-in winter stores of Red-headed Woodpeckers // *Wilson Bull*. **70**, 2: 107-113.

Kilham L. 1963. Food storing of Red-bellied Woodpeckers // *Wilson Bull*. **75**: 227-234.

MacRoberts M.H. 1970. Notes on the food habits and food defense of the Acorn Woodpecker // *Condor* **72**, 2: 196-204.

Martin J.W., Kroll J.C. 1975. Hoarding of corn by Golden-fronted Woodpeckers // *Wilson Bull*. **87**, 4: 553-553.

Short L.L., J. Morony J. 1970. A second hybrid Williamson's × Red-naped sapsucker, and an evolutionary history of sapsuckers // *Condor* **72**: 310-315.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1664**: 4422-4423*

Каролинский меланерпес *Melanerpes carolinus* переносит яйцо в клюве

Г.К.Хикман

*Перевод с английского. Первая публикация в 1970**

Деятельность гнездящейся пары каролинских меланерпесов *Melanerpes carolinus* у дупла в стволе дерева в 7 футах над землёй и в 20 футах от моей квартиры в Тампе (Флорида) привлекала моё внимание каждое утро весной 1968 года. 25 июня 1968 в 8 ч я увидел, что дятел залез в дупло так, что из летка торчал только хвост; мне показалось, что он кормит птенцов. Через мгновение дятел пролетел прямо надо

* Hickman G.C. 1970. Egg transport recorded for the Red-bellied Woodpecker // *Wilson Bull*. **82**, 4: 463. Перевод с англ.: А.В.Бардин.

мной всего в нескольких футах выше и скрылся за соседними домами. Как только он появился из дупла, я заметил в его клюве белое яйцо, предположительно его собственное, которое он держал тупым концом вперёд. К сожалению, я не определил пол этой птицы.

Перенос яиц из-за разрушения гнездового дерева заснят на киноплёнку у хохлатой желны *Dryocopus pileatus* во Флориде и отмечен для золотого шилоклювого дятла *Colates auratus auratus* в штате Массачусетс, где был вызван беспокойством со стороны скворцов *Sturnus vulgaris* (Truslow 1967). Сообщалось о переносе в клюве яйца домового воробья *Passer domesticus* каролинским меланерпесом (Brackbill 1969). В описанном случае высокая численность скворцов в Тампе, одна пара которых потом заняла дупло меланерпеса, откуда были унесены яйца, могла быть ответственна за необычное поведение дятлов.

Литература

Brackbill H. 1969. Red-bellied Woodpecker taking bird's eggs // *Bird-Banding* **40**, 4: 323-324.
Truslow F.K. 1967. Egg-carrying by the Pileated Woodpecker // *Living Bird* **6**: 227-236.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1664**: 4423*

Интересные находки и наблюдения за куликами осенью 1996 года на юго-западе Украины

И.П.Гержик, А.И.Корзюков

*Второе издание. Первая публикация в 1997**

Осенние встречи круглоносых плавунчиков *Phalaropus lobatus* и исландских песочников *Calidris canutus* в окрестностях Одессы неизвестны. Две стаи *Ph. lobatus* зарегистрированы в низовьях Тилигульского лимана 7 сентября (42 птицы) и 2 октября (8 птиц) 1996. Стая из 17 *C. canutus* отмечена 5 ноября 1996 в районе Цареградского гирла, связывающего Днестровский лиман с морем.

Массовое появление вальдшнепов *Scolopax rusticola* на осенней миграции – редкое явление на юго-западе Украины. Оно отмечено в Одесской области в последней декаде октября 1996 года, когда за 4-5 ч экскурсионного времени в прибрежных лесопосадках удавалось регистрировать по 20-25 вальдшнепов.

* Гержик И.П., Корзюков А.И. 1997. Интересные находки и наблюдения за куликами осенью 1996 года на юго-западе Украины // *Информ. материалы Рабочей группы по куликам*. М., **10**: 44.