ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1683

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII
Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1683

СОДЕРЖАНИЕ

5127-5131 Зимовка птиц в заповеднике «Ягорлык» в 2017/18 году. Е.С.СТАХУРСКАЯ, А.А.ТИЩЕНКОВ

5132-5133 Желтогорлая овсянка *Cristemberiza elegans* и синяя мухоловка *Cyanoptila cyanomelana* в Норском заповеднике. В.А.КОЛБИН

5133-5135 К осенней фауне птиц Чу-Илийских гор. Ю.Н.ГРАЧЁВ

5136-5137 К зимней орнитофауне гор Анархай. А.В.ГРАЧЁВ, Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ

5137-5140 Встреча предполагаемого гибрида малой *Egretta garzetta* и южной *Casmerodius modestus* белых цапель в Восточном Китае. Ю.Н.ГЛУЩЕНКО, В.П.ГЛУЩЕНКО

5140-5142 О необычно частых встречах вальдшнепа *Scolopax rusticola* в августе 2018 года в окрестностях новосибирского Академгородка. Т.К.ДЖУСУПОВ

5142-5143 Свиязь *Anas penelope* в Северной Кулунде. А.И.МИХАНТЬЕВ, М.А.СЕЛИВАНОВА

5143-5147 Современное распространение журавлей в Прибайкалье. И.В.ФЕФЕЛОВ

5147-5154 Редкие птицы Алданского нагорья (Южная Якутия). А.П.ИСАЕВ, Е.В.ШЕМЯКИН, В.В.БОЧКАРЁВ, Н.Н.ЕГОРОВ

5154-5157 Аистообразные Ciconiiformes Славянского района Краснодарского края. А.А.ГОЖКО, Л.П.ЕСИПЕНКО, А.Н.ХОХЛОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования: 18 октября 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1683

CONTENTS

5127-5131 Wintering of birds in Yagorlyk Reserve in 2017/18.
E.S.STAHURSKA, A.A.TISCHENKOV

5132-5133 The yellow-throated bunting *Cristemberiza elegans* and the blue-and-white flycatcher *Cyanoptila cyanomelana* in the Norsky Reserve. V.A.KOLBIN

5133-5135 By the autumn fauna of birds of the Chu-Ili mountains.
Yu.N.GRACHEV

5136-5137 To the winter avifauna of the Anarchai Mountains.
A.V.GRACHEV, N.N.BEREZOVIKOV

5137-5140 The alleged hybrid of the little *Egretta garzetta* and the eastern *Casmerodius modestus* egrets in East China.
Yu.N.GLUSCHENKO, V.P.GLUSCHENKO

5140-5142 Unusual abundance of the Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* in August 2018 in the vicinity of the Novosibirsk Academgorodok.
T.K.DZHUSUPOV

5142-5143 The wigeon *Anas penelope* in North Kulunda.
A.I.MIKHANTIEV, M.A.SELIVANOVA

5143-5147 Modern distribution of cranes in the Baikal area.
I.V.FEFELOV

5147-5154 Rare birds of the Aldan Highlands (South Yakutia).
A.P.ISAEV, E.V.SHEMYAKIN, V.V.BOCHKAREV, N.N.EGOROV

5154-5157 Ciconiiformes of Slavyansk Raion of Krasnodar Krai.
A.A.GOZHKO, L.P.ESIPENKO, A.N.KHOKHLOV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1683****: 5127-5131*

Зимовка птиц в заповеднике «Ягорлык» в 2017/18 году

Е.С.Стахурская, А.А.Тищенков

Елена Сергеевна Стахурская, *Алексей Анатольевич Тищенков*. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тираспольская средняя школа №4», Государственный заповедник «Ягорлык». Село Гояны, Дубоссарский район, Приднестровская Молдавская Республика. E-mail: elena.petriman@mail.ru; tdbirds@rambler.ru

Поступила в редакцию 7 октября 2018

Наземные зимние учёты традиционно проводились по методике В.И.Щёголева (1977) в урочищах «Литвина», «Сухой Ягорлык», «Цыбулевка». Общая длина учётных трансект составила 13.8 км. Учёты птиц водно-болотного комплекса производились с берегов во время пеших обходов водоёмов. Для более точного определения вида и количества птиц применялись бинокли БП-2 12×40 и COMET 10×50 DPSI.

Доминантами по обилию считались виды, доля участия которых в населении по суммарным показателям составляла 10% и более (индекс доминирования $D_i > 10$) (Кузякин 1962), субдоминантами – виды, индекс доминирования которых находился в пределах от 1 до 9. Расчёт индексов разнообразия Шеннона, выравненности распределения особей Пиелу, концентрации Симпсона производился по формулам, представленным в работе В.Д.Захарова (1998).

Данные по температуре воздуха и высоте снежного покрова в районе исследований (село Дойбаны Дубоссарского района и Дубоссары) получены в Республиканском гидрометцентре ПМР (табл. 1).

Таблица 1. Погодные условия в районе исследований зимой 2017/18 года

Месяц	Среднемесячные показатели	
	Температура воздуха, ˚С	Высота снежного покрова, см
Декабрь	+ 3,9	3
Январь	- 0,7	9
Февраль	- 0,8	5

Экологические условия заповедника «Ягорлык» благоприятны для зимовок многих птиц, поэтому зимняя орнитофауна здесь весьма разнообразна. Зимой 2017/18 года в наземных биотопах резервата было зарегистрировано 42 вида птиц (табл. 2).

В число доминантов зимой 2017/18 года входили 4 вида птиц: скворец *Sturnus vulgaris*, большая синица *Parus major*, лазоревка *Parus caeruleus* и рябинник *Turdus pilaris*. При этом лазоревка доминировала

Таблица 2. Структура орнитофауны наземных биотопов заповедника «Ягорлык»

Вид	Обилие, особей на 1 км^2		
	Декабрь	Январь	Февраль
Circus cyaneus	0.4	–	–
Accipiter gentilis	0.4	0.4	–
Accipiter nisus	2.8	0.6	–
Buteo lagopus	–	–	0.1
Buteo rufinus	0.1	0.1	0.1
Buteo buteo	0.8	0.8	1.1
Phasianus colchicus	8.7	16.4	9.3
Columba palumbus	–	23.5	97.2
Asio otus	35.7	107.2	1.7
Picus canus	1.6	1.4	6.1
Dendrocopos major	8.3	10.5	14.4
Dendrocopos syriacus	0.4	1.6	–
Dendrocopos medius	0.8	1.9	1.9
Dendrocopos minor	9.7	6.6	3.5
Sturnus vulgaris	807.4	55.6	19.1
Garrulus glandarius	30.6	29.7	28.9
Pica pica	8.1	9.1	8.7
Corvus cornix	2.0	0.9	1.0
Corvus corax	8.2	17.4	16.8
Troglodytes troglodytes	10.4	8.2	9.6
Regulus regulus	130.7	91.4	74.6
Erithacus rubecula	21.7	7.5	5.0
Turdus pilaris	98.4	160.0	42.0
Turdus merula	50.1	38.7	10.0
Turdus iliacus	2.9	15.5	–
Aegithalos caudatus	45.8	58.0	64.5
Parus ater	37.4	–	–
Parus caeruleus	424.5	303.5	134.2
Parus major	137.3	103.8	281.1
Sitta europaea	8.9	10.4	2.6
Certhia familiaris	5.3	5.0	–
Passer montanus	22.0	11.2	24.8
Fringilla coelebs	102.2	47.9	35.0
Fringilla montifringilla	63.3	–	5.4
Chloris chloris	68.1	11.7	28.7
Spinus spinus	9.7	2.6	–
Carduelis carduelis	23.8	39.2	44.2
Acanthis cannabina	103.4	33.5	42.6
Pyrrhula pyrrhula	22.1	21.0	25.3
Coccothraustes coccothraustes	166.6	74.1	92.7
Emberiza citrinella	238.4	4.3	3.4
Emberiza schoeniclus	11.3	19.1	5.8
Плотность	2730.3	1350.3	1141.4
Число видов	40	38	34
Индекс Шеннона	2.28	2.08	2.02
Индекс Пиелу	0.62	0.57	0.57
Индекс Симпсона	0.13	0.09	0.10

на протяжении всего сезона. К субдоминантам в разные месяцы относились 14-17 видов птиц (табл. 3). На протяжении всей зимы в эту категорию входили: сойка *Garrulus glandarius*, желтоголовый королёк

Regulus regulus, ополовник *Aegithalos caudatus*, зяблик *Fringilla coelebs*, коноплянка *Acanthis cannabina* и дубонос *Coccothraustes coccothraustes*.

Таблица 3. Птицы – доминанты и субдоминанты в заповеднике «Ягорлык» зимой 2017/18 года

Месяц	Доминанты *(D_i)*	Субдоминанты
Декабрь	*Sturnus vulgaris* (29.6) *Parus caeruleus* (15.5)	14 видов: *Emberiza citrinella*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Parus major*, *Regulus regulus*, *Acanthis cannabina*, *Fringilla coelebs*, *Turdus pilaris*, *Chloris chloris*, *Fringilla montifringilla*, *Turdus merula*, *Aegithalos caudatus*, *Parus ater*, *Asio otus*, *Garrulus glandarius*
Январь	*Parus caeruleus* (22.5) *Turdus pilaris* (11.8)	17 видов*: Asio otus*, *Parus major*, *Regulus regulus*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Aegithalos caudatus*, *Sturnus vulgaris*, *Fringilla coelebs*, *Turdus merula*, *Carduelis carduelis*, *Acanthis cannabina*, *Garrulus glandarius*, *Columba palumbus*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Emberiza schoeniclus*, *Corvus corax*, *Phasianus colchicus*, *Turdus iliacus*
Февраль	*Parus major* (24.6) *Parus caeruleus* (11.8)	15 видов: *Columba palumbus*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Regulus regulus*, *Aegithalos caudatus*, *Carduelis carduelis*, *Turdus pilaris*, *Acanthis cannabina*, *Fringilla coelebs*, *Garrulus glandarius*, *Chloris chloris*, *Passer montanus*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Sturnus vulgaris*, *Corvus corax*, *Dendrocopos major*

Примечание: субдоминанты перечислены в порядке уменьшения доли участия в формировании орнитонаселения.

Особенностями этой зимы была очень высокая численность врановых (особенно ворона *Corvus corax)* и канюков, что было обусловлено изобилием падали из-за массового падежа кабана *Sus scrofa*. Так, например, 17 февраля 2018 мы зарегистрировали около 10 трупов этого зверя на маршруте длиной 3.5 км, рис. 1). Кстати, всю зиму на падали в одном и том же месте урочища «Сухой Ягорлык» вместе с воронами кормился курганник *Buteo rufinus*.

Рис. 1. Павшие кабаны *Sus scrifa* – основной корм воронов и канюков в заповеднике «Ягорлык» зимой 2017/18 года

Довольно часто вблизи туш кабана мы регистрировали и соек, вероятнее всего, также питавшихся падалью.

В январе-феврале в заповеднике «Ягорлык» наблюдались многочисленные стаи вяхирей *Columba palumbus* – 27 особей 17 января и 112 особей 18 февраля 2018 (рис. 2).

Рис. 2. Стая вяхирей *Columba palumbus* в урочище «Сухой Ягорлык».

Регистрировались массовые скопления ушастых сов *Asio otus*. Так 18 декабря 2017 в парке заповедника зарегистрированы 6 особей, а 13 января 2018 на крымских соснах *Pinus pallasiana* напротив базы заповедника зарегистрирована группа из 18 особей.

В декабре в урочищах резервата были обычными московки *Parus ater*, которые этой зимой встречались в большом количестве во многих местах Приднестровья, что, вероятно, связано с их инвазией в регион из-за плохого урожая семян ели в Карпатах и лесной зоне.

Зимой 2017/18 гг. в резервате наблюдалось 13 видов лимнофильных птиц (табл. 4).

Таблица 4. Структура зимней орнитофауны лимнофильных птиц в заповеднике «Ягорлык»

Вид	Число особей						Итого		
	Сухой Ягорлык			Другие участки ВБУ					
	XII	I	II	XII	I	II	XII	I	II
Podiceps ruficollis	–	–	–	1	–	–	1	–	–
Podiceps cristatus	–	–	–	1	2	–	1	2	–
Phalacrocorax carbo	–	2	–	159	75	–	159	77	–
Cygnus olor	–	–	–	2	2	9	2	2	9
Anas platyrhynchos	16	9	–	696	1220	9	712	1229	9
Aythya fuligula	–	–	–	14	27	–	14	27	–
Bucephala clangula	–	–	–	21	11	–	21	11	–
Haliaeetus albicilla	–	–	–	3	1	1	3	1	1
Rallus aquaticus	–	–	2	1	1	–	1	1	2
Fulica atra	–	–	–	210	225	–	210	225	–
Larus cachinnans	–	–	–	1	3	–	1	3	–
Panurus biarmicus	–	–	–	–	–	2	–	–	2
Emberiza schoeniclus	6	5	4	-	5	-	6	10	4
Итого:	22	16	6	1109	1572	21	1131	1588	27

Рис. 3. Скопление кряквы *Anas platyrhynchos* в резервате зимой 2017/18 года.

В декабре и январе (до замерзания водоёмов) была отмечена массовая зимовка кряквы *Anas platyrhynchos* (рис. 3). 18 декабря 2017 мы наблюдали попытку самки тетеревятника *Accipiter gentilis* поймать крякву с воды, но утка успела нырнуть и ястреб остался без добычи.

Большинство лысух *Fulica atra* держалось в месте впадения Ягорлыка в Днестр, где они кормились дрейссенами *Dreissena polymorpha*.

Впервые зимой в заповеднике наблюдались орланы-белохвосты *Haliaeetus albicilla*. 18 декабря 2017 одного взрослого орлана преследовали четыре ворона в районе Дойбанского залива. 13 января 2018 в этом же районе замечен молодой орлан-белохвост, сидевший на иве (вероятнее всего, птица высматривала добычу в акватории заповедника, которая ещё не успела покрыться льдом), а в 16 ч он перелетел в сторону Цыбулёвской балки.

Вблизи конторы и возле автотрассы в зимнее время зарегистрирован всего один вид, не отмечавшийся в других местах резервата – домовой воробей *Passer domesticus*.

Таким образом, зимой 2017/18 года на территории заповедника «Ягорлык» зарегистрировано пребывание 56 видов птиц. Из них пять видов, включённых в Красную книгу Приднестровья (2009): лебедь-шипун *Cygnus olor*, гоголь *Bucephala clangula*, полевой лунь *Circus cyaneus*, курганник и орлан-белохвост.

Литература

Захаров В.Д. 1998. *Биоразнообразие населения птиц наземных местообитаний Южного Урала*. Миасс: 1-158.

Красная книга Приднестровья. 2009. Тирасполь: 1-376.

Кузякин А.П. 1962. Зоогеография СССР // *Учён. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Крупской* **109** (1): 3-182.

Щёголев В.И. 1977. Количественный учёт птиц в лесной зоне // *Методики исследования продуктивности и структуры видов птиц в пределах их ареалов*. Вильнюс, **1**: 95-102.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1683****: 5132-5133*

Желтогорлая овсянка *Cristemberiza elegans* и синяя мухоловка *Cyanoptila cyanomelana* в Норском заповеднике

В.А.Колбин

Василий Анфимович Колбин. ФГБУ Государственный заповедник «Вишерский».
Ул. Гагарина 36-Б, г. Красновишерск, Пермский край, 618590, Россия.
ФГБУ Государственный заповедник «Норский». Ул. Садовая 21, п. Февральск,
Селемджинский район, Амурская область, 676572, Россия. E-mail: kgularis@mail.ru

Поступила в редакцию 15 октября 2018

Желтогорлая овсянка *Cristemberiza elegans* продолжает продвижение на север в бассейне реки Селемджи. В 2000-е годы этот вид встретился мне только в районе устья этой реки в пойме реки Зеи (Колбин 2008), где широко представлены дубняки *Quercus mongolica*. Осенью 2014 года группа из 4 овсянок была обнаружена уже в пойме реки Орловки, которая является правым притоком Селемджи (Колбин 2014). Здесь птицы держались в рощах берёзы даурской *Betula davurica*.

В мае 2018 года желтогорлые овсянки многократно встретились мне ещё севернее – в окрестностях посёлка Норск в смешанных березняках из берёзы даурской и берёзы плосколистной *Betula platyphylla* (см. рисунок). Позднее, 18 мая, одиночный самец был обнаружен в пойме реки Норы в 100 км выше места её слияния с Селемджой, на стационаре заповедника «Антоновская протока».

Самец желтогорлой овсянки *Cristemberiza elegans* в окрестностях посёлка Норск.
3 мая 2018. Фото автора.

Синяя мухоловка *Cyanoptila cyanomelana* – ещё более южный вид, связанный с широколиственными лесами, был отмечен на южной границе Норского заповедника в районе устья реки Норы 7 июня 2007 (Колбин 2007). Позднее на протяжении ряда лет вид в данном месте не регистрировался (Колбин 2013). Однако 31 мая 2015 в районе Усть-Норской сопки снова был обнаружен поющий самец. В 2018 году 28 мая в пойме реки Селемджи в 25 км выше устья реки Норы на участке темнохвойно-лиственного леса был отмечен ещё один поющий самец синей мухоловки. Таким образом, можно констатировать, что синяя мухоловка также продвигается на север Приамурья.

Литература

Колбин В.А. 2007. Находка синей мухоловки *Cyanoptila cyanomelana* в окрестностях Норского заповедника // *Рус. орнитол. журн.* **16** (368): 959-960.

Колбин В.А. 2008. Желтогорлая овсянка *Cristemberiza elegans* на реке Зее // *Рус. орнитол. журн.* **17** (427): 1013-1014.

Колбин В.А. 2013. Залётные виды птиц в междуречье Норы и Селемджи // *Рус. орнитол. журн.* **22** (945): 3268-3270.

Колбин В.А. 2014. Желтогорлая овсянка *Cristemberiza elegans* в бассейне реки Селемджи // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1055): 3085-3086.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1683**: 5133-5135*

К осенней фауне птиц Чу-Илийских гор

Ю.Н.Грачёв

Юрий Николаевич Грачёв. Институт зоологии, Министерство образования и науки.
Проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан

Поступила в редакцию 13 октября 2018

С 29 сентября по 18 октября 1978 года производилось изучение популяции кеклика *Alectoris chukar* в горах Анархай (Аныракай) – одной из наиболее возвышенных частей Чу-Илийских гор, расположенных между северными отрогами Тянь-Шаня и Илийской долиной. Основные наблюдения велись между речками Сарыбулак и Алмалы в районе метеостанции «Анархай». Эта местность представляет собой скалистые ксерофитные склоны гор, усеянные многочисленными обломками разрушенных пород и осыпями. Во многих местах имеются глубокие ущелья с отвесными скальными стенами и лабиринтами отщелков, заваленных камнями. В ущельях с родниками и ручьями встречаются группы раскидистых вётл и клёнов, одиночные тополя. В таких местах нередко располагаются чабанские дома с кошарами.

Осенний сезон 1978 года был сухим и тёплым, поэтому характеризовался необычно поздними задержками отлёта некоторых птиц. Ниже приводим наиболее интересные встречи некоторых птиц.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. В ущелье речки Сарыбулак 2 октября на небольшом зеркале воды среди тростника встречена группа из 3 свистунков.

Широконоска *Anas clypeata*. Там же 2 октября вместе с чирками держались 3 широконоски.

Ястреб-тетеревятник *Accipiter gentilis*. С 29 сентября по 18 октября в горах Анархай между Алмалы и Сарыбулаком зафиксировано 5 встреч с тетеревятниками, державшихся в отщелках, в которых были многочисленны кеклики. При этом 2 октября добыт ястреб, в желудке которого содержалось мясо кеклика *Alectoris chukar*, а 4 октября видели тетеревятника, поймавшего кеклика.

Ястреб-перепелятник *Accipiter nisus*. С 7 по 9 октября ежедневно регистрировали по одному перепелятника, а 13 октября наблюдали ястреба, пытавшегося в кроне дерева поймать зяблика.

Пустельга *Falco tinnunculus*. На спуске из Алмалы в Сарыбулак 9 октября в скалах видели самца.

Саджа *Syrrhaptes paradoxus*. В горах Анархай между ущельями Сарыбулак и Алмалы 6 октября слышали крики пролетающих садж.

Кукушка *Cuculus canorus*. По дороге из ущелья Алмалы в Сарыбулак 9 октября в ивах у родника наблюдали одиночку. Столь поздняя встреча кукушки, зарегистрированная 9 октября 1965, известна также для Алма-Аты (Корелов 1970).

Скальная ласточка *Ptyonoprogne rupestris*. В скалах ущелья Сарыбулак 2 и 7 октября видели 3 одиночки. По литературным данным, основной отлёт этой ласточки происходит в сентябре (Бородихин 1970).

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. У кошары в ущелье Сарыбулак 7 октября держалась одиночка.

Лесной конёк *Anthus trivialis*. С 1 по 6 октября среди высохшей травы по днищу и на склонах ущелий Сарыбулак и Алмалы встречено свыше 10 одиночек.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. На ручье Сарыбулак 2 октября встречена одиночка.

Европейский жулан *Lanius collurio*. В ущелье ручья Сарыбулак 2 октября отмечен одиночный жулан в зарослях тростника. Это самая поздняя встреча из известных на юго-востоке Казахстана, т.к. миграция этих птиц обычно завершается здесь в сентябре (Корелов 1970).

Серая мухоловка *Muscicapa striata*. На пути из Алмалы в Сарыбулак 10 октября встретили трёх серых мухоловок в ивах у родника. В юго-восточной части Казахстана миграция этих мухоловок обычно завершается в середине сентября, столь поздних встреч пролётных птиц

этого вида до последнего время не регистрировалось (Ковшарь 1970).

Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros phoenicuroides*. С 1 по 14 октября в ущельях Алмалы и Сарыбулак встречалась ежедневно и чаще других мелких воробьиных птиц (1 октября – 12 особей/5 км, 4 октября – 29 особей/10 км маршрута). Горихвостки придерживались зарослей спиреи по каменистым склонам и дну ущелий. Отмечалось поедание ягод крушины.

Чернозобый дрозд *Turdus atrogularis*. В ущелье Алмалы с 9 по 17 октября по зарослям спиреи и крушины ежедневно встречались одиночки и группы по 2-5 особей.

Деряба *Turdus viscivorus*. В ущелье Алмалы 3 и 4 октября отмечены 2 одиночки.

Большой скальный поползень *Sitta tephronota*. С 1 по 17 октября на экскурсиях в отщелках между ущельями Алмалы и Сарыбулак каждый день встречали от 2 до 5 особей, преимущественно в одиночку, иногда парами. В первые 10 дней было учтено 20 особей, в том числе с 1 по 4 октября 14 особей на 27 км маршрутов.

Краснокрылый стенолаз *Tichodroma muraria*. Совершенно неожиданная встреча этой высокогорной птицы произошла 4 октября в отвесных скалах ущелья Алмалы.

Испанский воробей *Passer hispaniolensis*. С 1 по 9 октября между ущельями Алмалы и Сарыбулак наблюдали слабый пролёт стайками по 15-40 особей.

Зяблик *Fringilla coelebs*. В ущелье Алмалы с 30 сентября по 17 октября в группе ив у экспедиционного лагеря постоянно держалось миграционное скопление от 30 до 50 зябликов. Кроме того, по деревьям в ущельях встречались небольшие стайки.

Юрок *Fringilla montifringilla*. В ущелье Алмалы ежедневно наблюдался с 30 сентября по 17 октября в смешанных стаях с зябликом численностью до 30-60 особей.

Выражаю признательность Н.Н.Березовикову за помощь в подготовке статьи.

Литература

Бородихин И.Ф. 1970. Семейство Ласточковые – Hirundinidae // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **3**: 161-193.

Ковшарь А.Ф. 1970. Род Мухоловка – *Muscicapa* // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **3**: 425-446.

Корелов М.Н. 1970. Отряд Кукушки – Cuculi // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **3**: 9-21.

Корелов М.Н. 1970. Семейство Сорокопутовые – Laniidae // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **3**: 364-399.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1683****: 5136-5137*

К зимней орнитофауне гор Анархай

А.В.Грачёв, Н.Н.Березовиков

Александр Владимирович Грачёв. *Николай Николаевич Березовиков*. Институт зоологии, Министерство образования и науки. Проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.
E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 13 октября 2018

Во время зимних поездок в пустынную равнину Жусандала 17 декабря 1999 и 20 января 2007 совершены заезды в горный массив Анархай в Чу-Илийских горах по маршруту: село Каншенгель – речка Сарыбулак – метеостанция «Анархай» – ущелье Алмалы. Наиболее интересные встречи птиц, уточняющие характер их пребывания, приводим в этом сообщении.

Anas platyrhynchos. На речке Сарыбулак в восточной части Анархая в понижениях с незамерзающей водой и тростником 20 января 2007 наблюдались одиночки и группы по 2-3, всего 20 особей.

Aegypius monachus. ***Gyps fulvus***. На подгорном шлейфе Анархая между селом Каншенгель и метеостанцией «Анархай» среди саксауловой равнины вдоль Сарыбулака 17 декабря 1999 на зимнем пастбище лошадей и баранов наблюдали группу из одного чёрного грифа и трёх белоголовых сипов.

Phasianus colchicus mongolicus. Несколько одиночных семиреченских фазанов встречено 20 января 2007 в тростниках по руслу Сарыбулака. Во время поездок по Сарыбулаку в предыдущие годы фазанов ни разу не наблюдались. Ближайшие пункты их встреч в апреле 1998 года приходятся на тугайные заросли по руслам Копалысай и Жингельды, вытекающих из центральной части Анархая (Березовиков и др. 1999). Приведённые сведения свидетельствуют, что в благоприятные годы фазан расселяется по руслам речек в Чу-Илийские горы.

Perdix perdix. В саксауловой подгорной равнине вдоль речки Сарыбулак 20 января 2007 на 25 км автомаршрута встречено 5 стай по 10-15 особей. По дороге между ущельями Сарыбулака и Алмалы 17 декабря 1999 была отмечена стая, из которой добыт 1 экз.

Otis tarda. Очаг постоянной зимовки дрофы существует на подгорном каменистом шлейфе гор Анархай между сёлами Каншенгель и Аксуек (Березовиков и др. 2016). В январе 2007 года у восточного подножия Анархая вдоль русла речки Сарыбулак держалось 565 дроф (Березовиков и др. 2007).

Sitta tephronota. В скальных отщелках Анархая между ущельями Сарыбулака и Алмалы 17 декабря 1999 и 20 января 2007 неоднократно встречали одиночных больших скальных поползней.

Литература

Березовиков Н.Н, Губин Б.М., Гуль И.Р., Ерохов С.Н., Карпов Ф.Ф., Коваленко А.В. 1999. *Птицы пустыни Таукумы (юго-восточный Казахстан).* Киев: 1-116.

Березовиков Н.Н., Левинский Ю.П., Грачёв А.В. 2007. Новые данные о зимовке дрофы *Otis tarda* в Алматинской области // *Рус. орнитол. журн.* **16** (381): 1354-1355.

Березовиков Н.Н., Филимонов А.Н., Шмыгалёв С.С. 2016. Зимовка дрофы *Otis tarda* в Алматинской области в 2015/16 году // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1367): 4501-4504.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1683**: 5137-5140*

Встреча предполагаемого гибрида малой *Egretta garzetta* и южной *Casmerodius modestus* белых цапель в Восточном Китае

Ю.Н.Глущенко, В.П.Глущенко

Юрий Николаевич Глущенко. Дальневосточный Федеральный университет, Школа педагогики, ул. Некрасова, д. 35, г. Уссурийск, 692500, Россия. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, ул. Радио, д. 7, г. Владивосток, 690041, Россия. E-mail: yu.gluschenko@mail.ru
Вера Петровна Глущенко. Дальневосточный Федеральный университет, Школа педагогики, ул. Некрасова, д. 35, г. Уссурийск, 692500, Россия. E-mail: yu.gluschenko@mail.ru

Поступила в редакцию 6 октября 2018

Внутри семейства цаплевых Ardeidae известны сравнительно нечастые случаи межвидовой гибридизации, при этом с наибольшим числом видов, достигшим девяти, выявлена гибридизация малой белой цапли *Egretta garzetta* (McCarthy 2006). В указанное число не входит большая белая цапля *Casmerodius albus* sensu lato, несмотря на обширную область перекрывания ареалов этих двух политипических таксонов, в состав последнего из которых, трактуемого в широком смысле, входит и южная белая цапля *Casmerodius modestus* (J.E.Gray, 1831). Видовая самостоятельность южной белой цапли сравнительно недавно была вновь подтверждена данными по морфологии, брачному поведению (Inskipp *et al*. 1996), а также фенологии, гнездовой биологии и выявленной частичной симпатрии, прямым доказательством которой послужило обнаружение большой и южной белых цапель на гнездовании в общей колонии, расположенной на озере Ханка (Глущенко, Коробов 2005).

Ранним утром 23 июля 2018 в устье реки Хэнгхэ (Henghe), расположенном в китайской провинции Хэбэй (Hebei), встречен необычный экземпляр белой цапли, который держался в группе малых белых цапель. В первую очередь он обратил на себя наше внимание заметно

более крупными общими размерами (рис. 1), что позволило сделать предположение о том, что он является гибридом малой и южной белых цапель.

Рис. 1. Предполагаемый гибрид малой *Egretta garzetta* и южной *Casmerodius modestus* белых цапель (справа, указан стрелкой) и малая белая цапля (слева). Провинция Хэбэй (Восточный Китай), устье реки Хэнгхэ. 23 июля 2018. Фото Ю.Н.Глущенко.

Рис. 2. Предполагаемый гибрид малой *Egretta garzetta* и южной *Casmerodius modestus* белых цапель. Провинция Хэбэй (Восточный Китай), устье реки Хэнгхэ. 23 июля 2018. Фото Ю.Н.Глущенко.

Судя по наличию эгреток, встреченная особь была взрослой птицей, которая, помимо крупных размеров, отличалась от малых белых цапель несколько иными пропорциями тела и более размеренной, неторопливой походкой, присущей южной белой цапле. Расположенные на его спине эгретки были сравнительно длиннее и более рассученными, чем в типичном случае у малых белых цапель, но их концы, так же как и у представителей выше упомянутого вида, резко загибались вверх (рис. 2).

Следует указать, что отсутствие удлинённых перьев на затылке не может служить дополнительным признаком возможного гибридного происхождения этого экземпляра, поскольку на момент наблюдений многие особи малой белой цапли также утратили этот элемент брачного наряда. Дистальные концы цевки и пальцы предполагаемого гибрида имели светлую желтовато-мясную окраску, а его клюв казался относительно более массивным, чем у малой белой цапли (рис. 3).

Рис. 3. Голова предполагаемого гибрида малой *Egretta garzetta* и южной *Casmerodius modestus* белых цапель. Провинция Хэбэй (Восточный Китай), устье реки Хэнгхэ. 23 июля 2018. Фото Ю.Н.Глущенко.

Через некоторое время группа цапель, в которой держался предполагаемый гибрид, покинула место наших наблюдений и в последующие 6 дней (вплоть до нашего отъезда), несмотря на специальные поиски, обнаружить его нам не удалось.

В заключение отметим, что в последней декаде июля 2018 года в районе устья реки Хэнгхэ отмечено 7 видов цапель, самыми многочисленными из которых были малая и южная белые цапли, приблизи-

тельная численность которых здесь в разные дни составляла 100-140 и 30-40 особей соответственно. Среди других представителей белых цапель был встречен единственный молодой экземпляр желтоклювой цапли *Egretta eulophotes*, представляющей большую редкость в провинции Хэбэй (Hemmingsen, Guildal 1968; Williams *et al.* 1992) и одна средняя белая цапля *Casmerodius intermedius*, которая также встречается в данном регионе очень редко (Глущенко, Глущенко 2014). Предположение о том, что рассматриваемый экземпляр является гибридом малой белой цапли с каким-либо из двух выше перечисленных видов, мы считаем менее реалистичным, поскольку эта особь была крупнее обоих из них.

Литература

Глущенко Ю.Н., Глущенко В.П. 2014. Материалы к изучению авифауны и летнего населения птиц провинции Хэбэй, Китай // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1051): 2941-2952.

Глущенко Ю.Н., Коробов Д.В. 2005. Южная белая цапля *Egretta modesta* (J.E. Gray, 1831) в Приморском крае: таксономический статус в свете новых данных // *Рус. орнитол. журн.* **14** (304): 1028-1032.

Hemmingsen A.M., Guildal J.A. 1968. *Observation on birds in north eastern China*, II. Spolia Zoologica Musei Hauniensis **28**: 1-326.

Inskipp T., Lindsey N., Duckworth W. 1996. *An annotated checklist of the bird of the Oriental Region.* 1-294.

McCarthy E.M. 2006. *Handbook of Avian Hybrids of the World*. Oxford: 1-608.

Williams M.D., CareyG.J., Duff D.G., Weishu Xu. 1992. Autumn bird migration at Beidaihe, China, 1986-1990 // *Forktail* **7**: 3-55.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1683**: 5140-5142*

О необычно частых встречах вальдшнепа *Scolopax rusticola* в августе 2018 года в окрестностях новосибирского Академгородка

Т.К.Джусупов

Талгат Каисарович Джусупов. Мензбировское орнитологическое общество.
E-mail: str777nik@yandex.ru

Поступила в редакцию 12 октября 2018

Известно, что вальдшнепы *Scolopax rusticola* осенью, во время пролёта, образуют скопления – т.н. «высыпки». Даты этого явления в среднем по России приходятся на сентябрь. В Западной Сибири, например в окрестностях Томска, осенний пролёт этого кулика, по наблюдениям в 1958-1974 годах, отмечался 15-29 сентября, а отдельные вальдшнепы

встречались до середины октября (Гынгазов, Миловидов 1977). О каких либо «высыпках» упомянутые авторы ничего не пишут. Вероятно, это связано с относительно невысокой численностью данного вида в рассматриваемом регионе. В окрестностях Новосибирска вальдшнеп – очень редкая гнездящаяся птица (Козлов 1988), а в лесопарковой зоне Академгородка, где были проведены наши наблюдения, – по-видимому, пролётный вид, встречающийся довольно редко (Цыбулин 1985).

За многие годы орнитологических экскурсий в окрестностях новосибирского научного центра мы лишь несколько раз встречали одиночных вальдшнепов осенью. Неоднократно предпринятые нами попытки выявить здесь весенней тяги этого лесного кулика не увенчались успехом. В связи с вышесказанным представляется интересным поделиться результатами наших наблюдений в августе 2018 года. Большую пользу в этом мне оказал семимесячный щенок английского кокер-спаниеля, начальный период натаски которого по боровой дичи пришёлся как раз на время наших орнитологических экскурсий. Первая встреча с вальдшнепом произошла 5 августа во время выгула молодой собаки. Три птицы с интервалом в несколько секунд были подняты нами на крыло в относительно густых папоротниковых зарослях соснового бора, что непосредственно примыкает к жилым застройкам новосибирского Академгородка. Данный бор служит зоной отдыха у местного населения (пешие и велосипедные прогулки, выгул собак, сбор грибов и ягод, пикники и т.п.). Рекреационная нагрузка здесь весьма ощутима и это, естественно, сказывается на относительно бедном видовом составе и обилии птиц, населяющих этот лес, словно паутиной изрезанный сетью троп и дорожек, на которых практически в любое время суток можно увидеть человека. И поэтому неожиданная встреча с вальдшнепом, да ещё сразу с тремя птицами, нас удивила и нескрываемо обрадовала! Молодая спаниелька проявила интерес к новым для неё птицам и с азартом стала обнюхивать место днёвки улетевших куликов. Позднее, уже дома, занося в полевой дневник сведения о встрече этих трёх птиц, я не мог и предположить, что почти в течение всего августа мы будем со спаниелем практически ежедневно встречать в этом сосновом бору вальдшнепов.

Чем вызвано такое обилие вальдшнепов – остаётся загадкой, учитывая редкость обнаружения этих куликов в данном районе, тем более, что август – не время осенней миграции этого вида. Как бы там не было, но в последующие дни августа вплоть до 3 сентября нами был встречен во время утренних экскурсий 41 вальдшнеп. Вероятно, что при большем опыте розыска дичи у молодого спаниеля он обнаруживал бы (вспугивал) их значительно чаще. Но, тем не менее, даже такая частота встреч этого кулика в одном из сосновых боров, что окружают Академгородок, поражает своим обилием. Орнитологические экскур-

сии проводились каждый день утром, как правило с 7 до 9 ч. Вальдшнепы встречены с 5 августа по 3 сентября ежедневно за исключением 4 дней – 8, 12, 13 августа и 2 сентября. После 3 сентября вальдшнепы более не попадались, несмотря на периодичность их «розыска». Из 41 вальдшнепа, поднятого на крыло (в основном спаниелем), 17 птиц были вспугнуты группами по 2 и 3, остальные – поодиночке. Бо́льшая часть вальдшнепов держалась у границы леса близ железнодорожного пути «Новосибирск – Барнаул». От этой магистрали сосновый бор отделялся широкой щебёночной полосой и разнотравно-злаковой «лентой», что тянется вдоль границы бора и железнодорожного полотна. Вальдшнепы близко подпускали нас с собакой (3-7 м) и с характерным шумом взлетали из разреженного папоротника-орляка. Возможно, что данный биотоп привлекал птиц отсутствием здесь прогуливающихся людей (особенно с собаками), несмотря на близость железнодорожной магистрали и постоянно проходящие по ней электрички и грузовые составы. В заключение укажем на встречу молодой самки тетеревятника *Accipiter gentilis* 17 августа в сосновом бору близ улицы Пирогова. В вечернее время (около 20 ч) ястреб был спугнут нами с места поедания своей добычи, близ которого обнаружены перья вальдшнепа.

Литература

Гынгазов А.М., Миловидов С.П. 1977. *Орнитофауна Западно-Сибирской равнины*. Томск: 1-350.

Козлов Н.А. 1988. *Птицы Новосибирска (пространственно-временная организация населения)*. Новосибирск: 1-158.

Цыбулин С.М. 1985. *Птицы диффузного города (на примере новосибирского Академгородка)*. Новосибирск: 1-168.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1683**: 5142-5143*

Свиязь *Anas penelope* в Северной Кулунде

А.И.Михантьев, М.А.Селиванова

*Второе издание. Первая публикация в 1997**

Весенний пролёт свиязи *Anas penelope* проходит со второй декады апреля до первых чисел мая. В стаях 8-30 особей. В скоплениях до 150-300 птиц. Соотношение полов 1:1. На озере Кротовая Ляга (в 15 км западнее города Карасука, Карасукский район Новосибирской области)

* Михантьев А.И., Селиванова М.А. 1997. Свиязь в северной Кулунде // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 109-110.

свиязи гнездятся не ежегодно отдельными парами. В 1969 году в одном гнезде с 11 яйцами утята вывелись 8 июля. В 1995 году найдены гнёзда с 10, 8 и 3 яйцами. Утята вывелись, соответственно, 2 июня, 5 июля и 11 июля. С конца июня встречаются стаи, состоящие из одних селезней. Они образуют скопления до 500 птиц. В июле-августе свиязи образуют скопления, часто вместе с шилохвостью *Anas acuta* и чирками *A/ crecca* и *A. querquedula*. На осеннем пролёте свиязи встречаются до ледостава в конце октября. В засушливые годы летом свиязь в районе наблюдений не встречается.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1683**: 5143-5147*

Современное распространение журавлей в Прибайкалье

И.В.Фефелов

*Второе издание. Первая публикация в 2015**

В Красные книги Российской Федерации, Республики Бурятия или Иркутской области включены шесть из семи видов журавлей, известных для Прибайкалья. Под последним названием мы в данном случае понимаем территорию, непосредственно примыкающую к Байкалу, в рамках близлежащих субъектов РФ: Иркутской области и Республики Бурятия. Даже виды журавлей со стабильным состоянием заслуживают охраны, так как на фоне погодно-климатических изменений они зависимы от качества местообитаний и от антропогенной трансформации ландшафтов. Совокупность этих факторов значительно усиливает их влияние. Из семи видов журавлей два гнездятся, один предположительно гнездится, четыре – редкие мигранты и залётные. В течение предыдущих десятилетий опубликован ряд данных о статусе и распространении журавлей региона. В настоящем сообщении приводятся дополнительные новые данные о распространении редких видов этой группы птиц в Прибайкалье.

Серый журавль *Grus grus* сравнительно обычен на данной территории как гнездящийся, и вряд ли может быть назван редким, поэтому мы не включаем его в рамки данного обзора. Тем не менее, он внесён в Красные книги Иркутской области и Бурятии под категорией «3» как малочисленный, спорадично распространённый вид.

* Фефелов И.В. 2015. Современное распространение журавлей в Прибайкалье // *Журавли Евразии (биология, распространение, разведение)* **5**: 144-147.

Японский журавль *Grus japonensis*. Ю.А.Дурнев (2009) сообщает о фотографиях двух пар этого журавля, сделанных монгольским туристом Ц.Цэвэгом в Тункинской долине (Тункинский район Республики Бурятия) в мае 2007 года. Места недавнего гнездования – Забайкальский край, но единичные пары, гнездившиеся на Торейских озёрах в 2002-2007 годах, в настоящее время отсутствуют в связи с засушливым периодом (Горошко 2012а), а с 2014 года вид не гнездится и в верховьях реки Аргунь (Горошко 2015).

Даурский журавль *Antigone vipio*. На данный момент известен ряд залётов вида в Предбайкалье и Западное Забайкалье. По сведениям Ю.А.Дурнева (2009), 31 октября – 3 ноября 2006 две особи держались в районе дельты реки Голоустной (Иркутский район Иркутской области), а в начале ноября того же года трёх журавлей сфотографировали местные жители в пойме реки Тунка (Тункинский район Бурятии). Позднее, в 2009 году, пару даурских журавлей с 24 июня несколько дней наблюдали на озере Тухум (Бичурский район Бурятии) (Андронов, Фефелов 2009). В последующие годы Д.А.Андронов (устн. сообщ.) ежегодно до 2013 года регистрировал на том же озере одну особь, также явно негнездящуюся, которая, как правило, держалась вместе с несколькими красавками. Журавль появлялся обычно в конце июня (в 2010 году 29 мая), держался на озере несколько дней и затем исчезал. В 2014 году пара даурских журавлей встречена 27 апреля у посёлка Тулунжа в окрестностях Улан-Удэ (Ц.Ц.Чутумов, устн. сообщ.).

Ближайшие места гнездования даурского журавля – Монголия и Забайкальский край: лесостепь в бассейне реки Онон, Торейские озёра, река Аргунь (Горошко 2012б). В последнее десятилетие численность снизилась (Горошко 2015).

Чёрный журавль *Grus monacha* и **стерх** *Leucogeranus leucogeranus* остаются весьма редкими видами в Прибайкалье: первый – как редкий мигрант и, вероятно, локально гнездящийся вид, второй – как очень редкий пролётный. Обзор встреч этих журавлей в Иркутской области проведён В.В.Поповым (2012).

В Бурятии в последние годы одиночные чёрные журавли или негнездящиеся пары были несколько раз встречены в мае-июне 2010 и 2011 годов в окрестностях Улан-Удэ (Чутумов, Елаев 2013а,б), а также в июне 2009 года на озере Тухум (Андронов, Фефелов 2009). В последнем пункте 24 июля 2011 видели сразу две пары (Д.А.Андронов, устн. сообщ.). Новых данных о встречах стерхов в Бурятии пока нет.

Канадский журавль *Antigone canadensis*. Одна особь, несомненно, залётная, встречена вместе с красавками в районе посёлка Иволгинск 12 июня 2013 (Баженова 2015). Полученные фотографии позволяют без сомнения определить вид птицы.

Красавка *Anthropoides virgo*. В Республике Бурятия – довольно

обычный гнездящийся вид в южных районах, а также локально на западе республики (Тункинский и Окинский районы) и Баргузинской долине (Чутумов, Елаев 2013а).

Значительно реже красавка встречается в Иркутской области. В XX веке она впервые зарегистрирована здесь в 1970 году, когда стая из 13 особей всё лето держалась в Балаганской лесостепи на Братском водохранилище (Толчин 1971). Начиная с 1980-х годов отдельные пары, предположительно гнездящиеся, появились в лесостепных районах области, преимущественно в Усть-Ордынском Бурятском национальном округе, где степи наиболее распространены. Со второй половины 1990-х и особенно в 2000-е годы красавка регулярно, хотя и в малом числе, гнездится в этих районах. В мае 1987 года залётная особь наблюдалась у озера Орон в Витимском заповеднике (Бодайбинский район) (Волков 2015). Это самая северная регистрация вида в Иркутской области (57°10' с.ш., 116°30' в.д.).

На север находки выводков красавки известны вплоть до деревни Щапово Качугского района (53°58' с.ш., 106°04' в.д.). Однако чаще всего этих птиц встречают на территории Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, где, как предполагают, гнездится 10-15 пар (Рябцев 1999; Рябцев, Воронова 2006; Малеев, Попов 2007).

В 2007 году вид обнаружен и гораздо севернее. Так, А.Иванов сфотографировал пару птиц 30 апреля у деревни Якимовка Жигаловского района (54°49' с.ш., 105°22' в.д.), два лётных выводка встречены в августе в Зиминском и Куйтунском районах. 9 мая 2008 пара красавок встречена на пашне в 5 км юго-восточнее посёлка Куйтун, 12 мая – пара в долине реки Ельник между селом Барлук и деревней Бурук (одна из самых северных находок в области: 54°31' с.ш., 101°36' в.д.), а 1 августа двух особей видели на полях между посёлком Куйтун и деревней Ключи (Фефелов, Щибан 2009).

В окрестностях Иркутска, где красавка встречается с 1970-х годов, В.Е.Ивушкин (устн. сообщ.) встречал пару в 2013 году у села Куда, а 29 июня 2014 – у села Мамоны. Он же сфотографировал 17 августа 2015 стаю примерно из ста красавок на пастбище в долине реки Куда, на границе между Иркутским и Эхирит-Булагатским районами. В группе присутствовало несколько молодых птиц, но значительно преобладали взрослые. В июле-августе 2015 года М.Иванов и В.Степанов неоднократно встречали пару без птенцов в долине реки Иркут у села Мамон, а А.А.Лисова – пару по реке Ушаковка выше Иркутска, у посёлка Пивовариха (устн. собщ.).

Ещё южнее, у посёлка Култук Слюдянского района, красавка зарегистрирована как залётный или пролётный вид ещё в 1868 году (Дыбовский, Годлевский 1870): этот журавль прилетел 11 мая (по новому стилю). Нужно упомянуть, что в той же публикации в разделе о пере-

лётных птицах Култука упоминаются встречи чёрного журавля 17 мая и стерха – 19 мая, с пометками «встречаются очень редко». В 2011 году у посёлка Култук одна красавка 2 мая пролетела к востоку, вдоль Кругобайкальской железной дороги. Там же А.И.Поваринцев (устн. сообщ.) встретил пару 29 мая 2013 и одну особь в середине мая 2015 года.

Вероятно, в Предбайкалье красавка пытается, кроме пастбищных и пойменных участков, освоить возделываемые земли. Но этот процесс идёт или очень медленно, или недостаточно успешно.

Таким образом, в последние десятилетия зарегистрированы залёты в регион тех видов журавлей, которые населяют Восточную Азию, – даурского, японского и канадского. В отношении двух первых, вероятно, проявляются общие тенденции распространения видов в Забайкалье, которые связаны с состоянием их популяций и с климатической обстановкой. В частности, затянувшийся маловодный период в юго-восточном Забайкалье и Монголии приводит к выселению отдельных негнездящихся пар и особей за пределы обычного ареала. Можно предположить, что залёт канадского журавля в Бурятию стал возможным благодаря расширению его гнездовой части ареала к западу, что имеет место на северо-востоке Сибири. Чёрный журавль остаётся редким, предположительно гнездящимся видом региона (получен ряд новых наблюдений), стерх – крайне редким мигрантом.

Литература

Андронов Д.А., Фефелов И.В. 2009. Летние регистрации даурского *(Grus vipio)* и чёрного *(Grus monacha)* журавлей в Бичурском районе Бурятии // *Байкал. зоол. журн.* 3: 127.

Баженова Д.А. 2015. Первый залёт канадского журавля *Grus canadensis* в Юго-Западное Забайкалье // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1109): 613-614.

Волков С.Л. 2015. Птицы Витимского заповедника (аннотированный список) // *Байкал. зоол. журн.* 1 (16): 91-102.

Горошко О.А. 2012а. Японский журавль // *Красная книга Забайкальского края. Животные*. Новосибирск: 114-116.

Горошко О.А. 2012б. Даурский журавль // *Красная книга Забайкальского края. Животные*. Новосибирск: 120-122.

Горошко О.А. 2015. Состояние популяций журавлей в Даурии (Забайкалье) // *Журавли Палеарктики: биология, охрана, управление*. М.: 28-31.

Дурнев Ю.А. 2009. Значение Тункинской долины в динамике авифауны Байкальской рифтовой зоны // *Байкал. зоол. журн.* 1: 50-55.

Дыбовский В., Годлевский В. 1870. Предварительный отчёт о фаунистических исследованиях на Байкале // *Отчёт о действиях Сибирского отдела Имп. Рус. Геогр. общ-ва за 1869 год* (сост. А.Ф.Усольцев). СПб.: 167-204.

Малеев В.Г., Попов В.В. 2007. *Птицы лесостепей Верхнего Приангарья*. Иркутск: 1-120.

Попов В.В. 2012. Птицы Иркутской области: видовой состав, распространение и характер пребывания. Гагарообразные – журавлеобразные // *Байкал. зоол. журн.* 1 (9): 36-62.

Рябцев В.В. 1999. Красавка *Anthropoides virgo* в лесостепном Предбайкалье // *Рус. орнитол. журн.* **8** (85): 29-30.

Рябцев В.В., Воронова С.Г. 2006. Редкие и малоизученные птицы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа: проблемы охраны // *Бюл. Вост.-Сиб. науч. центра СО РАМН* 2 (48): 140-145.

Толчин В.А. 1971. Новые данные о распространении птиц Приангарья // *Изв. Вост.-Сиб. отд. Геогр. общ-ва СССР* **68**: 137-139.

Фефелов И.В., Щибан М. 2009. Новые данные о распространении некоторых видов птиц в Южном Прибайкалье в 2000-х гг. // *Байкал. зоол. журн.* 2: 85-87.

Чутумов Ц.Ц, Елаев Э.Н. 2013а. Красавка // *Красная книга Республики Бурятия.* 3-е изд., переработ. и доп. Улан-Удэ: 167-168.

Чутумов Ц.Ц, Елаев Э.Н. 2013б. Журавлиные (Gruidae) и соколиные (Falconidae) окрестностей г. Улан-Удэ: эколого-фаунистические заметки // *Вестн. Бурят. ун-та* 4: 145-147.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1683**: 5147-5154*

Редкие птицы Алданского нагорья (Южная Якутия)

А.П.Исаев, Е.В.Шемякин, В.В.Бочкарёв, Н.Н.Егоров

*Второе издание. Первая публикация в 2014**

До начала XIX века территория Алданского нагорья в орнитологическом плане была изучена довольно слабо. Некоторые сведения по орнитофауне Южной Якутии приведены в работах М.И.Ткаченко (1924), К.А. Воробьева (1958, 1963), Ю.В.Лабутина (1965), Ю.В.Ревина (1965), В.И.Перфильева (1972, 1986). В последние годы в связи с программой комплексного развития Южной Якутии были проведены широкомасштабные исследования по выявлению видового состава птиц и их количественных характеристик. Сведения по редким видам собраны в апреле-августе 2000 года в долине реки Алгама, в августе-сентябре 2003 года по рекам Гонам и Учур, в августе-сентябре 2005 года в бассейне среднего течения Алдана от устья реки Суннагин (правый берег) до устья реки Кюнкюнюр (левый берег), в июне-июле 2007 года по рекам Чульман и Тимптон, в августе 2010 года в бассейне реки Тимптон (от устья реки Чульман до устья реки Сеймджа), в июне-августе 2011 года в бассейне среднего Алдана, в июне-июле 2012 года на горе Эвота (хребет Западная Янги), в июле и августе 2013 года на территории посёлка Иенгра и ресурсного резервата (РР) «Унгра». Общая длина экспедиционных маршрутов составила более 4 тыс. км.

Ниже приводятся краткие очерки редких птиц Алданского нагорья.

* Исаев А.П., Шемякин Е.В., Бочкарёв В.В., Егоров Н.Н. 2014. Редкие виды птиц Алданского нагорья (Южная Якутия) // *Вестн. Омск. ун-та* 2: 110-113.

Серая цапля *Ardea cinerea*. В среднем течении реки Алгама встречена 28 июля (Исаев и др. 2006), а 12 сентября 2006 – в среднем течении реки Алдан вблизи устья реки Тимптон. По опросным сведениям, серая цапля крайне редко встречается и в гнездовой период. В бассейне реки Унгра встречается только в период миграций (сообщение госинспектора А.Г.Ложкина).

Чёрный аист *Ciconia nigra*. В Якутии ранее был найден на гнездовье в верховьях Алдана (Воробьёв 1963). В начале 2000 года встречался в окрестностях озера Большое Токо (Егоров и др. 2002).

Американская казарка *Branta (bernicla) nigricans*. По Алдану американская казарка на пролёте наблюдается крайне редко и лишь в весенний период. Больших стай птиц не отмечено, максимальная численность птиц в группах достигает 20 особей. Казарку наблюдали также на пролёте весной 2003 года в бассейне реки Учур (сообщение охотника-любителя А.Н.Куркулина).

Пискулька *Anser erythropus*. По сообщениям охотников, этот гусь на пролёте обычен и в небольшом числе гнездится по озёрам в верховьях рек Гертанда и Алгама. Стая из 8 особей отмечена 24 мая 2000 в долине среднего течения реки Алгама. В гнездовой период пара пискулек встречена 23 августа 2003 в устье реки Тас-Балаганнах (среднее течение реки Гонам).

Таёжный гуменник *Anser fabalis middendorffii*. В долине реки Алгама обычный пролётный и, по опросным сведениям, местами гнездящийся вид. На территории РР «Унгра» в 2013 году отмечен выводок в нижнем течении реки Дурай. По опросным сведениям, в Алданском нагорье весной на пролёте встречается редко, в осеннее время – обычный вид.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. По сообщениям госинспектора РР «Унгра» А.Г.Ложкина, на одном из протоков нижнего течения Унгры в 2005 и предыдущие годы гнездилась пара лебедей. В гнездовой период птицы отмечены в среднем течении Алгамы: в июле 2000 года – две взрослые особи, во второй декаде августа 2003 – две взрослые особи с одним сеголетком (устное сообщение госинспектора Д.И.Макарова). В августе 2003 года выводок кликуна встречен кадровым охотником А.Н. Шевяковым в нижнем течении реки Гыным (левый приток реки Учур). На весеннем и осеннем пролёте кликуны встречаются в среднем течении реки Хатыми (устное сообщение охотника-любителя В.И.Батаева), редко встречаются с конца сентября по октябрь (сообщение главы общины «Гонам» О.В.Сидорова).

Клоктун *Anas formosa*. Во время весенних миграций в последние годы небольшие стаи клоктунов регулярно встречаются в среднем течении реки Алгама (Исаев и др. 2006) и в среднем течении реки Алдан (устные сообщения охотников А.Н.Куркулина, В.Н.Иванова).

Серая утка *Anas strepera*. По литературным данным, отмечена 28 мая 1980 в низовьях реки Алдакай (Перфильев 1986). По сообщению охотинспектора Е.В.Панфилова, на участке Васькина протока весной 2005 года был добыт один самец серой утки (среднее течение Алдана).

Скопа *Pandion haliaetus*. В Якутии скопа распространена довольно широко, но практически по всему ареалу её численность крайне низкая, распространение носит спорадический характер (Лабутин и др. 2009). В августе 1955 года отмечена по реке Илли (бассейн реки Учур) (Воробьёв 1963). В долине среднего течения Алгамы в июне-июле 2000 года постоянно держалась пара скоп. 26 июля 2000 в устье ручья Давыдовское (река Гертанда) обнаружено жилое гнездо. В марте 2005 года в среднем течении реки Алгама найдены 2 гнезда скопы в 5-6 км ниже по течению от устья реки Ундытын и 8 км ниже по течению от устья реки Гертанда. По сообщению охотника-любителя Г.И.Иванова, второе гнездо в 2004 году было жилым. По сообщению госинспектора РР «Суннагино-Силлигилинский» Ю.Н.Ковалёва, в летний период пара скоп на протяжении уже нескольких лет обитает в нижнем течении реки Суннагин (среднее течение Алдана). За период с 13 по 21 июня 2010 по реке Гонам и его притоку Сутам обнаружено 11 жилых гнёзд скопы (устное сообщение заведующего лабораторией экологии млекопитающих Института биологических проблем криолитозоны СО РАН И.М.Охлопкова).

Хохлатый осоед *Pernis ptilorhyncus*. 2 июня 2000 пара токующих хохлатых осоедов наблюдалась в устье реки Мукунда (среднее течение реки Алгама). В этот год одиночные птицы периодически отмечены в течение всего лета в устье реки Гертанда (среднее течение Алгамы).

Мохноногий курганник *Buteo hemilasius*. В 1955 году в бассейне реки Учур отмечена одна пара мохноногих курганников (Воробьёв 1963); 16 июня 1977 В.И.Перфильев нашёл гнездо с 3 яйцами на берегу реки Дежневка (Перфильев 1986).

Беркут *Aquila chrysaetos*. Отмечен 23 августа 2003 в устье Гонама (бассейн реки Учур), 8 августа 2004 в среднем течении Алдана, 2 марта 2000 вблизи города Томмот. По опросным сведениям, на территории РР «Унгра» беркут иногда встречается в репродуктивный период, следовательно, возможно его гнездование.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. 31 мая 2000 одиночная птица встречена в устье реки Мукунда (среднее течение реки Алгама). По сведениям охотника-промысловика С.Г.Симонова, орлана постоянно наблюдали в гнездовой период, в том числе в 2000 году, возле комплекса озёр в устье реки Чайдах (левый приток реки Алгама). По опросным данным, в среднем течении Алдана до 1970-х годов белохвост был обычен в гнездовой период.

Кречет *Falco rusticolus*. По опросным сведениям, в зиму 2004/05

года один сокол держался бассейна рек Джос (среднее течение реки Алгама) и Нуям. Отмечен 27 марта 2005 в устье реки Гертанда.

Сапсан *Falco peregrinus*. В гнездовой период сапсан встречен на территории РР «Суннагино-Силлигилинский»: 22 и 26 августа 2004 на берегу близ устья реки Улахан-Джюлюкян, в 2006 году регулярно с 29 августа по 12 сентября. По сообщению госинспектора Ю.Н.Ковалёва, сапсан в резервате держится постоянно вблизи озёр на участке Заячья. Одиночная птица отмечена в устье реки Тимптон 16 июля 2007.

Дикуша *Falcipennis falcipennis*. Ранее была обычна на среднем Алдане и в низовьях Учура (Воробьёв 1963; Перфильев 1972). В настоящее время дикуша исключительно редкая птица, по опросным сведениям, встречается более или менее часто лишь на Токкинском Становике. По материалам августовских учётов, проведённых в 2003-2004 годах на северной границе распространения (правобережье Алдана), плотность населения составляет в среднем 0.3 ос./10 км^2, в центральной части области обитания (долина реки Гонам) – 1-3 ос./10 км^2. В предгорьях Станового хребта в бассейнах рек Сутам и Алгама (притоки 4-го порядка реки Алдан) зимой 2005 года численность дикуши была крайне низкой – 0.1 ос. /10 км^2. Крайне редко дикуша встречается на западной границе – в долине реки Тимптон.

Стерх *Grus leucogeranus*. В долине реки Алгама 17 мая 2000 отмечен пролёт 11 стерхов. В этом же году, по рассказам местных охотников, первых белых журавлей (стаю из 18 особей) видели двумя днями раньше. По данным опроса, в долине указанной реки птицы встречаются во время весенних миграций постоянно, причём в иные годы несколько дней держатся у комплекса озёр в устьях рек Гертанда и Туксани. По сообщению охотника-любителя Б.В.Рожкова, в конце сентября 2000 года на берегу этого озера на два дня останавливалась стая из 11 журавлей. По наблюдениям госинспектора РР «Большое Токо» Д.И. Макарова, в долине среднего течения Алгамы пролёт стерха осенью более выражен, чем весной, птицы часто отдыхают на косах реки, летят стаями от 4 до 15 особей, в первой декаде октября 2003 года за 1 ч пролетело более 40 особей. В долине реки Унгра, по сообщению госинспектора Б.А.Кочнева, весной 2002 года на пролёте отмечены две стаи из 7 и примерно из 50 особей. В середине лета 1999 и 2000 годов метеоролог А.А.Михалюта вблизи метеостанции «Чюлбе» по реке Учур отметил несколько раз по 3 журавля. В бассейне этой реки в весенний период во время отдыха стерхи встречаются вблизи озера Оньё (сообщение главы общины «Гонам» О.В.Сидорова). По сведениям кадровых охотников Е.В.Панфилова и М.И.Калинина, недалеко от участка Васькина протока (58°29' с.ш. 129°16' в.д.) 28 августа 2006 примерно в 16 ч на берегу реки Алдан отмечены одна взрослая и одна молодая особь.

Серый журавль *Grus grus*. В долине Алгамы серый журавль на

пролёте довольно обычен. По опросным сведениям 1999 года, в конце июля пара с одним птенцом встречена вблизи озера в 10 км ниже по течению от устья реки Гертанда (среднее течение Алгамы). На территории РР «Суннагино- Силлигилинский» серые журавли встречены 10 сентября 2006. Первую стаю журавлей из 28 особей наблюдали в 17 ч на берегу Алдана. Вторая стая из 36 особей в 17 ч 15 мин подсела к первой группе. В среднем течении этой реки на участке Непчики, по сообщению кадрового охотника Г.Измалкова, после 20-х чисел сентября 2004 года, когда перевал был закрыт облаками, скопилось множество гусей и серых журавлей. По опросным сведениям, серый журавль гнездится на верховых болотах в нижнем течении реки Тимптон.

Чёрный журавль *Grus monacha*. Отмечено гнездование вида в долине реки Туксани (в 5 км от устья) 20 июля 2000. На мари встречена пара черных журавлей с одним птенцом. 17 июня 2000 пара журавлей зафиксирована на берегу озера в устье реки Гертанда.

Вальдшнеп *Scolopax rusticolus*. В бассейне среднего течения реки Алгама 10 июня 2000 встречены 2 токующие птицы. Обычный вид на территории РР «Суннагино-Силлигилинский» и «Унгра».

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis*. В долине среднего течения Алгамы обычный гнездящийся вид. Так, в 2000 году в комплексе озёр в устье реки Гертанда постоянно держались 2 пары, 31 июля птенцы уже хорошо летали. 8 птиц держались на этих участках до 18 августа. Единично наблюдали птиц и в других участках по реке Алгама. Летом 2004 года на этом участке гнездилось не менее 2 пар (сообщение охотника Г.И.Иванова). На территориях РР «Унгра» и «Верхнеамгинский» кроншнеп редко встречается в гнездовой период (сообщения госинспекторов А.Г.Ложкина, А.П.Кузнецова).

Филин *Bubo bubo*. В горной части Алданского нагорья, видимо, крайне редкий вид, так как за всё время наблюдений в этой части региона не отмечен. В августе-сентябре 2006 года в долине среднего течения Алдана между озером Куобахтах и участком Васькина протока (территория РР «Суннагино-Силлигилинский») держались 3 птицы.

Воробьиный сычик *Glaucidium passerinum*. На территории РР «Унгра» воробьиный сычик отмечен 5 июня 2009, в сентябре 2001 года встречен близ Томмота (сообщение госинспектора А.П.Кузнецова).

Обыкновенный зимородок *Alcedo atthis*. Отмечен 30 мая 2000 в прибрежном высокоствольном лиственничнике по реке Алгама.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. В бассейне реки Алдан двух птиц наблюдали в начале мая 2004 года (сообщение кадрового охотника В.Кривогорницына). В конце апреля 2006 года и в весенний период 2004 года одиночные скворцы отмечены в окрестностях г. города Нерюнгри (сообщение старшего госинспектора Нерюнгринской районной инспекции охраны природы А.В.Исаева).

Сойка *Garrulus glandarius*. По опросным сведениям, сойки на протяжении последних нескольких лет регулярно встречаются в посёлке Чульман, где появляются в конце сентября – начале октября и держатся в течение 2-3 недель. По опросным данным, в осенне-зимнее время изредка встречаются в среднем течении реки Алдан.

Амурский свиристель *Bombycilla japonica*. В июне 2000 года зафиксирован в качестве гнездящейся птицы в среднем течении реки Алгама, где обитает по лиственничным лесам вдоль рек.

Оляпка *Cinclus cinclus*. По реке Туксани (среднее течение Алгамы) у незамерзающего переката 3 апреля 2000 встречена одиночная особь (Егоров и др. 2002). По опросным сведениям, зимой регулярно встречается по горным речкам, впадающим в Алгаму. 20 июня 2006 одна птица встречена в верховьях реки Левая Унгра. Встречается оляпка и в нижнем течении этой реки (сообщение госинспектора А.Г.Ложкина) и в отдельных случаях остаётся на зимовку на незамерзающих перекатах реки Унгра.

Таёжная мухоловка *Ficedula mugimaki*. Обычный вид в долине среднего течения Алгамы (Егоров и др. 2002). 25 августа 2006 таёжная мухоловка встречена в устье реки Оччугуй Джюкюнде (среднее течение Алдана).

Синий соловей *Luscinia cyane*. Добыт в районе Алдана (Воробьёв 1963). В долине среднего течения Алгамы обычная гнездящаяся птица. Плотность населения в лиственничниках в распадках достигает 7.3 особей на 1 км^2, в прибрежных смешанных лесах – 4.2 ос./км^2. 14 июля 2002 встречена в прибрежном лиственничнике в устье реки Чульмакан (левый приток реки Тимптон).

Соловей-свистун *Luscinia sibilans*. Отмечен в окрестностях города Алдана. На территории РР «Унгра» и «Суннагино-Силлигинский» является обычным видом.

Оливковый дрозд *Turdus obscurus*. Встречается в пойменных лесах среднего течения Алгамы (Егоров и др. 2002). 3 сентября 2004 отмечен в окрестностях города Томмот.

Сибирский дрозд *Zoothera sibirica*. Отмечен в верхнем течении Алдана, в районе устья реки Учур (Воробьёв 1963).

Пёстрый дрозд *Zoothera dauma*. Отмечен в 60 км выше устья реки Учур (Воробьёв 1963). В начале июня 2009 года встречался на территории РР «Унгра».

Серый снегирь *Pyrrhula cineracea*. Найден по среднему течению реки Гыным (Портенко 1963).

Желтобровая овсянка *Emberiza chrysophrys*. Добыта В.К.Воробьёвым (1963) 18 июня 1955 в окрестностях города Алдана. В среднем течении Алгамы этот вид в небольшом количестве гнездится в долинных лесах. В августе 2004 года желтобровая овсянка была обычной в пой-

менных лесах нижнего течения реки Суннагин, в июне-июле 2009 и 2010 годов в среднем течении р. Унгра.

В целом в Алданском нагорье обитает много видов, занесённых в Международные соглашения и Красные книги разного уровня. Так, из 36 видов птиц, занесённых в Красную книгу Республики Саха (Якутия), 5 видов занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, 14 – в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (Приложения 1,2 СИТЕС), 23 – в Боннскую конвенцию охраны мигрирующих видов животных, 16 видов – в Красную книгу Российской Федерации. Из встречающихся в регионе редких видов птиц Якутии 4 вида (дикуша, чёрный журавль, стерх, кречет) относятся к первой категории редкости (Красная книга… 2003).

На данном этапе работ нами сделан акцент на систематизации и обобщении накопленных материалов. В дальнейшем наиболее целесообразным является развитие и совершенствование исследований по изучению дикуши, стерха, скопы и сапсана. Назрел вопрос организации постоянного мониторинга этих птиц. Необходимо расширение исследований по дальнейшему выявлению редких видов животных и изучению их биологии и экологии. В ближайшее время комплексно вместе с экономистами и другими заинтересованными специалистами следует определить приоритетные социально-экономические механизмы, необходимые для сохранения редких видов в регионе. Следует создать базу данных и организовать респондентскую сеть для сбора и анализа информации.

Литература

Воробьёв К.А. 1958. Некоторые результаты орнитологических исследований в Южной Якутии // *Зоол. журн.* **37**, 3: 465-469.

Воробьёв К.А. 1963. *Птицы Якутии*. М.: 1-336.

Егоров Н.Н., Исаев А.П., Находкин Н.А. 2002. Орнитофауна среднего течения р. Алгама // *Наземные позвоночные Якутии: экология, распространение, численность*. Якутск: 42-50.

Исаев А.П., Егоров Н.Н., Находкин Н.А. 2006. Население птиц в районе промышленного освоения Эльгинского каменноугольного месторождения (ср. течение р. Алгама, Южная Якутия) // *Естествознание и гуманизм* **3**, 2: 42-43.

Красная книга Республики Саха (Якутия). Т. II. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 2003. Якутск: 1-205.

Лабутин Ю.В. 1965. К фауне птиц Токкинского заказника // *Природа Якутии*. Якутск:. 120-124.

Лабутин Ю.В., Егоров Н.Н., Исаев А.П. 2009. Распространение скопы *(Pandion haliaetus)* в Якутии // *Зоол. журнал*. **88**, 6: 703-707.

Перфильев В. И. 1986. Новое в орнитофауне Южной Якутии // *Териология, орнитология и охрана природы: тез. докл. 11-го Всесоюз. симп. «Биологические проблемы Севера»*. Якутск, **3**: 164.

Перфильев В.И. 1972. К орнитофауне редких птиц Юго-Восточной Якутии // *Природа Якутии и её охрана*. Якутск: 98-99.

Ревин Ю.В. 1965. Гнездящиеся водоплавающие птицы бассейна р. Токко и состояние их численности // *Природа Якутии и её охрана*. Якутск: 113-119.
Ткаченко М.И. 1924. Распространение некоторых видов птиц по рекам Нижней Тунгуске, Алдану и Мае // *Изв. Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. общ-ва* **47**: 8.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1683**: 5154-5157*

Аистообразные Ciconiiformes Славянского района Краснодарского края

А.А.Гожко, Л.П.Есипенко, А.Н.Хохлов

*Второе издание. Первая публикация в 2007**

Орнитофауна Краснодарского края включает около 320 видов 18 отрядов. Из них по характеру пребывания 42 вида встречаются только на пролёте, 113 относятся к пролётно-гнездящимся, 99 являются оседлыми и 22 вида зимуют (Нагалевский, Чистяков 2003). Наиболее распространёнными являются аистообразные Ciconiiformes, включающие 3 семейства: цаплевые Ardeidae, ибисовые Thresciornitidae и аистовые Ciconiidae. Эти птицы являются неотъемлемым и доминирующим компонентом водно-болотных экосистем. В основном виды данной группы гнездятся колониально, что делает их очень уязвимыми.

Славянский район Краснодарского края включает местность с большим количеством разнообразных мелководных озёр, лиманов, соединительных протоков, ериков, каналов с разнообразными надводным и подводным растительным миром. Весь этот комплекс естественных угодий создаёт благоприятные условия для гнездования колониальных птиц.

Целью наших исследований было изучение размещения, численности и современного состояния аистообразных птиц в Славянском районе Краснодарского края. В работе представлены данные о численности и размещении голенастых в Славянском районе, полученные в результате наших исследований и обобщены данные других исследователей.

При сборе материала использованы стандартные орнитологические методики. Возраст птенцов определялся визуально по состоянию и развитию их оперения и размерам (Спангенберг 1951). Птенцы цапель сохраняют пуховой наряд до 7-10-дневного возраста, в возрасте 7 дней

* Гожко А.А., Есипенко Л.П., Хохлов А.Н. 2007. Видовое разнообразие аистообразных птиц Славянского района Краснодарского края // *Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование*. Ставрополь: 25-28.

у них начинают пробиваться плечевые перья, на ноги они поднимаются в 16 дней, ходят по гнезду уверенно в возрасте 45-50 дней, летают в возрасте 60 дней (Спангенберг 1951; Bauer, Glutz von Blotzheim 1966). Выделено 6 возрастных классов: класс 1 (мелкие пуховые, возраст 1-5 дней); класс 2 (крупные пуховые, возраст 5-10 дней); класс 3 (начало развития оперения, возраст 8-16 дней); класс 4 (полуоперённые, возраст 16-30 дней); класс 5 (полностью оперённые, с остатками пуха на голове, шее, спине, возраст 30-45 дней); класс 6 (слётки, хорошо летают, при опасности покидают гнездо, возраст 45-60 дней) (Кошелев и др. 2005).

Места обитания голенастых птиц исследовались в периоды максимальной гнездовой активности (апрель-июнь), а также в августе-сентябре 2005-2007 годов. Проводились стационарные и маршрутные исследования в основных местах обитания голенастых птиц: лесонасаждение Крымского лесхоза, маршрут Славянск-на-Кубани – посёлок Кучугуры, лиманы Славянской районной общественной организации охотников и рыболовов.

Наиболее распространёнными гнездящимися видами в Славянском районе являются: малая белая цапля *Egretta garzetta*, кваква *Nycticorax nycticorax*, серая *Ardea cinerea* и рыжая *A. purpurea* цапли.

В исследованиях В.П.Белика и М.А.Динкевича (2005) упоминается, что начало гнездования смешанной колонии аистообразных птиц в лесонасаждениях Крымского лесхоза близ станицы Анасгасиевская относится к 1971 году. В тот год в колонии наблюдалось около 100 пар кваквы. К 1982 году гнездилось около 800 пар (Казаков и др. 2004), в 1983 году – 2400 (Ломадзе, Исаков 1986), а в 1987 году – 800, хотя ранее учитывали до 3700 пар (Заболотный, Хохлов 1989а) В колонии наблюдается гнездование малой белой цапли и серой цапли; так, в 1982, 1983, 1984 годах численность малой белой цапли составляла 150, 600 и 310 пар соответственно (Ломадзе, Исаков 1986; Казаков и др. 2004), серой цапли в 1982-1987 годах – 30-95 пар (Ломадзе, Исаков 1986; Казаков и др. 2004).

В 2007 году нами в апреле-мае было установлено, что смешанная колония насчитывает около 807 гнёзд. Из них серой цапли – 398, кваквы – 364 и малой белой цапли – 45 гнёзд. В связи с этим численность колонии составила около 1660 особей: 743 особи кваквы, 816 особей серой цапли и 100 особей малой белой цапли. Замечено, что гнезда серой цапли и кваквы располагались в основном на дубах окружностью 800-1570 мм, на высоте 14-16 м в числе от 1 до 11 гнёзд. А гнёзда малой белой цапли располагались совместно с серой цаплей и кваквами, преимущественно на ясенях и тополях окружностью 60-200 см на высоте 14-17 м. В гнёздах серой цапли находились птенцы 4 класса. 18 августа при обследовании данной колонии установлено, что гнёзда се-

рой цапли и кваквы пустовали. Восточнее данных гнездовий была обнаружена группа голенастых птиц, состоящая из 120-140 особей, представленная кваквой и малой белой цаплей. В данной группе обнаружены птенцы кваквы и малой белой цапли в возрасте 5 класса.

Менее распространёнными и требующими особого внимания к их состоянию в природной среде являются большая белая *Casmerodius albus* и жёлтая *Ardeola ralloides* цапли.

Большая белая цапля зимует в условиях Славянского района около 8-10 лет. Причём зимовка этой цапли периодична. Успешное зимовка в течение 2-3 лет сменяется полным отсутствием зимующих птиц в последующие 1-3 года. Это связано с гибелью практически всей популяции в результате суровых зим. Так, в феврале 2006 года в результате сильных заморозков погибла практически вся популяция зимующих больших белых цапель (Д.Н.Бакута, устн. сообщ.). В 2005 году в лиманах РОООР на маршрутах длиной 5-10 км отмечались до 50 особей (Гожко, Избранова 2005). В апреле 2007 года на побережье Азовского моря близ посёлка Кучугуры регистрировались стайки по 5-7 особей, кормящихся на мелководье.

Жёлтая цапля периодически, раз в 6-8 лет, гнездится в смешанной гнездовой колонии в Крымском лесхозе (Н.Л.Заболотный, устн. сообщ.). В 1971 году в лесхозе их гнездилось 15-20 пар (Ломадзе 1984), а в 1983-1984 – 10-20 пар (Ломадзе, Исаков 1986; Казаков и др. 2004). В апреле 2005 года вдоль дороги от хутора Верхний до посёлка Кучугуры отмечено 11 жёлтых цапель. В 2007 году в районе станицы Анастасиевская наблюдались 2 жёлтые цапли, кормящиеся в рисовой системе.

Крайне редкими, занесёнными в Красную книгу Краснодарского края, являются колпица *Platalea leucorodia*, каравайка *Plegadis falcinellus* и белый аист *Ciconia ciconia*. На территории Славянского района гнездятся колпица и каравайка. В весенне-летний период 2004 года на лимане Гнилой обнаружены 3 гнездовые колонии, в которых на заломах камыша гнездилось несколько сотен караваек и около 15 пар колпиц (Хохлов и др. 2006). В апреле 2007 года на побережье Азовского моря близ посёлка Кучугуры отмечена стая из 35 колпиц, кормящихся на мелководье. В первой декаде августа 2005 года в окрестностях станицы Петровская наблюдалась колония караваек численностью около 250 особей. В августе 2007 года в районе станицы Анастасиевская нами регистрировались стайки караваек в 8-25 особей.

Гнездование белого аиста на территории Славянского района пока ещё не отмечено, но нами регистрировались единичные встречи.

Таким образом, в Славянском районе Краснодарского края отмечено 9 видов Ciconiiformes. Наблюдается гнездование 6 видов: серой цапли, малой и большой белой цапли, кваквы, колпицы, каравайки.

Литература

Гожко А.А., Избранова С.И. 2005. Биолого-экологические особенности аистообразных птиц в условиях Славянского района Краснодарского края // *Сб. краевой науч.-практ. конф. преподавателей и студентов*. Славянск-на-Кубани.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П., Хохлов АН, Тильба П.А, Пишванов Ю.В., Прилуцкая Л.И., Комаров Ю.Н., Поливанов В.М., Емгыль М.Х., Бичерев А.П., Олейников Н.С., Заболотный Н.Л., Кукиш А.И., Мягкова Ю.Я., Гочиев Т.Ю., Гизатулин И.И., Витович О.А., Динкевич М.А. 2004. *Птицы Северного Кавказа*. Т. 1. Гагарообразные, Поганкообразные, Трубконосые, Веслоногие, Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные. Ростов-на-Дону: 1-398.

Кошелев А.И., Кошелев В.А., Пересадько Л.В., Покуса Р.В. 2005. Репродуктивные показатели цапель (Ardeidae) в Северо-Западном Приазовье // *Бранта* **8**: 96-113.

Ломадзе Н.Х. 1984. Голенастые в местах рисосеяния // *Животный мир Калмыкии и сопредельных районов*. Элиста: 58-65.

Ломадзе Н.Х., Исаков В.М. 1986. Устойчивость колониального гнездования голенастых в условиях рисосеяния на Кубани // *Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование*. Л., **2**: 35-37.

Мнацеканов Р.А. (2000) 2014. К гнездованию белого аиста *Ciconia ciconia* в Краснодарском крае // *Рус. орнитол. журн*. **23** (1028): 2306-2307.

Нагалевский Ю.Я., Чистяков В.И. 2003. *Физическая география Краснодарского края: Учебное пособие*. Краснодар: 1-256.

Спангенберг Е.П. 1951. Отряд голенастые птицы Gressores или Ciconiiformes // *Птицы Советского Союза*. М., **2**: 350-475.

Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Заболотный Н.Л., Есипенко Л.П., Хохлов Н.А. 2006. Новые сведения о некоторых птицах низовий Кубани // *Кавказ. орнитол. вестн*. **18**: 288-293.

Bauer K.M, Glutz von Blotzheim U.N. 1966. *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Frankfurt am Main, **1**: 1-620.