ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1686

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII
Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1686

СОДЕРЖАНИЕ

5253-5263 Материалы к фауне пухоедов (Phthiraptera, Amblycera: Ancistronidae, Laemobothriidae, Pseudomenoponidae) птиц Сибири. О. Н. СТЕПАНОВА

5264-5267 Первая встреча чернозобика *Calidris alpina* на пролёте в национальном парке «Себежский». Г. Л. КОСЕНКОВ

5267-5269 Питание домовых воробьёв *Passer domesticus* спелыми плодами сливы *Prunus domestica*. Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ, И. С. ТАБОЛИНА

5269-5274 Коноплянка *Acanthis cannabina* в Предбайкалье: распространение, статус пребывания. А. В. ХОЛИН

5274-5277 Экспансия сороки *Pica pica* в Забайкалье и Амурской области. О. А. ГОРОШКО

5277-5278 Гнездование красношейной поганки *Podiceps auritus* в Байкало-Ленском заповеднике. Н. М. ОЛОВЯННИКОВА

5279-5280 Залёты белоголового сипа *Gyps fulvus* в таёжную зону Западной Сибири. О. Ю. ТЮТЕНЬКОВ

5280-5283 Залёт белоголового сипа *Gyps fulvus* в арктическую тундру Якутии. С. П. ДАВЫДОВ

5283 Новый рекордный возраст травника *Tringa totanus*. А. И. КОРЗЮКОВ, О. А. ФОРМАНЮК, П. С. ПАНЧЕНКО

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования: 25 октября 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992
Volume XXVII
Express-issue
2018 № 1686

CONTENTS

5253-5263 Materials for the fauna of lice (Phthiraptera, Amblycera: Ancistronidae, Laemobothriidae, Pseudomenoponidae) of birds of Siberia. O. N. STEPANOVA

5264-5267 The first record of the dunlin *Calidris alpina* on migration in the national park «Sebezhsky». G. L. KOSENKOV

5267-5269 Feeding of house sparrows *Passer domesticus* on ripe fruits of the common plum *Prunus domestica*. N. N. BEREZOVIKOV, I. S. TABOLINA

5269-5274 The linnet *Acanthis cannabina* in Prebaikalie: distribution, status of stay. A. V. KHOLIN

5274-5277 Expansion of the magpie *Pica pica* in Transbaikalia and Amur region. O. A. GOROSHKO

5277-5278 Breeding of the Slavonian grebe *Podiceps auritus* in nature reserve «Baikalo-Lenski». N. M. OLOVYANNIKOVA

5279-5280 Vagrant griffon vulture *Gyps fulvus* in the taiga zone of Western Siberia. O. Y. TYUTEN'KOV

5280-5283 Vagrant griffon vulture *Gyps fulvus* in the arctic tundra of Yakutia. S. P. DAVYDOV

5283 New longevity record for the redshank *Tringa totanus*. A. I. KORZYUKOV, O. A. FORMANYUK, P. S. PANCHENKO

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1686**: 5253-5263*

Материалы к фауне пухоедов (Phthiraptera, Amblycera: Ancistronidae, Laemobothriidae, Pseudomenoponidae) птиц Сибири

О.Н.Степанова

Ольга Николаевна Степанова. Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН. Проспект Ленина, д. 41, Якутск, 677980, Россия. E-mail: stepon72@yandex.ru

Поступила в редакцию 15 октября 2018

Пухоеды (Insecta, Phthiraptera), согласно современной систематике (Barkers *et al*. 2003; Smith 2003), представляют собой группу мелких паразитических насекомых отряда Phthiraptera, обитающих на всех современных отрядах птиц. В Сибири основателем планомерного изучение пухоедов является Д.И.Благовещенский (1948). Существенный вклад в изучении пухоедов птиц Сибири внесён и многими другими исследователями (Киселёва 1948; Васюкова 1978, 1986, 1994; Васюкова, Федоренко 1979; Васюкова, Сидоров, Ермолаев 1980; Гермогенов, Сидоров, Васюкова 1980; Федоренко, Васюкова 1981, 1985; Эйхлер, Васюкова 1981; Федоренко, Сонин 1984; Васюкова, Сидоров 1986; Васюкова, Борисов, Исаев, Яковлев 1996; Eichler, Vasjukova 1980, 1981a,b; Степанова 2007, 2011, 2016, 2017). В результате этих исследований фауна пухоедов птиц Сибири оказалась достаточно хорошо изученной, чтобы появилась возможность обобщить её в виде ряда работ, что позволит существенно расширить представление о разнообразии и распространении пухоедов на такой большой территории, как Сибирь.

В этот обзор включено 47 видов пухоедов 6 родов из 3 семейств – Ancistronidae, Laemobothriidae и Pseudomenoponidae подотряда Amblycera. Систематика пухоедов приведена в соответствие с работами Емерсона (Emerson 1972) и Злоторжицкой (Zlotorzycka 1964a,b,c). Ниже приводим перечень видов пухоедов в пределах подотряда Amblycera, по возможности с указанием распространения видов в мировом масштабе.

Подотряд AMBLYCERA Kellogg, 1896

Семейство Ancistronidae Harrison, 1915

Род *Actornithophilus* Ferris, 1916

Actornithophilus bicolor (Piaget, 1880)

Типовой вид хозяина: *Arenaria interpres* (L., 1758).

Распространение: в Сибири паразит зарегистрирован на *Arenaria interpres oahuensis* (Bloxham, 1826). Также известен в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Palma, Jensen 2005).

Actornithophilus flavipes (Giebel, 1874)

Типовой вид хозяина: *Pluvialis squatarola* (L., 1758).

Распространение: в Сибири паразитирует на типовом хозяине. Вид известен на Чукотке (Тихонравова, Федоренко 1980), в Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972), Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackman 1973; Zlotorzycka 1980).

Actornithophilus flumineus Clay, 1962

Типовой вид хозяина: *Actitis hypoleucos* (L., 1758).

Распространение: в Сибири паразитирует на типовом хозяине. Также отмечался в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Eichler, Hackman 1973; Zlotorzycka 1980; Martín Mateo 2006), Средней Азии (Федоренко, Эминов 1975).

Actornithophilus gracilis (Piaget, 1880)

Типовой вид хозяина: *Vanellus vanellus* (L., 1758).

Распространение: в Сибири паразитирует на типовом хозяине, ранее отмечен в Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972), Европе (Palma, Jensen 2005).

Actornithophilus laveni Eichler, 1953

Типовой вид хозяина: *Charadrius hiaticula* L., 1758.

Распространение: в Сибири вид распространяется на *Ch. hiaticula tundrae* Lowe, 1915. Встречается также в Европе (Zlotorzycka 1980) и Северной Америке (Emerson 1972).

Actornithophilus limarius Clay, 1962

Типовой вид хозяина: *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823).

Распространение: в Сибири паразитирует на типовом хозяине, ранее был отмечен на Чукотке (Тихонравова, Федоренко 1980), в Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972).

Actornithophilus lyallpurensis Ansari, 1956

Типовой вид хозяина: *Tringa ochropus* L., 1758.

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, известен в Европе (Федоренко 1973; Zlotorzycka 1980), Индии (Das *et al*. 2000) и Средней Азии (Благовещенский 1951; Федоренко, Эминов 1975).

Actornithophilus ochraceus (Nitzsch, 1818)

Типовой вид хозяина: *Pluvialis apricaria* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран с широкого круга хозяев: *Pluvialis fulva* (Gmelin, 1789), *Pluvialis dominica* (Muller, 1776), *Eudromias morinellus* (L, 1758) и *Vanellus vanellus* (L, 1758). Известен так же в Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972) на различных видах ржанкообразных, также в Европе (Palma, Jensen 2005) и в Средней Азии (Благовещенский 1951).

Actornithophilus paludosus Clay, 1962

Типовой вид хозяина: *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Вид отмечался в Северной Америке(Emerson 1972), Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), Индии (Das *et al*. 2000) и Средней Азии (Благовещенский 1948).

Actornithophilus patellatus (Piaget, 1890)

Типовой вид хозяина: *Numenius arquata* (L., 1758).

Распространение: в Сибири встречен на типовом хозяине. Известен также в Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972) и Индии (Das *et al*. 2000).

Actornithophilus perrarus Blagoveshtchensky, 1948

Типовой вид хозяина: *Charadrius dubius* Scopoli, 1786.

Распространение: в Сибири собран на *Ch. d. curonicus* Gmelin, 1789.

Actornithophilus piceus lari (Packard, 1870)

Типовой вид хозяина: *Larus marinus* L., 1758.

Распространение: в Сибири обнаружен на чайках *Larus argentatus* sensu lato, *L. minutus* Pallas, 1776 и *Rhodostethia rosea* (MacGillivray, 1842). Вид распространён в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980; Tomas *et al*. 2016), Австралии (Stranger, Palma 1998), Средней Азии (Щербинина 1966).

Actornithophilus piceus piceus (Denny, 1842)

Типовой вид хозяина: *Thalasseus sandvicensis* (Latham, 1787).

Распространение: в Сибири паразит собран на *Sterna hirundo* L., 1758, *Chlidonias niger* L., 1758; *Ch. leucopterus* (Temminck, 1815) и *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770).Отмечен в Европе (Федоренко 1970; Zlotorzycka 1980), Турции (Dik *et al*. 2011), Австралии (Stranger, Palma 1998) и Северной Америке(Emerson 1972).

Примечание: взгляды в отношении видовых и подвидовых уровней рода *Actornithophilus*, паразитирующих на разных видах крачек, существенно различаются. Если Эмерсон (Emerson 1972) относит формы с широкого круга хозяев к *Actornithophilus piceus piceus*, то Злоторжицкая (Zlotorzycka 1990) описывает новые подвиды: *A. piceus negroidales* со *Sterna hirundo hirundo*, *A. piceus sperabilis* – со *Sterna albifrons albifrons* и признаёт в качестве подвида описанный ранее как самостоятельный вид *Actornithophilus (Colpocephalum) maurus* (Nitzsch, Giebel 1866). В связи с тем, что мы не располагаем по этому роду достаточно большим сравнительным материалом, то относим пухоеда с разных видов крачек к поликсенной форме.

Actornithophilus pustulosus (Piaget, 1880)

Типовой вид хозяина: *Philomachus pugnax* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Вид отмечался в Северной Америке(Malcomson 1960; Emerson 1972), Европе (Федоренко 1973; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), Южной (Dik *et al.* 2011) и Средней Азии (Федоренко, Эминов 1975), Чукотке (Тихонравова, Федоренко 1980).

Actornithophilus spinulosus (Piaget, 1880)

Типовой вид хозяина: *Limosa limosa* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Отмечен также в Северной Америке (Malcomson 1960), Европе (Харамбура 1971; Seguy 1944; Zlotorzycka 1980).

Actornithophilus stictus (Kellogg, Paine, 1911)

Типовой вид хозяина: *Gallinago gallinago* (L.,1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Отмечен в Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), Северной Америке(Malcomson 1960; Emerson 1972).

Actornithophilus totani (Schrank, 1803)

Типовой вид хозяина: *Tringa totanus* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на *Tringa erythropus* (Pallas, 1764), *T. glareola* L., 1758, *T. stagnatilis* (Bechstein, 1803), *T. totanus ussuriensis* Buturlin, 1934. Ранее этот вид отмечался в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Федоренко, Сребродольская 1964; Palma, Jensen 2005), Средней Азии (Благовещенский 1948; Федоренко, Эминов 1975).

Actornithophilus umbrinus (Burmeister, 1838)

Типовой вид хозяина: *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775), *Phalaropus fulicarius* (L., 1758), *Calidris minuta* (Leisler, 1812), *C. temminckii* (Leisler, 1812), *C. acuminata* (Horsfield, 1821), *C. alpina* L., 1758, *C. melanotos* (Vieillot, 1819) и *C. subminuta* (Middendorff, 1851). Отмечен ранее на Чукотке с разных видов куликов (Тихонравова, Федоренко 1980), в Африке (Seguy 1944; Balat 1953), Северной Америке (Emerson 1972), Южной Америке (Haasel, Alava 2014), Европе (Федоренко 1967, 1973; Zlotorzycka 1980; Palma, Jensen 2005; Tomas *et al.* 2016), Индии (Das *et al.* 2000), в Японии (Seguy 1944), Турции (Dik *et al.* 2011), Средней Азии (Благовещенский 1948; Федоренко, Эминов 1975).

Примечание: на разных видах хозяев возможно установление подвидовых форм паразита.

Actornithophilus uniseriatus (Piaget, 1880)

Типовой вид хозяина: *Recurvirostra avosetta* L., 1758.

Распространение: в Сибири найден на типовом хозяине.

Род *Austromenopon* Bedford, 1939

Austromenopon aegialitidis (Durrant, 1906)

Типовой вид хозяина: *Charadrius vociferus* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на *Pluvialis dominica* Muller, 1776 , *Charadrius hiaticula* L., 1758, *Pluvialis fulva* (Gmelin, 1789). Распространён на Чукотке (Тихонравова, Федоренко 1980), в Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), Северной Америке (Emerson 1972), Австралии (Stranger, Palma 1998).

Austromenopon alpinum Timmermann, 1954

Типовой вид хозяина: *Calidris alpina* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на *Calidris alpina centralis* Buturlin, 1932. Известен на Чукотке (Тихонравова, Федоренко 1980), в Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972), Турции (Dik *et al*. 2011).

Austromenopon atrofulvum (Piaget, 1880)

Типовой вид хозяина: *Thalasseus bergi* (Lichtenstein, 1823).

Распространение: в Сибири собран на *Sterna hirundo* L., 1758., *S. h. minussensis* Sushkin, 1925 и *S. h. longipennis* Nordmann, 1835, а также на *Chlidonias niger* (L., 1758) и *Ch. leucopterus* (Temminck, 1815). Распространён в Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972), Австралии (Stranger, Palma 1998), Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980), Турции (Dik *et al*. 2011), Средней Азии (Щербинина 1966, 1968).

Austromenopon confine Blagoveshtchensky, 1948

Типовой вид хозяина: *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817.

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине.

Austromenopon corporosum (Kellogg, Kuwana, 1900)

Типовой вид хозяина: *Phalaropus fulicarius* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине.

Austromenopon crocatum (Nitzsch, 1866)

Типовой вид хозяина: *Numenius arquata* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на *Numenius arquata orientalis* Brehm, 1831. Вид известен в Европе (Федоренко 1967), Индии (Das *et al*. 2000).

Austromenopon decorosum Zlotorzycka, 1968

Типовой вид хозяина: *Tringa erythropus* (Pallas, 1764).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в Европе (Palma, Jensen 2005).

Austromenopon durisetosum (Blagoveshtchensky, 1948)

Типовой вид хозяина: *Gallinago gallinago* (L., 1758).

Распространение: в Сибири известен на типовом хозяине. Известен в Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980) и Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972).

Austromenopon fuscofasciatum (Piaget, 1880)

Типовой вид хозяина: *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Распространён в Европе (Sequy 1944; Zlotorzycka 1980; Palma, Jensen 2005), Северной Америке с разных видов хозяев (Malcomson 1960; Emerson 1972).

Austromenopon hystriculum Zlotorzycka, 1968

Типовой вид хозяина: *Actitis hypoleucos* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в Европе (Zlotorzycka 1972) и Средней Азии (Благовещенский 1951).

Austromenopon icterum (Burmeister, 1838)

Типовой вид хозяина: *Scolopax rusticola* L., 1758.

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в Европе (Федоренко 1967; Zlotorzycka 1980), Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972).

Austromenopon limosae Timmermann, 1954

Типовой вид хозяина: *Limosa limosa* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в Европе (Zlotorzycka 1980), Северной Америке (Malcomson 1960), Индии (Das *et al*. 2000).

Austromenopon lutescens (Burmeister, 1838)

Типовой вид хозяина: *Philomachus pugnax* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775), *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803), *T. glareola* L., 1758, *T. ochropus* L., 1758, *T. nebularia* (Gunnerus, 1767), *T. totanus ussuriensis* Buturlin, 1934, *Philomachus pugnax* L., 1758, Ранее известен в Европе (Palma, Jensen 2005; Tomas *et al*. 2016), Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972), Турции (Dik *et al*. 2011), Средней Азии (Благовещенский 1951).

Austromenopon micrandum (Nitzsch, 1866)

Типовой вид хозяина: *Recurvirostra avosetta* L. 1758.

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Встречается в Австралии (Stranger, Palma 1998).

Austromenopon phaeopodis (Schrank, 1802)

Типовой вид хозяина: *Numenius phaeopus* (L. 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в

Европе (Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980; Palma, Jensen 2005), Северной Америке (Malcomson 1960; Emerson 1972) и в Новой Зеландии (Pilgrim, Palma 1982).

Austromenopon spenceri Timmermann, 1956

Типовой вид хозяина: *Phalaropus lobatus* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Вид известен в Европе (Федоренко 1967; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980) и Северной Америке (Emerson 1972).

Austromenopon squatarolae Timmermann, 1954

Типовой вид хозяина: *Pluvialis squatarola* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине. Известен в Северной Америке (Emerson 1972) и Европе (Palma, Jensen 2005).

Austromenopon transversum (Denny, 1842)

Типовой вид хозяина: *Rissa tridactyla* (L., 1758).

Распространение: в Сибири отмечен на *Larus minutus* Pallas, 1776, *L. ridibundus* L., 1766. Вид известен в Европе (Федоренко 1969; Eichler, Hackmann 1973; Zlotorzycka 1980; Palma, Jensen 2005; Martin Mateo 2006), Северной Америке (Emerson 1972), Австралии (Stranger, Palma 1998) и Средней Азии (Благовещенский 1951).

Austromenopon vanelli Zlotorzycka, 1968

Типовой вид хозяина: *Vanellus vanellus* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине.

Род *Holomenopon* Eichler, 1941

Holomenopon bucephalae Price, 1971

Типовой вид хозяина: *Bucephala albeola* L., 1758.

Распространение: в Сибири собран на *Bucephala clangula* L., 1758. Известен в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Palma, Jensen 2005).

Holomenopon clypeilargum Eichler, 1943

Типовой вид хозяина: *Anas acuta* L., 1758.

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, *Anas platyrhynchos* L., 1758, *A. crecca* L., 1758, *A. penelope* L., 1758, *A. clypeata* L., 1758, *A. querquedula* L., 1758, *A. formosa* Georgi, 1775, *A. falcata* Georgi, 1775, *Mergus albellus* L., 1758, *Aythya fuligula* (L., 1758), *A. marila* (L., 1761); *Bucephala clangula clangula* L., 1758; *Clangula hyemalis* (L., 1758); *Histrionicus histrionicus* (L., 1758). Отмечен также в Северной Америке (Price 1971; Emerson 1972), Европе (Zlotorzycka 1980; Martin Mateo 2006), Индии (Das *et al*. 2000).

Holomenopon leucoxanthum (Burmeister, 1838)

Типовой вид хозяина: *Anas crecca crecca* L., 1758.

Распространение: в Сибири собран с *Anas acuta* L., 1758, *Clangula hyemalis* (L., 1758), *Aythya fuligula* L.,1758, *A. marila* (L., 1761), *A. ferina* (L., 1758), *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769). Данный вид пухоеда неоднократно собирался на разных видах гусеобразных в Северной Америке (Brander 1969; Emerson 1972), в Европе (Emerson 1972; Price 1971; Palma, Jensen 2005; Martín Mateo 2006), Индии (Ahmad *et al*. 2014), Средней Азии (Благовещенский 1951).

Holomenopon loomisii (Kellogg, 1896)

Типовой вид хозяина: *Melanitta fusca* (L., 1758).

Распространение: в Сибири паразитирует на *Melanitta deglandi stejnegeri* Ridgway, 1887. Известен в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Price 1971; Palma, Jensen 2005).

Holomenopon setigerum (Blagoveshtchensky, 1948)

Типовой вид хозяина: *Anas clypeata* L., 1758.

Распространение: в Сибири собран на типовом хозяине, а также на *Aythya fuligula* (L., 1758), *Anas penelope* L., 1758, *A. platyrhynchos* L., 1758; *A. acuta* L., 1758. Известен в Северной Америке (Price 1971; Emerson 1972), Европе (Martín Mateo 2006), Индии (Das *et al*. 2000).

Holomenopon tadornae (Gervais, 1844)

Типовой вид хозяина: *Tadorna tadorna* (L., 1758).

Распространение: в Сибири собран на *Branta bernicla* (L., 1758), *B. nigricans* (Lawrence, 1846). В России известен в Закавказье (Васюкова, Комаров 1997). Также отмечен в Северной Америке (Emerson 1972), Европе (Price 1971), Индии (Das *et al*. 2000).

Семейство Laemobothriidae Mjöberg, 1910

Род *Laemobothrion* Nitzsch, 1818

Laemobothrion maximum (Scopoli, 1763)

Типовой вид хозяина: *Buteo buteo* (L., 1758).

Распространение: в Сибири отмечен на *Milvus migrans lineatus* Gray, 1831. Был отмечен в Турции (Esatgil *et al*. 2012).

Laemobothrion tinnunculi (Linnaeus, 1758)

Типовой вид хозяина: *Falco tinnunculus* L., 1758.

Распространение: в Сибири собран на *Circus aeruginosus aeruginosus* (L., 1758) и *C. macrourus* Gmelin, 1771. Ранее известен в Северной Америке (Emerson 1972) и Европе (Adam *et al*. 2009).

Семейство PSEUDOMENOPONIDAE Eichler, 1937

Род *Pseudomenopon* Mjöberg, 1910

Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763)

Типовой вид хозяина: *Fulica atra* L., 1758.

Распространение: в Сибири вид собран на типовом хозяине. Встречается в Северной Америке (Emerson 1972), Индии (Das *et al*. 2000) и Европе (Palma, Jensen 2005).

Статья выполнена в рамках проекта № АААА-А17-117020110058-4 «Структура и динамика популяций и сообществ животных холодного региона Северо-Востока России в современных условиях глобального изменения климата и антропогенной трансформации северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, сохранение».

Литература

Благовещенский Д.И. 1948. Mallophaga с птиц Барабинских озёр // *Паразитол. сб.* **10**: 259-294.

Благовещенский Д.И. 1951. Mallophaga Таджикистана // *Паразитол. сб.* **13**: 272-327.

Васюкова Т.Т. 1978. Эктопаразиты уток рода *Anas* в Центральной Якутии // *Водно-болотные виды птиц долины средней Лены*. Якутск: 90-103.

Васюкова Т.Т. 1986. *Пухоеды (Mallophaga) водно-болотных птиц Якутии*. Якутск: 1-116.

Васюкова Т.Т., Сидоров Б.И. 1986. Сведения о фауне пухоедов (Mallophaga) оседлых птиц Центральной Якутии // *Биологические проблемы Севера (Тез. докл. 9-го Всесоюз. симп.)*. Якутск, **4**: 126-127.

Васюкова Т.Т. 1994. Зональные особенности фауны и численности эктопаразитов птиц // *Успехи соврем. биол.* **114**, 2: 240-255.

Васюкова Т.Т., Борисов З.З., Исаев А.П., Яковлев Ф.Г. 1996. Эколого-фаунистические особенности эктопаразитов (пухоеды и перьевые клещи) птиц Верхоянья // *Успехи соврем. биол.* **116**, 5: 607-620.

Васюкова Т.Т., Комаров Ю.Е. 1997. Материалы к фауне пухоедов и перьевых клещей некоторых видов птиц республики Северная Осетия – Алания // *Кавказ. орнитол. вестн.* **9**: 5-19.

Васюкова Т.Т.,, Федоренко И.А. 1979. Фауна пухоедов (Mallophaga) куликов долины среднего течения р. Лены // *Миграции и экология птиц Сибири*. Якутск: 205-206.

Васюкова Т.Т., Сидоров Б.И., Ермолаев С.А. 1980. Эктопаразиты дятлов Якутии // *Бюл. науч.-тех. информации*. Якутск, декабрь: 19-21.

Гермогенов Н.И., Сидоров Б.И., Васюкова Т.Т. 1980. Эктопаразиты полевого воробья Центральной Якутии // *Бюл. науч.-тех. информации*. Якутск, апрель: 25-27.

Киселёва Е.Ф. 1948. К фауне пухоедов (Mallophaga) птиц Томского района // *Учён. зап. Томск. ун-та* **11**: 41-46.

Степанова О.Н. 2007. Фауна пухоедов (Mallophaga) зимующих птиц Якутии // *Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии*. Улан-Удэ: 197-199.

Степанова О.Н. 2011. Состав и численность пухоедов (Mallophaga) охотничье-промысловых птиц Якутии // *Птицы Сибири: структура и динамика фауны, населения и популяций*. М.: 317-324.

Степанова О.Н. 2016. Фауна и численность пухоедов (Insecta: Phthiraptera), паразитирующих на оседлых видах воробьинообразных птиц (Aves: Passeriformes) Якутии // *Паразитология* **50**, 5: 387-394.

Степанова О.Н. 2017. Пухоеды горбоносого турпана *Melanitta deglandi* в северо-западной части Якутии // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1522): 4633-4636.

Тихонравова Т.С., Федоренко И.А. 1980. Материалы по фауне пухоедов (Mallophaga) птиц Чукотского полуострова // *Исследования по энтомофауне Северо-Востока СССР*. Владивосток: 154-167.

Толстенков О.О., Матюхин А.В. 2009. К фауне пухоедов серой вороны (*Corvus cornix* L.), зимующей на территории Москвы // *Вестн. Мордов. ун-та* 1: 93-94.

Толстенков О.О., Алексеев А.Н., Дубинина Е.В. 2009. Пухоеды-гематофаги (Insecta, Phthiraptera, Amblycera) и клещи (Acari, Ixodes) перелётных птиц Куршской Косы // *Поволжский экол. журн*. 4: 327-336.

Федоренко И.А. 1967. Пухоеды куликов Северного Причерноморья. Подотряд Amblycera // *Вестн. зоол.* 6: 43-50.

Федоренко И.А. 1969. Фауна пухоедов птиц отряда чайкообразных Северного Причерноморья // *Вестн. зоол*. 6: 43-50.

Федоренко І.О. 1973. Фауна пухоїдів мисливсько-промислових птахів в УССР // *Паразити, паразитози та шляхи їх ліквідації*. Київ:, **2**: 92-95.

Федоренко И.А., Волков В.И. 1977. Фауна и экология пухоедов птиц Приамурья // *Биография Приамурья* **4**: 111-125.

Федоренко И.А., Васюкова Т.Т. 1981. Описание нового вида Amyrsidea Ewing (Mallophaga, Somaphantidae) // *Насекомые и клещи Сибири. Новые малоизвестные виды фауны Сибири*. Новосибирск: 109-110.

Федоренко И.А., Васюкова Т.Т. 1985. Новый вид пухоеда рода *Philopterus* (Mallophaga, Philopteridae) с сероголовой гаички из Якутии // *Вестн. зоол*. 2: 22-23.

Федоренко И.А., Сонин В.Д. 1983. К фауне пухоедов птиц (Mallophaga) восточной Сибири // *Экология позвоночных животных Восточной Сибири*. Иркутск: 121-139.

Федоренко И.А., Сребродольская Н.И. 1964. К фауне пухоедов болотных и водоплавающих птиц Западного Полесья // *Проблемы паразитологии*. Киев, **3**: 227-232.

Федоренко И.А., Эминов А.К. 1975. К фауне пухоедов (Mallophaga) куликов Южной Туркмении // *Изв. АН ТуркмССР*. Сер. биол. 1: 82-89.

Щербинина О.Х. 1966. Mallophaga с лимнадофильных птиц Каракумского канала // *Изв. АН ТуркмССР*. Сер. биол. 5: 59-64.

Щербинина О.Х. 1968. К фауне пухоедов крачек Туркмении // *Изв. АН ТуркмССР*. Сер. биол.: 107-123.

Эйхлер В., Васюкова Т.Т. 1981. Новый вид пухоеда рода *Docophorulus* Eichler, 1944 (Mallophaga, Philopteridae) с белокрылого клеста *Loxia leucoptera bifasciata* // *Энтомол. обозр*. **60**, 3: 620-622.

Adam C., Chisamera G., Daroczi S.Z., Sandor A.D., Gogu-Bogdan M. 2009. Data on the chewing louse fauna (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from some wild and domestic birds of Romania // *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»* **52**: 177-232.

Ahmad A., Gupta N.S., Gupta D.K. 2014. First record of *Holomenopon leucoxanthum* on Domestic Ducks, *Anas platyrhynchos* (Aseriformes: Anatidae) from India // *Bioinfolet* **11** (2A): 364-366.

Balat Fr. 1953. Mallophaga zjištěná na ptácích Moravy a Slovenska // *Spisy Vydáané Přírodově deckou Facultou Masarykovy University* (Brno) **6**: 169-176.

Barkers S.C., Whiting M., Johnson K.P., Murrel A. 2003. Phylogeny of the lice (Insecta, Phthiraptera) inferred from small subunit rRNA // *Zoologica Scripta* **32**, 5: 407-414.

Brander T. 1969.Tutkimus Soumen väiveistä, Mallophaga // *Lounais – Hämeen Luonto* **2**: 1-16.

Das B.C., Chattopadaya A., Datta A.L. 2000. A list of Menoponidae (Phthiraptera) from India // *Records Zool. survey of India* **98**, 3: 111-137.

Dik B., Yamac E.E., Uslu U. 2011. Chewing lice (Phthiraptera) found on wild birds in Turkey // *Kafkas Univ.Veter. Fak. Derg*. **17**, 5: 787-794.

Eichler Wd., Hackmann W. 1973. Finnische Mallophagen. I. Geschichtlicher Überblick über die Mallophagenforschung in Finnland, Enumeratio Mallophagorum Fenniae, Bibliographie der gesamten Finnischen Mallophagenliteratur // *Lounais – Hämeen Luonto*. **46**: 78-104.

Eichler Wd., Vasjukova T.T. 1980. Die Mallophagengattung *Anaticola* (Phthiraptera, Mallophaga) // *Dtsch. Entomol. Zeit*. (Berlin) **27**, 4/5: 335-375.

Eichler Wd., Vasjukova T.T. 1981a. Die Mallophagengattung *Trinoton* // *Mitt. Zool. Mus. in Berlin* **57**, 1: 23-62.

Eichler Wd., Vasjukova T.T. 1981b. Mallophagen von *Tetrao parvirostris* (Phthiraptera, Mallophaga) // *Dtsch. Entomol. Zeit*. (Berlin) **28**, 4/5: 231-237.

Emerson K.C. 1972. *Checklist of the Mallophaga of North America (North of Mexico). Suborder Amblycera*. Dugway, **2**: 1-118.

Esatgil M.U., Efil I.I., Tuzer E. 2012. Two chewing lice species, *Colpocephalum subzerafae* and *Laemobothrion tinnunculi*, on a kestrel *(Falco tinnunculus)* in Istanbul: two new records from Turkey // *Kafkas. Univ. Vet. Fak. Derg*. **18**: 241-244.

HaaseL.B., Alava J.J. 2014. First records of chewing lice (Phthiraptera: Menoponidae) in Pacific migratory shorebirds wintering in Ecuador // *Braz. J. Vet. Parasitol*. **23**, 1: 260-263.

Malcomson R.O. 1960. Mallophaga from birds of North America // *Wilson Bull*. **72**, 2: 182-197.

Martín Mateo M.P. 2006. Diversidad y distribucion de las especies de Mallophaga (Insecta) en aves y mamiferos de la comunidad de Madrid // *Graellsia* **62**: 21-32.

Palma R.L., Jensen J.-K. 2005. Lice (Insecta: Phthiraptera) and their host associations in the Faroe Islands // *Steenstrupia* **29**, 1: 49-73.

Pilgrim R.L.C., Palma R.L. 1982. A list of the chewing lice (Insecta: Mallophaga) from birds in New Zealand // *Nat. Mus. New Zealand Miscellaneous ser*. **6**: 1-32.

Price R.D. 1971. A review of the genus *Holomenopon* (Mallophaga: Menoponidae) from the Anseriformes // *Ann. Entomol. Soc. Amer*. **64**, 3: 633-646.

Sequy E. 1944. Insectes ectoparasites (Mallophages, Anoploures, Siphonapteres) // *Faune de France*. Paris, **43**: 23-407.

Smith V.S. 2003. Lousy phylogenies: Phthiraptera systematics and the antiquity of lice // *Proc. 1st Dresden Meeting on Insect Phylogen*: 150-151.

Stranger R.H., Palma R.L. 1998. Lice (Insecta: Phthiraptera) from some Australian birds // *Records of the Western Australian Museum* **19**: 169-186.

Tomas A., Palma R.L., Fonseca I.P. 2016. Chewing lice (Phthiraptera) from wild birds in Southern Portugal // *Parasitol. Int*. **65**, 3: 295-301.

Zlotorzycka J. 1964a. Mallophaga parasitizing Passeriformes and Pici. Subfamilia Dennyinae, Machaerilaeminae, Colpocephalinae // *Acta parasitol*. **12** (17): 165-192.

Zlotorzycka J. 1964b. Mallophaga parasitizing Passeriformes and Pici. Brueeliinae // *Acta parasitol.* **12** (24): 239-282.

Zlotorzycka J. 1964c. Mallophaga parasitizing Passeriformes and Pici. Philopterinae // *Acta parasitol.* 12 (37): 401-430.

Zlotorzycka J. 1972. *Klucze do oznaczania owadow Polski. Wszoly. Mallophaga. Czesc ogólna oraz nadrodziny Gyropoidea i Laemobothrioidea*. Warszawa, **15**, 1: 1-57.

Zlotorzycka J. 1980. *Klucze do oznaczania owadow Polski. Wszoly. Mallophaga. Nadrodzyna Philopteroidae*. Warsava; Wroclaw: 1-86.

Zlotorzycka J. 1990. *Katalog fauny pasozytniczej Polski*. Warszawa, **4**, 3: 1-368.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1686**: 5264-5267*

Первая встреча чернозобика *Calidris alpina* на пролёте в национальном парке «Себежский»

Г.Л.Косенков

Геннадий Леонидович Косенков. Национальный парк «Себежский».
Ул. 7 Ноября, 22, Себеж, Псковская область, 182250, Россия. E-mail: kraeved09@yandex.ru

Поступила в редакцию 22 октября 2018

13 сентября 2018 я наблюдал на пролёте группу чернышей *Tringa ochropus* из 5 птиц, кормившихся на обмелевших участках в северо-восточной части озера Ормея (56°06′10′′ с.ш., 28°17′08′′ в.д.), густо поросших харовыми водорослями (рис. 1). Это место находится в Псковском Поозерье, на юго-западе национального парка «Себежский», на границе с Витебской областью Белоруссии.



Рис. 1. Отмель в северо-восточной части озера Ормея. Себежский район, Псковская область.

Во время моего наблюдения черныши регулярно извлекали из растительности и склёвывали каких-то моллюсков, не проявляя при этом видимого беспокойства от моего присутствия. Они кормились недалеко друг от друга, подходя иногда вплотную к своим соседям, но не проявляя к ним никаких признаков агрессии.

Одна из птиц в группе куликов выделялась меньшими размерами и другими пропорциями тела, а также особенностями окраски. В поисках корма она перемещалась вдоль всего участка мелководья, погружаясь в воду иногда по самую грудь. При ближайшем рассмотрении этот кулик оказался чернозобиком *Calidris alpina* (рис. 2).



Рис. 2. Чернозобик *Calidris alpina* (слева) и черныш *Tringa ochropus*.
Озеро Ормея. 13 сентября 2018. Фото автора.

Правда, вопрос о подвидовой принадлежности встреченного чернозобика остаётся открытым, хотя по внешним признакам и географической локализации места встречи птицы (Мальчевский, Пукинский 1983; Коблик, Редькин, Архипов 2006; Мищенко, Суханова 2017) можно предположить, что это малый чернозобик *C. a. schinzii* (C.L.Brehm, 1822), внесённый в Красные книги Российской Федерации (2001) и Псковской области (2014). Судя по всему, этот чернозобик – молодая птица во время незавершённой линьки: в частности, обращает на себя внимание опятнённость его груди и передней части брюха, а перья на верхней стороне тела имеют каймы соломенно-каштанового цвета; участок с чёрным опятнением на брюхе небольшой и плохо просматривается из-за линьки в зимний наряд (рис. 2, 3).



Рис. 3. Кормящийся чернозобик *Calidris alpina*. Озеро Ормея. 13 сентября 2018. Фото автора.

Для территории национального парка «Себежский» это первая регистрация чернозобика. В соседнем Белорусском Поозерье чернозобик известен как очень редкий нерегулярно гнездящийся вид на Браславских озёрах (Дорофеев и др. 1982; Козлов 2005), однако бродячие и пролётные особи могут быть встречены на всей территории Белоруссии (Никифоров и др. 1997).

Литература

Дорофеев А.М., Козлов В.П., Кузьменко В.Я. 1982. Фауна куликов Белорусского Поозерья // *Орнитология* **17**: 164.

Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-256.

Козлов В.П. 2005. Гнездование чернозобика *Calidris alpina* в Белорусском Поозерье // *Рус. орнитол. журн.* **14** (302): 975.
Красная книга Псковской области. 2014. Псков: 1-544.
Красная книга Российской Федерации (Животные). 2001. М.: 1-862.
Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 1-480.
Мищенко А.Л., Суханова О.В. 2017. Балтийский чернозобик *Calidris alpina schinzii* в России: изменение ареала, состояние популяции и основные факторы, влияющие на динамику численности // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1388): 21-27.
Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тишечкин А.К. 1997. *Птицы Беларуси на рубеже XXI века: Статус, численность, распространение*. Минск: 1-188.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1686**: 5267-5269*

Питание домовых воробьёв *Passer domesticus* спелыми плодами сливы *Prunus domestica*

Н.Н.Березовиков, И.С.Таболина

Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии, Министерство образования и науки. Проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.
E-mail: berezovikov_n@mail.ru
Ирина Сергеевна Таболина. Караганда, Казахстан

Поступила в редакцию 20 октября 2018

В одном из дворов среди 9-этажных зданий микрорайона «Мамыр-4» в западной части города Алматы 23-25 августа 2016 под раскидистым кустом сливы *Prunus domestica* время от времени стали появляться созревшие плоды, рассыпанные как на земле под деревом, так и по асфальтовой дорожке. Осмотр показал, что на них имеются наклёвы, свойственные птицам. Первоначально предполагалось, что это были следы деятельности майн *Acridotheres tristis*, однако утром 26 августа на этот куст сливы был отмечен прилёт стайки из 25-30 домовых воробьёв *Passer domesticus*, состоящей из взрослых и самостоятельных молодых птиц. Рассевшись на ветках в верхней части кроны, они сразу же принялись клевать плоды. Некоторые сливы от частых клевков отрывались и падали на асфальт. Прилёты воробьёв на эту сливу продолжались до 30 августа, до тех пор, пока оставшийся урожай плодов с неё не был собран.

Подобный случай наблюдался также в одном из дачных садов Караганды. Здесь 10 и 11 октября 2014 отмечены появления нескольких домовых воробьёв на сливе, на верхних ветвях которой оставались не сорванные перезревшие плоды. Пристроившись рядом на ветке, воробей расклёвывал верхнюю часть плода и принимался поедать сочную

мякоть. На некоторых фотографиях хорошо видно, как он при этом погружал весь клюв внутрь плода (см. рисунок). К засохшим и сморщенным плодам воробьи не притрагивались.



Рис. 1. Самка домового воробья *Passer domesticus* питается мякотью сливы *Prunus domestica*. Караганда. 10 октября 2014. Фото И.С.Таболиной.



Рис. 2. Другая самка домового воробья *Passer domesticus* поедает сладкую мякоть сливы *Prunus domestica*. Караганда. 11 октября 2014. Фото И.С.Таболиной.

Ранее случаев кормёжки домовых воробьёв на сливах не наблюдалось (Гаврилов 1974; Ильенко 1976; Прокофьева 2005; Карпов 2017). В литературе имеются указания на то, что воробьи могут поедать плоды винограда, вишни и шелковицы (Зверев 1948; Пэк, Федянина 1961; Гаврилов 1974; Карпов 2007). Из других птиц питание плодами сливы известно для иволги *Oriolus oriolus* (Ковшарь 1966).

Литература

Гаврилов Э.И. 1974. Семейство Ткачиковые – Ploceidae // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **5**: 368-406.

Зверев М.Д. 1948. Изучение питания птиц экспериментальным путём и непосредственными наблюдениями // *Тр. Алматинского заповедника* **7**: 5-54.

Ильенко А.И. 1976. *Экология домовых воробьёв и их эктопаразитов*. М.: 1-120.

Карпов Ф.Ф. 2017. Трофические связи птиц с древесно-кустарниковыми породами в зелёных насаждениях города Алматы // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1476): 3090-3098.

Ковшарь А.Ф. 1966. *Птицы Таласского Алатау*. Алма-Ата: 1-435.

Прокофьева И.В. 2005. Воробьиные и дятлы – потребители сочных плодов // *Рус. орнитол. журн.* **14** (303): 996-1001.

Пэк Л.В., Федянина Т.Ф. 1961. Пища птиц Киргизии // *Птицы Киргизии*. Фрунзе, **3**: 59-120.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1686**: 5269-5274*

Коноплянка *Acanthis cannabina* в Предбайкалье: распространение, статус пребывания

А.В.Холин

*Второе издание. Первая публикация в 2018**

Коноплянка *Acanthis cannabina* – обычная, местами многочисленная гнездящаяся птица Европейской части России, Западной и Средней Сибири. Типичный обитатель сельского ландшафта с посадками кустарников и группами деревьев (Жуков 2006; Рогачёва 1988; Рябицев 2001). В Предбайкалье коноплянка стала встречаться начиная с конца 1970-х годов. В последующие годы отмечена тенденция расширения ареала коноплянки в восточном направлении. В настоящее время в регионе коноплянка встречается вдоль Транссибирской магистрали – от западных границ до Байкала, населяя преимущественно культурный ландшафт. Вид отмечен в ряде городов Иркутской области: Тайшете, Братске, Черемхово, Усолье-Сибирском, Ангарске, Иркутске, а также в их окрестностях (Дурнев и др. 1996; Малеев, Попов 2010; Мельников 2002; Пыжьянов 1983; Сайфутдинова 2015; Холин 2015).

По данным С.В.Пыжьянова (1983), к концу 1970-х годов коноплянка уже отмечалась и, возможно, периодически гнездилась в окрестностях Иркутска. Случай гнездования этих птиц в Центральном парке культуры и отдыха Иркутска летом 2001 года описан Ю.А.Мельнико-

* Холин А.В. 2018. Коноплянка *(Acanthis cannabina)* в Предбайкалье: распростране-ние, статус пребывания // *Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы 6-й Международ. орнитол. конф.* Иркутск: 239-243.

вым (2002). И.В.Фефелов (устн. сообщ.) встретил поющего самца конопляники 12 июня 2011 на перроне вокзала в городе Черемхово. Пара взрослых птиц с двумя птенцами встречена Р.В.Сайфутдиновой (2015) 2 июля 2014 на острове Варничный (река Ангара) в Усолье-Сибирском.

Нами коноплянка отмечена в городе Черемхово, а также в двух населённых пунктах Иркутского района: посёлке Новый Горный (9-10 км Качугского тракта) и деревне Лыловщина (32 км от Иркутска).



Рис. 1. Самец конопляники *Acanthis cannabina*.
Иркутский район. 17 апреля 2015. Фото автора.

Все встречи конопляник в Черемхово приурочены к заболоченной местности в долине реки Черемшанки, в квадрате улиц Куйбышева – Первомайская – Декабрьских событий – Школьная. Впервые коноплянка отмечена нами 17 июня 2008 – поющий самец сидел на вершине дерева. Во время пения он периодически взлетал, делал несколько кругов и планировал обратно на ту же присаду. 22 апреля 2015 встречена пара конопляник, собиравших материал для строительства гнезда. 1 апреля 2018 отмечена стая из 7 конопляник, а 30 апреля 2018 встречена пара конопляник, собиравших материал для строительства гнезда. В деревне Лыловщина днём 15 июля 2017 отмечена пара конопляник, собирающих гнездовой материал (минеральную вату). Приведённые материалы свидетельствуют о возможности гнездования конопляники на этих территориях.

Начиная с 2014 года нами проводятся стационарные наблюдения за коноплянками в окрестностях Иркутска на территории строящегося коттеджного микрорайона посёлок Новый Горный (9-10 км Качугского тракта). Ландшафт посёлка представляет собой заброшенные сельскохозяйственные угодья (бывшие пашни), заросшие сорным разнотравьем, местами с плотными зарослями сосны *Pinus sylvestris* (возраст деревьев до 20-25 лет). В настоящее время эта территория вновь разрабатывается и подвергается интенсивной застройке. За рассматриваемый период коноплянки ежегодно отмечались на данном участке, при этом сроки пребывания их достаточно растянуты и варьируют по годам. Весенний прилёт происходит в конце марта – середине апреля: 19 апреля 2014 – 2 особи (пара); 30 марта 2015 – 3; 20 марта 2016 – 4; 9 марта 2017 – 1 (самая ранняя встреча); 18 марта 2018 – 1 особь.



Рис. 2. Самка и самец коноплянки *Acanthis cannabina*. Иркутский район. 13 июля 2014. Фото автора.

После прилёта коноплянки некоторое время кочуют, а затем распределяются по гнездовым участкам. С 2014 года на рассматриваемой территории нами установлено их гнездование (Холин 2015). В сроках гнездования наблюдается растянутость: так, если в гнезде, обнаруженном 17 мая 2014, было 6 яиц, то в гнезде, найденном 13 мая 2017, было уже 3 птенца, у которых начали разворачиваться перья. Днём 25 августа 2014 отмечена пара взрослых коноплянок, кормящая 3 перепархивающих слётков, что указывает и на более поздние сроки гнездования. Следует отметить, что в пределах своего ареала, в Европейской части России, Западной и Средней Сибири, коноплянки могут селиться на небольшом расстоянии друг от друга, и многие пары гнездятся дважды, а возможно и трижды в течение сезона (в августе могут быть птенцы как вторых, так и третьих выводков) (Жуков 2006; Ряби-

цев 2001). Исходя из материалов, полученных нами в ходе наблюдений, и учитывая сроки гнездования, характерные для вида, можно сказать, что в Предбайкалье также возможно полициклическое гнездование коноплянки (Холин 2015).



Рис. 3. Самка коноплянки *Acanthis cannabina* у гнезда с птенцами.
Иркутский район. 13 мая 2016. Фото автора.



Рис. 4. Слёток коноплянки *Acanthis cannabina*. Иркутский район. 1июня 2014. Фото автора.

Численность коноплянок, отмеченных в посёлке Новый Горный, за всё время наблюдений варьировала от 1-2 особей (2014 год) до 18 птиц (23 марта 2017). В гнездовой период на ограниченном участке посёлка отмечалось от 1 до 4 гнездящихся пар. При этом просматривается тенденция увеличения численности вида с начала наблюдения по настоящее время. Возможно, одной из причин этого является антропогенное преобразование местности: в посёлке проредили заросли сосен, появились постройки и заборы, что дало больше подходящих мест для гнездования.

Отлёт коноплянок обычно происходит в августе-сентябре, при этом некоторые особи встречаются и в более поздние сроки: 15 сентября 2014 – 4 особи; 4 октября 2017 – 1; 22 сентября 2018 – 2 особи.

За время наблюдений нами установлен факт зимнего пребывания коноплянки на территории Предбайкалья. Весной (30 марта 2015) была сфотографирована самка с сильно загрязнённым перьевым покровом, на основании чего И.В.Фефелов высказал предположение о возможной зимовке этой особи на территории региона, но при этом не исключалась возможность её ночевки в горельнике после прилёта. 12 декабря 2017 в 8 ч 30 мин (температура воздуха минус 31°С) в посёлке Новый Горный наблюдались 4 коноплянки; самец, присутствовавший в стайке, периодически пел неполную песню. Через час птицы в том же количестве снова были встречены на территории посёлка.

В заключении следует сказать, что ещё в конце 1990-х годов исследователи отмечали, что низкая численность коноплянки в Иркутской области указывает на пессимальность комплекса абиотических и биотических факторов для этого вида (Дурнев и др. 1996). В настоящее время в Предбайкалье для коноплянки, вероятно, происходит улучшение условий существования. Таким образом, на основании вышеизложенных материалов коноплянку в данном регионе можно считать редким гнездящимся и периодически зимующим видом*.

Литература

Дурнев Ю.А., Мельников Ю.И., Бояркин И.В., Книжин И.Б., Матвеев А.Н., Медведев Д.Г., Рябцев В.В., Самусенок В.П., Сонина М.В. 1996. *Редкие и малоизученные позвоночные животные Предбайкалья: распространение, экология, охрана*. Иркутск: 1-287.

Жуков В.С. 2006. *Птицы лесостепи Средней Сибири*. Новосибирск: 1-492.

Малеев В.Г., Попов В.В. 2010. *Определитель птиц Иркутской области*. Иркутск: 1-198.

Мельников Ю.И. 2002. О восточной границе ареала коноплянки *Acanthis cannabina* в Прибайкалье // *Рус. орнитол. журн.* **11** (191): 685-686.

Пыжьянов С.В. 1983. К изменению ареалов некоторых видов воробьиных птиц в Восточной Сибири // *Птицы Сибири (2-я Сиб. орнитол. конф.)*. Горно-Алтайск: 97-99.

* С дополнительными фотоматериалами о коноплянке можно ознакомиться на сайте «Природа Байкала» (http://nature.baikal.ru/ obj.shtml?obj=fauna&id=acanthis_cannabina).

РогачёваЭ.В. 1988. *Птицы Средней Сибири*. М.: 1-310.
Рябицев В.К. 2001. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-608.
Сайфутдинова Р.В. 2015. Интересные встречи птиц в окрестностях г. Усолье-Сибирское и в г. Иркутске (Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн*. 2 (17): 125.
Холин А.В. 2015. Гнездование коноплянки *Acanthis cannabina* в Предбайкалье // *Рус. орнитол. журн*. **24** (1139): 1571-1577.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1686**: 5274-5277*

Экспансия сороки *Pica pica* в Забайкалье и Амурской области

О.А.Горошко

*Второе издание. Первая публикация в 2018**


Известно, что на территории России ареал сороки *Pica pica* (Linnaeus, 1758) имеет широкий разрыв в районе Восточного Забайкалья и Амурской области (Штегман 1932; Рустамов 1954; Флинт и др. 1968; Степанян 2003; и др.). С запада к зоне разрыва подходит *P. p. leucoptera* Gould, 1862, с востока – *P. p. jankowskii* Stegmann, 1928 (1927). Распространение подвидов сороки показано на рисунке из нашей статьи (Kryukov *et al*. 2017). Данные молекулярно-генетических исследований (Kryukov *et al*. 2004, 2017) показывают, что *leucoptera* и *jankowskii* относятся к двум значительно удалённым друг от друга группам подвидов. В последние десятилетия происходит активное расширение ареалов *leucoptera* и *jankowskii*, в том числе навстречу друг к другу. Сведения о современных границах распространения сороки в районе разрыва в литературе отсутствуют.

Динамика ареала сороки в 1970-2010-х годах прослежена по данным полевых работ автора и детального опроса местного населения (опрошено более 1300 человек) в 1988-2017 годах. Сорока – удобный для опроса вид. Она тесно привязана к поселениям людей, имеет яркую, запоминающуюся внешность, громкий голос, «нахальное» поведение. Поэтому при её появлении в новых местах люди сразу же обращают на неё внимание.

Распределение сороки в исследуемом регионе определяется в основном наличием: 1) древесно-кустарниковой растительности, 2) поселе-

* Горошко О.А. 2012. Экспансия сороки Pica pica (Linnaeus, 1758) в Забайкалье и Амур-ской области // *Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы 6-й Международ. орнитол. конф*. Иркутск: 62-64.

ний людей; 3) водно-болотных угодий. Вид обитает не повсеместно: он отсутствует в не населённых людьми сплошных лесных массивах, а также на подавляющей части лишённой древесно-кустарниковой растительности степи. Наиболее благоприятные условия для вида складываются в лесостепи. В Восточном Забайкалье в начале XX века *leucoptera* на север не заходил дальше реки Читы (бассейн Ингоды), а на восток распространялся до Сретенска в верхней части реки Шилки (Штегман 1932). Область распространения *jankowskii* (= *amurensis)* к началу XX века охватывала бассейн среднего и нижнего течения Амура на запад до села Кумара (приблизительно в 80 км юго-западнее города Шимановска) (Штегман 1932).



Распространение подвидов сороки *Pica pica.* По: Kryukov *et al.* 2017.

Данные опроса подтвердили все указанные выше литературные сведения об обитании вида в 1960-х годах. Активное распространение *jankowskii* началось в 1960-1970-х годах, *leucoptera* – в 1980-е годы. Наиболее быстро шло расселение вдоль Транссибирской магистрали *jankowskii* в западном направлении, а *leucoptera* – в восточном направлении. В конце 1980-х – начале 1990-х годов гнездовые ареалы подвидов здесь соединились в бассейне реки Шилки в районе границы Забайкальского края и Амурской области. Начиная с 1980-х годов и до настоящего времени с нескольких сторон идёт заселение обширной территории бассейна Аргуни в Забайкалье; в последние годы здесь также наблюдается соединение ареалов *leucoptera* и *jankowskii* вдоль реки Аргунь.

Одновременно идёт распространение сороки в северном направлении. К настоящему времени сороки заселили не только северную часть Восточного Забайкалья и Амурской области, но начали заселять и Якутию, дойдя на север до Олекминска (Находкин и др. 2008). При этом на таёжной, мало населённой людьми территории ареал сороки не сплошной, а имеет ленточный характер, поскольку вид обитает только

вдоль населённых людьми рек. Сороки пока отсутствуют на обширных участках горной тайги между реками Шилка, Чара и Витим. В северной части ареала важным коридором распространения в широтном направлении является Байкало-Амурская магистраль. Соединение ареалов *leucoptera* и *jankowskii* вдоль этой железной дороги должно произойти в ближайшие годы на стыке Забайкальского края, Амурской области и Якутии.



Рис. 2. Сороки *Pica pica*. Посёлок Устье, Сунтарский улус, Якутия. 17 февраля 2018. Фото М.Афанасьева.



Рис. 3. Сорока *Pica pica*. Зея, Амурская область. 19 мая 2015. Фото А.Яковлева.

Процесс расселения сороки в XX и XXI веках совпал с ростом количества населённых пунктов, дорог, площади агроландшафтов, трансформацией естественных ландшафтов в результате деятельности людей (в лесной зоне и в лесостепи увеличиваются площади открытых пространств из-за вырубки лесов; в степи, напротив, появляются лесо-

защитные полосы вдоль дорог и полей, искусственные насаждения в населённых пунктах и их окрестностях), а также строительством и электрификацией железных дорог (сороки любят гнездиться на железных опорах ЛЭП).

Литература

Находкин Н.А., Гермогенов Н.И., Сидоров Б.И. 2008. *Птицы Якутии: полевой справочник*. Якутск: 1-384.

Рустамов А.К. 1954. Семейство вороновые Corvidae // *Птицы Советского Союза*. М., **5**: 13-104.

Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области)*. М.: 1-808.

Флинт В.Е., Бёме Р.Л., Костин Ю.В., Кузнецов А.А. 1968. *Птицы СССР*. М.: 1-640.

Штегман Б.К. 1932. Вороновые птицы // *Птицы СССР*. Определители по фауне СССР. Л., **6**: 1-32.

Kryukov A., Iwasa M.A., Kakizawa R., Suzuki H., Pinsker W., Haring E. 2004. Synchronic east-west divergence in azure-winged magpies *(Cyanopica cyanus)* and magpies *(Pica pica)* // *J. Zool. Syst. Evol. Res*. **42**: 342-351.

Kryukov A.P., Spiridonova L.N., Mori S., Arkhipov V.Y., Red'kin Y.A., Goroshko O.A., Lobkov E.G., Haring E. 2017. Deep phylogeographic breaks in magpie *Pica pica* across the Holarctic: concordance with bioacoustics and phenotypes // *Zool. Sci*. **34**, 3: 185-200.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1686**: 5277-5278*

Гнездование красношейной поганки *Podiceps auritus* в Байкало-Ленском заповеднике

Н.М.Оловянникова

Второе издание. Первая публикация в 2018[*]

Красношейная поганка *Podiceps auritus* относится к широко, но спорадически распространённым видам. Международный союз охраны природы в 2015 году присвоил этой поганке категорию VU (уязвимый вид) в результате резкого снижения численности в последние 30 лет в Северной Америке и Европе. В Иркутской области красношейная поганка редка, на гнездовье отмечена в пойме реки Малая Анга, в Прибайкальском национальном парке единичные пары гнездятся на озёрах в Тажеранской степи и Крестовской пади, единичные особи и пары отмечены на реках Киренга, Чона, Мура, в устье реки Иркут, в истоках реки Ангары и др. (Попов 2012).

[*] Оловянникова Н.М. 2018. Гнездование красношейной поганки *Podiceps auritus* на территории Байкало-Ленского заповедника // *Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы 6-й Международ. орнитол. конф*. Иркутск: 163-165.

В Байкало-Ленском заповеднике красношейная поганка – редкий гнездящийся вид. Впервые на территории заповедника В.Н.Степаненко встретил одиночную птицу 19-20 июня 1996 на небольшом озере в районе Курулинского лома в верховьях реки Лены.

В 2003 году на побережье Байкала три пары держались на Большом соровом озере в районе мыса Большой Солонцовый в течение всего гнездового периода. В июне 2004 года на озере Ю.И.Мельников (2004) нашёл одно гнездо красношейной поганки.

Озеро Большое удалено от Байкала на 150 м вглубь мыса к подножию гор. Озеро неправильной формы, с вытянутым заострённым концом на запад, с восточной стороны – небольшое озерцо, отшнуровавшееся осоковым кочкарником. Водоём неглубокий, дно пологое, без резких перепадов и ям, максимальная глубина, ближе к восточному берегу, составляет 2.7 м, в прибрежной части – 0.3-0.5 м. Имеются заросли водных растений, таких как рдест пронзённолистный *Potamogeton perfoliatus*, горец земноводный *Persicaria amphibia*, уруть сибирская *Myriophyllum sibiricum*, пузырчатка малая *Utricularia minor* и обыкновенная *U. vulgaris*. Заросли водных растений занимают 1/4 площади озера.

С 2005 по 2015 год на Большом озере гнездилось стабильно от 3 до 6 пар красношейных поганок. Все гнёзда располагались в южной части озера в зарослях рдеста на сплавинах, в 2016 году на гнездовье уже отмечено 10 пар (20 особей), а в 2017 году численность поганок резко увеличилась, при обследовании озера 22 июня было найдено 21 гнездо с кладками (2-3 яйца), 3 гнезда располагались в южной части озера, 18 гнёзд обнаружено в северной части озера, где основная часть гнёзд располагалась на кочках, другая – на сплавинах в зарослях рдеста. На всех гнёздах поганки сидели на яйцах, общая численность поганок составила 60 особей. В 2017 году численность красношейных поганок увеличилась в три раза. Возможно, это связано с усыханием озёр в Тажеранской степи, из-за чего основная часть поганок переселилась в заповедник, где нашла благоприятные условия для гнездования.

Весной на территории Байкало-Ленского заповедника красношейные поганки появляются в конце мая – начале июня, осенью встречаются на озёрах до середины октября. Период пребывания на территории заповедника – с 23 мая по 15 октября.

Литература

Попов В.В. 2012. Птицы Иркутской области: видовой состав, распространение и характер пребывания. Гагарообразные – журавлеобразные // *Байкал. зоол. журн.* 1 (9): 36-62.

Мельников Ю.И. 2004. Новые встречи редких и малочисленных птиц на северо-западном побережье Байкала // *Рус. орнитол. журн.* **13** (268): 706-712.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1686**: 5279-5280*

Залёты белоголового сипа *Gyps fulvus* в таёжную зону Западной Сибири

О.Ю.Тютеньков

*Второе издание. Первая публикация в 2018**

Ареал белоголового сипа *Gyps fulvus* охватывает преимущественно горные местности. На Западно-Сибирской равнине сип относится к редким залётным видам (Рябицев 2008). При этом появление единичных особей в основном фиксируют в степной и лесостепной зонах региона (Гынгазов, Миловидов 1977; и др.). Для тайги известны достоверные факты встреч в середине XX века – в окрестностях Тавды (Рябицев 2008), Тобольска (Дементьев 1951) и Колпашево (Белышев 1960).

По современным опросным данным, в 1980-х годах охотники видели одиночного белоголового сипа близ посёлка Степановка Верхнекетского района, у 58° с.ш. (Железнова, Новокрещенных 2015).

В XXI веке появились новые сведения об этом редком виде, собранные в Томской области. В мае 2012 года в окрестностях деревни Маркелово Шегарского района (56°42' с.ш., 83°35' в.д.) на трассе «Мельниково – Бакчар» произошло столкновения автомобиля с сидящим белоголовым сипом. Местным жителем из погибшей птицы было изготовлено чучело, которое он впоследствии пытался продать.

В начале июля 2017 года на удалённое месторождение нефти и газа «Снежное», расположенное в Каргасокском районе (58°56' с.ш., 79° 45' в.д.), из тайги пешком вышел ослабленный самец белоголового сипа. Работники месторождения попытались выходить его и откормить рыбой. Птицу на вертолёте вывезли в райцентр, а затем 13 июля на автомобиле доставили в зоопарк города Северска. К сожалению, сип был очень истощён и погиб в тот же день. При вскрытии сотрудниками ветеринарного отдела зоопарка было установлено, что у птицы произошло поражение почек. Тушку сипа передали в зоологический музей Томского госуниверситета для изготовления экспоната.

Дальние залёты белоголового сипа, как и других крупных хищных птиц, использующих планирующий полёт, обычно объясняют заносом их на север преобладающими воздушными потоками (Давыдов 2013). Однако появление белоголового сипа в XXI веке в таёжной зоне Западной Сибири может быть связано и с некоторым расширением гнездового ареала. Если ранее ближайшее место гнездования находилось

* Тютеньков О.Ю. 2018. Залёты белоголового сипа *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783) в таёжную зону Западной Сибири // *Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: Материалы 6-й Международ. орнитол. конф.* Иркутск: 232-234.

на западном Тянь-Шане (Корелов 1962), то в начале 2000-х годов две колонии этого вида обнаружены на северо-востоке Казахского мелкосопочника – в Павлодарской области (Жатканбаев 2003). Они расположены менее чем в 700 км от места обнаружения белоголового сипа в Томской области.

Литература

Белышев Б.Ф. 1960. Птицы Томской области // *Acta ornithol.* **5**, 13: 347-365.

Гынгазов А.М., Миловидов С.П. 1977. *Орнитофауна Западно-Сибирской равнины.* Томск: 1-351.

Давыдов С.П. (2013) 2018. Залёт белоголового сипа *Gyps fulvus* в арктическую тундру Якутии // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1686): 5280-5283.

Дементьев Г.П. 1951. Отряд хищные птицы Acipitres или Falconiformes // *Птицы Советского Союза.* М., **1**: 70-341.

Жатканбаев А.Ж. 2003. Гнездование белоголового сипа в Павлодарской области Казахстана – новая самая северная точка размножения в ареале вида // *Материалы 4-й конф. по хищным птицам Северной Евразии.* Пенза: 189-191.

Железнова Т.К., Новокрещенных В.А. 2015. Неворобьиные птицы (non-Passeriformes) Томского Прикетья // *Научный диалог* 2 (38): 86-128.

Корелов М.Н. 1962. Отряд хищные птицы – Falconiformes // *Птицы Казахстана.* Алма-Ата, **2**: 488-707.

Рябицев В.К. 2008. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник-определитель.* Екатеринбург: 1-634.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1686**: 5280-5283*

Залёт белоголового сипа *Gyps fulvus* в арктическую тундру Якутии

С.П.Давыдов

*Второе издание. Первая публикация в 2013**

Белоголовый сип *Gyps fulvus* – крупная хищная (трупоядная) птица фауны южных окраин России. Как редкий вид с ограниченным распространением занесён в Красную Книгу Российской Федерации, внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС, Приложения II Боннской и Бернской конвенций. Северная граница гнездовой части ареала сипа проходит по северным склонам гор Большого Кавказа. Вне России область гнездования вида включает Украину, Грузию, Армению, Узбекистан, Туркмению и Казахстан, а также Северную Африку, Южную

* Давыдов С.П. 2013. Залёт белоголового сипа Gyps fulvus (Accipitridae) в арктическую тундру Якутии // *Вестн. СВНЦ ДВО РАН* 2: 128-129.

Европу (Испания, Балканы), Малую, Среднюю и Центральную Азию (Дементьев 1951; Flint *et al.* 1984).

Часто белоголовый сип появляется далеко за пределами ареала. Его залёты отмечены в Западной и Восточной Европе, в том числе в Прибалтике, Белоруссии, северных областях Украины, а также в Казахстане. В пределах России этот вид отмечен в Среднем и Нижнем Поволжье, Южном Урале, Республике Коми, Западной Сибири и достаточно регулярно на Алтае. Известны флуктуации границ гнездовой части ареала и численности белоголовых сипов в его пределах (Тильба, Мнацеканов 2003; http://www. sevin. ru/redbooksevin/).

Залёты белоголового сипа на территорию Якутии отмечают с начала 2000-х годов. Так, В.С.Находкин (2005) сообщает о залёте *G. fulvus* июле 2004 года в Хангаласский район (Центральная Якутия, здесь птица погибла от истощения). В июле 2007 года работники компании «Алмазы Анабара» (Анабарский район) встретили в лесотундре обессилевшего сипа. Птицу отправили в республиканский зоопарк «Орто Дойду», окольцевали и передали в Ленинградский зоопарк, где определили её возраст – 3-4 года (В Арктику... 2011).

Летом 2011 года белоголовый сип впервые найден в Колымской низменности. Место встречи (район мыса Крестовский, 70°14' с.ш., 160° 05' в.д.) – территория республиканского заказника «Чайгургино». Первая информация о находке получена в конце июля от С.Е.Волкова, бригадира оленеводов стада № 8 кочевой родовой общины «Турваургин» (село Колымское, Нижнеколымский район), которое кочевало к юго-западу вдоль побережья Восточно-Сибирского моря от мыса Крестовский в сторону долины реки Чукочья. Сип парил в непосредственной близости от стада домашних северных оленей и затем сопровождал его на протяжении почти 100 км во время кочёвки вдоль прибрежной полосы арктической тундры. В эти дни оленеводы подкармливали птицу мясом и отходами от забоя оленей. В дальнейшем, во второй половине августа, после прекращения подкормки птица держалась на рыболовецком участке «Эмэскывеем» в нижнем течении Чукочьей, в долине которой кочевала бригада (70°00' с.ш., 159°11' в.д., в 18 км от побережья Восточно-Сибирского моря). Там хозяева участка подкармливали сипа рыбой, в основном – различными видами сигов. Птица охотно их ела.

По сообщению рыбаков, сип продолжительно парил в воздухе, отслеживая перемещения людей по тундре; сопровождал их во время проверки рыболовных сетей. В эти моменты птицу обильно кормили. В этой равнинной местности для отдыха хищник всегда выбирал возвышенные участки с дальним обзором. Часто, особенно в ясные дни, гриф подолгу сидел на возвышенных берегах реки, расправив крылья и как бы ловя ими ветер. Поведение птицы выглядело вполне комфортным в

отличие от двух предыдущих залётов *G. fulvus* в Якутию. По-видимому, в данном случае птица быстро освоилась в местных условиях не без помощи оленеводов и рыбаков.

Первую неделю пребывания на участке «Эмэскывеем» в конце второй декады августа сип регулярно подвергался нападениям крупных чаек – халея *Larus heuglini* и бургомистра *L. hyperboreus*, которые позже прекратились. В конце первой декады сентября, с началом заморозков и усилением северных ветров с моросящими осадками, белоголовый сип покинул долину реки Чукочья.



Белоголовый сип *Gyps fulvus* в долине реки Чукочья.
Фото В.Ф.Островского.

В настоящее время это самый дальний район Северо-Востока России, где отмечен *Gyps fulvus*. Залёт белоголового сипа в арктическую тундру Колымской низменности, как и другие случаи встреч этого вида в Якутии, вероятно, объясняется его способностью к продолжительному парению в воздушных потоках и длительному голоданию. Так, исследования ДВНИГМИ Росгидромета показывают значительное увеличение интенсивности меридионального переноса приземных воздушных масс в мае-июле в некоторые годы, включая июнь-июль 2011 (Ежемесячный... 2011). По-видимому, столь дальние залёты представителя центральноазиатской авифауны в северные районы Палеарктики связаны как раз с этими попутными воздушными потоками. С высокой степенью вероятности можно предположить и то, что в период плейстоценового расцвета млекопитающих мамонтового фаунистического комплекса Северной Евразии посещение сипом и другими видами-падальщиками высоких широт было более частым.

Автор благодарит хозяев участка «Эмэскывеем» В.Ф.Островского и Р.И.Рольтыргину, государственного инспектора Нижнеколымской инспекции охраны природы А.Я. Габайдуллина, а также С.Е.Волкова и других оленеводов стада № 8 КРО «Турваургин», оказавшим помощь в сборе информации.

Литература

Дементьев Г.П. 1951. Отряд хищные птицы Acipitres или Falconiformes // *Птицы Советского Союза*. М., **1**: 70-341.

Находкин Н.А. 2005. О птицах Якутии // *Наука и техника в Якутии* 1: 98-101.

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. 2003. Многолетняя динамика численности и пространственная структура популяции белоголового сипа на Западном Кавказе // *Бюл. МОИП*. Отд. биол. **108**, 2: 45-50.

В Арктику наведался сип с Кавказа // РИГ SakhaPress. [Электрон. ресурс]. 25.10.2011. http:// sakhapress.ru/archives/3 5812

Ежемесячный гидрометеорологический бюллетень ДВНИГМИ // ДВНИГМИ. [Электрон. ресурс]. Владивосток, 2011. http://ferhri.org/ index.php?option=com_content&view= article&id=199:biblio-bulletin 201106&catid=81:biblio-bulletin&Itemid= 56

Flint V.E., Boehme R.L., Kostin Y.V., Kuznetsov A.A. 1984. *Birds of the USSR*. Princeton Univ. Press: 1-353.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1686**: 5283*

Новый рекордный возраст травника *Tringa totanus*

А.И.Корзюков, О.А.Форманюк, П.С.Панченко

Второе издание. Первая публикация в 2002[*]

30 июня 2000 на Приканальных островах низовьев Тилигульского лимана (село Коблево Николаевской области) среди сотни птиц, погибших от орнитоза, найден труп травника *Tringa totanus* с московским кольцом «Р 680992». Птица была поймана и окольцована 17 июня 1982 всего в нескольких десятках метров от места находки. Найдена она через 6588 дней. Если учесть, что птица в момент кольцевания была уже взрослой, то она прожила по крайней мере до 19 лет. По литературным данным (Паевский 1985, Корзюков, Форманюк 1999, Cramp, Simmons 1983), документированный прежде максимальный возраст травника равен 17 годам. Возраст отмеченных ранее в нашем регионе травников-долгожителей не превышал 14 лет. Возможно, что если бы в колонии не было эпизоотии, то птица прожила бы дольше.

Литература

Корзюков А.И., Форманюк О.А. (1999) 2018. Кулики – долгожители // *Рус. орнитол. журн*. **27** (1657): 4118-4119.

Паевский В.А. 1985. *Демография птиц*. Л., 1-285.

Cramp S., Simmons K.E.L. (eds). 1983. *The Birds of the Western Palearctic*. Oxford Univ. Press, 3.

[*] Корзюков А., Форманюк О., Панченко П. 2002. Новый рекордный возраст травника // *Информ. материалы Рабочей группы по куликам* **15**: 52.