ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1702
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1702

СОДЕРЖАНИЕ

5845-5850 Динамика численности степной пустельги *Falco naumanni* в Калмыкии и лимитирующие её факторы. В.М.МУЗАЕВ, А.К.МАНЖЕЕВ, Г.И.ЭРДНЕНОВ

5851-5865 К орнитофауне Алтайского края и республики Алтай. А.И.ГОНЧАРОВ, Д.В.ДУБИКОВСКИЙ

5865-5869 Дополнение к списку и новые сведения о птицах окрестностей деревни Красницы (Гатчинский район Ленинградской области). В.И.ГОЛОВАНЬ

5869-5872 Первая регистрация сибирской теньковки *Phylloscopus collybita tristis* в Новгородской области. В.Ю.АРХИПОВ

5872-5873 Регистрация гоголя-головастика *Bucephala albeola* у юго-восточного побережья Чукотского полуострова. А.В.КОСЯК

5873-5874 Поздняя встреча плосконосого плавунчика *Phalaropus fulicarius* около мыса Чаплина на юго-востоке Чукотского полуострова. М.А.АНТИПИН, И.Г.БОБЫРЬ

5874-5875 Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* в условиях города Львова. В.С.КЛИМИШИН

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования 28 ноября 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1702

CONTENTS

5845-5850 Population dynamics of the lesser kestrel *Falco naumanni* in Kalmykia and its limiting factors. V.M.MUZAEV, A.K.MANZHEEV, G.I.ERDNENOV

5851-5865 To the avifauna of the Altai Krai and the Altai Republic. A.I.GONCHAROV, D.V.DUBIKOVSKY

5865-5869 Addition to the bird-list and new information about the birds in the vicinity of Krasnitsy (Gatchina Raion, Leningrad Oblast). V.I.GOLOVAN

5869-5872 First registration of the Siberian chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis* in the Novgorod Oblast. V.Yu.ARKHIPOV

5872-5873 Registration of the bufflehead *Bucephala albeola* off the southeastern coast of the Chukotka Peninsula. A.V.KOSYAK

5873-5874 Late record of the red phalarope *Phalaropus fulicarius* near Cape Chaplin in the southeast of the Chukotka Peninsula. M.A.ANTIPIN, I.G.BOBYR

5874-5875 The Eurasian collared dove *Streptopelia decaocto* in Lviv. V.S.KLIMISHIN

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1702**: 5845-5850*

Динамика численности степной пустельги *Falco naumanni* в Калмыкии и лимитирующие её факторы

В.М.Музаев, А.К.Манжеев, Г.И.Эрдненов

Валентин Манцаевич Музаев, *Араш Каримович Манжеев*. Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова. Ул. Пушкина, д. 11, Элиста, 358000, Россия. E-mail: muzaev_vm@mail.ru
Геннадий Ильич Эрдненов. Государственный природный биосферный заповедник «Чёрные земли». Ул. Некрасова, д. 31, посёлок Комсомольский, Черноземельский район, Республика Калмыкия, 359240, Россия. E-mail: erdgeil@mail.ru

*Поступила в редакцию 27 ноября 2018**

Степная пустельга *Falco naumanni* в Калмыкии – редкий, уязвимый, спорадически гнездящийся на юго-востоке республики вид, занесённый в региональную Красную книгу под 3-й категорией охранного статуса (Музаев 2013). Под этой же категорией планируют внести её во второе издание Красной книги Российской Федерации (Список объектов… 2016), в то время как в первом издании (2001) ей была присвоена категория 1 – «исчезающий вид». По обобщённым Лабораторией Красной книги ВНИИприроды данным, по состоянию на конец 2012 года этот сокол был занесён в Красные книги 23 субъектов Российской Федерации, в том числе всех пограничных с Калмыкией регионов – Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края и Республики Дагестан (Предложения по совершенствованию… 2012; Белик 2014) (табл. 1). Мировая же популяция степной пустельги в настоящее время оценена МСОП (IUCN Red List-2018) как благополучная (least concern – «вид, вызывающий наименьшие опасения»).

Таблица 1. Категории статуса редкости степной пустельги в Красных книгах России, Калмыкии и сопредельных с ней регионов

Россия	Астраханская область	Волгоградская область	Ростовская область	Ставропольский край	Дагестан	Калмыкия
1983-2001	2004-2014	2004-2017	2004-2014	2002-2013	1998-2009	2013
– - 1	3-3	1-1	1-1	1-3	– - 2	3

Примечание: Категории статуса редкости: 1 – исчезающий вид, 2 – сокращающийся в численности вид, 3 – редкий вид. Под названием региона указаны годы публикации Красных книг.

Как известно, степная пустельга пережила глубокую депрессию численности во второй половине XX века (Белик, Давыгора 1990; Мосей-

* Доклад на симпозиуме «Актуальные вопросы экологии и охраны птиц», посвящённого 50-летию Ладожской орнитологической станции Санкт-Петербургского государственного университета. Старый Петергоф, 22 ноября 2018.

кин, Мосейкин 2000; Галушин 2003; и др.). По мнению специалистов, основными антропогенными причинами катастрофического сокращения её численности на юге России явились интенсивное использование для борьбы с насекомыми-вредителями и грызунами инсектицидов и пестицидов, приведшее к подрыву кормовой базы (насекомых, ящериц, грызунов), электрификация животноводческих комплексов и гибель птиц на ЛЭП, недостаток мест гнездования в результате изменения конструкций и материалов крыш строений (Белик 2000; Джамирзоев, Букреев 2006; и др.).

Предполагается, что в предгорьях Восточного Кавказа и в Восточном Предкавказье, включая юг Калмыкии, пик депрессии этого вида пришёлся на 1980-е и начало 1990-х годов. В последующие годы численность степной пустельги здесь в целом имеет тенденцию к увеличению (Ильюх 1997, 2001, 2007, 2015; Джамирзоев, Букреев 2006; Джамирзоев и др. 2008; Белик 2007, 2014).

В Калмыкии специальное изучение степной пустельги начато не так давно – во второй половине прошлого десятилетия (Цапко 2007; Дьяченко 2009; Музаев и др. 2010). Здесь она обнаружена на гнездовании лишь в двух административных районах – Черноземельском и Лаганском. Причём в первом из них все её колонии и микроколонии (№№ 1-5 в таблице 2) находились или находятся на чабанских точках, расположенных в остепнённых пустынях в окрестностях Состинских озёр, а во втором – обе колонии (№ 6 и № 7 в таблице 2) располагаются в заброшенных производственных помещениях, соответственно, на окраине посёлка Улан-Хол и города Лагань. Более подробная информация о местах их локализации и расстоянии между ними, продолжительности существования, а также сведения о численности в них пустельг в 2006-2013 годах и сроках их прилёта и отлёта приведены в нашей предыдущей публикации (Музаев и др. 2014). В таблице 2 сведения по численности за указанный период дополнены результатами учётов этих соколков и в последующие годы.

Как видно из приведённых в таблице 2 данных, в 2009-2013 годах в колониях №№ 1-4, расположенных под крышами кошар, общее количество взрослых и годовалых птиц, за исключением 2010 года, в целом оставалось более или менее стабильным – на уровне 90-110 особей, с некоторыми колебаниями по годам в мелких поселениях в ту или иную сторону. В 2010 году численность степных пустельг во всех колониях была выше (в самой большой – примерно на 1/3), чем в предыдущий и последующие годы. Известно, что такие межгодовые флуктуации численности птиц в гнездовых колониях, связанные, главным образом, с состоянием кормовой базы в их окрестностях, являются одной из характерных особенностей этого вида (Ильюх, Хохлов 2010). В 2013 году из-за замены на крыше кошары старого шифера на новый прекратила

существование микроколония № 4. В «уланхольской» колонии (№ 6), за которой ведётся наблюдение с 2008 года, возможно, с самого начала её формирования (Дьяченко 2009), в этот период отмечался устойчивый рост численности пустельг (за 6 лет – в 6-7 раз).

Таблица 2. Результаты учётов численности годовалых и взрослых степных пустельг в Калмыкии в весенне-летний период 2006-2018 годов

Дата проведения учёта	Количество птиц в колониях							Всего особей
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	
20.06.06	24[1]	н/и	н/и	н/и	н/и	н/с	н/и	?
10-23.05.08	?	н/и	н/и	н/и	н/и	4-5[2]	н/и	?
23-24.05.09	10-11	6	70-80	3	н/и	?	н/и	90-100
24-25.04.10	14-16	13-14	~110	6	н/и	11-15	н/и	155-160
30.04-1.05.11	8	7-8	80-90	2	н/и	18	н/и	120-130
18-19.07.12	отл	отл	отл	отл	н/и	?	90-100[3]	?
1-3.07.13	10-13	10-12	70-80	0	40-45	30-35*	40-45	200-230
15.05.14	?	?	?	?	35-40	?	?	?
26-27.06.15	0	0	~90	0	35-40	?	~40**	165-170
6-7.05.16	0	0	45-50	0	25-30	?	?	70-80
22.05.18	0	0	6	0	4	6	12	28

Примечание: [1] – данные Н.В.Цапко (2007); [2] – данные М.П.Дьяченко (2009); [3] – с учётом вылетевших из гнёзд молодых птиц; н/и – колония не была известна; н/с – колония не существовала; отл – птицы отлетели с места гнездования; ? – учеты не проводились; * – В.П.Белик (устн. сообщ.) 9 мая 2013 насчитал 25-35 птиц;
** - учёты проведены 2 июля 2015 Г.И.Эрдневым и Б.И.Убушаевым.

В 2012 и 2013 годах были найдены ещё две колонии средней величины (№ 5 – на точке на чердаке жилого дома и под крышей хозяйственной постройки, № 7 – на окраине города Лагань), численность соколков в которых в 2013-2015 годах находилась примерно на одном уровне. С их учётом в 2013 году общая численность взрослых и годовалых птиц во всех известных нам колониях составляла 200-230 особей. По нашим расчётам, количество гнездящихся в них степных пустельг могло достигать 80-100 пар. Эти данные, наряду с формированием «на наших глазах» колонии № 6, явились основанием для занесения степной пустельги в Красную книгу Калмыкии, но, в отличие от федерального издания, под 3-й охранной категорией, так же как и в Ставропольском крае, где этот вид демонстрировал положительные тенденции численности и синантропизации (Ильюх, Хохлов 2013) (табл. 1).

В 2014 году учётом была охвачена лишь колония № 5, в которой численность пустельг была лишь ненамного меньше, чем в предыдущем году. В 2015 году были обследованы практически все колонии и установлено исчезновение по непонятным причинам ещё двух мелких колоний – № 1 и № 2, которые в дальнейшем так и не восстановились. Однако в самой большой (№ 3) и в двух средних по величине (№ 5 и № 7) колониях численность соколков оставалась примерно на уровне

2013 года, а общая их численность, с учётом не обследованной колонии № 6, возможно, достигала 200 особей.

В 2016 году численность степных пустельг в колонии № 3 сократилась почти вдвое. Это, несомненно, явилось результатом проведённого здесь в конце лета предыдущего года ремонта кошары новым хозяином, когда был заменён на новый весь повреждённый старый шифер и заделаны цементным раствором почти все большие щели между стенами и шифером (рис. 1), где предпочитали гнездиться пустельги. Также заметно сократилась численность соколков в том году, но по неустановленной причине, и в колонии № 5.

Рис. 1. Вид на кошару, где обитала самая большая колония степной пустельги *Falco naumanni* в Калмыкии, в 2011 году (слева) и в 2018 году (справа).

В 2017 году учётные работы не проводились. Результаты же проведённых в 2018 году наблюдений были для нас шокирующими. Выяснилось, что все 4 оставшиеся колонии влачат жалкое существование. Общая численность отмеченных в них степных пустельг не превышала трёх десятков, что примерно в 7-8 раз меньше, чем в 2013 году.

Как уже было сказано выше, основной причиной исчезновения одной из микроколоний, а также практически полной деградации самой большой колонии явился антропогенный фактор. Несомненно, он же явился причиной деградации и «уланхольской» колонии, где резко сократилось число удобных для гнездования пустельг ниш в результате дальнейшего разбора строительного материала мясокомбината местными жителями (рис. 2).

Причиной же почти полного исчезновения колонии № 5, гнездившейся на точке на чердаке жилого дома и под крышей хозяйственной постройки, по мнению их хозяев, явилось гнездование здесь же в 2017 году большого количества розовых скворцов *Pastor roseus*. Они мешали пустельгам своим поведением и производимым шумом нормально вывести потомство и даже выбрасывали на землю их неоперённых птенцов. Имело ли место последнее – требует специального исследования,

но, как бы там ни было, в 2018 году мы насчитали на этой точке всего 4 пустельги, и это несмотря на то, что розовые скворцы в текущем году здесь не гнездились.

Рис. 2. Вид на развалины мясокомбината на окраине посёлка Улан-Хол в 2010 году (слева) и в 2018 году (справа).

Как уже говорилось, причины исчезновения микроколоний № 1 и № 2 остались для нас невыясненными, поскольку на точках, где они располагались, никаких ремонтных работ не проводилось. Также непонятно 3-4-кратное сокращение численности степных пустельг в колонии на окраине города Лагань, хотя никаких видимых изменений обстановки в этом районе нами не замечено.

В связи с вышеизложенным возникают вопросы: куда делись покинувшие колонии степные пустельги и есть ли будущее у этого вида в Калмыкии? Здесь остаётся только надеяться на то, что произошло пространственное перераспределение птиц и они образовали ещё неизвестные нам колонии в других местах. Надежду на это вселяет встреча нами в конце мая текущего года, т.е. в гнездовой сезон, в Черноземельском районе, примерно в 40 км от ближайшей известной нам колонии, одиночного взрослого самца. Поиски новых колоний степной пустельги – наша задача на ближайшее время.

Литература

Белик В.П. 2000. *Птицы степного Придонья: Формирование фауны, её антропогенная трансформация и вопросы охраны*. Ростов-на-Дону: 1-376.

Белик В.П. 2007. Гнездовая фауна хищных птиц Калмыкии и её трансформации в XX веке // *Стрепет* **5**, 1/2: 30-38.

Белик В.П. 2014. Опыт работы с региональными Красными книгами в Южной России // *Стрепет* **12**, 1/2: 112-166.

Белик В.П., Давыгора А.В. 1990. Степная пустельга – кандидат в Красную книгу РСФСР // *Итоги изучения редких животных*. М.: 52-53.

Галушин В.М. 2003. Новости в мире хищных птиц // *Материалы 4-й конф. по хищным птицам Северной Евразии*. Пенза: 49-54.

Джамирзоев Г.С., Букреев С.А. 2006. Степная пустельга на Восточном Кавказе // *Орнитологические исследования в Северной Евразии: Тез. докл. 12-й Международ. орнитол. конф.* Ставрополь: 175-176.

Джамирзоев Г.С., Букреев С.А., Ильюх М.П. 2008. План действий по сохранению степной пустельги *(Falco naumanni)* в Кавказском экорегионе // *Планы действий по сохранению глобально угрожаемых видов птиц в Кавказском экорегионе*. М.; Махачкала: 63-71.

Дьяченко М.П. 2009. Гнездование степной пустельги в посёлке Улан-Хол на востоке Калмыкии // *Стрепет* **7**, 1/2: 94-96.

Ильюх М.П. 1997. Степная пустельга в Центральном Предкавказье // *Научное наследие Н.Я.Динника и его роль в развитии современного естествознания*. Ставрополь: 57-76.

Ильюх М.П. 2001. Уникальное поселение степной пустельги в г. Нефтекумске // *Новости в мире птиц* 3: 20.

Ильюх М.П. 2007. Степная пустельга в Предкавказье: прошлое, настоящее, будущее // *Кавказ. орнитол. вестн.* **19**: 23-51.

Ильюх М.П. 2015. Гнездящиеся хищные птицы города Нефтекумска и его окрестностей // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1120): 949-970.

Ильюх М.П., Хохлов А.Н. 2010. Степная пустельга *Falco naumanni* Fleischer, 1818 // *Хищные птицы и совы трансформированных экосистем Предкавказья*. Ставрополь: 464-499.

Ильюх М.П., Хохлов А.Н. 2013. Степная пустельга *Falco naumanni* Fleischer, 1818 // *Красная книга Ставропольского края. Животные*. Ставрополь, 2: 187.

Красная книга Российской Федерации: Животные. 2001. М.: 1-862.

Мосейкин В.Н., Мосейкин Е.В. 2000. Степная пустельга в Волго-Уральском междуречье // *Кавказ. орнитол. вестн.* **12**: 148-157.

Музаев В.М. 2013. Степная пустельга *Falco naumanni* Fleischer, 1818 // *Красная книга Республики Калмыкия. Животные*. Элиста, **1**: 138-139.

Музаев В.М., Эрдненов Г.И., Борцов Г.Е. 2010. К вопросу о распространении и численности степной пустельги *(Falco naumanni)* в Калмыкии // *Орнитология в Северной Евразии: Материалы 13-й Международ. орнитол. конф. Северной Евразии. Тез. докл.* Оренбург: 228-229.

Музаев В.М., Эрдненов Г.И., Комолова А.С., Манжеев А.К., Убушаев Б.И. 2014. Материалы по численности и экологии степной пустельги в Калмыкии в 2009-2013 гг. // *Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных регионов: Распространение, экология, динамика популяций, охрана: материалы Международ. конф.* Ростов-на-Дону: 255-263.

Предложения по совершенствованию Красной книги Российской Федерации. 2012. Позвоночные животные: принципы, структура, видовой состав. М.: 1-528.

Список объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (по состоянию на 1.09.2016) // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56583565/

Цапко Н.В. (2007) 2017. Авифаунистические находки в Калмыкии // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1428): 1426-1429.

The IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 http://oldredlist.iucnredlist.org/search?page=322.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1702**: 5851-5865*

К орнитофауне Алтайского края и республики Алтай

А.И.Гончаров, Д.В.Дубиковский

Александр Иванович Гончаров. Кемерово, Россия. E-mail:pochtagon@rambler.ru
Дмитрий Вадимович Дубиковский. Кемерово, Россия.E-mail: dmitry.dubikovskiy@gmail.com

Поступила в редакцию 23 ноября 2018

Алтайский Край и республика Алтай – два соседних региона на юге Сибири, для которых характерен довольно богатый видовой состав птиц, как гнездящихся, так и встречающихся на миграциях. Многие виды живут здесь на границе своего распространения. Среди местных видов немало редких, которые занесены в Красные книги различных уровней, при этом многие стороны их биологии остаются изученными далеко не полно, особенно это относится к распространению на краях ареалов, их численности и статусу. Поэтому любые достоверные сведения о таких птицах из данных регионов представляют собой важную научную информацию, дополняющую картину их распространения и характера пребывания.

В августе 2018 года нами была совершена поездка по Алтайскому краю и республике Алтай, в ходе которой фиксировались наблюдения встреченных птиц. Наиболее интересные из них кратко описаны в настоящей статье. Поездка совершена с 5 по 12 августа на автомобиле по маршруту Новосибирск – озеро Мостовое – Завьялово – Волчиха – Малиновое озеро – Угловское – Рубцовск – Алейск – Солонешное – Ябоган – озеро Теньгинское – Кош-Агач – Чуйская степь – Ортолык – Бельтир – Кош-Агач – Тархатинское озеро – озеро Зерлюкаль-Нур (или Зерлюколь-Нур, или Зерлюкуль-Нур) – Кокоря – Кош-Агач – Тыдтуярык – Курайская степь – Айгулак – Семинский перевал – Кемерово. Всего за поездку встречено более 150 видов птиц.

Названия и порядок видов приводится в соответствии со «Списком птиц Российской Федерации» (Коблик и др. 2006). В ходе текста использованы следующие сокращения: АК – Алтайский край, РА – республика Алтай, РФ – Российская Федерация, КК – Красная книга.

Gavia arctica. Достаточно редкий вид, занесённый в обе региональные КК. Встречена нами только в республике Алтай. Одна особь – на Тархатинском озере 9 августа. На озере Зерлюкаль-Нур 10 августа встречено суммарно около 20 чернозобых гагар, как одиночных, так и парами и группами до 9 птиц (рис. 1).

Podiceps nigricollis. Неоднократно отмечалась на различных водоёмах АК по нашему маршруту. Довольно большие скопления чер-

ношейных поганок, суммарно более двух десятков особей, отмечены на озере Танатор-4 6 августа.

Podiceps auritus. Нами отмечена только в РА, где она является гнездящимся видом (Гричик 2016). 9 августа мы встретили несколько птиц на небольших водоёмах в Чуйской степи вблизи Кош-Агача.

Рис. 1. Чернозобые гагары *Gavia arctica*. Республика Алтай, озеро Зерлюкаль-Нур. 10 августа 2018. Фото А.И.Гончарова.

Рис. 2. Большие бакланы *Phalacrocorax carbo*. Республика Алтай, озеро Зерлюкаль-Нур. 10 августа 2018. Фото А.И.Гончарова.

Phalacrocorax carbo. Большой баклан может быть многочисленным на гнездовании в определённых районах, а потом полностью исчезать оттуда на десятилетия. Занесён в КК РА в категорию 3. Нами в АК встречено по 4 птицы 6 августа на озёрах Мостовое и Танатор-4. В РА большой баклан встречен нами на озере Зерлюкаль-Нур. 9 августа здесь отмечены 3 особи, а 10 августа – более 30 (рис. 2), что довольно примечательно, учитывая его редкость в целом в РА.

Casmerodius albus. Вид, находящийся в АК на северо-восточном крае ареала и распространённый здесь главным образом в его западной части, занесён в 3-ю категорию КК АК. Нами отмечена в нескольких точках. 6 августа встречена в селе Волчиха. Встреча интересна тем, что прямо в самом селе, в довольно людном месте, находится водоём, окружённый строениями и дорогами, на котором держатся многие водяные птицы – чайки, кулики, утки, цапли, пастушковые, которые почти не реагируют на присутствующих здесь людей. Среди птиц было и несколько больших белых цапель. 6 августа несколько этих цапель отмечено на озёрах Танатор, в частности, на озере Танатор-4.

Ardea cinerea. Довольно обычна в АК, где встречалась нам неоднократно. В РА это редкий вид, занесённый в КК РА. Нами встречена одна серая цапля на Теньгинском озере 8 августа.

Ciconia nigra. Глобально редкий вид, занесённый в КК РФ, КК АК и КК РА. Нами отмечен только в РА. 8 августа 3 птицы встречены недалеко от Чуйского тракта в окрестностях Акташа. Одна птица пролетела над Кош-Агачем 10 августа. Несколько чёрных аистов держалось со скоплением журавлей-красавок в Чуйской степи 11 августа.

Anser anser. Вид, довольно сильно сократившийся в численности и распространении в последние годы на многих участках своего ареала, особенно в европейской части России, однако в АК остаётся местами ещё относительно обычным и в настоящее время не занесён в региональную КК. Нами был встречен на озере Мостовое в Завьяловском районе. Вечером 5 августа на закате стаи серых гусей одна за другой пролетали над берегом в сторону озера в южном направлении. На следующее утро, 6 августа, гуси летели в обратном направлении. Всего за вечернее и утреннее время учтено более двухсот птиц.

Cygnus cygnus. Гнездящийся вид АК и РА. Занесён в КК РА как редкий вид. Семья кликунов в составе 2 взрослых и 3 молодых птиц отмечена 9 августа на одном из водоёмов Чуйской степи недалеко от Кош-Агача. Две птицы отмечены на озере Зерлюкаль-Нур 10 августа.

Tadorna tadorna. В АК обитает недалеко от северных пределов своего распространения. Нами встречены 3 пеганки 6 августа и не менее 5 птиц 7 августа в окрестностях Угловского.

Melanitta deglandi. Гнездящийся на Алтае вид, обитающий здесь на западной границе ареала. Нами встречена группа горбоносых турпанов порядка десятка птиц на одном из водоёмов в Чуйской степи недалеко от Кош-Агача. Присутствовали как самцы, так и самки.

Mergellus albellus. Редкий, единично гнездящийся в РА, вид. Выводок из двух молодых в сопровождении одной взрослой птицы отмечен на озере Красногорское у Тыдтуярыка 11 августа. Размножение лутка отмечается здесь с 2012 года (Архипов и др. 2014).

Circus cyaneus. Самка полевого луня наблюдалась в окрестностях

озера Мостовое, а самец – в окрестностях Угловского 6 августа. В последней точке встречена и самка 7 августа.

Circus macrourus. Вид, глобально сокращающийся в численности, в том числе и на территории АК, занесённый в КК АК. Нами отмечена одна молодая птица 6 августа в окрестностях Волчихи, что косвенно указывает на возможное размножение птиц в этом районе. Так же одна самка степного луня встречена нами 7 августа в окрестностях Угловского.

Circus pygargus. Взрослый самец лугового луня отмечен вечером 6 августа в окрестностях Угловского.

Circus aeruginosus. Самки болотного луня отмечены нами 6 августа на озере Мостовое и в окрестностях Завьялово и Угловского, 7 августа – в окрестностях Угловского.

Buteo hemilasius. В настоящее время характерный для южного Алтая вид, однако, он занесён в КК РА. Утром 9 августа нами встречены 3 птицы, видимо выводок, на автодороге Ортолык–Бельтир. Стоит отметить, что все три птицы были разного типа окраски. Одна взрослая птица была нами вспугнута 9 августа по дороге, ведущей на плато Укок перед Тархатинским озером.

Рис. 3. Восточный канюк *Buteo buteo japonicus*. Окрестности Угловского, Алтайский край. 7 августа 2018. Фото Д.В.Дубиковского.

Buteo buteo japonicus. Таксономический статус восточного канюка трактуется по-разному: либо в качестве самостоятельного вида, либо в качестве подвида обыкновенного канюка. Гнездовой ареал восточного канюка находится гораздо восточнее АК, ближайшие известные места гнездования – это республика Хакасия, где он редок и еди-

ничен, обычным же он становится ещё далее к востоку. Территория Салаира, Алтая и Кузнецкого Алатау в настоящее время входит в зону контакта обыкновенного и восточного канюков, поэтому тут иногда встречаются птицы, сочетающие в себе признаки обеих форм. На территории АК в норме гнездится форма *vulpinus*. Однако по территории АК, главным образом его юга, проходят пути миграции канюков формы *japonicus* – они пересекают эту территорию и следует далее в Казахстан. Нами 7 августа в окрестностях Угловского встречены две одиночные птицы, по полевым определительным признакам соответствующие восточному канюку: отсутствие рыжины, белёсый цвет, тёмный живот и светлые голова с грудью, отсутствие явной полосы по заднему краю крыла и отсутствие ярких полос на хвосте (рис. 3).

Aquila nipalensis. Редкий вид, занесённый в КК РФ, КК АК и КК РА. Нами встречен только в РА. Две одиночные птицы отмечены вечером 7 августа на столбах ЛЭП у дороги недалеко от Ябогана. Там же, но уже утром 8 августа на скалах отмечена ещё одна молодая птица, что свидетельствует о размножении. Один степной орёл встречен 8 августа на Теньгинском озере. Три одиночных орла и пара (взрослый + двухлетний) встречены утром 9 августа на автодороге Ортолык–Бельтир. В этот же день один степной орёл встречен по дороге, ведущей на плато Укок перед Тархатинским озером. 10 августа два степных орла отмечены на берегу озера Зерлюкаль-Нур. Ещё один орёл отмечен 11 августа в Чуйской степи.

Aquila clanga. Редкий вид, занесённый в федеральную и множество региональных Красных книг. В КК АК занесён в 3-ю категорию как редкий вид со спорадичным распространением. За поездку нами отмечены три больших подорлика в АК. Первая птица встречена 6 августа недалеко от озера Мостовое в Завьяловском районе, к югу от него, у автодороги Баёво–Завьялово. Птица сидела недалеко от дороги, а при остановке нашей машины поднялась в воздух. Второй подорлик отмечен тоже 6 августа недалеко от места встречи первой птицы. Он также сидел недалеко от дороги, а при нашей остановке отлетел на десяток метров и снова сел. При фотографировании его было обнаружено, что у птицы сильно повреждён правый глаз и орёл, судя по всему, им не видит. В этот же день, но позже, ещё один подорлик встречен нами в окрестностях Угловского – он сидел на столбе прямо в черте населённого пункта и подпустил очень близко, после остановки нашего автомобиля ещё какое-то время оставаясь на месте, позволив нам хорошо сфотографировать его, после чего всё-таки улетел.

Aquila heliaca. Редкий вид, занесённый в КК РФ, КК АК и КК РА. Нами отмечался за время поездки неоднократно. Первая птица встречена в АК 6 августа парящей в небе в окрестностях Волчихи. Так же 6 августа встречена вторая птица в окрестностях Угловского – она

сидела на дереве, при приближении нашего автомобиля улетела. Там же были встречены ещё два могильника, но уже 7 августа. Два могильника, взрослый и молодой, встречены утром 8 августа на скалах вблизи Ябогана.

Falco cherrug. Глобально редкий вид, занесённый в КК РФ, КК АК и КК РА. Нами встречены два балобана утром 9 августа на автодороге Ортолык–Бельтир. Один был очень тёмной окраски (рис. 4).

Рис. 4. Балобан *Falco cherrug*. Республика Алтай, дорога Ортолык–Бельтир. 9 августа 2018. Фото Д.В.Дубиковского.

Falco peregrinus. Редкий вид, занесённый в КК РФ, КК АК и КК РА. Нами 8 августа встречены два сапсана – взрослый и молодой на берегу Теньгинского озера. Отмечена неудачная попытка охоты молодого сапсана на крякв.

Falco naumanni. Этот вид, занесённый и в федеральную и в региональные Красные книги, достаточно широко распространён в южной части республики Алтай, однако нами была встречена только одна птица – взрослый самец степной пустельги сидел на дереве в Курайской степи на берегу Чуи 11 августа.

Perdix perdix. Выводок серых куропаток встречен 6 августа на берегу озера Мостовое на грунтовой дороге, идущей вдоль подсолнухового поля. С выводком отмечены две взрослые птицы. Размером птенцы были примерно вдвое меньше взрослых.

Grus grus. Занесён в КК РА как вид с постоянно снижающейся численностью. Две взрослые птицы встречены 6 августа в АК на озере

Мостовое и 4 журавля – в окрестностях Угловского. Так же 2 взрослые птицы отмечены 8 августа на Теньгинском озере в РА. Обращает на себя внимание, что все встреченные взрослые птицы держались парами, при этом без сопровождения молодых. Возможно, что все наблюдавшиеся нами серые журавли либо неудачно размножались, либо совсем не гнездились в текущем году.

Anthropoides virgo. Степной вид, занесённый в КК РФ, КК РА и КК АК. Нами встречен только в РА, где он довольно обычен. Несколько птиц встречены 8 августа у Чуйского тракта вблизи Акташа. Пара держалась 9 августа у водоёма в Чуйской степи вблизи Кош-Агача и ещё одна пара пролетела вечером над озером Зерлюколь-Нур. Скопление красавок в несколько десятков птиц отмечено в Чуйской степи 11 августа.

Pluvialis squatarola. Довольно редкий на территории АК пролётный северный кулик. 6 августа на водоёмах около Угловского наблюдалась группа из 3 ржанок, из которых был один тулес (рис. 5).

Рис. 5. Тулес *Pluvialis squatarola*. Алтайский край, окрестности Угловского. 6 августа 2018. Фото Д.В.Дубиковского.

Pluvialis fulva. Как и тулес, довольно редка на пролёте в АК. Нами встречены две бурокрылые ржанки совместно с тулесом 6 августа в окрестностях Угловского.

Charadrius leschenaultii. Вид, распространённый лишь на юге Алтая, где находится северная оконечность его ареала. Занесён в КК РА. Нами было встречено 9 августа около двух десятков толстоклювых зуйков на небольших водоёмах в Чуйской степи вблизи Кош-Агача. Встречены как молодые птицы, что указывает на успешное размножение здесь этого вида, так и взрослые, уже перелинявшие в осенний наряд.

Himantopus himantopus. Вид, занесённый в КК РФ и КК АК. В Алтайском крае находится на северо-восточной границе ареала. Нами отмечен неоднократно – 6 и 7 августа птицы встречены к югу от Завьялово, на озере Танатор-4 и на водоёмах в окрестностях Угловского. Всего отмечено не менее 30 ходулочников, в том числе и молодых.

Recurvirostra avosetta. Редкий вид, занесённый в КК РФ, КК РА и КК АК. Нами встречены птицы в количестве около десятка 6 и 7 августа в окрестностях Угловского. Здесь отмечены как взрослые, так и молодые птицы, что указывает на их размножение. В РА это довольно редкий вид, ставший регулярно гнездиться в Чуйской степи только несколько лет назад. Нами шилоклювки отмечались здесь на небольшом водоёме вблизи дороги 8 августа в количестве нескольких десятков.

Tringa glareola. Вид, занесённый в КК АК в категорию 1 как находящийся в регионе под угрозой исчезновения. В ней указано, что за последние десятилетия встречи фифи в регионе единичны и большая их часть относится к пойме Оби под Барнаулом. Нами одна птица отмечена и сфотографирована 6 августа к югу от Завьялово на небольших водоёмах вдоль дороги, что, видимо, является новой точкой встречи фифи в АК.

Tringa totanus. Группы травников встречены нами к югу от Завьялово 6 августа на небольших водоёмах вдоль дороги. 9 августа несколько этих куликов встречено в Чуйской степи вблизи Кош-Агача и 6 особей – на берегу озера Зерлюкаль-Нур.

Xenus cinereus. Занесена в КК АК, в 3-ю категорию. Отмечается, что в АК в последние десятилетия встречаются одиночные птицы. Мы отметили 6 августа несколько птиц на разных участках озера Танатор-4 (рис. 6), а 9 августа несколько мородунок встречено на небольшом водоёме в Чуйской степи вблизи Кош-Агача.

Phalaropus lobatus. Северный кулик, мигрирующий через юг Сибири. Нами встречены две птицы утром 8 августа на небольшом водоёме у дороги в окрестностях Ябогана. 9 августа стайка из 13 плавунчиков встречена на водоёме в Чуйской степи вблизи Кош-Агача.

Gallinago sp. Виды данного рода неоднократно встречались нам в РА. Однако ввиду сложностей в полевом определении этих птиц и отсутствия фотографий, позволяющих рассмотреть определительные признаки, мы определили этих куликов только до рода, отметив точки, где были встречены птицы. 9 августа одна птица отмечена в Бельтире, другая – в Чуйской степи вблизи Кош-Агача. У последней птицы вся нижняя поверхность крыла, кроме маховых, была густо испещрена тёмными штрихами, что сужает вероятность её принадлежности до двух вариантов – азиатского бекаса *Gallinago stenura* или лесного дупеля *Gallinago megala*. Несколько птиц так же были встречены у уреза воды 10 августа на озере Зерлюколь-Нур.

Рис. 6. Мородунка *Xenus cinereus*. Алтайский край, озеро Танатор-4. 6 августа 2018. Фото Д.В.Дубиковского.

Limosa limosa. Несколько больших веретенников встречены 6 августа недалеко от Завьялово на небольших водоёмах у дороги.

Larus ichthyaetus. Редкий вид, занесённый в КК РФ и КК АК. В регионе распространён главным образом в его западной половине. Нами отмечены одиночные черноголовые хохотуны 6 августа на озере Мостовое. В этот же день отмечены как одиночные птицы, так и скоплениями на озере Танатор-4, где наряду со взрослыми, встречены и молодые, что указывает на размножение.

Larus heuglini barabensis. Таксономический статус этой чайки продолжает оставаться дискуссионным, он рассматривается либо в качестве самостоятельного вида, либо в качестве подвида в составе халея или хохотуньи. Довольно обычная чайка юга Западной Сибири. Неоднократно отмечалась нами во многих местах АК по нашему маршруту. Однако фенотип барабинских чаек довольно различен, что, видимо, обусловлено индивидуальной изменчивостью. Некоторые птицы были заметно крупнее других, что особенно заметно в скоплениях птиц. Также довольно заметно чайки различаются степенью яркости клюва и оттенком мантии (светлее-темнее).

Larus cachinnans mongolus. Как и барабинская чайка, эта форма имеет разную таксономическую трактовку, в данной статье, согласно «Списку птиц Российской Федерации» (Коблик и др. 2006), мы рассматриваем её в качестве подвида хохотуньи. Одна взрослая монгольская чайка отмечена вечером 9 августа над озером Зерлюкаль-Нур. Здесь же на следующий день была встречена ещё одна птица.

Chlidonias niger. Нами отмечены 6 августа молодые и взрослые птицы, уже перелинявшие в зимний наряд, на озере Танатор-4, что указывает на вероятное размножение чёрных крачек в данном месте.

Chlidonias leucopterus. Встречена нами 6 августа на юго-западе АК в окрестностях Угловского и Волчихи, а также на озере Танатор-4. Отмечены как взрослые линяющие белокрылые крачки, так и молодые, что указывает на их размножение.

Sterna hirundo. Речная крачка довольно обычна и неоднократно встречалась нам на маршруте. На юге Сибири при встрече с этими птицами следует обращать внимание на окраску ног и клюва, поскольку по этому признаку различаются подвиды, которые могут быть здесь встречены. Утром 9 августа на небольшом водоёме на окраине Бельтира нами встречены взрослая и молодая речные крачки. У взрослой птицы цвет клюва и ног был почти полностью красным, лишь самый кончик клюва был чёрным. По этому признаку данная крачка относится к западному подвиду *minussensis* (или *hirundo*, если форму *minussensis* принимать как гибридную между восточной и западной), который, по литературным данным, и должен здесь гнездиться. Однако на Алтае уже неоднократно отмечались и особи с тёмными клювами и ногами, которых можно отнести к восточному подвиду *longipennis*. Поэтому можно говорить о том, что в настоящее время на Алтае обитают две разные формы речной крачки, и сведения, уточняющие внешность встречаемых птиц, помогут в дальнейшем разобраться в их распространении. Ещё одна взрослая речная крачка с красными клювом и ногами встречена 9 августа на Тархатинском озере.

Columba livia. Основным видом синантропных голубей на юге Алтая является скальный голубь. 10 августа в Кош-Агаче отмечен одиночный сизый голубь «синантропной», то есть тёмной окраски.

Columba rupestris. Обычный вид Алтая, обитающий здесь как в населённых пунктах и представленный синантропной формой, так и в естественных ландшафтах, главным образом горных, и представленный, соответственно, дикой формой. Синантропная форма отмечена нами 8 августа в Кош-Агаче, 9 августа – в Бельтире. Три диких пугливых скальных голубя отмечены в горах у села Кокоря 11 августа.

Athene noctua. В настоящее время довольно редкий вид южного Алтая, хотя в прошлом был здесь обычным. Один домовый сыч встречен днём 9 августа у подножия горы Джалгизтобе в Чуйской степи.

Coracias garrulus. Распространена на гнездовании в южной и западной части АК, в региональную КК не занесена. Нами отмечена неоднократно 6 и 7 августа в разных точках нашего маршрута. Всего за поездку встречены более 20 сизоворонок. В основном они отмечались сидящими на проводах ЛЭП вдоль дорог. Места встреч: 6 августа – окрестности Завьялово, окрестности Волчихи, окрестности Угловского, 7 августа – окрестности Угловского и Рубцовска.

Merops apiaster. Занесена в КК АК как редкий вид на периферии ареала. Нами золотистая щурка встречена дважды – одиночная птица

недалеко от Волчихи 6 августа и пара щурок – 7 августа в окрестностях Алейска.

Ptyonoprogne rupestris. Редкий вид, спорадично распространённый на Алтае. Пара скальных ласточек встречена нами на скалах у Чуйского тракта недалеко от Айгулака 11 августа.

Melanocorypha yeltoniensis. Вид, отсутствующий в КК АК. В Алтайском крае чёрный жаворонок регистрируется очень редко, главным образом в зимне-весеннее время. Достоверных летних встреч на территории АК не было уже очень продолжительное время, возможно – более полувека, хотя его относительно регулярно регистрируют на сопредельных участках Казахстана. Конкретные гнездовые находки для АК указаны только для начала и середины XX века. В Западной Сибири известно современное его периодическое гнездование по югу Омской области (Нефёдов 2017).

Рис. 7. Чёрный жаворонок *Melanocorypha yeltoniensis*.
Алтайский край, окрестности Угловского. 7 августа 2018. Фото А.И.Гончарова.

Утром 7 августа на степном участке к юго-западу от Угловского нами была встречена группа жаворонков минимум из 4 птиц. По их голосам нам сразу же стало понятно, что это не полевой жаворонок, обычный в этих местах и чей голос нам хорошо знаком. Поведение птиц затрудняло их фотофиксацию – они взлетали невысоко над травой и сразу же планировали в неё обратно. Помимо того, неблагоприятным фактором для фотосъёмки был скудный утренний свет. Нами по очереди были проиграны голоса малого, белокрылого, степного и чёрного жаворонков, однако птицы на них не реагировали. Из всех сделанных нами в таких условиях снимков только на одном удалось

получить приемлемое изображение, по которому достоверно определяется самец чёрного жаворонка в летнем пере (рис. 7). Это, видимо, первая документированная встреча этого вида в летнее время на территории Алтайского края за несколько десятилетий. По остальным нашим снимкам, из-за их качества, нельзя достоверно определить птиц, однако видно, что это жаворонки, и что часть из них – не тёмные. Возможно, что это самки или же молодые птицы этого вида.

Eremophila alpestris. Довольно обычный на Алтае вид. Нами в РА отмечен выводок вблизи автодороги Ортолык–Бельтир 9 августа. В этот же день несколько рогатых жаворонков отмечены у Кош-Агача.

Anthus campestris. Несколько полевых коньков, в том числе и молодые, встречены нами 6 августа к югу от озера Танатор-4, что указывает на размножение.

Motacilla citreola. На юге Алтая обитает подвид *quassatrix*. Самка данной формы встречена 9 августа на берегу водоёма в степи у Ортолыка.

Lanius isabellinus. Обычный на южном Алтае вид. Нами 9 августа обнаружена довольно компактная группировка этого вида на берегу небольшого водоёма в степи недалеко от Ортолыка. Здесь держалось около 20 буланых жуланов, как взрослых, так и слётков.

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Довольно обычный вид Алтая, обитающий здесь, как и скальный голубь, и в синантропных и в диких условиях. Отмечены нами в Кош-Агаче 8 и 9 августа на крышах строений. Несколько особей отмечены 9 августа в Бельтире. Выводок клушиц встречен 10 августа на скалах у озера Зерлюкаль-Нур. Одиночные и группы до 7 птиц отмечены 11 августа у села Кокоря и у Тыдтуярыка.

Prunella fulvescens. Пара птиц отмечена утром 10 августа на скалах у озера Зерлюкаль-Нур. Несколько бледных завирушек встречено 11 августа у села Кокоря.

Locustella naevia. Одна птица встречена в Рубцовском районе АК 7 августа. Ещё один обыкновенной сверчок встречена 9 августа вблизи Ортолыка.

Acrocephalus arundinaceus. 6 августа встречена одна взрослая дроздовидная камышевка в прибрежных зарослях на берегу озера Танатор-4.

Phylloscopus griseolus. Спорадично распространённый на Алтае вид, обитающий здесь близ северной границы своего распространения. Одна индийская пеночка встречена нами 11 августа у села Кокоря.

Muscicapa striata. Обычная птица, неоднократно встречалась нам во время поездки. Одна встреча представляет интерес, поскольку мухоловка была встречена 9 августа на вершине одиночной горы Джалгизтобе в Чуйской степи, вдалеке от ближайших деревьев и лесов. По всей видимости, это была мигрирующая особь.

Oenanthe oenanthe. Самец обыкновенной каменки встречен 9 августа на окраине Бельтира.

Oenanthe pleschanka. Является гнездящимся видом Алтая. Нами встречена одна-единственная птица этого вида 11 августа. На скалах вблизи Чуйского тракта недалеко от села Курай держался взрослый линяющий самец плешанки.

Oenanthe deserti. Гнездящийся вид Южного Алтая на северной границе ареала. Несколько взрослых пустынных каменок обоих полов в процессе линьки встречены нами на горе Джалгизтобе в Чуйской степи 9 августа.

Oenanthe isabellina. По нашим наблюдениям, каменка-плясунья оказалась довольно обычным, местами – многочисленным видом юга АК и РА.

Monticola saxatilis. На Алтае является довольно обычным гнездящимся видом. Нами встречено несколько птиц 11 августа рядом с Чуйским трактом недалеко от Айгулака и 1 птица – у села Кокоря.

Phoenicurus ochruros. На Алтае местами обычна. Нами одна птица отмечена 9 августа в Бельтире, прямо посреди населённого пункта, где она сидела на металлическом заборе. Несколько горихвосток-чернушек отмечено 11 августа на скалах у Чуйского тракта вблизи Айгулака и у Тыдтуярыка, а так же у села Кокоря.

Turdus ruficollis. Спорадично распространён на Алтае. Стайка краснозобых дроздов примерно из десятка птиц отмечена вечером 11 августа на Семинском перевале.

Passer domesticus. На территории РА домовый воробей является довольно обычным видом. Однако здесь отмечены особи, которые по внешним признакам могут быть отнесены к индийскому воробью. Учитывая это, мы уделяли внимание этому виду, специально высматривая воробьёв с признаками индийских. Однако из всех встреченных нами воробьёв таких особей отмечено не было.

Petronia petronia. Гнездящийся на Алтае вид, обитающий здесь близ северной границы ареала. Нами встречена стая каменных воробьёв не менее чем в сотню птиц 9 августа в Чуйской степи у Кош-Агача. Ещё одна небольшая стайка отмечена 11 августа на окраине Чуйской степи.

Carduelis caniceps. На Алтае седоголовый щегол – гнездящийся вид. Нам встретилась стайка примерно в 10 особей вблизи Тыдтуярыка 11 августа. Среди птиц были как взрослые, так и молодые, что указывает на размножение.

Carduelis flavirostris. Стайка в полтора-два десятка горных чечёток встречена утром 10 августа на скалах у озера Зерлюкаль-Нур.

Bucanetes mongolicus. Редкий вид, встречающийся на юго-востоке Алтая, где он находится на крайнем севере своего ареала. Зане-

сён в КК РА. Несколько монгольских снегирей мы встретили 11 августа на скалах у села Кокоря (рис. 8).

Рис. 8. Монгольский снегирь *Bucanetes mongolicus*. Республика Алтай, окрестности села Кокоря. 11 августа 2018. Фото А.И.Гончарова.

Emberiza godlewskii. Довольно обычный для Алтая вид, известный из многих точек. Нами была встречена и сфотографирована одна овсянка Годлевского утром 8 августа недалеко от Ябогана.

Schoeniclus pallasi. Две полярные овсянки (по всей видимости, молодые) встречены у берега озера Зерлюкаль-Нур 10 августа.

Emberiza aureola. Вид, ставший глобально редким, исчезнувший за последнее десятилетие из многих мест своего обитания по всему ареалу. Нами 8 августа встречена самка дубровника на берегу Тенькинского озера в Онгудайском районе РА. Следует отметить, что она отмечалась тут другими наблюдателями в июле 2018 года, поэтому мы целенаправленно искали здесь этот вид.

Наши наблюдения дополняют материалы по авифауне Алтайского края и республики Алтай, собранные в последние годы (Грибков и др. 2010; Эбель и др. 2012; Архипов и др. 2014; Эбель 2015; Гричик 2016).

Литература

Архипов В.Ю., Беляев И.А., Кондрашов Ф.А., Михайлов К.Е., Писаревский С.В., Шнайдер Е.П., Эбель А.Л. 2014. К распространению и фенологии некоторых неворобьиных птиц Горного Алтая // *Рус. орнитол. журн.* **23** (972): 563-576.

Грибков А.В., Гармс О.Я., Рябицев В.К., Рябицев А.В. 2010. К фауне птиц хребта Сайлюгем и его окрестностей (Юго-Восточный Алтай) // *Рус. орнитол. журн.* **19** (593): 1515-1561.

Гричик В.В. 2016. Материалы к распространению и биологии птиц Юго-Восточного Алтая (неворобьиные) // *Орнитология* **40**: 46-61.
Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-256.
Красная книга Алтайского края. Том 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. 2016. Барнаул: 1-312.
Красная книга республики Алтай (животные). 2017. 3-е изд. Горно-Алтайск: 1-368.
Нефёдов А.А. 2017. К орнитофауне Омской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1447): 2043-2079.
Эбель А.Л. 2015. О некоторых фаунистических и фенологических наблюдениях птиц в Алтайском крае (неворобьиные) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1104): 427-450.
Эбель А.Л., Елисеев С.Л., Уколов И.И., Чернышев О.Г., Вурман Д.Э. 2012. К фауне птиц Горного Алтая // *Рус. орнитол. журн.* **21** (766): 1367-1380.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1702**: 5865-5869*

Дополнение к списку и новые сведения о птицах окрестностей деревни Красницы (Гатчинский район Ленинградской области)

В.И.Головань

Владимир Иванович Головань. Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: golovanv@gmail.com

Поступила в редакцию 25 ноября 2018

За период, прошедший с опубликования списка птиц окрестностей деревни Красницы Гатчинского района Ленинградской области и дополнения к нему (Головань 2012, 2014), получены новые данные о населении птиц этой местности. Список пополнился новыми видами, а некоторые виды появились здесь вновь после некоторого перерыва.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Взрослая особь наблюдалась 7 ноября 2015 на реке Суйде вблизи впадения в неё Большого ручья. Птица вынырнула из густого тумана, стоявшего в течение всего дня, в 25-30 м от меня и тут же резко взмыла вверх. Появление здесь орлана можно объяснить многочисленностью вида в настоящее время в Ленинградской области. В октябре 2015 года наблюдалось скопление орланов в Свирской губе Ладожского озера (Ковалев 2015).

Серая куропатка *Perdix perdix*. После обильных снегопадов в декабре 2010 года вид исчез в январе 2011 года (Головань 2014). После нескольких непродолжительных и тёплых зим 2014-2016 годов серые куропатки вновь были встречены в окрестностях деревни Красницы в

октябре 2016 года. В апреле 2018 года на приусадебных участках и вблизи деревни держались 2 особи, а в октябре у Симкиного ручья была поднята стайка из 16 птиц.

Рис. 1. Луговой конёк *Anthus pratensis* с кормом для слётков.
Кауштинское болото. 18 июля 2015. Фото автора.

Рис. 2. Мочажинный участок Кауштинского болота, где был встречен выводок лугового конька *Anthus pratensis*. 9 мая 2018. Фото автора.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. Эти птицы встречались преимущественно зимой и ранней весной на зарастающей гари и в пойме реки Суйды. Токование наблюдалось лишь изредка в первые годы мо-

их наблюдений. Сведений о гнездовании белой куропатки на Кауштинском болоте не было. Лишь 28 июня 2018 на мочажинном участке болота была поднята взрослая птица, а спустя несколько минут здесь же влетели две молодые куропатки. Они были в полтора раза меньше взрослой особи.

Чибис *Vanellus vanellus*. После 2009 года в пойме реки Суйды чибисы не гнездились. Вновь две пары чибисов поселились в 2018 году на распаханном охотниками участке берега реки у старицы Сковорода.

Дупель *Gallinago media*. Одна особь была встречена 11 июля 2018 на лугу у Симкиного ручья. В это время встречи одиночных дупелей здесь отмечаются почти ежегодно (на том же самом месте).

Мохноногий сыч *Aegolius funereus*. Токование мохноногого сыча неоднократно слышалось на правом берегу реки Суйды на участке от Большого ручья до очистных сооружений, а также на левом берегу в ельнике, расположенном у юго-западной части Кауштинского болота. Здесь 10 апреля 2015 в густом еловом лесу удалось увидеть мохноногого сыча. Птица в течение получаса занималась уходом за пером. Она расположилась на еловой ветви на высоте 7-8 м и не обращала внимания на расположившихся поблизости зябликов *Fringilla coelebs*, постоянно окрикивавших сову.

Седой дятел *Picus canus*. За весь период моих наблюдений седой дятел наблюдался лишь дважды: в августе 2012 года молодая особь кормилась на опушке леса у лесной гари, а в октябре 2016 года взрослый седой дятел поздним вечером обследовала жилой дом на восточной окраине деревни Красницы.

Луговой конёк *Anthus pratensis*. Обычен на пролёте. В течение августа стайки луговых коньков останавливаются на Кауштинском болоте, а в сентябре и октябре они появляются и в пойме реки, но в значительно меньшем количестве. На гнездовании этот конёк малочислен и гнездится лишь на Кауштинском болоте. 18 июля 2015 на мочажинном участке болота птицы кормили слётков, ещё не способных летать (рис. 1, 2).

Обыкновенный сверчок *Locustella naevia*. В начале июля 2018 года самец активно пел у восточной окраины деревни Красницы.

Московка *Parus ater*. Отмечалась изредка лишь осенью и в небольшом числе. С осени 2016 года московка стала встречаться регулярно. С начала марта 2017 года слышалось регулярное пение, а 5 мая 2017 в ельнике близ устья Большого ручья московка сильно беспокоилась, как около гнезда. В 2018 году московки по-прежнему были обычны в течение всего года.

Пуночка *Plectrophenax nivalis*. Пролёт пуночек в окрестностях деревни Красницы не наблюдался. За все годы исследований вид был отмечен лишь дважды. 5 апреля 2016 одна особь кормилась на обо-

чине полевой дороги между деревней и Симкиным ручьём (рис. 3). Здесь же одну пуночку отметили 30 октября 2018. Птица держалась здесь в течение всего дня (рис. 4).

Рис. 3. Пуночка *Plectrophenax nivalis*. Окрестности деревни Красницы. 5 апреля 2016. Фото автора.

Рис. 4. Пуночка *Plectrophenax nivalis*. Окрестности деревни Красницы. 30 октября 2018. Фото автора.

Литература

Головань В.И. 2012. Птицы окрестностей деревни Красницы (Гатчинский район Ленинградской области) // *Рус. орнитол. журн.* **21** (750): 899-927.

Головань В.И. 2014. Дополнение к списку птиц окрестностей деревни Красницы (Гатчинский район Ленинградской области) // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1040): 2658-2662.

Ковалев В.А. 2015. Скопление орланов-белохвостов *Haliaetus albicilla* в Нижне-Свирском заповеднике в октябре 2015 года // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1204): 3787-3790.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1702**: 5869-5872*

Первая регистрация сибирской теньковки *Phylloscopus collybita tristis* в Новгородской области

В.Ю.Архипов

Владимир Юрьевич Архипов. Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Пущино, Московская область, 142290, Россия. Государственный природный заповедник «Рдейский». Ул. Челпанова, д. 27, г. Холм, Новгородская область, 175270. Россия.
E-mail: arkhivov@gmail.com

Поступила в редакцию 27 ноября 2018

Одиночный поющий самец сибирской теньковки *Phylloscopus collybita tristis* был встречен мной 21 мая 2018 в заболоченном сосняке на берегу Роговского озера в Рдейском заповеднике (Холмский район Новгородской области). Птица определена по характерной песне, а впоследствии хорошо рассмотрена и сфотографирована (рис. 1). В течении примерно 15 мин я следовал за поющей и кормящейся птицей, которая перелетала по соснам вдоль берега озера. Это позволило мне записать её характерную песню (рис. 2). Особь не производила впечатления территориальной, так как следовала в южном направлении вдоль озера и в окрестностях места первоначальной встречи впоследствии не появилась. Биотоп, где была найдена сибирская теньковка, представлял собой разреженный сосняк на болоте с багульником и визуально напоминал северо-таёжные ландшафты. Обычных в окрестностях заповедника теньковок восточно-европейского подвида в данном биотопе отмечено не было.

Сибирская теньковка – подвид *Phylloscopus collybita* с хорошо выраженными отличиями в вокализации и незначительными отличиями в окраске (Marova *et al*. 2013, Shipilina *et al*. 2017). В некоторых современных сводках она рассматривается в качестве самостоятельного вида (del Holyo, Collar 2016).

Рис 1. Сибирская теньковка *Phylloscopus collybita tristis* у берега Роговского озера. Рдейский заповедник. 21 мая 2018. Фото В.Ю.Архипова.



Рис 2. Спектрограмма фрагмента песни сибирской теньковки *Phylloscopus collybita tristis*. 21 мая 2018. Рдейский заповедник. Запись: В.Ю.Архипов.



Рис 3. Спектрограмма фрагмента типичной песни восточно-европейской теньковки *Phylloscopus collybita abietinus*. Окрестности деревни Ельно, Рдейский заповедник. 26 апреля 2013. Запись: В.Ю.Архипов.

В Новгородской области обычен на гнездовании восточноевропейский подвид теньковки *Ph. c. abietinus* (Степанян 2003, Коблик и др. 2006), который, как уже было сказано, хорошо отличается от сибирской формы характерной (тенькающей) песней (рис. 3). Данных о находках сибирского подвида в Новгородской области до настоящего времени в орнитологической литературе не было. Ближайший известный район обитания сибирской теньковки – Архангельская область, где находится зона контактов восточноевропейской и сибирской теньковок (Комарова, Шипилина 2010; Квартальнов 2017). В последние годы в весенне-летнее время неоднократно регистрировали отдельных поющих самцов теньковки с песней сибирского подвида значительно западнее известного ареала, например, в Карелии (Хохлова 2017), в Москве, в Московской и Ярославской областях (Уколов 2014) и даже в Ростовской области (Марова 2018). Что позволяет предполагать продвижение сибирской формы на запад. Это подтверждают также участившиеся встречи сибирских теньковок на пролёте в европейской части России и других европейских странах (Редькин 2003, de Knijff *et al*. 2012, Dean 2013; и др.).

Литература

Квартальнов П.В. 2017. Сибирские элементы в фауне птиц окрестностей Архангельска: синехвостка *Tarsiger cyanurus* и гибридная теньковка *Phylloscopus collybita abietinus* × *Ph. (c.) tristis* // *Рус. орнитол. журн*. **26** (1507): 4159-4167.

Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-287.

Комарова А.Ф., Шипилина Д.А. 2010. Гибридная популяция восточно-европейской и сибирской форм пеночки-теньковки *(Phylloscopus collybita abietinus*, *Ph. (c.) tristis)* в Пинежском заповеднике // *Актуальные проблемы экологии и природопользования* **12**: 239-244.

Марова И.М., Ильина И.Ю., Иваницкий В.В. 2018. Неожиданная встреча в начале лета: гибрид сибирской *Phylloscopus tristis* и европейской *Ph. collybita* теньковок в Ростовской области // *Рус. орнитол. журн*. **27** (1604): 2093-2099.

Редькин Я.А. 2003. Осенние находки сибирских теньковок в Москве и Московской области // *Птицы Москвы и Подмосковья – 2001*. М.: 101-105.

Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области)*. М.: 1-808.

Уколов И.И. 2014. Летние встречи сибирской теньковки *Phylloscopus collybita tristis* в центре европейской части России // *Рус. орнитол. журн*. **23** (1039): 2645-2647.

Хохлова Т.Ю. 2017. Встреча гибридной теньковки *Phylloscopus collybita abietinus* × *Ph. (c.) tristis* в Сегежском районе Карелии // *Рус. орнитол. журн*. **26** (1519): 4552-4553.

del Hoyo J., Collar N.J. 2016. *HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World*. Vol. 2. Passerines. Barcelona: 1-1013.

Dean A. 2013. How many Siberian Chiffchaffs are reaching Britain? // *Brit. Birds* **106**: 282-283.

de Knijff P., van der Spek V., Fisher J. 2012. Genetic identity of grey chiffchaffs trapped in the Netherlands in autumns of 2009-2011 // *Dutch Birding* **34**: 386-392.

Marova I.M., Shipilina D.A., Fedorov V.V., Ivanitskii V.V. 2013. Siberian and Eastern European Chiffchaffs: geographical distribution, morphological features, vocalization,

phenomenon of mixed singing and evidences of hybridization in sympatry zone // *El Mosquitero ibérico. Grupo Ibérico de Anillamiento* / N.Rodríguez, J.García, J.L.Copete (coord.). León: 119-139.
Shipilina D., Serbyn M., Ivanitskii V., Marova I., Backström N. 2017. Patterns of genetic, phenotypic, and acoustic variation across a chiffchaff *(Phylloscopus collybita abietinus/tristis)* hybrid zone // *Ecology and Evolution* **7**: 2169-2180.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1702**: 5872-5873*

Регистрация гоголя-головастика *Bucephala albeola* у юго-восточного побережья Чукотского полуострова

А.В.Косяк

Анатолий Васильевич Косяк. Национальный парк «Берингия». Набережная Дежнёва д. 10, пгт. Провидения, Чукотский АО, 689251, Россия. E-mail: kosyak5709@mail.ru

Поступила в редакцию 27 ноября 2018

Гоголь-головастик *Bucephala albeola* распространён в лесной зоне Северной Америки. В России известны регулярные залёты на Камчатку, Командорские острова и в Приморье (Сыроечковский 2011).

В литературе имеется информация о наблюдении 25-27 мая 2005 самки гоголя-головастика в бухте Эмма (Загребин и др. 2015). 27 мая 2011 в этом же районе также встречена одиночная самка (И.А.Загребин, устн. сообщ.).



Гоголи-головастики *Bucephala albeola*. Юго-восточное побережье Чукотского полуострова. 19 сентября 2018. Фото А.В.Косяка.

19 сентября 2018 самка и два самца гоголя-головастика наблюдались у юго-восточного побережья Чукотского полуострова (см. рисунок). Птицы держались в 100-120 м от берега Северной Чаплинской косы (в 12 км к северо-западу от мыса Чаплина) в точке с координатами 64°

29'19.08" с.ш., 172°23'10.08" з.д. Гоголи-головастики около 40 мин отдыхали на воде, не приближаясь к берегу, а затем улетели в северо-восточном направлении.

Литература

Загребин И.А., Антипин М.А., Косяк А.В. 2015. Регистрация редких и залётных видов птиц на юго-востоке Чукотского полуострова в 2001-2015 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1172): 2701-2716.

Сыроечковский Е.Е. (ред.) 2011. *Полевой определитель гусеобразных птиц России*. М.: 1-219.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1702**: 5873-5874*

Поздняя встреча плосконосого плавунчика *Phalaropus fulicarius* около мыса Чаплина на юго-востоке Чукотского полуострова

М.А.Антипин, И.Г.Бобырь

Максим Александрович Антипин, *Игорь Германович Бобырь*. Национальный парк «Берингия». Набережная Дежнева, д. 10, пгт. Провидения, Чукотский АО, 689251, Россия.
E-mail: merops@mail.ru; ostrova.bobyr@gmail.com

Поступила в редакцию 27 ноября 2018

Поздняя встреча плосконосого плавунчика *Phalaropus fulicarius* зарегистрирована 23 ноября 2018 на морском побережье недалеко от мыса Чаплина (64°29'10.85" с.ш, 172°22'53.05" з.д.).

Плосконосый плавунчик *Phalaropus fulicarius*. Окрестности мыса Чаплина на юго-востоке Чукотского полуострова. 23 ноября 2018. Фото И.Г.Бобырь.

Одиночная птица кормилась на море вдоль песчано-галечной косы в 5 м от берега (см. рисунок). Следует отметить, что активная осенняя миграция плосконосых плавунчиков наблюдается на юго-востоке Чукотского полуострова в первой декаде сентября (Антипин 2016), в то время как одиночные птицы чаще всего держатся в указанном районе до первых чисел октября.

Литература

Антипин М.А. 2017. Результаты кратковременных орнитологических учётов в районе мыса Чаплина в летне-осенний период 2016 года // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1542): 5379-5395.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1702**: 5874-5875*

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* в условиях города Львова

В.С.Климишин

*Второе издание. Первая публикация в 1962**

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* впервые появилась в городе Львове в апреле 1949 года (Страутман 1951). Пару этих птиц обнаружили в ботаническом саду по улице Ломоносова. В мае того же года кольчатые горлицы загнездились и выкормили двух птенцов. С тех пор они наблюдались во Львове постоянно, причём численность их всё увеличивалась. В настоящее время, как показывают данные зимнего учёта 1962 года, кольчатых горлиц во Львове насчитывается не менее 400 особей.

Кольчатая горлица – птица культурного ландшафта. Нами эти птицы наблюдались в небольших садах по улицам Энгельса, Ленина, Шевченко, Ломоносова, Кузнецова и др. Ни разу кольчатые горлицы не были встречены в больших массивах деревьев (Стрийский парк, парк Железные Воды, Погулянка и др.).

Активны кольчатые горлицы на протяжении светового дня. С рассветом можно услышать воркование, птицы начинают перелетать к местам кормёжек и на водопой. К 21 ч они успокаиваются, сидят на деревьях, нередко воркуют. На ночлег собираются на деревьях большими группами. Так, 23 августа 1961 во дворе жилого дома по улице

* Климишин В.С. 1962. Кольчатая горлица в условиях г. Львова // *Материалы 3-й Всесоюз. орнитол. конф.* Львов, **2**: 28-29.

Энгельса собралось на ночлег на берёзе и ели 44 птицы (в основном молодые), во дворе пожарного училища по улице Кузнецова, д. 35, в конце февраля – марте 1962 года на ночёвке наблюдалось около 200 кольчатых горлиц.

Зимой кольчатые горлицы концентрируются вблизи мест, изобилующих кормами. Такими местами кормёжек являются: элеватор по улице Шевченко, мельзавод по улице Лемковской, двор дома № 59 по улице Волгоградской, где их подкармливает пенсионер Ю.А.Билинкевич. На элеваторе и мельзаводе горлицы склёвывают зерно, просыпанное при транспортировке и перегрузке, а также отходы помола. Здесь же кормятся и домашние сизые голуби *Columba livia*, но кольчатые горлицы держатся обособленно. В продолжение дня группы птиц от 2-3 до 15-17 штук постоянно перелетают от места ночёвки к месту кормёжки. 17-18 марта 1962, когда наблюдалось резкое похолодание и выпал снег, кольчатые горлицы весь день держались у мельзавода по улице Лемковской, а часть из них здесь же и ночевала, не вернувшись на место постоянного ночлега по улице Кузнецова, д. 35.

С наступлением весны кольчатые горлицы разлетаются по всему городу, занимая для гнездовий новые районы, а часть из них улетает за черту города. Так, весной 1962 года кольчатые горлицы наблюдались нами на улицах Варшавской, Пасечной, в посёлке Брюховичи, где ранее их не было.

Цикл размножения у кольчатых горлиц ранний. Гнёзда они охотно устраивают на хвойных деревьях, но не пренебрегают и другими породами деревьев. Из 17 обнаруженных нами гнёзд 5 располагались на ели, 3 на сосне и 9 на каштане. Гнездо представляет собой рыхлую постройку из тонких веточек, без всякой подстилки, с очень мелким лотком и располагается на высоте от 3-4 до 20 м. Яйца начинают откладывать во второй половине апреля (24-25 апреля 1962 в 3 гнёздах были уже слегка насиженные яйца). Некоторые пары в это же время ещё заняты постройкой гнезда. Яйца в поздних гнёздах появляются в первых числах мая. В условиях Львова зафиксировано две кладки, возможно, бывает и третья. Для второй кладки птицы строят новые гнёзда, изредка используя прошлогодние гнёзда или даже такие, в которых насиживали яйца первой кладки.

Наблюдения за кольчатыми горлицами во Львове показывают, что эта птица хорошо приспособилась к условиям города и вошла в число птиц-урбанистов.