ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2018
XXVII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1703
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2018 № 1703

СОДЕРЖАНИЕ

5879-5882 Дубровник *Ocyris aureola* на Вишерском Урале и в некоторых районах Приамурья. В.А.КОЛБИН

5882-5884 Хищничество перевязки *Vormela peregusna* в колонии зелёной щурки *Merops persicus* в Ставропольском крае. Л.В.МАЛОВИЧКО, К.Е.УМЕЦ

5885-5897 Фауна птиц бассейна средней Вычегды (Республика Коми) по наблюдениям 2018 года. О.Ю.МИНЕЕВ, С.К.КОЧАНОВ, Г.Л.НАКУЛ

5898 Встреча старика *Synthliboramphus antiquus* на юго-востоке Чукотского полуострова. И.Г.БОБЫРЬ

5899-5900 Гнездо скопы *Pandion haliaetus* на триангуляционной вышке в Усть-Илимском районе Иркутской области. В.В.ПОПОВ

5900-5901 Встречи воробьиного сычика *Glaucidium passerinum* в Плюсском районе Псковской области. С.В.ГОРЧАКОВ

5901-5902 Зимняя встреча юрка *Fringilla montifringilla* и зяблика *Fringilla coelebs* в городе Печоры. А.В.БАРДИН

5902-5903 К питанию белой трясогузки *Motacilla alba* и лесного конька *Anthus trivialis* в Ленинградской области. И.В.ПРОКОФЬЕВА

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2018
Дата опубликования: 11 декабря 2018

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVII
Express-issue

2018 № 1703

CONTENTS

5879-5882 The yellow-breasted bunting *Ocyris aureola* on Vishersky Ural and in some areas of the Amur region. V.A.KOLBIN

5882-5884 Predation by the marbled polecat *Vormela peregusna* on blue-cheeked bee-eater *Merops persicus* nests in Stavropol Krai. L.V.MALOVICHKO, K.E.UMETZ

5885-5897 Bird fauna in the middle reaches of the Vychegda River basin (Komi Republic) according to 2018 observations. O.Yu.MINEEV, S.K.KOCHANOV, G.L.NAKUL

5898 The record of the ancient murrelet *Synthliboramphus antiquus* in the southeast of the Chukotka Peninsula. I.G.BOBYR

5899-5900 Nest of the osprey *Pandion haliaetus* on a triangulation tower in the Ust-Ilimsk Raion, Irkutsk Oblast. V.V.POPOV

5900-5901 The records of the Eurasian pygmy owl *Glaucidium passerinum* in the Plyussa Raion, Pskov Oblast. S.V.GORCHAKOV

5901-5902 Winter records of the brambling *Fringilla montifringilla* and the chaffinch *Fringilla coelebs* in Pechory. A.V.BARDIN

5902-5903 To the food of the white wagtail *Motacilla alba* and the tree pipit *Anthus trivialis* in the Leningrad Oblast. I.V.PROKOFJEVA

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2018

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск ***1703****: 5879-5882*

Дубровник *Ocyris aureola* на Вишерском Урале и в некоторых районах Приамурья

В.А.Колбин

Василий Анфимович Колбин. ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский». Ул. Гагарина, д. 36 Б, г. Красновишерск, Пермский край, 618590, Россия. ФГБУ «Государственный заповедник «Норский». Ул. Садовая, д. 21, посёлок Февральск, Селемджинский район, Амурская область, 676572, Россия. E-mail: kgularis@mail.ru

Поступила в редакцию 27 ноября 2018

Данные, рассмотренные в этом сообщении, собраны в ходе общих учётов птиц, которые проводились в Комсомольском, Норском и Вишерском заповедниках и сопредельных с ними территориях, а также на побережье Татарского пролива и в пойме реки Амур в окрестностях озёр Удыль и Кади. В Комсомольском заповеднике наблюдения проводились с 1984 по 1991 год, в Норском – с 2000 по 2018 год, в Вишерском – с 1995 по 2017 год, на Нижнем Амуре и побережье Татарского пролива в июне-июле 2018 года.

В Комсомольском заповеднике, расположенном по левому берегу Амура в районе устья реки Горин, наибольшее количество дубровников *Ocyris aureola* отмечалось на пойменных лугах. Здесь этот вид безоговорочно доминировал (рис. 1). На болотах эти птицы встречались значительно реже: по данным учёта 1987 года, плотность населения дубровников на лиственничной мари в окрестностях стационара Золотой составила 1.3 пар/км². По данным Б.А.Воронова (1986), плотность вида на немелиорированных лугах в окрестностях Комсомольска-на-Амуре составила 39 ос./км².



Рис. 1. Ранговое распределение птиц по обилию на лугах Комсомольского заповедника.

По данным учётов с лодки в низовьях реки Горин, встречаемость дубровников составила 3.2±1.5 пар/10 км реки.

В Норском заповеднике дубровники также отмечались на лугах разного типа и травянистых болотах. Доминирование вида, по данным за 2000-2006 годы, было выражено ещё сильнее, чем в Комсомольском заповеднике (рис. 2). Плотность населения дубровника на лугах в период с 2007 по 2013 год составила 16.5±6.7 пар/км². В 2015 и 2016 годах птицы в местах традиционного пребывания возле посёлков Февральск и Норск не были обнаружены. В третьей декаде мая 2018 года дубровники были вновь зарегистрированы на лугу в пойме реки Альдикон в окрестностях Норска, локальная плотность населения вида составила 14.3 пар/км². На лугах в окрестностях Февральска дубровники снова не отмечались.



Рис. 2. Ранговое распределение птиц по обилию на лугах Норского заповедника.

На Нижнем Амуре в окрестностях озёр Удыль и Кади в июне-июле 2018 года не было встречено ни одного дубровника, правда, целенаправленного поиска вида не предпринималось. На побережье Татарского пролива на заболоченных лугах в окрестностях реки Нигирь 12 июля 2018 отмечено 3 пары этих овсянок.

На территории Вишерского заповедника численность дубровников никогда не была высокой вследствие небольшой площади лугов. До 2005 года территориальные самцы эпизодически регистрировались на альпийских лугах в горной части. На луговине возле кордона Лыпья 1-2 пары дубровников гнездились с 1995 по 2013 годы.

По данным учётов с лодки в среднем течении реки Вишеры в 2004-2005 годах (188 км) встречаемость дубровников составила 2.1±1.7 пар

Рис. 3. Самец дубровника *Ocyris aureola* в окрестностях посёлка Февральск. 29 мая 2011. Фото автора.

Рис. 4. Самка дубровника *Ocyris aureola* на болоте у реки Нигирь около побережья Татарского пролива. 12 июля 2018. Фото автора.

на 10 км русла, а встречаемость самых обычных камышовых овсянок *Schoeniclus schoeniclus* на этом же маршруте была 1.7±1.1 пар/10 км. Во время сплавов в гнездовое время в 2014 году и в последующие годы дубровники не отмечались (Колбин 2016).

Таким образом, можно констатировать исчезновение дубровника в окрестностях Вишерского заповедника и значительное снижение численности в обследованных районах Приамурья.

Литература

Воронов Б.А. 1986. Влияние мелиорации на население птиц в зоне восточного участка БАМ // *Тез. докл. 9-й Всесоюз. орнитол. конф.* Л.,1: 133-134.

Колбин В.А. 2016. *Птицы заповедника «Вишерский» и прилегающих территорий*. М.: 1-356.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1703**: 5882-5884*

Хищничество перевязки *Vormela peregusna* в колонии зелёной щурки *Merops persicus* в Ставропольском крае

Л.В.Маловичко, К.Е.Умец

Любовь Васильевна Маловичко, *Константин Евгеньевич Умец*. Кафедра зоологии, факультет зоотехнии и биологии, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, Москва, Россия. mail: l-malovichko@yandex.ru; kostya_umets_93@inbox.ru

Поступила в редакцию 6 декабря 2018

Гнездование в норах имеет существенные преимущества, так как повышает защищённость кладок, птенцов и взрослых птиц от хищников. Поэтому у птиц-норников потери яиц и птенцов из-за деятельности хищников значительно меньше, чем у открыто гнездящихся видов (Маловичко, Константинов 2000). О хищнической деятельности млекопитающих но отношению гнёзд птиц-норников можно судить по следам, обнаруженным на песке у входа в норы. Из млекопитающих в колонии зелёной щурки *Merops persicus* 13 июля 2014 в Левокумском районе Ставропольского края у хутора Арбали мы отмечали ушастого ежа *Hemiechinus auritus*. Серая крыса *Rattus norvegicus* отмечена 29 мая 2008 в колонии зелёных щурок на территории жилой кошары в 500 м от реки Кумы. На этой же кошаре чабаны наблюдали, как лисица *Vulpes vulpes* разрывала нору зелёных щурок.

Интересные наблюдения за хищнической деятельностью перевязки *Vormela peregusna* (редкого вида куньих) нам удалось провести в 2018

году на территории кошары севернее хутора Кочубей Левокумского района Ставропольского края (45°04.384' с.ш., 45°11.623' в.д.).

Эта колония зелёных щурок состояла из 10 нор. Стационарные наблюдения проводились с 13 мая по 20 июля 2018. Суточная активность птиц в период насиживания кладки и выкармливания птенцов изучалась с применением фотоловушки (Falcon Eye FE-AC200G). Наблюдаемая нора зелёной щурки находилась в 102 м от жилого дома и 31 м от загонов для овец (рис. 1). Длина тоннеля норы – 164 см; высота входного отверстия – 5.5 см, ширина входного отверстия – 5.6 см. Гнездовая камера имела следующие размеры: длина – 30 см; ширина – 20 см; высота – 14 см.

Рис. 1. Космический снимок кошары с колонией зелёных щурок *Merops persicus* в окрестностях хутора Кочубей Левокумского района Ставропольского края.

Самка приступила к насиживанию кладки 4 июня 2018. А 11 июня гнездо было разорено перевязкой, что зафиксировано установленной у норы фотоловушкой. Главным способом добывания пищи у перевязок служит охота на мелких грызунов и птиц в их же собственных норах. Впервые фотоловушка зафиксировала присутствие перевязки в 10 ч 49 мин. До 10 ч 54 мин она ходила возле норы. Первый заход в нору состоялся в 10 ч 54 мин, при этом зверёк расширил вход в нору (рис. 2). Находилась перевязка в норе 41 мин – до 11 ч 35 мин. Затем в течение минуты перевязка на выходе из норы озиралась по сторонам (рис. 3).

Второй заход перевязки в нору щурки отмечен в 11 ч 36 мин и продлился почти целый час – до 12 ч 35 мин. С 12 ч 35 мин перевязка, высунувшись из норы, просидела до 13 ч 37 мин. Потом перевязка ещё 4 раза (в 13 ч 37 мин, 13 ч 57 мин, 16 ч 41 мин и 18 ч 30 мин) выходила из норы – осматривалась по сторонам в течение минуты и опять заходила в нору. С 18 ч 30 мин фотоловушка фиксировала перевязку у норы до 18 ч 42 мин, но из-за перехода в режим ночной сьёмки не было видно захода в нору. Позже, уже в темноте перевязка наблюдалась

около норы с 19 ч 46 мин до 20 ч 04 мин. Всего перевязка провела в норе зелёной щурки 433 мин.

Рис. 2. Перевязка *Vormela peregusna* расширяет нору зелёной щурки *Merops persicus*.

Рис. 3. Перевязка *Vormela peregusna* выглядывает из норы зелёной щурки *Merops persicus*.

При осмотре мы обнаружили в норе перья щурки и скорлупу яиц. Посещение перевязкой колонии щурок в дневное время в антропогенном ландшафте, очевидно, указывает на то, что она периодически посещает норы птиц не только в поисках добычи, но и скрывается в них от жгучего солнца в течение дня. Ранее, в 1990 году, мы неоднократно видели перевязок в колониях зелёных щурок, но достоверных фактов их хищнической деятельности зафиксировано не было.

Несмотря на вред, наносимый перевязкой птицам, её всё же нужно всячески охранять. Этот вид внесён в Красную книгу Ставропольского края (2013) со статусом «Редкие» и встречается только в степных районах на севере и востоке края.

Литература

Красная книга Ставропольского края. Т. 2. Животные. 2013. Ставрополь: 229.

Маловичко Л.В., Константинов В.М. 2000. *Сравнительная экология птиц-норников: экологические и морфологические адаптации*. Ставрополь; М.: 1-288.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1703**: 5885-5897*

Фауна птиц бассейна средней Вычегды (Республика Коми) по наблюдениям 2018 года

О.Ю.Минеев, С.К.Кочанов, Г.Л.Накул

Олег Юрьевич Минеев, *Сергей Калистратович Кочанов*, *Глеб Леонидович Накул*.
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
Ул. Коммунистическая, д. 28, Сыктывкар, Республика Коми, 167982, Россия.
E-mail: mineev@ib.komisc.ru; kochanov@ib.komisc.ru; nakul@ib.komisc.ru

Поступила в редакцию 27 ноября 2018

Сведения по распространению и биологии птиц бассейн Средней Вычегды (от села Усть-Кулом до села Сторожевск) до настоящего времени были немногочисленны (Капитонов 1959; Остроумов 1949, 1972). Изучение видового состава, распределения и численности птиц в бассейне Средней Вычегды (Усть-Куломский и Корткеросский районы Республики Коми) проведены нами 21-29 мая 2018. Эти исследования являются продолжением работ, начатых нами в 2015-2017 годах (Минеев и др. 2017, 2018). На лодочных маршрутах обследовано русло реки Вычегды протяжённостью 145 км (от Усть-Кулома до Сторожевска). Во время остановок проведены пешие маршруты (общей протяжённостью 30 км) в разных местообитаниях.

Сбор материала поводился по стандартной методике. Ширина учётной полосы на пеших маршрутах на открытых пространствах (луга) была дифференцирована: водоплавающие, хищные, чайкообразные и врановые птицы учитывались в полосе 500 м; средние и крупные кулики, дрозды – 300 м; мелкие кулики и воробьиные – 100 м; в лесных местобитаниях ширина полосы была взята за 50 м, на водных маршрутах ширина учётной полосы соответствовала ширине реки.

Обследованы следующие биотопы, отличающиеся по характеру растительности и видовому составу птиц. 1) Пойменные луга реки Вычегды. Характеризуются высоким разнотравьем с преобладанием злаков, куртинами кустарников (ива, шиповник), берёзы, черёмухи, рябины и наличием различных по величине водоёмов. 2) Прирусловые смешанные елово-берёзовые леса. Преобладающие породы деревьев: ель, берёза, пихта, сосна. В подлеске рябина, шиповник. В наземном ярусе преобладают черника, брусника, зелёные мхи, реже различные травы. 3) Мохово-кустарничковые болота. Заболоченные елово-берёзовые, реже сосновые редколесья. Расположены преимущественно в 2-7 км от русла реки. Они перемежаются мохово-кустарничковыми кочкарниковыми увлажнёнными участками. Встречаются участки открытой воды. В наземном ярусе – сфагновые мхи, голубика, черника, клюква, морошка, карликовая берёзка. 4) Сосновые леса. Произрастают на сухих возвышенных участках. Преобладают светлые сосново-лишайниковые боры, реже мохово-кустарничковые, где наряду с сосной встречается берёза и ель, а наземный ярус представлен кустарничками (черника) и зелёными мхами. 5) Берега рек. Обширные песчаные пляжи и зарастающие ивняком берега, наземная растительность представлена различными видами осок, реже злаками и белокрыльником.

Названия видов и их порядок приводятся по Л.С.Степаняну (2003).

Gavia arctica. Гнездящийся вид (Остроумов 1972). Чернозобые гагары встречены на русле Вычегды 23 мая в районе устья Кузьобъю и 25 мая 2018 на залитых лугах у посёлка Подтыбок. Численность чернозобой гагары для русла Вычегды в среднем составила 0.1 ос./10 км маршрута.

Anas platyrhynchos. В 1960-е годы редкая утка озера Донты и района села Сторожевск (Остроумов 1972). В настоящее время – обычный гнездящийся вид. В период исследований встречались одиночные, пары и группы до 3 птиц. Плотность населения кряквы на водоёмах пойменных лугов была равна 7.5, в сосновых борах с участками мохово-кустарничковых болот – 1.7 и в среднем составила 2.2 ос./км^2. Вдоль русла Вычегды встречаемость в среднем была 1.5 ос./10 км.

Anas crecca. Гнездящийся вид. Одиночные, пары и стайки (4-20 особей) свистунков отмечены в сосновых борах и на прирусловых озёрах. Плотность населения чирка на пойменных лугах 25.1, в сосновых борах с участками мохово-кустарничковых болот 0.9 и в среднем составила 5.3 ос./км^2. Численность свистунка на русле Вычегды была равна 2.7 ос./10 км лодочного маршрута.

Anas penelope. Гнездящийся вид. Зарегистрированы одиночные, пары и стайки из 3-4 особей. В пойме Вычегды численность свиязи в среднем была равна 1.6 ос./10 км. В сосновых лесах на участках мохово-кустарничковых болот плотность населения 1.7, для обследованного района в среднем составила 0.7 ос./км^2. Гнездо свиязи найдено 28 мая в сосновом бору-зеленомошнике в 120 м от берега Вычегды. Оно располагалось в сфагнуме между 5 сосен и было сделано из пуха с примесью сосновой коры, ветоши, веточек и листочков брусники. Размеры, см: диаметр гнезда 22.6, диаметр лотка 16.5, глубина лотка 6.5. Кладка содержала 9 яиц (54.4×39.3, 55.8×38.3, 54.6×38.9, 55.6×38.6, 55.0×38.5, 56.7×39.0, 55.1×39.6, 55.0×38.9, 54.9×39.3 мм).

Anas acuta. Немногочисленный гнездящийся вид. На пойменных лугах численность была равна 2.5, в среднем для района исследований составила 0.5 ос./км^2. Вдоль русла Вычегды плотность населения шилохвости была равна 1 ос./10 км учётного маршрута.

Anas querquedula. Одиночные чирки-трескунки и пары отмечены на озёрах пойменных лугов Вычегды. Ранее вид зарегистрирован на озере Донты (Остроумов 1972).

Anas clypeata. Гнездящийся вид. Ранее отмечалась в Усть-Куломском районе (Остроумов 1972). За время исследований отмечены одиночные, пары и стайки из 5-24 широконосок. Плотность населения в пойменных местообитаниях была равна 15.3, для исследованного района в среднем составила 3.1 ос./км^2. На водотоках численность широконосок в среднем составила 6.0 ос./10 км лодочных маршрутов.

Aythya fuligula. Ранее была отмечена в Усть-Куломском районе

(Остроумов 1972). В пойме Вычегды встречены одиночные, пары и стаи из 4-10 хохлатых чернетей. В основном это были пролётные утки. Численность в среднем была равна 7.5 ос./10 км учётного маршрута.

Clangula hyemalis. Одиночный самец морянки отмечен 21 мая на отмели в устье реки Кужью. Он держался вместе со стайками шилохвостей, хохлатых чернетей, чирков-свистунков и турухтанов. В 1960-1970-е годы морянка наблюдалась на пролёте в Усть-Куломском районе Республики Коми (Остроумов 1972).

Bucephala clangula. Ранее гоголь был обычен в Усть-Куломском районе (Остроумов 1972). Встречались одиночные, пары и стайки до 5 особей. В бассейне Вычегды – гнездящийся вид. В пойме этой реки численность гоголя была равна 2.7 ос./10 км учётного маршрута.

Melanitta nigra. Пролётный вид. Отмечены одиночные, пары и стайки из 4-5 особей на русле Вычегды и на заливах, образованных разливом реки. Численность была равна 2.2 ос./10 км.

Mergus serrator. Редкий вид. Одиночный средний крохаль отмечен 25 мая на пролёте около посёлка Подтыбок.

Mergus merganser. Большой крохаль ранее отмечен на озере Донты (Остроумов 1972).На магистральном русле Вычегды встречается на пролёте. На реке наблюдали одиночных особей и пары. Численность птиц была равна 0.2 ос./10 км учётного маршрута.

Pandion haliaetus. Гнездящийся вид. Скопа отмечена 21 и 22 мая на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба. Ранее она также встречалась в Усть-Куломском районе (Остроумов 1972).

Milvus migrans. Обыкновенный гнездящийся вид (Остроумов 1972). В период исследований чёрный коршун отмечен в районе сёл Руч, Сторожевск и посёлка Подтыбок. Плотность населения на пойменных разнотравных лугах была равна 2.5, в сосновых борах с участками мохово-кустарничковых болот – 1.7 ос./км^2. Средняя плотность населения коршуна на пеших маршрутах – 1.2 ос./км^2, по данным лодочных маршрутов – 0.04 ос./10 км учётного маршрута.

Circus cyaneus. Обыкновенный гнездящийся вид (Остроумов 1972). Полевые луни были отмечены в пойме Вычегды. На пойменных лугах, по данным пеших маршрутов, плотность населения луня была равна 2.5, в среднем для района – 0.5 ос./км^2. Вдоль русла Вычегды численность равна 0.3 ос./10 км учётного маршрута.

Accipiter nisus. в Республике Коми перепелятник встречается во всех лесах (Остроумов 1972). Нами он отмечен 27 мая близ устья реки Вишеры.

Buteo buteo. Гнездящийся вид (Остроумов 1972). Канюк встречался на пойменных разнотравных лугах и в сосновых борах с участками мохово-кустарничковых болот. Плотность населения в этих местообитаниях – 2.5 и 3.4 ос./км^2. В среднем численность равна 1.8 ос./км^2.

Falco columbarius. Одиночные дербники отмечены 22 мая на пойменных лугах Вычегды у деревни Малая Кужба.

Lyrurus tetrix. Обыкновенный гнездящийся вид. Тетерева отмечены на пойменных разнотравных лугах (5.0) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (0.9 ос./км^2). Плотность населения в среднем для района исследований составила 1.3 ос./км^2. Тока отмечены в вечернее время (после 23 ч) на пойменных лугах около деревни Малая Кужба (5-6 петухов) и в местечке Войпока (район села Руч).

Tetrao urogallus. Обыкновенный гнездящийся вид. Глухарок регулярно наблюдали в пойме Вычегды на краю елово-берёзового леса в районе деревни Малая Кужба и местечке Войпока.

Tetrastes bonasia. Обыкновенный гнездящийся вид. Рябчик отмечался в смешанном елово-берёзовом (5.0) и сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (1.7 ос./км^2). В среднем для района исследований плотность населения составила 2.7 ос./км^2.

Grus grus. Гнездящийся вид. Серые журавли (2-4 особи) отмечены 21 мая на болотах в районе деревни Малая Кужба.

Pluvialis squatarola. Пролётный вид. Тулесы отмечены 21 мая на отмели в устье реки Кужью, вместе со стайками шилохвостей, хохлатых чернетей, чирков-свистунков, турухтанов и щёголей.

Haematopus ostralegus. Гнездящийся вид. В пойме Вычегды одиночные кулики-сороки встречались в районе Усть-Кулома, Малой Кужбы, посёлка Подтыбок и села Сторожевск. На лодочных маршрутах численность в среднем была равна 0.4 ос./10 км.

Tringa ochropus. Обычный гнездящийся вид (Остроумов 1972). В период исследований черныш встречался в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (11.7 ос./км^2). Плотность населения на пеших маршрутах в среднем равна 4.7 ос./км^2.

Tringa glareola. Обыкновенный гнездящийся вид. Отдельные пары и стайки (5-15 особей) встречались на пойменном разнотравном лугу (12.5) и мохово-кустарничковых болотах (10 ос./км^2) среди соснового леса. В среднем плотность населения фифи равна 6.5 ос./км^2. На лодочных маршрутах численность оценена в 0.6 ос./10 км.

Tringa nebularia. Гнездящийся вид. В пойме Вычегды встречены одиночные большие улиты – 0.2 ос./10 км учётного маршрута.

Tringa erythropus. Пролётный вид. На отмели в устье реки Кужью 21 мая отмечены 3 самца совместно со стайками шилохвостей, хохлатых чернетей, чирков-свистунков, турухтанов и тулесов.

Tringa stagnatilis. Первая регистрация вида в Коми. Пара поручейников отмечена 21 мая на отмели в устье Кужью вместе со стайками шилохвостей, хохлатых чернетей, свистунков, турухтанов и тулесов. Стая поручейников (более 20) вместе со стайкой фифи зарегистрирована 10 мая 2018 на заливных лугах в окрестностях Сыктывкара.

Actitis hypoleucos. Обыкновенный гнездящийся вид (Остроумов 1972). Отмечены одиночные особи, пары и стайки (до 5 птиц). Перевозчики встречены в смешанном елово-берёзовом пойменном лесу (10.0) и на пойменных лугах (2.5), в среднем численность равна 4.5 ос./км^2. На лодочных маршрутах встречаемость не превышала 1 ос./10 км.

Xenus cinereus. Гнездящийся вид. Встречены одиночные мородунки, пары и стайки (3-4 особи). Летом 2018 года они встречались на пойменных лугах (2.5 ос./км). Средняя плотность населения была равна 0.5 ос./км^2. На лодочных маршрутах численность мородунок не превышала 1 ос./10 км.

Philomachus pugnax. Пролётный вид. Встречены одиночные, пары и стайки (5-15 особей). Крупная стая турухтанов (около 200 особей) отмечена 21 мая на отмели в устье Кужью вместе со стайками шилохвостей, хохлатых чернетей, свистунков и тулесов. На лодочных маршрутах численность в среднем равна 3.1 ос./10 км.

Calidris temminckii. Пролётный вид. Стайка из 12 белохвостых песочников отмечена 27 мая в окрестностях села Вомын (Корткеросский район).

Lymnocryptes minimus. Ток гаршнепа зарегистрирован 21 и 22 мая в вечернее время (22-23 ч) в районе деревни Малая Кужба.

Gallinago gallinago. Обычный гнездящийся вид (Остроумов 1972). В 2018 году численность бекаса на пойменных разнотравных лугах была равна 2.5, в среднем составляя 0.4 ос./км^2. Вдоль русла Вычегды численность в среднем равна 0.2 ос./10 км учётного маршрута.

Gallinago media. Гнездящийся вид. Дупелиные тока отмечены на пойменных разнотравных лугах. Численность на лугах была равна 10, в среднем составила 2.0 ос./км^2. Наиболее многочисленны эти кулики были на лугах в местечке Войпока (район села Руч).

Scolopax rusticola. Гнездящийся вид. В период исследований тяга вальдшнепа отмечена на опушках смешанного елово-берёзового леса по берегам Вычегды в районе деревни Малая Кужба и в местечке Войпока. Численность вальдшнепа на пойменных разнотравных лугах была равна 2.5, в смешанном елово-берёзовом лесу – 1.7 и в среднем составила 1.2 ос./км^2.

Numenius arquata. Гнездящийся вид. Одиночки и пары отмечены на пойменных лугах и мохово-кустарничковых болотах. На мохово-кустарничковых болотах численность больших кроншнепов была равна 1.7, по данным наземных маршрутов – в среднем 0.7 ос./км^2.

Limosa limosa. Гнездящийся вид. Одиночки, пары и группы (до 3 птиц) встречались вдоль русла Вычегды. Численность в среднем составила 0.3 ос./10 км лодочного учётного маршрута.

Larus minutus. В период исследований отмечены одиночные пары и стайки (3-10 особей) малых чаек, которые кормились на реке. Веро-

ятно, гнездится. В Усть-Куломском районе численность равна 5.8, в Корткеросском – 1.4 и в среднем составила 4.5 ос./10 км учётного маршрута.

Larus ridibundus. Гнездящийся вид. В период исследований была немногочисленна и отмечена только в Усть-Куломском районе. Встречались одиночные птицы и стаи (34-40 особей). Озёрные чайки зарегистрированы на пойменных лугах (2.5 ос./км^2). На лодочных маршрутах численность в среднем равна 1.04 ос./10 км.

Larus canus. Обыкновенный гнездящийся вид (Остроумов 1972). Встречались одиночные, пары, группы (3-5) и стайки (до 16 особей). Плотность населения сизых чаек на пойменных разнотравных лугах была равна 5.0 и в среднем составила 1.0 ос./км^2. По данным лодочных маршрутов, численность сизой чайки в Усть-Куломском районе была равна 3.2, в Корткеросском – 7.4 и в среднем составила 4.1 ос./10 км учётного маршрута. Пять гнёзд сизой чайки найдены 28 мая 2018 в районе села Сторожевск на осоково-моховом болоте с участками открытой воды среди соснового леса.

Sterna hirundo. Гнездящийся вид пойменных местообитаний Вычегды (Минеев и др. 2017, 2018). В мае 2018 года из-за раннего начала проведения полевых работ гнездовые колонии речных крачек не отмечены. Птицы поодиночке, парами и группами (до 3) были обычны в пойменных местообитаниях. По данным пеших маршрутов, плотность населения крачек на пойменных лугах была равна 2.5 и в среднем для района исследований составила 0.5 ос./км^2. По данным лодочных маршрутов численность речных крачек вдоль русла Вычегды в Усть-Куломском районе была равна 0.9, в Корткеросском – 1.8 и в среднем составила 1.1 ос./10 км.

Columba palumbus. Гнездящийся вид. Одиночные вяхири и пары встречались на пойменных разнотравных лугах (2.5) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (3.4 ос./км^2). В среднем численность вяхиря была равна 1.8 ос./км^2.

Cuculus canorus. Обыкновенный размножающийся вид. В мае 2018 года обыкновенная кукушка отмечена в смешанном елово-берёзовом лесу (10.0), в сосновом бору с участками мохово-кустарничковых болот (10.9 ос./км^2). В среднем по данным пеших маршрутов численность равна 8.3 ос./км^2, а по данным лодочных учётов – 0.2 ос./10 км.

Cuculus saturatus. Немногочисленна. В мае 2018 года плотность населения глухой кукушки в среднем составила 1.0 ос./км^2. Наиболее часто глухая кукушка (5 ос./км^2) встречалась на пойменных разнотравных лугах.

Asio flammeus. Гнездящийся вид. Болотная сова регулярно встречалась в пойменных местообитаниях (0.4 ос./10 км учётного маршрута.

Caprimulgus europaeus. Гнездящийся вид. Отмечен ранее в Усть-

Куломском районе (Остроумов 1972). Ночные полёты козодоев (3 и 1 особи) отмечены 27 мая в 22 ч 03 мин. Полёты проходили в направлении северо-восток-восток, в сосновом бору над просекой (противопожарная полоса), на берегу Вычегды, в районе устья Вишеры. Токование зарегистрировано 28 мая в 21 ч 43 мин в этом же месте.

Apus apus. Гнездящийся вид. В мае 2018 года стрижи (группы до 5 особей) отмечены в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (8.4) и на пойменных лугах (1.0 ос./км^2). Численность стрижей в среднем по району исследований была равна 3.3 ос./км^2. В сосновом лесу обнаружено четыре дупла в стволе старой сосны, где гнездились чёрные стрижи. Гнёзда располагались на высоте 4-10 м.

Dendrocopos major. Обыкновенный гнездящийся вид. В мае 2018 года большой пёстрый дятел отмечен в смешанном елово-берёзовом лесу (6.7) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (5.0 ос./км^2). В среднем плотность населения равна 4.7 ос./км^2. В местечке Войпока обнаружено жилое дупло большого пёстрого дятла в стволе осины на высоте около 12 м над землёй.

Riparia riparia. Обыкновенный гнездящийся вид (Минеев и др. 2017, 2018). В мае 2018 года численность береговушки в пойме Вычегды в среднем была равна 2.04 ос./10 км учётного маршрута.

Eremophila alpestris. В мае 2018 года в пойме Вычегды проходил пролёт рогатых жаворонков. Стайки (до 40 особей) мигрантов отмечены 21-22 мая на пойменных лугах.

Alauda arvensis. Гнездящийся вид. Одиночки и пары отмечены 21 мая 2018 на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба.

Anthus trivialis. Обыкновенный гнездящийся вид. В мае 2018 года лесной конёк отмечен в смешанном елово-берёзовом лесу (50.0), в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (16.7 ос./км^2). В среднем плотность населения равна 26.7 ос./км^2.

Anthus hodgsoni. Немногочисленный гнездящийся вид. Плотность населения зелёных коньков в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот равна 11.7 ос./км^2. В среднем для района исследований численность составила 4.7 ос./км^2.

Anthus cervinus. Пролётный вид. Пара краснозобых коньков отмечена 21 мая 2018 в селе Усть-Кулом, а стайка из 10 особей – 26 мая в районе посёлка Подтыбок.

Motacilla alba. Гнездящийся вид. В мае 2018 года белая трясогузка отмечена в смешанном елово-берёзовом лесу (10.0 ос./км^2). В пойме Вычегды численность составила 0.1 ос./10 км. В среднем плотность населения белой трясогузки равна 4.0 ос./км^2.

Sturnus vulgaris. Гнездящийся вид. Одиночный скворец отмечен 27 мая 2018 в селе Вомын на берегу Вычегды.

Pica pica. Гнездящийся вид. Сорока встречена на пойменных лу-

гах с плотностью 5.0 ос./км². В местечке Войпока 25 мая 2018 найдено гнездо. Оно размещалось в развилке ветвей ели (высотой 10 м) на высоте 7.5 м. В кладке было 7 яиц.

Garrulus glandarius. Гнездящийся вид. Сойка зарегистрирована 22 мая в смешанном елово-берёзовом лесу в районе Малой Кужбы.

Corvus cornix. Гнездящийся вид. В мае 2018 года серая ворона встречалась поодиночке, парами и группами (до 3 особей) в смешанном елово-берёзовом лесу (5.0), на пойменном разнотравно-ивняковом лугу (0.5) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (4.2 ос./км²). В среднем по данным пеших маршрутов плотность населения серой вороны – 3.8 ос./км². По данным лодочных маршрутов, её численность в Усть-Куломском районе равна 0.8, в Корткеросском – 1.2 и в среднем составила 0.9 ос./10 км учётного маршрута.

Corvus corax. Немногочисленный гнездящийся оседлый вид. 23 и 24 мая 2018 одиночные вороны отмечены на пойменных лугах.

Bombycilla garrulus. Одиночные свиристели и пары отмечены 22 мая в смешанном елово-берёзовом лесу и на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба.

Acrocephalus dumetorum. Гнездящийся вид. Пары садовых камышевок отмечены в мае 2018 года на пойменных лугах. Численность в среднем была равна 2.0 ос./км².

Sylvia borin. Гнездящийся вид. В период исследований численность садовой славки в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот была равна 10.3, в смешанном елово-берёзовом лесу – 20.0 и в среднем составила 12.1 ос./км².

Sylvia communis. Ранее отмечалась на Вычегде у Усть-Кулома (Остроумов 1972). В период исследований серые славки встречены на пойменных лугах с плотностью 10.0 ос./км².

Sylvia curruca. Гнездящийся вид. В мае 2018 года славка-мельничек встречалась в смешанном елово-берёзовом лесу (40.0), на пойменных лугах (10.0) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (10.0 ос./км²). Плотность в среднем 22.0 ос./км².

Phylloscopus trochilus. Гнездится. В мае 2018 года весничка встречалась на пойменных лугах (80.1), в смешанном елово-берёзовом (83.4) и в сосновом лесу с мохово-кустарничковыми болотами (46.7 ос./км²). Плотность населения в среднем была равна 68.2 ос./км². По данным лодочных маршрутов, численность пеночки составила 0.3 ос./10 км.

Phylloscopus collybita. Гнездящийся вид. Теньковка отмечена в с на пойменных лугах (10.3) и в сосновых лесах с участками мохово-кустарничковых болот (26.7 ос./км²). В среднем плотность 14.0 ос./км².

Phylloscopus sibilatrix. Гнездящийся вид. В мае 2018 года трещотка была немногочисленна. Пение зарегистрировано 21 мая 2018 на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба.

Phylloscopus borealis. Обыкновенный гнездящийся вид бассейна Вычегды. В мае 2018 года таловка была немногочисленна. Пение отмечено 21 мая на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба.

Phylloscopus trochiloides. Зелёная пеночка – гнездящийся вид. В период исследований она встречалась в смешанном елово-берёзовом лесу (13.4) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (30.1 ос./км^2). Плотность населения в среднем 17.3 ос./км^2.

Regulus regulus. Гнездящийся вид. В мае 2018 года желтоголовый королёк отмечен в смешанном елово-берёзовом лесу (10.4) и сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (10.1 ос./км^2). В среднем плотность составила 8.2 ос./км^2.

Ficedula hypoleuca. Гнездится. Пение мухоловки-пеструшки зарегистрированы в смешанном елово-берёзовом лесу (43.4), на пойменном лугу (4.8) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (5.2 ос./км^2). В среднем плотность населения 19.3 ос./км^2.

Ficedula parva. В период исследований малая мухоловка населяла смешанный елово-берёзовый лес (10.1), пойменный луг (10.2) и сосновый лес с участками мохово-кустарничковых болот (10.1 ос./км^2). В среднем плотность 10.3 ос./км^2.

Muscicapa striata. Серая мухоловка отмечена 26 и 28 мая 2018 в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот, где её численность составила 1.7 ос./км^2.

Saxicola rubetra. Гнездящийся вид. В мае 2018 года плотность населения на пойменных лугах была равна 20.3 и в среднем составила 4.2 ос./км^2. По данным лодочных учётов – 0.3 ос./10 км.

Saxicola torquata. Черноголовый чекан встречался в пойме Вычегды (0.3 ос./10 км).

Phoenicurus phoenicurus. Немногочисленный гнездящийся вид. В период исследований обыкновенная горихвостка встречалась в смешанном елово-берёзовом лесу (10.1) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (10.3 ос./км^2). В среднем плотность составила 8.2 ос./км^2.

Erithacus rubecula. Гнездящийся вид. Встречалась в смешанном елово-берёзовом лесу (13.4) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (3.4 ос./км^2). В среднем плотность населения составила 6.7 ос./км^2.

Tarsiger cyanurus. Синехвостка известна в Усть-Куломском районе с 1960-х годов (Остроумов 1972). В настоящее время – это обыкновенный гнездящийся вид. Встречалась в смешанном елово-берёзовом лесу (43.4), на пойменных лугах (28.7), в сосновом лесу с мохово-кустарничковыми болотами (23.4 ос./км^2). В среднем плотность населения синехвостки составила 26.7 ос./км^2.

Turdus pilaris. Многочисленный гнездящийся вид. Гнездо рябин-

ника найдено 24 мая на пойменном осоково-разнотравно-ивняковом лугу в 10 м от берега реки. Оно располагалось на ели (высотой 2 м) на высоте 1.8 м. В мае 2018 года рябинник отмечен в пойменном смешанном елово-берёзовом (25.2), на пойменном лугу (125.1) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (3.4 ос./км^2). В среднем плотность составила 36.4 ос./км^2.

Turdus merula. Гнездящийся вид. Численность чёрного дрозда в мае 2018 года на пойменных лугах в была равна 10.2, в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот – 10.1 и в среднем составила 6.0 ос./км^2.

Turdus iliacus. Обыкновенный гнездящийся вид. В период исследований численность белобровика на пойменных лугах была равна 10.3, в пойменном смешанном елово-берёзовом лесу – 80.2 и в среднем составила 18 ос./км^2.

Turdus philomelos. Обыкновенный гнездящийся вид. В мае 2018 года певчий дрозд встречался в смешанном елово-берёзовом лесу (13.4) и на пойменных лугах (16.0), в среднем плотность 8.5 ос./км^2.

Parus montanus. Обыкновенный гнездящийся вид. Пухляк отмечен на пойменных лугах (10.3) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (14.2 ос./км^2). В среднем плотность населения была равна 7.7 ос./км^2.

Parus ater. Немногочисленный вид. Возможно, гнездится. Пение московки отмечено 22 мая 2018 на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба.

Parus major. Обыкновенный гнездящийся вид. В период исследований большая синица встречалась на пойменных лугах (10.1) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (3.4 ос./км^2). В среднем плотность населения составила 4.2 ос./км^2.

Certhia familiaris. Отмечена в смешанном елово-берёзовом лесу (3.4 ос./км^2). Плотность населения в среднем составила 1.3 ос./км^2.

Fringilla coelebs. Многочисленный гнездящийся вид. Одиночные, пары и стайки (3-8 особей) встречались повсеместно. В мае 2018 года плотность населения зяблика на пойменных лугах была равна 30.1, в смешанном елово-берёзовом лесу – 33,4, в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот – 88.3 и в среднем составила 54.7 ос./км^2.

Fringilla montifringilla. Гнездящийся вид. В период исследований юрок отмечен на пойменном лугу (10.1), в смешанном елово-берёзовом лесу (123.4) и сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (13.4 ос./км^2). Плотность населения в среднем равна 54.7 ос./км^2.

Spinus spinus. Широко распространённый, но немногочисленный гнездящийся вид (Остроумов 1972). Отмечен в смешанном елово-берёзовом лесу (3.4), в сосновом лесу с мохово-кустарничковыми болотами (1.7), на пойменном лугу (0.8 ос./км^2). Плотность в среднем 2 ос./км^2.

Carpodacus erythrinus. Гнездящийся вид. Плотность населения чечевицы в мае 2018 года на пойменных лугах была равна 16.7 и в среднем составила 2.0 ос./км^2.

Loxia curvirostra. Гнездящийся вид. Во время наших исследований клесты-еловики встречались поодиночке, парами и стайками (3-4 особи) в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (13.4) и на пойменном лугу (25 ос./км^2). В среднем плотность населения равна 10.3 ос./км^2.

Pyrrhula pyrrhula. Гнездящийся вид. В мае 2018 года снегири встречались в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот и на пойменном лугу с плотностью 5.0 и 4.2 ос./км^2 соответственно. В среднем плотность населения 2.1 ос./км^2.

Emberiza citrinella. Пара обыкновенных овсянок отмечена 26 мая 2018 в сосновом бору в районе посёлка Подтыбок.

Emberiza schoeniclus. Немногочисленный гнездящийся вид. В период наблюдений камышовая овсянка отмечена на пойменных лугах (5.2) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (3.4 ос./км^2). В среднем плотность составила 2.3 ос./км^2.

Заключение

В ходе полевых работ с 21 по 29 мая 2018 в среднем течении реки Вычегды (от села Усть-Кулом до села Сторожевск) зарегистрировано 98 видов птиц. Гнездование установлено для 71 вида (72.5%), возможно гнездится 17 видов (17.4%), пролётные – 5 видов (5.1%), характер пребывания 5 видов (5.1%) не установлен.

Зарегистрированные ранее в Усть-Куломском районе серый гусь *Anser anser*, кликун *Cygnus cygnus*, серая утка *Anas strepera*, луток *Mergellus albellus*, чеглок *Falco subbuteo*, пустельга *Falco tinnunculus*, коростель *Crex crex*, малый зуёк *Charadrius dubius*, чибис *Vanellus vanellus* и хохлатая синица *Parus cristatus* (Остроумов 1972) в период наших исследований не отмечены. В связи с поздним началом весны (примерно на 2 недели) и неблагоприятными погодными условиями часть обычных для района исследований видов (в основном воробьиных) не были отмечены. Кроме этого, мы зарегистрировали миграцию некоторых видов, гнездящихся в северных районах региона.

С наибольшей численностью (645.8 ос./км^2) птицы населяют смешанный елово-берёзовый лес (отмечено 28 видов). Плотность населения птиц в сосновом лесу составила 438.8 ос./км2 (39 видов). На пойменном лугу отмечено 39 видов, которые населяли этот биотоп с плотностью 521.5 ос./км^2. В среднем для всех биотопов плотность населения птиц составила 538.9 ос./км^2.

По данным лодочных маршрутов, на исследованном отрезке в среднем отмечен 41 вид (52 ос./10 км). В Усть-Куломском районе отмечено

37 видов (58.1), в Сторожевском районе – 17 видов (25.8 ос./10 км).

Наиболее многочисленными видами в период исследований в мае 2018 года были: пеночка-весничка (68.0), зяблик (54.7), юрок (54.7), рябинник (36.4), лесной конёк (26.7), синехвостка (26.7), славка-мельничек (22.1), мухоловка-пеструшка (19.3), белобровик (18.1), зелёная пеночка (17.3), теньковка (14.1), садовая славка (12.2), малая мухоловка (10.3), клёст-еловик (10.3), певчий дрозд (8.5), обыкновенная кукушка (8.3), желтоголовый королёк (8.1), обыкновенная горихвостка (8.03), пухляк (7.7), зарянка (6.7), фифи (6.5), чёрный дрозд (6.1), зелёный конёк (5.8), чирок-свистунок (5.3), черныш (4.7), большой пёстрый дятел (4.7) и перевозчик (4.5 ос./км^2).

Наибольшая плотность птиц вдоль русла Вычегды была характерна для хохлатой чернети (7.5), широконоски (6.3), малой чайки (4.5), чирка-свистунка (2.7) синьги (2.2), ласточки-береговушки (2.04), свиязи (1.6), кряквы (1.5), речной крачки (1.1), озёрной чайки (1.04), шилохвости (1.0), перевозчика (1.0) и мородунки (1.0 ос./10 км).

Число общих встреченных видов за период исследований в 2016 году (Минеев и др. 2017) составило 78: кряква, свистунок, свиязь, трескунок, шилохвость, широконоска, хохлатая чернеть, гоголь, чёрный коршун, полевой лунь, перепелятник, канюк, дербник, тетерев, глухарь, рябчик, серый журавль, кулик-сорока, черныш, большой улит, фифи, щёголь, перевозчик, мородунка, турухтан, обыкновенный бекас, обыкновенный дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп, большой веретенник, малая чайка, озёрная чайка, сизая чайка, речная крачка, вяхирь, обыкновенная кукушка, глухая кукушка, болотная сова, чёрный стриж, большой пёстрый дятел, береговая ласточка, полевой жаворонок, лесной конёк, белая трясогузка, обыкновенный скворец, сорока, серая ворона, ворон, свиристель, садовая камышевка, садовая славка, серая славка, славка-мельничек, весничка, теньковка, трещотка, таловка, зелёная пеночка, желтоголовый королёк, мухоловка-пеструшка, малая мухоловка, серая мухоловка, луговой чекан, обыкновенная горихвостка, зарянка, рябинник, чёрный дрозд, певчий дрозд, белобровик, пухляк, московка, большая синица, зяблик, юрок, чиж, чечевица, клёст-еловик, снегирь и камышовая овсянка.

Число общих встреченных видов за период исследований в 2017 году (Минеев и др. 2018) составило 71: чернозобая гагара, кряква, свистунок, свиязь, широконоска, хохлатая чернеть, гоголь, средний крохаль, чёрный коршун, перепелятник, канюк, тетерев, глухарь, рябчик, кулик-сорока, черныш, большой улит, перевозчик, мородунка, обыкновенный бекас, обыкновенный дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп, большой веретенник, малая чайка, озёрная чайка, сизая чайка, речная крачка, обыкновенная кукушка, глухая кукушка, чёрный стриж, большой пёстрый дятел, береговая ласточка, лесной конёк, зелёный

конёк, белая трясогузка, сорока, серая ворона, ворон, свиристель, садовая камышевка, садовая славка, серая славка, славка-мельничек, весничка, теньковка, трещотка, таловка, зелёная пеночка, желтоголовый королёк, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, луговой чекан, обыкновенная горихвостка, зарянка, синехвостка, рябинник, чёрный дрозд, белобровик, певчий дрозд, пухляк, московка, большая синица, зяблик, юрок, чиж, чечевица, клёст-еловик, снегирь, обыкновенная овсянка и камышовая овсянка.

На исследованном отрезке среднего течения реки Вычегды по литературным данным и результатам наших исследований отмечено пребывание 6 видов птиц, включённых в Красную Книгу Республики Коми: чернозобая гагара, скопа, серый журавль, кулик-сорока, дупель, большой веретенник.

Научно-исследовательские работы выполнены по теме лаборатории «Систематика, распространение и пространственная организация фауны и населения наземных и водных животных таёжных и тундровых экосистем европейского северо-востока России». № гос. регистрации АААА-А17-117112850235-2. Для выполнения работ задействованы средства гранта РФФИ Коми № 16-44-110167 «Оценка состояния и динамика популяций редких видов растений, грибов и животных, занесённых в Красные книги Республики Коми и Российской Федерации».

Литература

Андреев В.Д. 1910. Птицы Усть-Сысольского уезда (краткий орнитологический очерк) // *Тр. экспедиции по использованию земель Печорского края, Вологодской губ.* СПб, **2**: 33-41.

Андреев В.Д., Бианки В.Л. 1910. К авифауне Усть-Сысольского уезда Вологодской губ. // *Ежегодн. Зоол. музея Акад. наук* **15**, 2: 247-253.

Капитонов В.И. 1959. Зимующие птицы Строжевского района Коми АССР // *Тр. Науч.-исслед. ин-та сельск. хоз. Крайнего Севера* **9**: 208-216.

Кочанов С.К. 1986. Численность птиц лесных местообитаний Средней Вычегды и её сезонные изменения // *Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учёта животного мира: Тез. докл.* М., **2**: 323-324.

Минеев О.Ю., Кочанов С.К., Накул Г.Л. 2017. Фауна птиц бассейна Средней Вычегды (Республика Коми) // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1428): 1391-1415.

Минеев О.Ю., Накул Г.Л., Кочанов С.К. 2018. Фауна птиц бассейна Средней Вычегды (Республика Коми) по наблюдениям 2017 года // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1620): 2653-2666.

Остроумов Н.А. 1949. *Животный мир Коми АССР: Позвоночные.* Сыктывкар: 1-240.

Остроумов Н.А. 1972. *Животный мир Коми АССР.* Сыктывкар: 1-279.

Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).* М.: 1-808.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1703**: 5898*

Встреча старика *Synthliboramphus antiquus* на юго-востоке Чукотского полуострова

И.Г.Бобырь

Игорь Германович Бобырь. Национальный парк «Берингия». Набережная Дежнёва, д. 10, пгт Провидения, Чукотский АО, 689251, Россия. E-mail: ostrova.bobyr@gmail.com

Поступила в редакцию 4 декабря 2018

Ста́рик *Synthliboramphus antiquus* – редкий, но регулярно встречающийся вид в северной части Берингова моря. Ста́риков отмечали на юге Чукотского полуострова в бухте Провидения 31 августа 1950 и у мыса Чукотский 2 августа 1985 (Konyuhov *et al*. 1998).

Нами два ста́рика встречены у мыса Чаплина (64°24'10" с.ш, 172° 13'47" з.д.) на юго-востоке Чукотского полуострова 12 августа 2018. Они кормились в 50 м от берега, ныряя в течение получаса (см. рисунок).

Обыкновенный ста́рик *Synthliboramphus antiquus* у мыса Чаплина.
Юго-восток Чукотского полуострова. 12 августа 2018. Фото автора.

Литература

Konyuhov N., Bogoslovskaya L., Zvonov B., Van Pelt T. 1998. Seabirds of the Chukotka peninsula, Russia // *Arctic* **51**, 4: 315-329

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1703**: 5899-5900*

Гнездо скопы *Pandion haliaetus* на триангуляционной вышке в Усть-Илимском районе Иркутской области

В.В.Попов

Виктор Васильевич Попов. Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии». Иркутск. E-mail: vpopov2010@yandex.ru

Поступила в редакцию 3 декабря 2018

Скопа *Pandion haliaetus* – редкий гнездящийся вид Иркутской области (Попов 2009; 2016), поэтому любая находка гнезда этого вида представляет определённый интерес. Нами при проведении полевого обследования в Усть-Илимском районе Иркутской области в долине реки Туба (левый приток Ангары, в настоящее время впадает в Усть-Илимское водохранилище) 24 августа 2018 обнаружено гнездо скопы. Интересно, что это гнездо располагалось на старой триангуляционной вышке (см. рисунок). Судя по размерам, оно было многолетним. При нашем приближении с гнезда слетела скопа, вскоре подлетела вторая птица, и они с криками кружились над гнездом, периодически присаживаясь на соседние деревья. Из гнезда доносился крик птенца. Осматривать гнездо из-за ветхости вышки и опасности её обрушения мы не стали. Кроме того, массивное гнездо закрывало выход на верхнюю площадку вышки. Ранее случаев находок гнёзд скопы на триангуляционных вышках на территории Иркутской области не было.

Гнездо скопы *Pandion haliaetus* на старой триангуляционной вышке.
Усть-Илимский район Иркутской области. 24 августа 2018. Фото автора.

Интересно, что гнездо располагалось примерно в 4 км по прямой до реки Туба (как в западном, так и в восточном направлении) на водо-

раздельном хребте (река Туба в верхнем течении течёт на север, затем делает петлю и поворачивает на юго-запад, гнездо расположено примерно в центре этой петли). Птицы вынуждены летать за кормом на значительное расстояние. Отъезжая на северо-запад, в 1 км от гнезда мы встретили скопу, летящую по направлению к реке.

Река Туба расположена на малодоступной и слабо освоенной территории на юго-востоке Усть-Илимского района. Её водораздельная часть, где расположено гнездо, пока слабо затронута рубками. О находке гнезда мы сообщили лесозаготовительной организации, арендующей этот лесной массив, и участок радиусом 500 м вокруг гнезда исключён из плана рубок.

Литература

Попов В.В. 2012. Птицы Иркутской области: видовой состав, распространение и характер пребывания. Гагарообразные – журавлеобразные // *Байкал. зоол. журн.* 1 (9): 36-62.

Попов В.В. 2016. Распространение скопы *Pandion haliaetus* в Иркутской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1380): 4927-4931.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1703**: 5900-5901*

Встречи воробьиного сычика *Glaucidium passerinum* в Плюсском районе Псковской области

С.В.Горчаков

Сергей Владимирович Горчаков. Союз охраны птиц России. E-mail: zoometod@mail.ru

Поступила в редакцию 27 ноября 2018

Воробьиный сычик *Glaucidium passerinum* занесён в Красную книгу Псковской области (Щеблыкина 2014). Сведения о встречах данного вида в Плюсском районе этой области отсутствуют. В связи с этим считаю необходимым сообщить о моих встречах воробьиного сычика в Запольской волости Плюсского района Псковской области.

Кратковременные орнитологические наблюдения в данной местности производятся мной с 1991 года. В течении этих лет мне удалось наблюдать воробьиного сычика трижды.

21 августа 1998 воробьиный сычик был встречен у заброшенного зернохранилища в деревне Заполье.

15 октября 2007 воробьиный сычик наблюдался на кладбище, расположенном у деревни Заполье.

24 марта 2017 воробьиный сычик активно обследовал скворечники и яблоневые сады в деревне Заполье (см. рисунок).

Воробьиный сычик *Glaucidium passerinum* в скворечнике. Деревня Заполье. Плюсский район, Псковская область. 24 марта 2017. Фото автора.

Литература

Щеблыкина Л.С. 2014. Воробьиный сыч – *Glaucidium passerinum* Linnaeus, 1758 // *Красная книга Псковской области*. Псков: 442

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1703**: 5901-5902*

Зимняя встреча юрка *Fringilla montifringilla* и зяблика *Fringilla coelebs* в городе Печоры

А.В.Бардин

Александр Васильевич Бардин. SPIN-код: 5608-1832. Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034 Россия. E-mail: ornis@mail.ru

Поступила в редакцию 11 декабря 2018

С 28 ноября по 10 декабря 2018, уже в зимних условиях, в городе Печоры Псковской области на углу Псковской и Новой улиц я каждый день наблюдал одного юрка *Fringilla montifringilla* (самца, судя по

широким закруглённым рулевым – старого). Птицу удалось хорошо рассмотреть на подоконнике с очень близкого расстояния. Это первая зимняя встреча юрка в Печорах и окрестностях.

Кроме того, как и в прошлую зиму (Бардин 2017), кормушку с подсолнечными семечками посещали зяблики *Fringilla coelebs* (самец и самка). Среди прилетавших на кормушку птиц преобладали зеленушки *Chloris chloris* (более 40 особей) и большие синицы *Parus major*. Регулярно кормились также полевые воробьи *Passer montanus*, пара домовых воробьёв *Passer domesticus* (самец и самка), снегири *Pyrrhula pyrrhula*, чечётки *Acanthis flammea*, два поползня *Sitta europaea*, две лазоревки *Parus caeruleus* и две болотные гаички *Parus palustris*.

Литература

Бардин А.В. 2017. Зимующие зяблики *Fringilla coelebs* в городе Печоры Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1548): 5587-5589.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск **1703**: 5902-5903*

К питанию белой трясогузки *Motacilla alba* и лесного конька *Anthus trivialis* в Ленинградской области

И.В.Прокофьева

*Второе издание. Первая публикация в 1962**

Наблюдения велись в апреле-августе 1955-1961 годов. Проанализировано 150 порций корма и 5 желудков белых трясогузок *Motacilla alba*, 160 порций корма и 36 желудков лесных коньков *Anthus trivialis*.

Наблюдения показали, что в корме птенцов белой трясогузки преобладающей группой являются двукрылые. В 1955 году они составляли 63.4% всех объектов питания, в 1957 – 50%, в 1961 – 60.4%. В первый год трясогузки отдавали предпочтение долгоножкам и слепням, во второй – комарам, в третий – тахинам. Подёнки занимали второе по количеству место в рационе белой трясогузки (38.3%) только в 1957 году, когда выкармливание птенцов совпало со временем массового лета этих насекомых. Водные насекомые и моллюски встречены в пище всех подопытных выводков в незначительном количестве. Иногда вместе с ними трясогузки захватывают ряску.

* Прокофьева И.В. 1962. К питанию белой трясогузки и лесного конька в Ленинградской области // *Материалы 3-й Всесоюз. орнитол. конф.* Львов, **2**: 150-152.

Круглосуточные наблюдения у гнёзд показали, что большие птенцы получают корм в среднем 16 раз в час, маленькие – 7. Просыпание и вылет за пищей взрослых птиц происходит около 4 ч, окончание кормления затягивается до 22 ч.

Пища взрослых трясогузок состоит из разнообразного животного корма и изредка из растительного (вегетативных частей растений). Корм добывается в основном на земле, реже в воздухе и из воды.

Лесные коньки питаются очень разнообразной пищей. В питании птенцов наибольшее значение имеют чешуекрылые (22.1%), перепончатокрылые (20.4%), двукрылые (14.4%), пауки (15%) и иногда прямокрылые. Птенцы получают как очень мелких насекомых (тлей), так и довольно крупных (кузнечиков). Растительная пища даётся им редко и чаще случайно. Осторожность, свойственная конькам, является причиной того, что нормальный темп кормления птенцов часто нарушается.

В желудках взрослых лесных коньков по количеству экземпляров и по числу встреч преобладают жуки. В июне на долю жуков приходилось 63.1% всех обнаруженных беспозвоночных, в июле – 44.2%, в августе – 40.8%. Долгоносики составляли 58.2 всех жуков. Преобладание жуков отчасти объясняется тем, что они сохраняются в желудках лучше, нежели другие насекомые. В остальном рацион взрослых птиц и птенцов сходен.

Семена растений взрослые лесные коньки поедают редко (11.8% встреч). Весной значение семян в питании коньков более существенно, нежели летом, когда они играют вспомогательную роль.

Корм добывается на земле, в траве, на кустарниках и деревьях.

Хозяйственное значение белой трясогузки и лесного конька различно. Лесной конёк уничтожает обитателей как открытых пространств, так и леса. Вредные насекомые составляют свыше 60% всех объектов его питания. Белая трясогузка из вредных насекомых добывает в основном кровососущих двукрылых и обитателей травяного покрова, которые в среднем составляют лишь около 35% корма (от 17% до 48% в разные годы). В некоторых условиях ею уничтожается и много полезных насекомых. Так, по данным 1961 года, 34.8% всей пищи птенцов этого вида приходилось на долю тахин.