ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал

2019
XXVIII

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1820

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXVIII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2019 № 1820

СОДЕРЖАНИЕ

4221-4230 Первый случай успешного размножения большой белой цапли *Casmerodius albus* в Ленинградской области на Кургальском полуострове (окрестности посёлка Липово). С.А.КОУЗОВ, А.В.КРАВЧУК, М.О.ШИРЯЕВА

4230-4235 К фенологии весеннего прилёта огаря *Tadorna ferruginea* на Южном Алтае. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ, Ф.И.ШЕРШНЁВ

4236-4245 Первая встреча галстучника *Charadrius hiaticula* в Псковском Поозерье. Г.Л.КОСЕНКОВ, С.А.ФЕТИСОВ

4245-4246 Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на Белом озере в Гатчинском парке. Е.С.КИСЕЛЁВА

4247-4249 О залётах даурского журавля *Grus vipio* в Байкальский регион. Ц.З.ДОРЖИЕВ, Е.Н.БАДМАЕВА, Ю.А.ДУРНЕВ

4250-4253 К орнитофауне Соловецкого архипелага Белого моря. А.Е.ЧЕРЕНКОВ, В.Ю.СЕМАШКО, Г.М.ТЕРТИЦКИЙ

4253-4254 Встреча болотной гаички *Poecile palustris* в «Лесу на Ворскле». Т.П.ДЬЯКОНОВА

4254-4255 Первая регистрация гнездования длиннохвостой неясыти *Strix uralensis* в Окском заповеднике. Р.Б.БОБКОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2019
Дата опубликования: 29 августа 2019

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVIII
Express-issue

2019 № 1820

CONTENTS

4221-4230 The first case of successful breeding of the great egret *Casmerodius albus* in the Leningrad Oblast on the Kurgalsky Peninsula (near the village of Lipovo). S.A.KOUZOV, A.V.KRAVCHUK, M.O.SHIRYAEVA

4230-4235 On the phenology of the spring arrival of the ruddy shelduck *Tadorna ferruginea* in Southern Altai. N.N.BEREZOVIKOV, F.I.SHERSHNEV

4236-4245 First registration of the ringed plover *Charadrius hiaticula* in Pskov Poozerie. G.L.KOSENKOV, S.A.FETISOV

4245-4246 The great Cormorant *Phalacrocorax carbo* on Beloye Lake in Gatchina Park. E.S.KISELEVA

4247-4249 Cases of the appearance of the white-naped crane *Grus vipio* in the Baikal region. Ts.Z.DORZHIEV, E.N.BADMAEVA, Yu.A.DURNEV

4250-4253 To the avifauna of the Solovetsky archipelago of the White Sea. A.E.CHERENKOV, V.Yu.SEMASHKO, G.M.TERTITSKY

4253-4254 The record of the marsh tit *Poecile palustris* in the Forest on Vorskla River. T.P.DIAKONOVA

4254-4255 The first nest record of the Ural owl *Strix uralensis* in the Oka State Nature Reserve. R.B.BOBKOV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2019

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск **1820**: 4221-4230*

Первый случай успешного размножения большой белой цапли *Casmerodius albus* в Ленинградской области на Кургальском полуострове (окрестности посёлка Липово)

С.А.Коузов, А.В.Кравчук, М.О.Ширяева

Сергей Александрович Коузов, *Анна Валентиновна Кравчук*, *Марина Олеговна Ширяева*. Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, д. 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: skouzov@mail.ru

Поступила в редакцию 26 августа 2019

В первых десятилетиях XXI столетия большая белая цапля *Casmerodius albus* на территории Ленинградской области превратилась из крайне редкого залётного вида (Brandt 1880; Ризнич 1962; Мальчевский, Пукинский 1983;) в немногочисленный регулярно летующий вид (Коузов 2015а) (рис. 1).

Рис. 1. Взрослая большая белая цапля *Casmerodius albus* в полёте. Окрестности посёлка Гакково. Кургальский полуостров. 23 июня 2019. Фото авторов.

На рубеже XX и XXI веков частота встреч больших белых цапель в Ленинградской области заметно возросла (Ковалев 2001; Богуславский 2010; Головань 2011), особенно сильно – в 2009-2015 годы, когда этих

птиц во второй половине лета и осенью отмечали во многих, преимущественно южных и западных районах области (Богуславский 2010; Головань и др. 2015; Домбровский 2015; Конечная 2015; Коузов 2015б; Поляков 2015; Храбрый 2015).

Самыми северными местами встреч больших белых цапель были Раковые озера на Карельском перешейке (Барабанова и др. 2015) и долина реки Гороховки у южного берега Выборгского залива (Коузов 2015в). Самой восточной точкой регистрации вида было нижнее течение реки Свири (Ковалев 2013). Чаще всего большие белые цапли отмечались в южной части Кургальского полуострова (Коузов 2015а,б) и на других участках южного берега Финского залива, в районе Бронки–Лебяжьего (Головань и др. 2015) и в Кронштадтской колонии (Коузов 2015г). В 2017 году появление большой белой цапли отмечено на озере Копанское (Домбровский 2017), в долине реки Хревицы (Гребёнкин 2017), на северном берегу Кургальского полуострова (Коузов 2017) и во многих других местах Ленинградской области (Домбровский 2018).

Рис. 2. Группа больших белых цапель *Casmerodius albus* с преобладанием взрослых птиц в Гакковской бухте. 23 июня 2019. Фото авторов.

На Кургальском полуострове в последние годы большие белые цапли держатся постоянно в течение лета и осени. Местом их наибольшей концентрации является западное побережье в районе от посёлка Тисколово до угодья Кирьямо. В 2013 году здесь единовременно отмечалось до 5 птиц (Коузов 2015б), в 2014-2015 – до 18-19 (Коузов 2015а). В 2017-2019 годах во время учётов птиц от посёлка Тисколово до угодья Кирьямо нам удавалось зарегистрировать за день до 25-32 охотящихся больших белых цапель. При этом чаще всего они держались в бухте у

посёлка Гакково, где единовременно можно было видеть до 22-26 птиц (рис. 2), на ночёвку они отлетали на остров Реймосар или собирались на группе деревьев в середине острова Мучной (рис. 3).

Рис. 3. Группа больших белых цапель *Casmerodius albus* с преобладанием взрослых птиц на острове Мучной. 23 июня 2019. Фото авторов.

Обращают внимание два важных изменения: в сезонности встреч и в возрастном составе. В 2011-2014 годах одиночные особи изредка отмечались во второй половине мая, а большая часть регистраций приходилась на период с последних числе июля до начала сентября. В 2015- 2017 годах появление крупных скоплений цапель начиналось с начала первой декады июля. По характеру окраски клюва и оперения было видно, что подавляющее большинство встреченных птиц – это молодые неполовозрелые особи (жёлтый клюв и заметная желтизна кожи голени).

Рис. 4. Большая белая цапля *Casmerodius albus* в полном брачном наряде (слева) пара взрослых цапель, охотящихся на полыньях в Гакковской бухте сразу после прилёта. 15 апреля 2019. Фото авторов.

В 2017-2019 годах первые группы из 2-6 взрослых больших белых цапель появлялись у посёлка Гакково 12-15 апреля (рис. 4). В эти же сроки первые цапли были встречены нами на других участках южного берега Финского залива около посёлка Чайка и в Копорской губе. Если большая часть акватории была ещё покрыта льдом, большие белые цапли, как и серые *Ardea cinerea*, охотились около первых участков открытой воды (рис. 4). В первой половине мая здесь ежегодно держалось уже до 15-20 птиц. При этом почти все встреченные большие белые цапли были старыми птицами с большим развитием чёрного цвета на клювах, ярко зелёными уздечками и хорошо заметными эгретками на спине.

Рис. 5. Летящая группа из нескольких взрослых больших белых цапель *Casmerodius albus* и одной неполовозрелой птицы у острова Реймосар. 23 июня 2019. Фото авторов.

Рис. 6. Семья больших белых цапель *Casmerodius albus* из двух молодых и одной взрослой птицы в Гакковской бухте. 23 июня 2019. Фото авторов.

В третьей декаде июня число птиц в скоплениях на западном берегу Кургальского полуострова в эти годы достигало 30-35 птиц, при этом основная масса (до 12-15 особей) молодых и неполовозрелых цапель появлялась именно в это время (рис. 5). При этом были хорошо заметны выводки из 1-3 плохо летающих молодых птиц в сопровождении двух родителей (рис. 6).

Все вышеописанные обстоятельства позволяли предполагать высокую вероятность гнездования больших белых цапель либо в этом районе, либо где-то поблизости. Однако поиски гнёзд в тростниковых зарослях островов Мучной 23 июня 2019 и Реймосар 18 мая и 23 июня 2019, а также в угодье Кирьямо результатов пока не принесли.

Рис. 7. Биотоп южной окраины колонии серой цапли *Ardea cinerea* с залежами перьев большой белой цапли *Casmerodius albus* на земле. Окрестности посёлка Липово. 22 июня 2019. Фото авторов.

22 июня 2019 нами обследовалась колония серых цапель в окрестностях посёлка Липово (Коузов и др. 2019). Эта колония состояла из 52 гнёзд и располагалась на сухой, вытянутой в меридиональном направлении гриве, поросшей густым разновозрастным ельником (рис. 7), посреди топкого чернольхового леса с примесью других пород (ель, берёза, рябина, ивы, кустарники) на нижней береговой террасе между урезом воды (240 м) и древним литориновым уступом (120 м). В южной части колонии под деревьями мы нашли много маховых и контурных перьев большой белой цапли, в том числе и эгретки (рис. 7-8). Несмотря

на предпринятые нами специальные поиски, больших белых цапель и их птенцов в этот день найти не удалось. Однако из-за крайне плохой видимости в еловом лесу мы не сочли данный отрицательный результат достаточным для окончательных выводов.

Рис. 8. Перья большой белой цапли *Casmerodius albus*, в том числе украшающие перья-эгретки из брачного наряда (внизу), на южной окраине колонии серых цапель *Ardea cinerea*. Окрестности посёлка Липово. 22 июня 2019. Фото авторов.

28 июня 2019 мы провели повторное обследование колонии. К этому времени значительная часть выводков серой цапли уже покинула место гнездования; было отмечено только 22 птенца на 12 деревьях с гнёздами. Ещё при подходе к колонии была замечена большая белая цапля, взлетевшая с верхушки ели. Однако крайне плохая видимость в ельнике не позволила определить возраст птицы.

При тщательном осмотре в южной части колонии в 12 ч 35 мин была обнаружена ещё одна белая цапля, скрывающаяся в густых ветвях в верхней трети кроны старой ели. Мы стали наблюдать за ней. В 14 ч 45 мин. сквозь густые ветки мы увидели, как к ней подлетела другая

птица и, судя по голосовым реакциям и бурной возне птиц в ветвях, осуществила передачу корма. После её отлёта мы перешли на место с лучшим обзором и продолжили наблюдения. В 16 ч 11 мин в воздухе появилась взрослая большая белая цапля. При её появлении наблюдавшаяся нами птица выбралась на отдельную длинную еловую ветвь. Её осмотр и последующий анализ сделанных фотографий показал, что перед нами ещё нелётная молодая особь с жёлтым клювом и заметной желтизной на черноватой коже голени (рис. 9). На верхней части головы были хорошо заметны остатки пухового наряда. Размеры птенца составляли приблизительно 4/5 от размеров державшейся рядом взрослой птицы. Когда цапля раскрывала крылья, было хорошо видно, что самые основания маховых перьев находятся ещё в остатках чехлов, которые были заметны из-под не полностью отросших больших нижних кроющих перьев первостепенных и второстепенных маховых.

Рис. 9. Птенец-слёток большой белой *цапли Casmerodius albus* на ели. Южная окраина колонии серых цапель *Ardea cinerea* в окрестностях посёлка Липово. 28 июня 2019. Фото авторов.

Находка большой белой цапли на гнездовании в Ленинградской области была давно ожидаемой (Коузов 2015а,б). Скорее всего, на Кургальском полуострове в ближайшее время будут найдены новые места гнездования этого вида. Как указывалось выше, основным местом концентрации больших белых цапель здесь является западное побережье полуострова в районе Гакково–Кирьямо. Здесь есть обширные тростниковые крепи, где предпочитают гнездиться эти цапли на большей части области гнездования (Cramp, Simmons 1977; Celmiņš 2004; Lipsbergs, Opermanis 2004; Грищенко 2011). Кроме того, подходящие для больших белых цапель крупные массивы тростников есть в южной части озера Тихое и у посёлка Лужицы, как на побережье Лужской губы, так и на удалении от берега в межгрядовом понижении. Все эти места должны быть обследованы как возможные мест гнездования этих птиц в ближайшие годы.

В заключение следует ещё раз отметить, что Кургальский полуостров является уникальной территорией в Ленинградской области, где отмечается наибольшее разнообразие птиц. Именно здесь отмечены первые случаи гнездования в области большого числа видов птиц южного происхождения, расширяющих свои ареалы в северо-восточном направлении (Бузун, Храбрый 1990; Бубырева и др. 1993, Бузун, Мераускас 1993; Леоке 1998; Коузов 1995, 2007; Коузов, Кравчук 2008, 2010, 2012, 2013, 2014; Фёдоров 2009). Однако из-за строительства у границ Кургальского заказника Усть-Лужского портового комплекса, многократного усиления нерегламентированной рекреации в заказнике и нарушений его режима, в том числе и в местах массового гнездования водоплавающих птиц, а также из-за отсутствия реальной охраны существует реальная угроза деградации и гибели уникальных природных комплексов этой территории. И под наибольшей угрозой находятся колониальные поселения водоплавающих и околоводных птиц.

Литература

Барабанова Е.Н., Шатенёв К.Г., Машкова Е.В. 2015. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на Раковых озёрах на Карельском перешейке // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1152): 2018-2021.

Богуславский А.В. 2010. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на южном берегу Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **19** (542): 31.

Бубырева В.А., Бузун В.А., Волкович Н.М., Коузов С.А., Шаповалова О.В., Щукин А.К. 1993. Отчёт Кургальской экспедиции Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей в полевой сезон 1992 г. // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3) 10: 111-117.

Бузун В.А., Мераускас П. 1993. Орнитологические находки в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **2**, 2: 253-259.

Бузун В.А., Храбрый В.М. (1990) 2017. История появления лебедя-шипуна *Cygnus olor* на гнездовании в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1483): 3321-3323.

Головань В.И. 2011. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на южном берегу Лужской губы // *Рус. орнитол. журн.* **20** (663): 1143-1144.

Головань В.И., Резвый С.П., Савинич И.Б. 2015. О встречах больших белых цапель *Casmerodius albus* на востоке Финского залива в 2013-2015 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1190): 3339.

Гребёнкин А.В. 2017. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на реке Хревица в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1490): 3563-3564.

Грищенко В.Н. 2011. Большая белая цапля *Casmerodius albus* (Linnaeus 1758) // *Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные*. М.: 304-329.

Домбровский К.Ю. 2015. Наблюдение большой белой цапли *Casmerodius albus* в деревне Струпово (низовья реки Луги) // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1153): 2059-2060.

Домбровский К.Ю. 2017. Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* на Копанском озере в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1481): 3267-3268.

Домбровский К.Ю. 2018. Новые встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1693): 5527-5532.

Ковалев В.А. 2001. Орнитологические находки в Лодейнопольском районе Ленинградской области в 1998-2000 годах // *Рус. орнитол. журн.* **10** (137): 248-251.

Ковалев В.А. 2013. Новый залёт большой белой цапли *Casmerodius albus* на восток Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **22** (946): 3291.

Конечная Г.Ю. 2016. Осенние встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* на озере Сяберо (Лужский район Ленинградской области) // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1236): 126-127.

Коузов С.А. 1995. Первая регистрация гнездования пестроносой крачки *Thalasseus sandvicensis* в восточной части Финского залива // *Рус. орнитол. журн.* **4**, 1/2: 66-67.

Коузов С.А. 2007. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на Кургальском полуострове: история вселения и особенности биологии // *Рус. орнитол. журн.* **16** (349): 339-365.

Коузов С.А. 2010а. Особенности биологии лебедя-шипуна и серого гуся на Кургальском полуострове // *Казарка* **12**, 2: 85-113.

Коузов С.А. 2015а. О характере пребывания большой белой цапли *(Casmerodius albus* L.) на Кургальском полуострове и сопредельных участках восточной части Финского залива в последнем десятилетии // *Вестн. С.-Петерб. ун-та* (Сер. 3) 1: 41-50.

Коузов С.А. 2015б. О существенном увеличении числа встреч летующих больших белых цапель *Casmerodius albus* на западном побережье Кургальского полуострова в 2014 и 2015 годах // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1191): 3353-3358.

Коузов С.А. 2015в. О встречах большой белой цапли *Casmerodius albus* в долине реки Гороховки (Карельский перешеек) в июле 2015 года // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1189): 3299-3300.

Коузов С.А. 2015г. Встреча больших белых цапель *Casmerodius albus* в плавнях Кронштадтской колонии осенью 2015 года // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1195): 3507-3509.

Коузов С.А. 2017. О встречах большой белой цапли *Casmerodius albus* на северном побережье Кургальского полуострова // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1539): 5292-5297.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2008. Размножение водяного пастушка *Rallus aquaticus* на Кургальском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* **17** (410): 515-517.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2010. Размножение серой утки *(Anas strepera* L.) в Ленинградской области // *Вестн. охотовед.* **7**, 2: 254-259.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2012. Серая утка в восточной части Финского залива: история заселения, биология и миграции // *Казарка* **15**, 2: 106-139.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2013. Серый гусь *(Anser anser* L.) в Ленинградской области: основные тенденции многолетних изменений численности, экология, миграции и перспективы реинтродукции // *Вестн. охотовед.* **10**, 1: 5-16.

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2014. Биология лебедя-шипуна *(Cygnus olor)* в восточной части Финского залива // *Вестн. охотовед.* **11**, 2: 119-204.

Коузов С.А., Кравчук А.В., Ширяева М.О. 2019. Находка колонии серой цапли *Ardea cinerea* на Кургальском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1818): 4164-4170.
Леоке Д.Ю. 1998. Лебедь-шипун *Cygnus olor* — обычная гнездящаяся птица Кургальского рифа (восточная часть Финского залива) // *Рус. орнитол. журн.* **7** (46): 19-21.
Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 1-480.
Поляков В.М. 2015. Встреча двух больших белых цапель *Casmerodius albus* в верховьях Оредежа // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1145): 1799.
Ризнич И.И. 1962. Интересные встречи // *Наша охота* **3**.
Фёдоров В.А. 2009. Орнитологические находки в Кургальском заказнике (Ленинградская область) // *Рус. орнитол. журн.* **18** (480): 708-716.
Храбрый В.М. 2015. Наблюдения больших белых цапель *Casmerodius albus* в Лужском районе Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1230): 4631-4633.
Brandt J.F. 1880. Avium Provinciae Petropolitane Enumeratio. Aufzählung der in der Provinz Peterburg beobachteten Vögel // *J. Ornithol.* **28**.
Celmiņš A. 2004. Lielā baltā gārņa *Ardea alba* invāzija Latvijā 2004 gadā vasarā // *Putni dabā* **14**, 4: 12-16.
Cramp S., Simmons K. E. L. (eds.) 1977. *The Birds of the Western Palearctic*. Vol. 1: Ostrich to Ducks. Oxford Univ. Press: 1-722.
Ławicki Ł. 2014. The Great White Egret in Europe: population increase and range expansion since 1980 // *Brit. Birds* **107**, 1: 8-25.
Lipsbergs J., Opermanis O. 2004. Nesekmīga lielo balto gārņu *Egretta alba* ligzdošana Engures ezerā 2002 // *Putni dabā* **14**, 2: 8-10.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск **1820**: 4230-4235*

К фенологии весеннего прилёта огаря *Tadorna ferruginea* на Южном Алтае

Н.Н.Березовиков, Ф.И.Шершнёв

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки. Проспект Аль-Фараби, д. 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru
Фёдор Иванович Шершнёв. Казселезащита. Посёлок Катон-Карагай, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область, 070900, Казахстан

Поступила в редакцию 26 августа 2019

Огарь *Tadorna ferruginea* принадлежит к числу одной из рано прилетающих птиц. На Южном Алтае огари чаще всего появляются весной во второй-третьей декадах марта, с первыми оттепелями и проталинами на обочинах дорог и южных склонах гор. Обычно в эту пору они продвигаются в горы в условиях позднезимнего многоснежья вдоль проезжих дорог по межгорным долинам, останавливаясь на отдых и кормёжку на остожьях – остатках вывезенных стогов сена, около овцеводческих кошар, загонов скота у животноводческих хозяйств, на кучах навоза на окраинах деревень.

Рис. 1. Огари *Tadorna ferruginea*. Река Бухтарма, Катон-Карагайский район. 12 апреля 2017. Фото В.М.Воробьёва.

Рис. 2. Огарь *Tadorna ferruginea*. Катон-Карагай. 29 апреля 2014. Фото В.М.Воробьёва.

У местных жителей огарь хорошо известен под названием «варнавка» и «красная утка», а среди казахов он почитается как святая и неприкасаемая птица, которую нельзя убивать и употреблять в пищу её

мясо (рис. 1, 2). Первое появление огарей считается одним из признаков наступления весны и приближения весеннего праздника Наурыз. Среди фенологов прилёт огаря также является индикатором наступления ранней весны, так же как появление грача *Corvus frugilegus* и скворца *Sturnus vulgaris*. Лишь в годы с поздней весной, до конца марта сопровождающейся холодами и затяжными снегопадами, передовые огари прилетают в первых числах апреля. Так, в горах на озере Маркаколь их появление регистрировали 29 марта 1981, 24 марта 1986, 26 марта 1982 и 1983, 30 марта 1983 и 1984, когда кругом ещё лежал сплошной снежный покров (рис. 3). Только в аномально раннюю весну 1978 года (самую раннюю за последние 50 лет) огари появились здесь 15 марта, а в позднюю весну 1980 года – 3 апреля (Березовиков 1989). В 1958 году, когда была самая поздняя весна в XX веке, огари прилетели только 11 апреля (Гаврилов и др. 2002).

Рис. 3. Ранняя весна на озере Маркаколь. Южный Алтай. 5 апреля 2014. Фото Т.Бодровой.

Рис. 2.. Южные предгорья Азутау у Мраморной горы и пески Бландыкум.
2012 год. Фото Н.Сидорова.

В долине Кара-Кабы у села Бобровка прилёт огарей наблюди 24 марта 1984 (Березовиков, Зинченко 2007). В степных предгорьях хребта Азутау, обращённых к песчаной пустыне Бландыкум в пограничном Китае, передовые огари чаще всего встречаются раньше, чем на горном Маркаколе (рис. 4). Так, в селе Алексеевка (ныне Теректы) их появление регистрировали 14 марта 1980, 12 марта 1982, 15 марта 1984, на речке Кальджир у села Черняевка (Калжир) – 12 марта 1985 (Березовиков 2002). В северо-западных отрогах Нарымского хребта у села Высокогорка первых огарей отмечали 1 апреля 1970, 22 марта 1971, 26 марта 1973, в селе Сергеевка (ныне Кайнар) – 15 марта 1975, 20 марта 1980, 26 марта 1981, 12 марта 1983, 20 марта 1984, 26 марта 1985, 17 марта 1986 (Березовиков, Воробьёв 2001).

Рис. 5. Огарь *Tadorna ferruginea*. Урочище Каражер. Катон-Карагайский район. 2 мая 2018. Фото В.М.Воробьёва.

Сведений о времени появления передовых огарей в Бухтарминской долине в литературе нет. Во время поездки вверх по Бухтарме между сёлами Катон-Карагай, Берель и Арчаты 18 марта 2019 пару огарей, отдыхающую на песчаном островке реки, видели около села Жамбыл (49°14'21.16" с.ш., 86°19'34.53" в.д., 1054 м н.у.м.). Бухтарма на участке между сёлами Урыль и Берель была уже вскрывшейся (рис. 6, 7). В этот же день ещё 4 пары огарей видели на левобережье Бухтармы на незамерзающем зимой ручье в урочище Каражер в 4 км восточнее села Чингистай (49°10'59.71" с.ш., 85°56'33.98" в.д., 892 м н.у.м.). Огари держались здесь вместе со стаей крякв *Anas platyrhynchos*, состоящей из 5 брачных пар и 3 селезней. По словам местных жителей, они появились здесь раньше – 13 марта.

Рис. 6. Вскрывшееся русло Бухтармы между сёлами Жамбыл и Берель. Южный Алтай. 18 марта 2019. Фото Ф.И.Шершнёва.

Рис. 7. Место встречи огарей *Tadorna ferruginea* на Бухтарме у села Жамбыл. 18 марта 2019. Фото Ф.И.Шершнёва.

Приводя эту дату прилёта огаря, следует отметить одну из местных климатических особенностей Бухтарминской долины: весна в её верхней части наступает гораздо раньше, чем в нижней, более холодной и многоснежной. Так было и в этом, 2019 году, когда 18 марта между посёлками Катон-Карагай снег оставался лишь отдельными пятнами, а русло реки Бухтармы между сёлами Каменка, Жана-Ульго, Чингистай, Урыль и Берель было открытым. Вскрылось оно в январе и феврале без ледохода, в результате размывания многочисленных полыней по центральной части реки в оттепельные дни. Совершенно иной была гидрологическая ситуация на Бухтарме в её среднем течении между сёлами Барлык, Коробиха, Сенное, Быково, где река имела мощный торосистый ледовый покров с редкими узкими промоинами и высту-

пившими кое-где наледями. В самых низовьях реки у Малеевска, Снегирёво и Тургусуна по руслу реки во второй половине марта во многих местах имелись полыньи, на которых первые большие крохали *Mergus merganser* появились 17 марта, а кряквы – 25 марта. Однако в северных предгорьях Южного Алтая, лежащих между долинами Бухтармы, Нарыма и Иртыша, после суровой затяжной зимы во второй-третьей декадах марта ещё лежал сплошной снежный покров. Во время поездок с 15 по 26 марта по трассе между Катон-Карагаем, Большенарымом и Зыряновском огарей встречать не приходилось, основной прилёт водяных птиц здесь пришёлся на первую декаду апреля.

Рис. 8. Огарь *Tadorna ferruginea*. Урочище Сарыкора. Катон-Карагайский район. 6 апреля 2017. Фото В.М.Воробьёва.

Литература

Березовиков Н.Н. 1989. *Птицы Маркакольской котловины (Южный Алтай)*. Алма-Ата: 1-200.

Березовиков Н.Н. 2002. Материалы к авифауне Курчумских гор и южных предгорий Азутау (Южный Алтай) // *Рус. орнитол. журн.* **11** (202): 983-1009.

Березовиков Н.Н., Воробьёв И.С. 2001. Птицы западных отрогов Нарымского хребта (Южный Алтай) // *Рус. орнитол. журн.* **10** (170): 1067-1086.

Березовиков Н.Н., Зинченко Ю.К. 2007. Очерк орнитофауны бассейна реки Кара-Кабы (Южный Алтай) // *Рус. орнитол. журн.* **16** (383): 1399-1421.

Гаврилов Э.И., Кузьмина М.А., Грачёв Ю.Н., Родионов Э.Ф., Березовиков Н.Н. 2002. Материалы о птицах Южного Алтая. 1. Non-Passeriformes // *Рус. орнитол. журн.* **11** (183): 351-371.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск **1820**: 4236-4245*

Первая встреча галстучника *Charadrius hiaticula* в Псковском Поозерье

Г.Л.Косенков, С.А.Фетисов

Геннадий Леонидович Косенков, *Сергей Анатольевич Фетисов*. Национальный парк «Себежский». Ул. 7 Ноября, д. 22, Себеж, Псковская область, 182250, Россия. E-mail: Seb_park@mail.ru

Поступила в редакцию 19 августа 2019

Южную границу гнездовой части ареала галстучника *Charadrius hiaticula hiaticula* в Восточной Европе до сих пор проводят гораздо севернее Псковской области: по зонам тундры и лесотундры, отчасти – по северу лесной зоны. Правда, при этом всегда оговаривают, что по морским побережьям и крупным рекам галстучник может проникать и южнее, например, на берега Балтийского моря, хотя область его гнездования в Прибалтике сравнительно невелика и заметно сокращается в последние полвека (Гладков 1951; Иванов 1976; Мальчевский, Пукинский 1983; Хиларецки, Оянен 2003; Морозов 2013) (рис. 1). В связи с этим в ряде регионов Северо-Запада России, в том числе в Псковской области, положение современной границы области гнездования галстучника остаётся спорным или не обсуждалось вовсе. Тем более, что до последнего времени галстучник был известен здесь лишь как случайно гнездящийся вид, встречающийся только на берегах Псковско-Чудского озера (Фетисов 2014, 2018; Бардин, Фетисов 2019).

На сопредельных с Псковской областью территориях гнездование галстучника доказано (следуя с севера на юг) в Ленинградской области, Эстонии, Новгородской области, Латвии и южной части Белоруссии. Однако даже в Ленинградской области галстучник стал уже очень редким видом и как гнездящаяся птица постепенно исчезает и сохраняется на гнездовье в основном на берегах и островах Финского залива (Мальчевский, Пукинский 1983). Он включён в Красную книгу Ленинградской области (Головань 2018). За последние десятилетия размножавшиеся пары отмечали в Южном Приладожье и на берегу и островах Финского залива (Коузов 1993; Бубличенко, Бубличенко 1998; Высоцкий, Кондратьев 1999; Иовченко и др. 2017; Коузов, Кравчук 2010).

В Эстонии галстучник был вполне обычен на морском побережье (на каменистых или песчаных пляжах, отмелях, песчаных пустырях у воды) ещё в середине 1990-х годов, но и там его общая численность на гнездовании уменьшилась до 4-5 тыс. пар, или почти вдвое, по сравнению с численностью в 1960-е годы (Magi 1994). Тем не менее, согласно эстонскому атласу птиц, галстучник иногда ещё гнездится на эстонской стороне Чудского озера (Luigujoe 1999; Luigujoe, Kuresoo 2001). На про-

лёте осенью 1961 года на русской и эстонской сторонах Чудского озера было зарегистрировано более 1 тыс. галстучников (Luigujoe 1999; Luigujoe, Kuresoo 2001).

Рис. 1. Область гнездования галстучника в Прибалтике
(по: Species information sheet… 2013*).

В Новгородской области галстучник долгое время считался лишь пролётным видом (Зиновьев, Кошелев, Виноградов 2016). Лишь в мае 2001 года 5-6 пар этих куликов (вместе с малыми зуйками *Charadrius dubius)* были найдены на южном берегу озера Ильмень; там же гнездо галстучников с полной кладкой было обнаружено на участке с мелкой галькой, в 0.5 м от уреза воды в озере (Мищенко, Суханова 2003, 2005). Однако галстучник гнездился в пойме Ильменя не ежегодно. Сокращение поголовья скота и прекращение сенокосов в 2001-2007 годах привели к зарастанию лугов в пойме высокой густой травой, а прибрежных глинистых, песчаных и галечниковых участков – ивняком. Помимо того, там же стали регулярно происходить весенние палы и сильно возросла рекреационная нагрузка, из-за чего галстучник прекратил

* Species information sheet *Charadrius hiaticula hiaticula*. 2013 // HELCOM Red list Bird Expert Group. www.helcom.fi>Baltic Sea trends>Biodiversity>Red List of species.

гнездиться на южном берегу Ильменя, по-видимому, полностью (Мищенко, Суханова 2009, 2013).

В Латвии, как и в Эстонии, галстучник распространён спорадически, в основном в приморской полосе. Но и там во второй половине XX века его численность на местах размножения сокращалась (Страздс 1983). В середине 1980-х годов в Латвии насчитывали на гнездовании всего 45-60 пар, причём большинство из них – на берегах и островах нижнего течения реки Даугавы, на морских пляжах, в песчаных или гравийных карьерах (Приедниекс и др. 1989).

В Белоруссии на начало XXI века численность галстучника в период размножения оценивали в 110-160 пар. Он был признан редким на гнездовании видом и включён в Красную книгу Республики Беларусь. Здесь он встречается в основном только на открытых опустошённых лугах и песчаных берегах таких рек, как Припять и Днепр, а также в низовьях их притоков (Никифоров и др. 1997; Красная книга… 2004).

Таким образом, общая картина распространения галстучника на Северо-Западе России, в Прибалтике и Белоруссии не исключает возможности его гнездования в Псковской области, например, на побережье Псковско-Чудского озера. На территории Псковской области галстучник упоминался в литературе ещё в конце XIX века. При этом все авторы, проводившие свои наблюдения как в то время (Дерюгин 1897; Зарудный 1910), так и позднее (Нестеров, Никандров 1913а,б, 1914, 1915; Никандров 1913; Бианки 1922; Чистовский 1927а,б; Каменев 1962; Мешков 1963; Борисов 2003), регистрировали его на Псковско-Чудской приозёрной низменности, чаще в ближайших окрестностях Псковско-Чудского озера и дельты реки Великой, и характеризовали в качестве обычного или редкого (во второй половине XX века), но исключительно пролётного вида. Правда, наряду с этим было зафиксировано и два факта, противоречащих единодушно принятому в разные годы определению статуса галстучника в Псковской области, но они долгое время оставались в забвении*. О возможности гнездования галстучника первый раз сообщили в своём орнитофенологическом отчёте П.В.Нестеров и Я.Н.Никандров (1915), которые 27 июня 1914 нашли птенцов галстучника в траве на южном берегу Псковского озера. Во втором случае галстучник был отмечен в 1961 году в период размножения на восточном берегу Чудского озера в Гдовском районе студентом Ленинградского университета В.М.Каменевым (1962), собиравшем

* Об этих фактах, к сожалению, не упомянули ни псковские орнитологи Л.П.Урядова и Л.С.Щеблыкина (1993), предложившие ещё в начале 1990-х годов считать галстучника редким гнездящимся видом Псковской области, ни В.Г.Кривенко с соавторами (1994), придавшие ему в области статус вероятно гнездящегося вида. Наоборот, в 1970-1990-е годы галстучник не был упомянут ни в одной обзорной статье по развитию орнитофаунистики и не внесён ни в один перечень редких видов птиц Псковской области, включая Псковско-Чудское озеро, расположенное на Беломорско-Балтийской пролётной трассе птиц (Мешков 1974, 1978; Борисов, Урядова, Щеблыкина 1993; Лебедева и др. 1993; Ильинский, Фетисов 1998; Тарасов 2002; Щеблыкина 2002).

здесь материал для дипломной работы. Кроме того, примерно в тех же местах, около деревни Козлов Берег, Ю.Г.Бояринова и Е.Н.Смирнов (Bojarinova, Smirnov 2001) зарегистрировали 7 галстучников во второй декаде мая 1998 года, а в 2012 году возле деревни Спицино, на берегу Чудского озера в Гдовском районе, удалось наблюдать пару галстучников, беспокоившихся на гнездовом участке (Фетисов 2014). Все перечисленные места встреч галстучников в репродуктивный период показаны на рисунке 2.



Рис. 3. Места встреч галстучников в репродуктивный период в Псковской области.
Места встреч: 1 – выводка (Нестеров, Никандров 1915); 2, 3 – взрослых особей в период размножения (Каменев 1962; Bojarinova, Smirnov 2001); 4 – пары на гнездовом участке (Фетисов 2014); 5 – кочующей до отлёта взрослой особи. Фото на врезке: галстучник *Charadrius hiaticula*. Национальный парк «Себежский». 1 августа 2019. Фото авторов.

Первая встреча галстучника в Псковской области вдали от Псковско-Чудского озера произошла 1 августа 2019 в национальном парке «Себежский» – на мысу Себежского озера в городе Себеж, расположенном в Псковском Поозерье, на крайнем юго-западе Псковской области,

на границе с Белорусским Поозерьем (рис. 3). По всей видимости, этого кулика привлекли сюда появившиеся в 2019 году из-за продолжительной засухи и сильного обмеления озера песчаные и песчано-галечные отмели (рис. 4 а-б), а также повсеместно многочисленные на берегу и в прибрежной полосе разные водяные птицы (не менее 230-250 крякв *Anas platyrhynchos*, примерно 200 лысух *Fulica atra*, около 150 озёрных чаек *Larus ridibundus* и др.). Вероятно, по той же причине в третьей декаде июля 2019 года здесь же встречены и другие редкие и очень редкие в Псковском Поозерье кулики: фифи *Tringa glareola*, малый зуёк *Charadrius dubius*, большой веретенник *Limosa limosa*, большой улит *Tringa nebularia* и чернозобик *Calidris alpina*, а в первой декаде августа – камнешарка *Arenaria interpres* (Косенков, Фетисов 2019), турухтан *Philomachus pugnax* и ещё один чернозобик*.

Рис. 3. Галстучник *Charadrius hiaticula*. Себежское озеро. 1 августа 2019. Фото авторов.

Одиночный галстучник (рис. 3, 5) появился близ городской набережной Себежа утром 1 августа 2019† и пробыл на берегу Себежского озера 2 полных дня (1 и 2 августа). При этом почти сразу он присоединился к одному чернозобику, с которым кормился и отдыхал бок о бок, не мешая ему и обследуя в поисках пищи соседние с ним микроучастки по урезу воды. Нередко эта пара объединялась также с одиночной камнешаркой или пересекала кормовой участок турухтана, который держался от других куликов несколько обособленно. Помимо того, по-

* По крайней мере, в других местах на Себежском озере и соседнем с ним озере Ороно ни один из перечисленных видов куликов, включая галстучника, встречен не был.

† Это точная дата его появления там, потому что в предыдущие 2 недели на этом участке берега Себежского озера длиной 400-450 м проводились ежедневные наблюдения за куликами.

чти все кулики, кормившиеся и отдыхавшие на берегу Себежского озера, были вынуждены постоянно менять участки своего пребывания из-за того, что их часто беспокоили отдыхавшие тут же люди, в первую очередь дети. Остаётся только удивляться чрезвычайной доверчивости как галстучника, так и чернозобика, приближавшихся к неподвижно стоявшему у воды человеку на расстояние 3-4 м и почти не реагировавших на людей, проходивших вдоль набережной в 5-7 м от воды.

Рис. 4. Места кормёжки и отдыха галстучника 1-2 августа 2019 на берегу Себежского озера в городе Себеж. Фото авторов.

Несмотря на частые перемещения, галстучник с чернозобиком облюбовали себе два постоянных места (в 200-250 м одно от другого), куда перелетали после вспугивания людьми, и продолжали кормиться и отдыхать на новом участке, пока их не вспугивали и там, и потом возвращалась на свой первый, вероятно, такой же кормный участок, не превышавший 70-80 м вдоль уреза воды и 1-2 м шириной. Чаще всего они обследовали грязевые и заиленные участки, а также места рядом с водной растительностью, выброшенной волнами на берег (рис. 5). На отдыхавших на берегу и кормившихся у воды и на воде многочисленных крякв, лысух и озёрных чаек галстучник (как и другие кулики) не обращал особого внимания и нередко приближался к ним вплотную.

Во время кормёжки в Себеже галстучник использовал не менее двух приёмов добывания пищи. Продвигаясь вдоль уреза воды в озере, он постоянно отклонялся в стороны, то заходя на мелких местах в воду,

то обследуя примерно метровую полосу берега и время от времени делая выпады и быстро склёвывая что-то как в воде, так и на берегу. На грязевых же участках он сначала зондировал субстрат сомкнутым клювом (рис. 5, фото вверху), а уже потом извлекал из него в случае удачи добычу и тут же её проглатывал (рис. 5, фото внизу). Задержавшись после этого на несколько секунд, передохнув и осмотревшись, галстучник продолжал свои перебежки вдоль берега, высматривая впереди и по сторонам от себя новые кормовые объекты.

Рис. 5. Галстучник *Charadrius hiaticula* во время кормёжки 1-2 августа 2019 на берегу Себежского озера. Фото авторов.

Вечером 2 августа или утром 3 августа 2019 галстучник покинул берег Себежского озера. Несмотря на поиски в других подходящих для куликов местах птицу увидеть больше не удалось. Можно предположить, что она продолжила свои летние кочёвки* в пределах Псковского или соседних с ним Латгальского и даже Белорусского Поозерья, ещё более удалённого от Балтийского моря,. Ближайшие же от Себежа места размножения этого вида находятся в центральных районах Латвии (Приедниекс и др. 1989).

Литература

Бардин А.В., Фетисов С.А. 2019. Птицы Псковской области: аннотированный список видов // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1733): 731-789.

Бианки В.Л. 1922. Распространение птиц в северо-западной части Европейской России // *Ежегодник Зоол. музея Акад. наук* **23**, 2: 97-128.

Борисов В.В. 2003. Орнитофауна // *Экологический мониторинг дельты реки Великой*. Псков, **1**: 105-116.

Борисов В.В., Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. 1993. Охраняемые и редкие виды птиц Псковской области // *Краеведение и охрана природы*. Псков: 150-153.

Бубличенко Ю.Н., Бубличенко А.Г. 1998. Фауна наземных позвоночных Кургальского полуострова и островов Кургальской Реймы (предварительные данные) // *Комплексные природоведческие исследования на Северо-Западе России. Валаамская и Кургальская экспедиции СПбОЕ*. СПб.: 85-106.

Высоцкий В.Г., Кондратьев А.В. 1999. О гнездовании галстучника *Charadrius hiaticula* в Южном Приладожье // *Рус. орнитол. журн.* **8** (86): 15-16.

Гладков Н.А. 1951. Отряд кулики Limicolae или Charadriiformes // *Птицы Советского Союза*. М., **3**: 3-372.

Головань В.И. 2018. Галстучник *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 // *Красная книга Ленинградской области. Животные*. СПб.: 418-419.

Дерюгин К.М. 1897. Орнитологические исследования в Псковской губернии // *Тр. С.-Петерб. общ-ва естествоиспыт*. Отд. зоол. и физиол. **27**, 3: 17-38.

Зарудный Н.А. (1910) 2003. Птицы Псковской губернии // *Рус. орнитол. журн.* **12** (234): 939-957.

Зиновьев А.В., Кошелев Д.В., Виноградов А.А. 2016. Аннотированный список птиц Тверской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1245): 397-445.

Иванов А.И. 1976. *Каталог птиц СССР*. Л.: 1-276.

Ильинский И.В., Фетисов С.А. 1998. О видовом составе, характере пребывания и размещении птиц на восточном побережье Псковского озера и в дельте реки Великой летом 1995 года // *Проблемы сохранения биоразнообразия Псковской области*. СПб.: 34-74 (Тр. СПбОЕ. Сер. 6. Т. 1).

Иовченко Н.П., Гагинская А.Р., Носков Г.А., Резвый С.П. 2017. Результаты орнитологического обследования островов Финского залива в 1994-1995 годах // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1528): 4884-4902.

Каменев В.М. 1962. *Водоплавающие и болотные птицы Чудского озера (Пейпси)*. Дипломная работа. Л.: 1-78 (рукопись).

Косенков Г.Л., Фетисов С.А. 2019. Первая встреча камнешарки *Arenaria interpres* в Псковском Поозерье // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1817): 4104-4111.

Коузов С.А. 1993. Водоплавающие и околоводные птицы северного побережья Невской губы // *Тр. Зоол. ин-та РАН* **252**: 60-83.

* Осенний пролёт галстучника в Псковской области наблюдали не ранее середины августа (Зарудный 1910; Нестеров, Никандров 1914; Каменев 1962) а в Эстонии – с конца августа (Magi 1994).

Коузов С.А., Кравчук А.В. 2010. О гнездовании галстучника *Charadrius hiaticula* на Кургальском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* **19** (613): 2075-2078.

Красная книга Республики Беларусь. Животные. 2004. Минск: 1-320.

Кривенко В.Г., Равкин Е.С., Виноградов В.Г., Авданин В.О., Мирутенко М.В., Божанский А.Т., Русаков О.С. 1994. *Итоговый отчёт по научно-практической разработке «Кадастр животного мира Псковской области» (Обобщённые результаты за 1992-1993 гг.).* Межотрасл. научно-инженер. центр по охране окр. среды и рац. использованию природных ресурсов. М.: 1-210 (рукопись).

Лебедева О.А., Судницына Д.Н., Иванов С.В., Тарасова С.Г., Михайлов А.Е., Кугаевская Н.Н., Борисов В.В., Филиппова Г.П., Завьялова М.Н., Татарников О.М., Вецель Н.К. 1993. Природный комплекс дельты реки Великой и его охрана // *Краеведение и охрана природы*. Псков: 15-26.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 1-480.

Мешков М.М. 1963. Осенний пролёт птиц в 1959-1961 гг. на восточном побережье Псковского озера // *Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц* **2**: 43-58.

Мешков М.М. 1974. Развитие орнитофаунистических работ в Псковской области // *Ornitol. kogutik* **7**: 67-77.

Мешков М.М. 1978. Псковско-Чудской микрорайон на Беломорско-Балтийской пролётной трассе // *Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц* **11**: 3-11.

Мищенко А.Л., Суханова О.В. (2003) 2005. О гнездовании редких видов куликов в Приильменье // *Рус. орнитол. журн.* **14** (278): 81-83.

Мищенко А.Л., Суханова О.В. (2009) 2013. Динамика численности и распределения куликов в Приильменье // *Рус. орнитол. журн.* **22** (847): 412-413.

Морозов В.В. 2013. Галстучник // *Полный определитель птиц европейской части России*. М., **2**: 22-24.

Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1913а. Материалы к авифенологии окрестностей г. Пскова (1912 г.) // *Птицевед. и птицеводство* **4**, 4: 294-299.

Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1913б. Прилёт, пролёт и гнездование птиц в окрестностях г. Пскова // *Ежегодник Зоол. музея Акад. наук* **18**, 1: 102-124.

Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1914. Материалы к авифенологии окрестностей г. Пскова (1913 г.) // *Птицевед. и птицеводство* **5**, 1: 27-39.

Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1915. Материалы к авифенологии окрестностей г. Пскова (1914 г.) // *Птицевед. и птицеводство* **6**, 1: 38-48.

Никандров Я.Н. 1913. Орнитофенологические наблюдения. Весна 1913 года. 14. Погост Корлы, Логазовской волости, Псковского уезда, на берегу Псковского (Талабского) озера, близ устья реки Великой // *Орнитол. вестн.* **4**, 4: 333-338.

Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тишечкин А.К. 1997. *Птицы Беларуси на рубеже XXI века: статус, численность, распространение*. Минск: 1-188.

Приедниекс Я., Страздс М., Страздс А., Петриньш А. 1989. *Атлас гнездящихся птиц Латвии. 1980-1984*. Рига: 1-351.

Страздс М. 1983. Галстучник *Charadrius hiaticula* L. // *Птицы Латвии: Территориальное размещение и численность*. Рига: 80.

Тарасов В.А. 2002. Заметки о редких птицах водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёрная низменность» // *Природа Псковского края* **13**: 24-26.

Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. 1993. Наземные позвоночные животные Псковской области // *Краеведение и охрана природы*. Псков: 137-144.

Фетисов С.А. 2014. О распространении, статусе и экологии галстучника *Charadrius hiaticula* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1013): 1885-1893.

Фетисов С.А. 2018. *Водно-болотные птицы в районе российской стороны Псковско-Чудского водоёма и рамсарском угодье «Псковско-Чудская приозёрная низменность».*

Материалы для оценки современного состояния видов, разработки системы их мониторинга и мероприятий по сохранению природных комплексов. Себеж: 1-710. (Тр. нац. парка «Себежский». Вып. 6).

Хиларецки П., Оянен М. 2003. Галстучник *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 // *Атлас гнездящихся птиц Европы Европейского совета по учётам птиц. Сокращ. версия текст. части*. М.: 119.

Чистовский С.М. 1927а. *Птицы Псковской губернии («Каталог птиц Псковского краеведческого естественно-научного музея» и «Промысловая или охотничья дичь Псковской губернии»)*. Псков: 1-22.

Чистовский С.М. 1927б. Птицы Псковской губернии // *Познай свой край. Сб. Псков. общ-ва краевед*. Псков, **3**: 82-101.

Щеблыкина Л.С. 2002. Встречи редких и охраняемых видов птиц в период осенних миграций на территории водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёрная низменность» // *Природные и культурные ландшафты: Проблемы экологии и устойчивого развития. Материалы обществ.-науч. конф. с международ. участием*. Псков, **2**: 64-68.

Bojarinova Ju.G., Smirnov Ye.N. 2001. Spring bird migration at Lake Chudskoye (Peipsi) in 1998 // *Study of the status and trends of migratory bird populations in Russia*. St. Petersburg, **3**: 115-123.

Luigujoe L. 1999. Linnud // *Peipsi*. Tallinn: 165-173.

Luigujoe L., Kuresoo A. 2001. Birds // *Flora and fauna. Lake Peipsi*. Tartu: 112-118.

Magi E. 1994. Great Ringed Plover *Charadrius hiaticula* L. // *Birds of Estonia: status, distribution and numbers*. Tallinn: 101-102.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск **1820**: 4245-4246*

Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на Белом озере в Гатчинском парке

Е.С.Киселёва

Екатерина Сергеевна Киселёва. Санкт-Петербургский университет МВД России.
Ул. Лётчика Пилютова, д. 1. Санкт-Петербург, 198206, Россия. E-mail: yekaterina_s@mail.ru

Поступила в редакцию 21 августа 2019

Большой баклан *Phalacrocorax carbo* начал гнездиться на островах Финского залива в пределах Ленинградской области в начале 1990-х годов (Гагинская 1995; Коузов 2007). К настоящему времени его численность существенно выросла, однако в континентальной части области его встречи довольно редки (Попов 2007; Поляков 2016; Бек, Домбровский 2018). В Гатчине большой баклан ранее не наблюдался (Ингинен и др. 2010; наши данные).

10 августа 2019 большой баклан *Phalacrocorax carbo* был замечен на Белом озере в парке города Гатчины. Птица расположилась на одном из островов в центре озера. Баклан отдыхал на засохшем дереве,

чистил перья (см. рисунок). На следующий день и в дальнейшем его здесь больше не встречали.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. Белое озеро. Дворцовый парк Гатчины. 10 августа 2019. Фото автора.

Литература

Бек Ю.Ю., Домбровский К.Ю. 2018. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на Мерёвском озере в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1594): 1707-1708.

Гагинская А.Р. 1995. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* – гнездящийся вид Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **4**, 3/4: 93-96.

Ингинен М.П., Борель И.В., Нецепляева И.С. 2010. Птицы Гатчинского ландшафтного парка (по наблюдениям 2008-2009 годов) // *Рус. орнитол. журн.* **19** (541): 6-14.

Коузов С.А. 2007. Большой баклан *Phalacrocorax carbo* на Кургальском полуострове: история вселения и особенности биологии // *Рус. орнитол. журн.* **16** (349): 339-365.

Поляков В.М. 2016. Встреча большого баклана *Phalacrocorax carbo* на озере Донцо, или Кюрлевский Карьер (Волосовский район Ленинградской области) // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1326): 3075-3076.

Попов И.Н. 2007. Встреча большого баклана *Phalacrocorax carbo* на озере Вялье в Ленинградской области // *Рус. орнитол. журн.* **16** (357): 617-618.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск **1820**: 4247-4249*

О залётах даурского журавля *Grus vipio* в Байкальский регион

Ц.З.Доржиев, Е.Н.Бадмаева, Ю.А.Дурнев

Цыдыпжап Заятуевич Доржиев, *Евгения Николаевна Бадмаева*. Бурятский государственный университет. Ул. Смолина, д. 24а, Улан-Удэ, 670000, Россия.
E-mail: tsydypdor@mail.ru; calidris03@gmail.com
Юрий Анатольевич Дурнев. Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. Набережная реки Мойки, д. 48, Санкт-Петербург, 191186, Россия.
E-mail: baikalbirds@mail.ru

Поступила в редакцию 28 августа 2019

Залёты даурского журавля *Grus vipio* в Байкальский регион известны давно. Сведения о встречах этих птиц на Байкале начали поступать с середины XX столетия. Между 1955 и 1962 годами единичные залёты зарегистрированы на Южном Байкале в дельте реки Селенги (Швецов, Швецова 1967). В последующие годы здесь их не наблюдали, хотя иркутскими орнитологами велись многолетние (1973-1997) стационарные исследования по всему этому району (Фефелов и др. 2001). В дальнейшем исследования в дельте стали носить кратковременный характер, её регулярно посещают орнитологи и любители, но сведения о даурских журавлях от них не поступают.

На юго-западном побережье Байкала в устье реки Большая Голоустная в конце октября – начале ноября 2006 нами был зарегистрирован залёт пары даурских журавлей. Птицы держались на разных степных луговых участках дельты реки 4 дня (Дурнев 2009).

О двух залётах даурского журавля – в Баргузинскую долину и в долину реки Селенги – без указания более точных мест встречи приводят В.В.Попов и А.Н.Матвеев (2006). Западнее Байкала, в Тункинской долине, в первых числах ноября 2006 года на лугах в пойме реки Тунка отмечены три даурских журавля (Дурнев 2009).

19 сентября 2018 один даурский журавль обнаружен в окрестностях посёлка Усть-Ордынский на заболоченном лугу в пойме реки Ордушка у Ордынского пруда; 27 сентября, вероятно, та же птица держалась на том же месте (Евтух 2018).

В Юго-Западном Забайкалье даурские журавли были встречены дважды. 26 июня 2009 в долине реки Хилка на озере Тухум (в 55 км на запад от села Бичура) зарегистрирована одна пара (Андронов, Фефелов 2009). Новый залёт пары этих журавлей отмечен нами 20 августа 2019 на озере Оронгойское степное Белое в 45 км западнее Улан-Удэ. Птицы спокойно кормились на влажном лугу у озера. Рядом с ними на лугу кормилась стая красавок *Anthropoides virgo* из 35 особей. Даур-

ские журавли держались обособленно от красавок и спокойно паслись в течение 2 ч наших наблюдений.

Как видно, даурский журавль периодически, хотя и редко, появляется в разных районах Байкальского региона. По срокам их залёты приурочены к летне-осеннему периоду. Весенних залётов не зарегистрировано. Среди встреченных птиц не было сеголетков. Очевидно, залёты совершают неразмножащиеся птицы после окончания линьки, которая в Монголии обычно завершается в конце июля – середине августа (Цэвээнмядаг, устн. сообщ.). Некоторые особи линяют не каждый год, они могут появиться в другое время. Залёты даурских журавлей в Байкальский регион вполне ожидаемы, поскольку он находится относительно недалеко от северных границ гнездовой части ареала, которая располагается в юго-восточном Забайкалье и Северо-Восточной Монголии, есть небольшой изолированный участок гнездования в бассейне реки Селенги на территории Монголии. Учащение залётов, надо полагать, связано со значительными изменениями условий обитания даурских журавлей в местах гнездования. Это могут быть засухи, летние наводнения, степные и лесные пожары, которые в последние десятилетия стали частыми.

Однако не вполне понятны очень далёкие залёты (за тысячи километров) даурских журавлей на север. Известны два случая встречи их в Якутии. В первый раз залёт был зарегистрирован в августе 2014 года в окрестности посёлка Батагай (Верхоянский район, среднее течение реки Яны). Вторая встреча одиночного даурского журавля состоялась 27 мая 2018 на окраине улуса Сунтар (Сунтарский район, среднее течение Вилюя) (Афанасьев 2018). В последнем случае встречена одиночная птица, которая привлекала внимание своим необычным поведением. Она не боялась людей, позволяла детям фотографироваться рядом с ней. Судя по отношению к человеку, до этого её могли содержать в неволе. Естественной причиной дальних залётов птиц обычно является присоединение одиночных особей или небольших групп к мигрирующим стаям близких видов и, увлекаясь ими, они попадают в отдалённые районы.

На ближайших к Байкальскому региону территориях – в Юго-Восточном Забайкалье и Северной Монголии обитает значительная часть мировой популяции даурских журавлей. В настоящее время на Земле обитает 6.5 тыс. особей (Gombobaatar, Monks 2011). До 40% этих птиц встречается в Монголии (Gombobaatar, Monks 2011), а в Забайкалье – до 23% (Goroshko 2002). В Монголии в 1993-2000 годах насчитывалось ежегодно в среднем около 200 территориальных пар, а общая численность достигала 700-1000 особей (Горошко, Цэвээнмядаг 2001). В настоящее время, по данным Н.Цэвээнмядага (устн. сообщ.), в Монголии обитает около 1000 птиц, из них гнездится около 300. В Юго-Восточном

Забайкалье, по данным за 1990-2000 годы, установлено обитание 49 территориальных пар, численность гнездящихся пар оценена 70-100 (Горошко, Цэвээнмядаг 2001), за 2009-2012 годы – 32-57 территориальных пар (Горошко 2012). По наблюдениям этих и других авторов (Горошко, Цэвээнмядаг 2001, 2003; Малков 2018; Цэвээнмядаг и др. 2018), распределение по территории и численность даурских журавлей подвержена сильным изменениям год от года. Прежде всего, на журавлей оказывает влияние динамика экологических условий. С ухудшением условий гнездования увеличивается численность холостующих птиц. Все эти факторы являются одними из главных причин активных перемещений журавлей, в том числе вылета за пределы основной части ареала.

Литература

Андронов Д.А., Фефелов И.В. 2009. Летние регистрации даурского *(Grus vipio)* и чёрного *(Grus monacha)* журавлей в Бичурском районе Бурятии // *Байкал. зоол. журн.* 3: 127.

Афанасьев М.А. 2018. Интересные встречи птиц в окрестностях с. Сунтар (Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия)) // *Байкал. зоол. журн.* 1 (22): 97-98.

Горошко О.А. 2012. Даурский журавль // *Красная книга Забайкальского края. Животные*. Новосибирск: 120-122.

Горошко О.А., Цэвээнмядаг Н. 2001. Даурский журавль в Юго-Восточном Забайкалье и Северо-Восточной Монголии // *Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков*. Казань: 522-529.

Горошко О.А., Цэвээнмядаг Н. 2003. Данные о влиянии засух на популяцию даурских журавлей // *Наземные позвоночные Даурии*. Чита, **3**: 121-130.

Дурнев Ю.А. 2009. Значение Тункинской долины в динамике авифауны Байкальской рифтовой зоны // *Байкал. зоол. журн.* 1: 50-55.

Евтух Г.Ю. 2018. Вторая находка даурского журавля *Grus vipio* в Иркутской области // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1681): 5062-5063.

Малков Е.А. 2018. Особенности динамики даурского журавля *(Grus vipio* Pall.) на трансграничной территории верхнего бассейна Онона // *Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии. Материалы 4-й международ. орнитол. конф.* Иркутск: 124-126.

Попов В.В., Матвеев А.Н. 2006. *Охрана позвоночных животных в Байкальском регионе.* Иркутск: 110.

Цэвээнмядаг Н., Нямбаяр Б., Батбаяр Г., Идэрбат Д., Миринде К., Арчибальд Ж. 2018. Состояние популяций и экология даурского журавля в Восточной Монголии // *Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии. Материалы 4-й международ. орнитол. конф.* Иркутск: 249-251.

Швецов Ю.Г., Швецова И.В. 1967. Птицы дельты Селенги // *Изв. ИСХИ* **25**: 224-231

Gombobaatar S., Monks E.M. (comp.) 2011. *Mongolian Red List of Birds* / Regional Red List Series Vol. 7. Birds. London: 1-1036.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск **1820**: 4250-4253*

К орнитофауне Соловецкого архипелага Белого моря

А.Е.Черенков, В.Ю.Семашко, Г.М.Тертицкий

Александр Евгеньевич Черенков. Соловецкий филиал Беломорской биостанции Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Ул. Заозёрная, д. 17-6, посёлок Соловецкий, Архангельская область, 164070, Россия. E-mail: chersol@mail.ru
Владимир Юрьевич Семашко. Ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 3, кв. 115, Москва, 125475, Россия. E-mail: simakovw@mail.ru
Григорий Маркович Тертицкий. Институт географии РАН. Старомонетный переулок, д. 29, Москва, 119017 Россия. E-mail tertitski@mail.ru

Поступила в редакцию 27 августа 2019

Полный список орнитофауны Соловецкого архипелага и островов Онежского залива опубликован нами в 2014 году (Черенков и др. 2014). С тех пор он пополнился рядом видов, информация о которых приведена ниже.

Короткоклювый гуменник *Anser brachyrhynchus*. С 19 по 24 апреля 2019 одиночный гусь держался на лугах на окраине посёлка Соловецкий (рис. 1). Ранее короткоклювый гуменник отмечался в мае на севере Архангельской области – в дельте Северной Двины и на острове Мудьюгский (Андреев 2007), а в Карелии также и на осеннем пролёте (Зимин 2016).

Рис.1. Короткоклювый гуменник *Anser brachyrhynchus* на лугах у посёлка Соловецкий. 24 апреля 2019. Фото Ю.Б.Гендлина.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina*. 29 мая 2015 одиночный самец отмечен на Большом Соловецком острове на Филипповских садках (рис. 2). Ранее на Соловецких островах красноголовая чернеть никогда не встречалась. Этой же весной 13 мая на озере Корзиха в границах Архангельска был зарегистрирован самец красноголовой чернети (Андреев, Спицын 2015), а 15 мая пролетающий самец встречен над береговой линией на мысе Красногорский в окрестностях посёлка Пертоминск (Брагин, Покровская 2015). Весной 2017 года стайки этих уток наблюдались на озёрах в пригородной зоне города Северодвинска (Андреев и др. 2017).

Рис. 2. Кулик-сорока *Haematopus ostralegus* и самец красноголовой чернети *Aythya ferina* на Филипповских садках. Большой Соловецкий остров. 29 мая 2015. Фото В.Ю. Семашко.

Кобчик *Falco vespertinus*. 25 августа 2015 самец встречен в Грязной губе на юге Большого Соловецкого острова. На севере Архангельской области кобчик встречен в мае 1996 года на острове Мудьюгский (Андреев и др. 1998). В Карелии этот сокол не регистрировался севернее реки Илексы (Zimin *et al*. 2005).

Перепел *Coturnix coturnix*. 19 мая 2016 токующего самца слышали на лугах у посёлка Соловецкий. Г.И.Поляков (1929) приводил перепела в списке залётных видов для Соловецкого архипелага, не указывая конкретных встреч. Впоследствии этот вид не отмечался ни на Соловках, ни в сопредельных районах. Токующих самцов изредка регистрировали на материке в соседних районах Карелии и Архангельской области (Хохлова, Артемьев 2012).

Плосконосый плавунчик *Phalaropus fulicarius*. На Большом Соловецком острове, на лайде у Грязной губы 6 июня 2017 встречена самка в брачном наряде. Холодная весна 2017 года заставила многих

пролётных северных куликов задержаться на Белом море. В частности, у Соловков в начале июня держались стаи круглоносых плавунчиков *Phalaropus lobatus*, чего в обычные годы не наблюдается. В одной из таких стаек, кормящейся на солоноватых лужах, и отмечен плосконосый плавунчик. Из литературы нам известно лишь об одной осенней встрече этого кулика на Белом море (Lehikoinen *et al.* 2006).

Седой дятел *Picus canus*. 29 сентября 2015 отмечен в посёлке Соловецкий. Это вторая встреча седого дятла на Соловецком архипелаге. Впервые его наблюдали у временного посёлка Реболда на севере Большого Соловецкого острова 4 июля 1990 (Черенков и др. 2014). На материке в районе Онежского залива этот вид регистрировали в окрестностях посёлка Вирьма 6 мая 1975 (Томкович, Добрынина 1976).

Пёстрый дрозд *Zoothera dauma*. 23 мая 2019 встречен на лесной дороге к югу от посёлка Соловецкий. Западная граница этого вида не ясна. В России ближайший к Соловкам район регистрации пёстрого дрозда находится в Пинежском заповеднике и в его окрестностях, где поющих самцов отмечали в мае и июне 1986, 2003, 2006 и 2011 годов (Рыкова 2013). В европейских странах залётные особи регистрировались неоднократно от Балкан до Норвегии (Нанкинов 2009).

Славка-черноголовка *Sylvia atricapilla*. На острове Большой Соловецкий поющий самец впервые встречен 15 июля 2009. Повторная встреча была в 2015 году, когда самца черноголовки отмечали 30 мая и 3 июня на одном и том же участке в мелколесье. В 2016 году пару волнующихся черноголовок наблюдали 31 мая, а 15 июня и 14 июля слышали поющих самцов. Пролётные славки-черноголовки регулярно встречаются осенью в Мурманской области с 1970 года (Коханов 1998; Гашек 2014), но весной эту славку там не наблюдали ни разу. Ближайший известный район гнездования этого вида находится в низовьях реки Онеги (Корнеева и др. 1984).

Литература

Андреев В.А., Нолет Б.А., Поот М.П. 1998. Хищные птицы о. Мудьюгский в Белом море // *Материалы 3-й конф. по хищным птицам Вост. Европы и Сев. Азии*. Ставрополь, **1**: 4-5.

Андреев В.А., Спицын В.М. 2015. Весенние орнитологические находки в Архангельске в 2015 году // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1149): 1925-1927.

Андреев В.А., Спицын В.М., Потапов Г.С. 2017. Результаты орнитологических наблюдений в окрестностях Северодвинска в 2017 году // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1529): 4924-4928.

Брагин А.В., Покровская И.В. 2015. Сведения о редких и малочисленных птицах района Унской губы и Двинского залива Белого моря // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1215): 4149-4152.

Гашек В.А. 2014. Позднеосенняя встреча славки-черноголовки *Sylvia atricapilla* на Кольском полуострове // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1078): 3841-3843.

Зимин В.Б. 2016. Короткоклювый гуменник *Anser brachyrhynchus* // *Миграции птиц Северо-Запада России. Неворобьиные*. СПб.: 109.

Корнеева Т.М., Быков А.В., Реган С.П. 1984. *Наземные позвоночные низовий р. Онеги*. М.: 1-88.

Коханов В.Д. 1998. Характер пребывания черноголовой славки *Sylvia atricapilla* в Мурманской области // *Рус. орнитол. журн.* **7** (32): 7-9.

Нанкинов Д.Н. 2009. Сибирские дрозды на юго-востоке Европы: установленные и ожидаемые залёты видов и подвидов // *Рус. орнитол. журн.* **18** (506): 1457-1464.

Поляков Г.И. 1929. К познанию орнитофауны Соловецких островов // *Материалы Соловецкого общ-ва краевед.* **20**: 1-56.

Рыкова С.Ю. 2013. *Птицы Беломорско-Кулойского плато*. Архангельск: 1-188.

Томкович П.С., Добрынина И.Н. 1976. Некоторые данные по весеннему пролёту птиц на Белом море // *Материалы 9-й Прибалт. орнитол. конф.* Вильнюс: 259-261.

Хохлова Т.Ю., Артемьев А.В. 2012. Новые встречи перепела *Coturnix coturnix* в Карелии // *Рус. орнитол. журн.* **21** (717): 31-33.

Черенков А.Е., Семашко В.Ю., Тертицкий Г.М. 2014. *Птицы Соловецких островов и Онежского залива Белого моря*. Архангельск: 1-383.

Lehikoinen A., Kondratyev A., Asanti T., Gustafsson E., Lamminsalo O., Lapshin N., Pessa J., Rusanen P. 2006. *Survey of arctic bird migration and staging areas at the White Sea, in the autumns of 1999 and 2004*. Helsinki: 1-107.

Zimin V.B., Sazonov S.V., Lapshin N.V., Artemiev A.V., Medvedev N.V., Khokhlova T.Y.,Yakovleva M.V. 2005. A review of rare diurnal raptor species breeding in Karelia // *Status of raptor populations in Eastern Fennoscandia: Proc. Workshop*. Kostomuksha: 168-184.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск **1820**: 4253-4254*

Встреча болотной гаички *Poecile palustris* в «Лесу на Ворскле»

Т.П.Дьяконова

Татьяна Павловна Дьяконова. Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия.

Поступила в редакцию 26 августа 2019

Всестороннее изучение фауны и флоры лесостепной дубравы «Лес на Ворскле» (в настоящее время – один из участков заповедника «Белогорье», Белгородская область) началось 1920-е годы и особенно интенсивно велось в послевоенное время. Из синиц в заповедном лесу и его окрестностях многие годы гнездились только большая синица *Parus major* и лазоревка *Cyanistes caeruleus*, а на пролёте изредка встречалась московка *Periparus ater* (Новиков и др. 1963). Пухляк *Poecile montanus* впервые обнаружен на гнездовании в 1999 году (Бардин, Дьяконова 1999). Пухляки продолжали встречаться здесь в 2000 году (Шерстаков 2000), наблюдались и в 2012 (А.В.Бардин, устн. сообщ.).

Во время проведения практики студентов Санкт-Петербургского университета в Лесу на Ворскле в июне 2019 года мы несколько раз встречали пухляков, а один раз удалось наблюдать болотную гаичку *Poecile palustris*. Встреча с ней произошла на усадьбе заповедника в т.н. Нижнем Саду 26 июня 2019 в 18 ч. Проводя здесь наблюдения, мы заметили на яблонях в группе больших синиц и лазоревок одну гаичку. Её удалось рассмотреть совсем близко и услышать её характерный призывный крик, так что у нас нет никаких сомнений, что это именно *P. palustris*. По всей видимости, это была молодая расселяющаяся особь.

Литература

Бардин А.В., Дьяконова Т.П. 1999. Появление пухляка *Parus montanus* на гнездовании в «Лесу на Ворскле» (Белгородская область) // *Рус. орнитол. журн.* **8** (83): 9-10.

Новиков Г.А., Мальчевский А.С., Овчинникова Н.П., Иванова Н.С. 1963. Птицы «Леса на Ворскле» и его окрестностей // *Вопросы экологии и биоценологии* **8**: 9-118.

Шерстаков Д.Н. 2000. Усатая синица *Panurus biarmicus*, пухляк *Parus montanus* и рябинник *Turdus pilaris* в «Лесу на Ворскле» в 2000 году // *Рус. орнитол. журн.* **9** (111): 18-19.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск **1820**: 4254-4255*

Первая регистрация гнездования длиннохвостой неясыти *Strix uralensis* в Окском заповеднике

Р.Б.Бобков

*Второе издание. Первая публикация в 1998**

Впервые длиннохвостая неясыть *Strix uralensis* в Окском заповеднике встречена 26 сентября 1994. Молодой (судя по голосу) самец в течение 12 ночей активно перемещался и токовал в непосредственной близости от центральной усадьбы заповедника. Дважды птица садилась под фонари, позволяя рассмотреть себя в деталях. Начиная с 5 октября интенсивность токования резко снизилась, и самец сместился к северо-востоку по пойме реки Пры, а после 7 октября 1994 его уже не слышали.

11 марта 1995 отмечено токование взрослого самца длиннохвостой неясыти на территории Комсомольского лесничества (северная часть биосферного полигона ОБГЗ). 13 апреля 1995 взрослый самец токовал

* Бобков Р.Б. 1998. Первая регистрация гнездования длиннохвостой неясыти в Окском заповеднике // *Современная орнитология 1998*. М.: 340-341.

в 300 м к западу от кордона Кормилицын. На имитацию крика он реагировал агрессивно, подлетая вплотную к имитатору. В течение последующей недели активность самца снизилась, и начиная с 20 апреля он издавал только редкие призывные крики.

1 мая 1995 в 430 м к западу от кордона Кормилицын найдено гнездо длиннохвостой неясыти. Оно было сделано в берёзовом пне (остолопе) на высоте 4 м в смешанном лесу (ель, осина, берёза) с густым подседом (лещина, крушина), в 20 м от края вырубки. На момент обследования (14 мая) в гнезде было 4 птенца. Диаметр гнезда 56×60 см, глубина – около 50 см. Выстилка – толстый слой плотно утрамбованной древесной трухи. Возраст птенцов на момент осмотра: первый птенец – 21 день, второй – 17-18 дней, третий – 13-14 дней и четвёртый – 10 дней; все в хорошем состоянии, упитанность 3 балла. Оба родителя атаковали людей, причём очень крупный (с самку) самец делал это активнее самки. Птенцы были помечены стандартными алюминиевыми кольцами серии «С».

Второе гнездо длиннохвостой неясыти обнаружено 7 мая 1995 (обследовано 8 мая) в 144-м квартале заповедника, в 3 км к северо-востоку от кордона Старое. Оно располагалось на вершине осинового пня, на высоте 6 м, среди заболоченного лиственного леса. Диаметр гнезда составил около 50 см, высота стенок – до 65 см. Выстилкой служил слой древесной трухи. В стенке гнезда на уровне дна два широких отверстия. В гнезде находились три птенца: старший в возрасте 21-22 дней, средний – 17-18 и младший – 14-15 дней (два младших птенца окольцованы стандартными кольцами серии «С» 15 мая). Все три птенца были хорошо упитаны. Ещё два птенца найдены на земле под гнездом. Судя по степени разложения одного из них, он погиб более 10 дней назад в возрасте 15-16 дней. Второй птенец, видимо, погиб за 2-3 дня до осмотра гнезда в возрасте 21-22 дня.

Анализ литературы (Кревер 1985; Степанян 1990) позволяет заключить, что наша находка является первой регистрацией гнездования длиннохвостой неясыти в Рязанской области.

Литература

Кревер В.Г. 1985. Хищные птицы и совы в заповедниках РСФСР // *Сб. науч. тр. ЦНИЛ Главохоты РСФСР*. М.: 138-155.

Степанян Л.С. 1990. *Конспект орнитологической фауны СССР*. М.: 1-728.