ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал

2020
XXIX

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК

1912

EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXIX

Экспресс-выпуск • Express-issue

2020 № 1912

СОДЕРЖАНИЕ

1739-1745 Дальневосточный кулик-сорока *Haematopus ostralegus osculans* в Кроноцком заповеднике на юго-восточном побережье Камчатки: размещение и доказательства размножения. Е.Г.ЛОБКОВ, Ф.В.КАЗАНСКИЙ

1745-1747 Встреча краснозобой гагары *Gavia stellata* на озере Полисто в Псковской области. О.А.ШЕМЯКИНА

1747-1750 Ранний прилёт и начало тяги вальдшнепа *Scolopax rusticola* весной 2020 года (Новоржевский район Псковской области). Э.В.ГРИГОРЬЕВ

1750-1751 Ранний прилёт клинтуха *Columba oenas* в Красное Село (южная окраина Санкт-Петербурга) весной 2020 года. К.Ю.ДОМБРОВСКИЙ

1751-1754 К распространению садовой камышевки *Acrocephalus dumetorum* в Иркутской области. В.В.ПОПОВ

1754-1757 Групповое нападение сорок *Pica pica* на краснощёкого суслика *Spermophilus erythrogenys*. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ, А.С.ФЕЛЬДМАН

1757-1758 Зимовка сапсана *Falco peregrinus* в городе Атырау. С.С.ХАЛМЕНОВ

1758-1761 Скальный конёк *Anthus petrosus* на Москве-реке в музее-заповеднике Коломенское (Москва). А.М.НАУМОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2020
Дата опубликования: 27 марта 2020

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXIX
Express-issue

2020 № 1912

CONTENTS

1739-1745 The Eurasian oystercatcher *Haematopus ostralegus osculans* in the Kronotsky reserve on the southeast coast of Kamchatka: distribution and evidence of breeding. E.G.LOBKOV. F.V.KAZANSKY

1745-1747 The record of the red-throated diver *Gavia stellata* on Lake Polisto in the Pskov Oblast. O.A.SHEMYAKINA

1747-1750 Early arrival and start of roding of the woodcock *Scolopax rusticola* in spring 2020 (Novorzhevsky Raion, Pskov Oblast). E.V.GRIGORIEV

1750-1751 Early arrival of the stock dove *Columba oenas* in Krasnoye Selo (southern outskirts of St. Petersburg) in the spring of 2020. K.Yu.DOMBROVSKY

1751-1754 On the distribution of the Blyth's reed warbler *Acrocephalus dumetorum* in the Irkutsk Oblast. V.V.POPOV

1754-1757 Group attack of magpies *Pica pica* on a red-cheeked ground squirrel *Spermophilus erythrogenys*. N.N.BEREZOVIKOV, A.S.FELDMAN

1757-1758 The peregrine falcon *Falco peregrinus* wintering in Atyrau. S.S.KHALMENOV

1758-1761 The Eurasian rock pipit *Anthus petrosus* on the Moscow River in the museum-reserve Kolomenskoye (Moscow). A.M.NAUMOV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2020

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1912**: 1739-1745*

Дальневосточный кулик-сорока *Haematopus ostralegus osculans* в Кроноцком заповеднике на юго-восточном побережье Камчатки: размещение и доказательства размножения

Е.Г.Лобков, Ф.В.Казанский

Евгений Георгиевич Лобков. Камчатский государственный технический университет. Ул. Ключевская, д. 35. Петропавловск-Камчатский, 683003, Россия. E-mail: lobkov48@mail.ru
Фёдор Васильевич Казанский. Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник. Ул. Рябикова, д. 48. Елизово, Камчатский край. 684010. Россия. E-mail: F.Kazansky@gmail.com

Поступила в редакцию 25 марта 2020

Как известно, основная часть популяции дальневосточного кулика-сороки *Haematopus ostralegus osculans* Swinhoe 1871 на Камчатке в настоящее время сосредоточена на охотском (западном) побережье полуострова Камчатка (в основном к северу от устья Большой Воровской) и на побережье Пенжинской губы (Лобков 2001; Герасимов 2006; Герасимов, Лобков 2018). На тихоокеанском (восточном) побережье Камчатки летние находки взрослых птиц зарегистрированы в разных местах от Авачинской губы на юге до устья Апуки на севере, но подтверждений размножению из этой части Камчатки вот уже 80-90 лет как нет. Последние доказательства были собраны в 1931 году в бухте Оссора (не полностью оперившийся птенец в коллекции Зоологического института РАН, Санкт-Петербург – Лобков 1986) и в 1936 и 1939 годах в бухте Ольга, где, судя по всему, встречали выводки (Аверин 1948).

Наиболее регулярно пребывание куликов-сорок на Восточной Камчатке известно в настоящее время на территории Кроноцкого заповедника в районе одноимённого (Кроноцкого) полуострова от бухты Ольга до устья Малой Чажмы и особенно в междуречье Большой и Малой Чажмы (расстояние между этими реками примерно 7 км). Полуостров Кроноцкий разделяет лежащий к северу от него Камчатский залив и находящийся к югу Кроноцкий залив. Обе реки – Большая и Малая Чажма – принадлежат бассейну Камчатского залива, граничащего с Беринговым морем (рис. 1).

В устье Большой Чажмы (на её правобережье) расположен кордон заповедника, где более или менее длительно живут инспектора, которые попутно с исполнением своих прямых обязанностей наблюдают за природной обстановкой и часто сообщают о своих наблюдениях, в том числе куликов-сорок.

Встреч с куликами-сороками в районе рек Большая и Малая Чажма и вдоль побережья Кроноцкого полуострова (устья рек Кручёная, Ка-

менистая и др.) за последние почти 50 лет (с 1971 года) так много, что гнездование вида в этом районе казалось очевидным. Однако поисками гнёзд и выводков никто не занимался, и прямых доказательств размножения долго не было. Вот, например, как отражена в Летописи природы Кроноцкого заповедника информация о встречах с куликами-сороками на территории заповедника в течение 18 лет (см. таблицу).

Рис. 1. Место расположения (чёрная точка) междуречья Большой и Малой Чажмы на восточном побережье полуострова Камчатка.

Очевидно, что кулики-сороки действительно регулярно (ежегодно) держатся летом на морском побережье в районе рек Большая и Малая Чажма. Они появляются весной в мае (самые ранние наблюдения 13-17 мая) и до конца августа или даже до начала сентября (самые поздние сроки 1-5 сентября) держатся поодиночке, парами, небольшими группами и стаями до 17 особей. По сведениям, полученным от инспекторов Кроноцкого заповедника Н.А.Ким и А.В.Маслова, в конце июля здесь может быть зарегистрировано до 30 птиц за день.

Рядом с гористым побережьем Кроноцкого полуострова междуречье Большой и Малой Чажмы в самой нижней (приустьевой) части их бассейнов отличается широкой открытой местностью, заболоченной, с кустарником и мелколиственным лесом. Низкий морской берег огибает

залив в виде излучины. Основные места обитания куликов-сорок здесь – это песчаные, песчано-ракушечниковые и песчано-галечниковые морские пляжи с характерным для Камчатки чёрным песком, оголённые или слабо заросшие растениями-солеросами и с фрагментами намытой волнами ветоши. Кроме того, кулики-сороки держатся и на первых, невысоких прибрежных морских террасах, покрытых приморскими лугами (обычно с доминированием колосняка *Leymus* sp.), но только там, где растительность невысокая и негустая.

Сведения о наблюдениях за куликами-сороками в Кроноцком заповеднике по материалам Летописи природы за 2000-2017 годы

Годы	Что наблюдали
2000	Неоднократно взрослые птицы по 2-7 особей в период с 13 мая по 26 августа в районе рек Большая и Малая Чажма
2001	Пара взрослых в устье р. Каменистой
2002	Неоднократно наблюдали взрослых по 3-5 особей в период с 13 мая по 8 августа на Чажме
2003	Неоднократные встречи по 1-3-5 особей в междуречье Большой и Малой Чажмы в период с 8 июня по 23 августа
2004	Регулярные встречи по 1-4 особи в районе Большой и Малой Чажмы в период с 30 мая по 26 июня. Кроме того, 19 июня одиночку видели в междуречье Татьяны и Ольги, а на косе Семячикского лимана в период с 29 июня по 19 августа трижды регистрировали этих куликов поодиночке и стайкой из 4 особей
2005	В районе Малой Чажмы в период с 12 июля по 1 сентября регулярно по 1-4-7-8 особей; 19 июля – пара с активным отвлекающим поведением
2006	Информации нет
2007	28 мая и 18 июля поодиночке на Семячикском лимане, а также с 31мая по 15 июня 5 раз отмечены в бухте Ольга, в основном поодиночке, но 6 июня – 3 особи вместе
2008	17 мая одиночная птица на берегу Семячикского лимана, а также в бухте Ольга 15 и 20 июня одиночные особи и 23 июля – три вместе
2009	Конкретных фактов нет
2010	Нет информации
2011	Нет информации
2012	12 июля 4 особи в устье Большой Чажмы на песчано-галечниковом пляже
2013	22 июля близ устья Малой Чажмы взрослые с отвлекающим поведением
2014	Нет информации
2015	Нет информации
2016	В устье Большой Чажмы в период с 28 июня по 5 сентября неоднократно по 2-4 особи (в августе-сентябре по 7-10 птиц)
2017	В течение июля в окрестностях кордона «Чажма» многократные встречи поодиночке и стаями до 12 особей

Непосредственно на морских пляжах, на удалении от прибоя, кулики-сороки устраивают гнёзда. Теперь у нас есть тому доказательства. Гнездо представляет собой лунку в песке диаметром примерно 21 см без дополнительной выстилки. На стенках лунки и рядом с гнездом в небольшом количестве и в беспорядке присутствуют более или менее короткие сухие фрагменты от веток деревьев, кустарников и побегов кустарничков, намытых морскими волнами. Одно гнездо было

буквально прижато внешним краем лунки к толстой сухой ветке, лежавшей на песке.

Рис. 2. Первое из обнаруженных гнёзд кулика-сороки *Haematopus ostralegus* с кладкой в устье Большой Чажмы. 6 июня 2012. Фото С.И.Габова.

Рис. 3. Гнездо кулика-сороки *Haematopus ostralegus* с оставшимся в лунке, возможно, неоплодотворённым яйцом. Устье реки Большая Чажма. 11 июля 2018. Фото Н.А.Ким.

6 июня 2012 в устье Большой Чажмы инспектор Кроноцкого заповедника С.И.Габов впервые нашёл и сфотографировал гнездо кулика-

сороки с кладкой из 3 яиц (рис. 2). Следующая находка была сделана 6 лет спустя: 11 июля 2018 гнездо с 1 яйцом сфотографировано инспектором Н.А.Ким (рис. 3). Судя по относительно поздним срокам этой находки, состоянию гнездовой лунки и кажущейся «неполной» кладке, можно предположить, что птенцы успешно вылупились и покинули гнездо, а оставшееся яйцо может быть болтуном. На следующий сезон Н.А.Ким отыскала и сфотографировала ещё два гнезда, отличающиеся характером грунта, на который были отложены яйца: 29 мая 2019 два яйца лежали на голом песке (рис. 4), а 1 июня 2019 найдена полная кладка из 4 яиц (рис. 5 и 6) на песчано-ракушечно-галечниковом пляже. 27 июня 2019 оба гнезда проверены повторно, они оказались пустыми, без следов разорения, что позволяет предположить, что птенцы вылупились и покинули их.

Рис. 4. Кладка кулика-сороки *Haematopus ostralegus* на песчаном морском пляже в устье реки Большая Чажма. 29 мая 2019. Фото Н.А.Ким.

Рис. 5. Кладка кулика-сороки *Haematopus ostralegus* на песчано-ракушечно-галечниковом морском пляже в устье реки Большая Чажима.1 июня 2019. Фото Н.А.Ким.

Рис. 6. Насиживающий кулик-сорока *Haematopus ostralegus* на гнезде в устье реки Большая Чажма. 12 июня 2019. Фото Н.А.Ким.

Кладка из 4 яиц у кулика-сороки на Камчатке найдена впервые, ранее здесь находили гнёзда с кладками только из 2 и 3 яиц и выводки не более чем из 3 молодых (Лобков 1986; Герасимов и др. 1992; Герасимов 2006; Герасимов, Лобков 2018).

Таким образом, устья рек Большая и Малая Чажма пока остаются единственным местом, где фактически доказано современное гнездование дальневосточного кулика-сороки на восточном побережье полуострова Камчатка. Размножение этого вида вполне можно предполагать также на некоторых участках побережья Кроноцкого полуострова в устьях других крупных рек.

Авторы выражают искреннюю благодарность инспекторам Кроноцкого заповедника Н.А.Ким, А.В.Кащееву, А.В.Маслову, С.И.Габову, В.И.Аксёнову и другим работниками заповедника за предоставленную информацию и фотографии, использованные в данной публикации.

Литература

Аверин Ю.В. 1948. Наземные позвоночные Восточной Камчатки // *Тр. Кроноцкого заповедника* **1**: 1-223.

Герасимов Н.Н., Соколов А.М., Томкович П.С. 1992. Птицы орнитологического заказника «Река Морошечная», Западная Камчатка // *Рус. орнитол. журн.* **1**, 2: 157-208.

Герасимов Ю.Н. 2006. Дальневосточный кулик-сорока *Haematopus ostralegus osculans* Swinhoe, 1871 // *Красная книга Камчатки. Т. 1. Животные*. Петропавловск-Камчатский: 163-164.

Герасимов Ю.Н., Лобков Е.Г. 2018. Дальневосточный кулик-сорока *Haematopus ostralegus osculans* (Swinhoe, 1871) // *Красная книга Камчатского края. Т. 1. Животные*. Петропавловск-Камчатский: 112.

Лобков Е.Г. 1986. *Гнездящиеся птицы Камчатки*. Владивосток: 1-304.
Лобков Е.Г. 2001. Кулик-сорока (дальневосточный подвид) *Haematopus ostralegus osculans* (Swinhoe, 1871) // *Красная книга Российской Федерации. Животные*. М.: 501-502.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1912**: 1745-1747*

Встреча краснозобой гагары *Gavia stellata* на озере Полисто в Псковской области

О.А.Шемякина

Оксана Александровна Шемякина. Кафедра зоологии и экологии животных, естественно-географический факультет, Псковский государственный университет, ул. Советская, 21, Псков, 180000 Россия. E-mail: oksshem@mail.ru

Поступила в редакцию 23 марта 2020

Краснозобая гагара *Gavia stellata* в Псковской области – редкий пролётный вид (Бардин, Фетисов 2019). Наиболее полные сведения о встречах и характере пребывания этого вида в регионе содержится в работах С.А.Фетисова (2018, 2020). До 1996 года краснозобая гагара встречалась только на Псковско-Чудском озере в период миграций и то нерегулярно. Обычно гагары, следующие Беломоро-Балтийским путём, пролетают в районе Тёплого озера и немного южнее, на Псковском озере, встречи с ними уже редки (Леус 1961).

Также есть мнение о существовании осеннего пролёта гагар через внутренние материковые районы Северо-Запада России, вероятно, в сторону черноморских зимовок или к юго-западному берегу Балтийского моря (Кищинский 1978; Флинт 1982). Не исключается возможность, что единичные краснозобые гагары в стаях чернозобых гагар *Gavia arctica* следуют Волховским миграционным путём: от Ладоги по реке Волхов, через озеро Ильмень и Полистово-Ловатскую болотную систему (Бузун, Кондратьев 2006; Фетисов 2018). Об этом могут свидетельствовать отдельные встречи гагар на осенних миграциях в Новоржевском (Григорьев, Бардин 2016) и Себежском (Фетисов 2020) районах Псковской области (Григорьев, Бардин 2016), Холмском и Марёвском районах Новгородской области (Зуева 2008; Архипов, Зуева 2018).

Встреча краснозобых гагар весной на внутреннем водоёме – озере Полисто у западных границ Полистово-Ловатской болотной системы произошла 26 мая 2016. В северо-восточной части озера во время учёта птиц с моторной лодки недалеко от берега на воде были отмечены четыре гагары. Птицы держались одной группой. При попытке приблизиться они с разбега поднялись и улетели дальше в озеро. Было сде-

лано несколько фотографий (см. рисунок). Две птицы были во взрослом наряде, две – молодые. Однако были ли молодые птицы тоже краснозобыми гагарами, утверждать сложно, так как по окраске они довольно схожи с чернозобыми гагарами и в литературе упоминается о совместных миграциях обоих видов (Фетисов 2018).

Краснозобые гагары *Gavia stellata*. Озеро Полисто, Бежаницкий район, Псковская область. 26 мая 2016. Фото автора.

Примечательно, что эта встреча краснозобой гагары территориально близка к трём другим местам встреч этого вида, также лежащим на внутриматериковом миграционном пути гагар. В начале декабря 1996 года одна краснозобая гагара ударилась о провода в деревне Пришвино Новоржевского района (Григорьев, Бардин 2016), что в 80 км к юго-западу от озера Полисто. 12 ноября 2016 в 35 км к юго-востоку от Полисто в посёлке Красный Бор Новгородской области была найдена на земле одна краснозобая гагара, которую потом выпустили в реку Полисть в городе Старая Русса (Архипов, Зуева 2018). 30 октября 2019 краснозобая гагара наблюдалась у восточного берега Себежского озера в 154 км юго-западнее озера Полисто (Фетисов 2020).

Также нужно отметить, что встреча краснозобых гагар 26 мая – одна из наиболее поздних известных весенних регистраций этого вида в Псковской области. Известно, что Н.А.Зарудный (1910) встретил одну краснозобую гагару на реке Великой у моста прямо в Пскове 13 мая 1893 (по старому стилю) и писал об этом как об очень поздней находке.

Литература

Архипов В.Ю., Зуева Н.В. 2018. Редкие виды птиц в Рдейском заповеднике и окрестностях в 2015-2016 годах // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1600): 1919-1928.

Бардин А.В., Фетисов С.А. 2019. Птицы Псковской области: аннотированный список видов // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1733): 731-789.

Бузун В.А., Кондратьев А.В. 2006. Миграции чернозобых гагар *Gavia arctica* над озером Ильмень осенью 2002 года // *Рус. орнитол. журн.* **15** (330): 848-850.

Григорьев Э.В., Бардин А.В. 2016. Необычная находка пролётной краснозобой гагары *Gavia stellata* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1385): 5073-5074.

Зарудный Н.А. (1910) 2003. Птицы Псковской губернии // *Рус. орнитол. журн.* **12** (233): 903-913.

Зуева Н.В. 2008. Находки пролётных чернозобых гагар *Gavia arctica* под Холмом // *Рус. орнитол. журн.* **17** (425): 959-960.

Кищинский А.А. 1978. Миграция гагарообразных // *Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии: Гагарообразные – Аистообразные*. М.: 27-37.

Леус С.И. 1961. Общая характеристика миграции водоплавающих птиц на Псковском озере осенью 1956, 1958 и 1959 гг. // *Экология и миграции птиц Прибалтики*. Рига: 207-213.

Фетисов С.А. 2018. *Водно-болотные птицы в районе российской стороны Псковско-Чудского водоема и рамсарском угодье «Псковско-Чудская приозёрная низменность» (Материалы для оценки современного состояния видов, разработки системы их мониторинга и мероприятий по сохранению природных комплексов)*. Себеж: 1-710 (Тр. национального парка «Себежский». Вып. 6).

Фетисов С.А. 2020. Первая встреча краснозобой гагары *Gavia stellata* в Псковском Поозерье // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1875): 211-217.

Флинт В.Е. 1982. Отряд гагарообразные Gaviiformes // *Птицы СССР: История изучения. Гагары. Поганки. Трубконосые*. М.: 245-283.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1912**: 1747-1750*

Ранний прилёт и начало тяги вальдшнепа *Scolopax rusticola* весной 2020 года (Новоржевский район Псковской области)

Э.В.Григорьев

Эдуард Вячеславович Григорьев. Деревня Дубровы, Новоржевский район, Псковская область, 182457,Россия. E-mail: edik.grigoriev2016@yndex.ru

Поступила в редакцию 25 марта 2020

5 марта 2020 года в 19 ч 10 мин я наблюдал в деревне Дубровы Новоржевского района Псковской области первую тягу вальдшнепа *Scolopax rusticola*. Это была и первая встреча с ним весной 2020 года. До этого, по данным наблюдений в этом районе с 1988 года, самая ранняя дата прилёта вальдшнепа была 9 марта 2015 (средняя первого появ-

ления весной за 19 лет – 31 марта), а самая ранняя тяга наблюдалась 20 марта 2002 (средняя дата за 17 лет – 3 апреля) (Григорьев 2017; плюс данные за 2018 и 2019 годы). Таким образом, это самая ранняя дата прилёта и начала тяги вальдшнепа за все годы моих наблюдений; тяга началась почти на месяц раньше средних сроков.

Очевидно, такие ранние сроки фенологических явлений связаны с необычной тёплой и малоснежной зимой 2019/20 года. Началась она своевременно, в конце ноября. Средняя температура воздуха за три зимних месяца составила +2.0°C, причём во все декады средняя температура воздуха была положительной: декабрь – 1-я декада +0.9°C; 2-я декада +2.6°C; 3-я декада +1.3°C; январь – 1-я декада +0.8°C, 2-я декада +3.3°C, 3-я декада +1.2°C; февраль – 1-я декада +0.3°C, 2-я декада +3.7°C, 3-я декада +3.4C. Большую часть времени водоёмы были без ледостава (лёд всегда таял), а речки вообще не покрывались льдом. Оттепели наблюдались в течение 83 дней (92%); 62 дня (68%) стояла пасмурная погода, 61 день наблюдались осадки в виде дождя и снега (116.8 мм). Снеговой покров был недолговечным и наблюдался лишь 26 дней. Были два снегопада, две метели (вьюга), три дня со штормом, два дня с оледенением на деревьях и прочих предметах и шесть дней с туманами. А 19 февраля 2020 наблюдалась радуга.

Средняя температура первой пентады марта +4.3°C, полное отсутствие снега с 3 марта. Снегопад был 27 февраля, когда выпало 12 см мокрого снега, который пролежал 5 дней.

Уже в календарные сроки зимы начали цвести первоцветы. Волчеягодник (волчье лыко) *Daphne mezereum* зацвёл 10 ноября 2019 и, неспешно распускаясь и расцветая всю зиму, продолжил цвести весной (рис. 1). Лещина *Corylus avellana* уже 16 января была готова запылить и расцвела 23 января (рис. 2). Серая ольха *Alnus incana* зацвела 7 февраля. Печёночница благородная *Hepatica nobilis* зацвела 2 февраля (рис. 2), первоцвет весенний *Primula veris* – 26 февраля, хохлатка плотная *Corydalis solida* и гусиный лук *Gagea minima* – 4 марта, медуница неясная *Pulmonaria obscura* – 5 марта 2020. Сокодвижение у клёна остролистного *Acer platanoides* началось 21 февраля, у берёзы бородавчатой *Betula pendula* – 1 марта.

Гриб саркосцифа алая *Sarcoscypha coccinea* появился в лесах с ноября и встречался всю зиму до весны. На протяжении всей зимы попадались опёнок зимний *Flammulina velutipes* и дрожалка оранжевая *Tremella mesenterica*.В течение всей зимы наблюдались активно ползающие по земле дождевые черви и некоторые наземные моллюски.

В Псковской области известны случаи зимовки вальдшнепов (Фетисов 2017). Казалось бы, в эту зиму для этого были благоприятные условия. Однако мне в Новоржевском районе встречать вальдшнепов зимой не приходилось.

Рис. 1. Волчье лыко *Daphne mezereum*. Слева – 14 января, справа – 29 февраля 2020. Окрестности деревни Дубровы. Новоржевский район, Псковская область. Фото автора.

Рис. 2. Слева – лещина *Corylus avellana*, 28 января 2020; справа – печёночница благородная *Hepatica nobilis*, 2 февраля 2020. Окрестности деревни Дубровы. Новоржевский район, Псковская область. Фото автора.

Литература

Григорьев Э.В. 2017. Фенология прилёта, отлёта и токования вальдшнепа *Scolopax rusticola* в Новоржевском районе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1403): 527-529.

Фетисов С.А. 2017. О зимних встречах вальдшнепа *Scolopax rusticola* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1403): 521-527.

ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск ***1912****: 1750-1751*

Ранний прилёт клинтуха *Columba oenas* в Красное Село (южная окраина Санкт-Петербурга) весной 2020 года

К.Ю.Домбровский

Константин Юзефович Домбровский. Всероссийский Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С.Берга), Набережная Макарова, д. 26, Санкт-Петербург, 199053, Россия.
E-mail: k.dombrovsky@yandex.ru

Поступила в редакцию 20 марта 2020

Клинтухи *Columba oenas*, которых можно было наблюдать летом 2019 года в Нижнем парке Красного Села (Домбровский 2019), в 2020 году появились очень рано. 17 марта 2020 мне удалось услышать голос токующего клинтуха, а потом и увидеть пару птиц, перелетавших от дерева к дереву. Голуби присаживались на ветку вплотную друг к другу, и сразу раздавался голос самца. 19 марта я снова слышал токующего клинтуха.

Биотоп клинтуха *Columba oenas* в Нижнем парке Красного Села. 17 марта 2020. Фото автора.

Нужно отметить, что прошедшая зима в регионе была аномально тёплой и практически бесснежной. Но столь ранний прилёт клинтухов не является необычным. Хотя эти голуби появляются в Ленинградской области обычно в течение первой декады апреля, но иногда могут быть встречены уже во второй декаде марта (Мальчевский, Пукинский 1983).

Литература

Домбровский К.Ю. 2019. Клинтух *Columba oenas* в Красном Селе (южная окраина Санкт-Петербурга) // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1844): 5160-5164.

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., **1**: 1-480.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1912**: 1751-1754*

К распространению садовой камышевки *Acrocephalus dumetorum* в Иркутской области

В.В.Попов

Виктор Васильевич Попов. Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии». Иркутск, Россия. E-mail: vpopov2010@yandex.ru

Поступила в редакцию 25 марта 2020

Садовая камышевка *Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849 в Иркутской области – это широко распространённый, но в тоже время редкий гнездящийся вид. Для неё характерно спорадическое распространение. Местообитания в основном связаны с кустарниковыми пойменными зарослями, перемежающимися с открытыми биотопами, в основном лугами. Садовая камышевка указана как гнездящийся вид для Ангарского и Лено-Киренского орнитогеографических участков (Гагина 1961). Существует мнение, что на протяжении последних 20 лет численность вида увеличивается и наблюдается продвижение на северо-восток до Качуга, Киренска и Жигалово (Мельников, Дурнев 1999). Но ещё в начале XX века садовая камышевка была отмечена как обыкновенный вид в верховьях реки Нижняя Тунгуска и на соседней части реки Лены (Ткаченко 1924, 1937). В долине Нижней Тунгуски встречена в июне 1997 года в пойме реки Поймыга (Лисовский, Лисовская 2007). 12 июля 2014 птицу с гнездовым поведением наблюдали в кустарниках на правом берегу реки Киренги в окрестностях Киренска у паромной переправы (Попов, Серышев 2014). Поющий самец отмечен 8 июня 2018 на острове Домашний в городе Усть-Кут (Баянов 2018). Два экземпляра этого вида были добыты 18 июня 1962 на реке Тутура (Реймерс 1966). Обычный вид прибрежных влажных лугов и кустарников в пойме реки Лены. Несколько птиц отловлено в паутинные сети с 30 июня по 7 июля 2003 в долине Лены в ивняках в окрестностях деревни Турука (Тупицын 2009). В заказнике «Туколонь» в 2014 году поющий самец садовой камышевки встречен в кустарниковых зарослях на одном из островов реки Киренги (Поваринцев и др. 2016).

Садовая камышевка отмечена как обычный гнездящийся вид в кустарниках по берегам реки Бирюсы и по окраинам полей в окрестностях села Шелаево в Тайшетском районе (Фефелов 1998). Имеются экземпляры из долины реки Чуна (Тугаринов, Бутурлин 1911). 18 июля 2016 пару наблюдали в кустарнике на поле около сворота с тракта на реку Тангуй (Попов, Серышев 2016). В Тулунском районе 5 июня 2015 отмечен поющий самец в кустарнике на восточном берегу озера, расположенного между железной дорогой и рекой Азейка (Попов 2015). Немногочисленный пролётный и, возможно, гнездящийся вид Зиминско-Куйтунского степного участка, встречается в поймах рек и на надпойменных террасах реки Оки (Мельников 1999). В Куйтунском районе ежегодно наблюдали поющих самцов. 19 июля 1998 в кустарнике на берегу пруда между посёлками Куйтун и Ключи наблюдали беспокоящую пару. Численность на пролёте выше, чем в гнездовой период (Фефелов, Хидекель 1999). В 2015 году 11 июля слышали песни в урочище «Сосновый бор» в долине реки Малая Белая и в деревне Поморцево. 12-13 июня утром слышали песни в окрестностях Поморцево. 13 июня там же встречена в зарослях бурьяна (Попов, Поваринцев 2015). Поющие самцы встречены в июне 2015 года в Усольском районе в долине реки Целоты в зарослях кустарника под ЛЭП (Попов 2016).

В Южном Прибайкалье – редкий вид. Встречена в июле 1983 года в пойме реки Анга. 19 августа 1974 добыта в устье пади Куртуник севернее села Большое Голоустное на берегу Байкала. В июле 1983 года наблюдалась в густых зарослях ивы в пойме Анги (Богородский 1989). В 2003-2009 годах в дельте Голоустной была обычным гнездящимся видом (Пыжьянов и др. 2010). Пару с гнездовым поведением наблюдали 17 июня 2013 в пойме реки Ушаковки около моста по Голоустненскому тракту (Попов 2014а). В Иркутске гнездование садовой камышевки установлено для старого Глазковского кладбища (Дурнев, Сонина 2011). На Ново-Ленинских болотах зарегистрирована в 1985 году дважды: по одной птице 9 июня и 4 июля (Мельников 2011). Впервые за период наблюдения встречена на острове Конный в Иркутске в зарослях кустарника около моста 18 июля 2014 (Попов 2014б). В районе посёлка Листвянка в 2009–2017 годах садовая камышевка периодически, но не ежегодно, учитывалась нами отдельными парами в густых кустах у жилых зданий и на огородах (Мельников 2017). Зарегистрирована в окрестностях деревень Анчук и Тибельти (Сонина и др. 2001). Указана для окрестностей Братска, Нижнеудинска, Тулуна, Тайшета, долины реки Чуны, Качуга, Черемхово, Киренска, Жигалово и Слюдянки в устье реки Талой без конкретных дат (Дурнев и др. 1996).

Таким образом, садовая камышевка обычна на отдельных локальных участках, но в целом по Иркутской области её можно относить к редким видам.

Литература

Баянов Е.С. 2018. Встречи некоторых видов птиц в Киренском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах Иркутской области // *Байкал. зоол. журн.* 1 (22): 24-27.

Богородский Ю.В. 1989. *Птицы Южного Предбайкалья*. Иркутск: 1-207.

Гагина Т.Н. 1961. Птицы Восточной Сибири (список и распространение) // *Тр. Баргузинского заповедника* **3**: 99-123.

Дурнев Ю.А., Мельников Ю.И., Бояркин И.В., Книжин И.Б., Матвеев А.Н., Медведев Д.Г., Рябцев В.В., Самусёнок В.П., Сонина М.В. 1996. *Редкие и малоизученные позвоночные животные Предбайкалья: распространение, экология, охрана*. Иркутск: 1-288.

Дурнев Ю.А., Сонина М.В. 2011. Птицы семейства славковых Sylvidae в Иркутске: экология и перспективы урбанизации // *Байкал. зоол. журн.* 2 (7): 21-29.

Лисовский А.А., Лисовская Е.В. 2007. Материалы к изучению долины р. Нижняя Тунгуска // *Тр. заповедника «Центральносибирский»* **1**: 230-244.

Мельников Ю.И. 1999. Птицы Зиминско-Куйтунского степного участка (Восточная Сибирь). Часть 2. Воробьиные // *Рус. орнитол. журн.* **8** (61): 3-13.

Мельников Ю.И. 2011. Птицы Ново-Ленинских (Иннокентьевских) болот города Иркутска во второй половине XX столетия: видовая структура, обилие и фенология основных жизненных циклов // *Байкал. зоол. журн.* 7: 30-68.

Мельников Ю.И. 2017. Новые виды птиц котловины оз. Байкал (вторая половина XX – начало XXI столетия) // *Природа Внутренней Азии* 3 (4): 38-63.

Мельников Ю.И., Дурнев Ю.А. 1999. Расширение к востоку ареалов некоторых видов птиц Средней и Восточной Сибири // *Бюл. МОИП*. Отд. биол. **104**, 5: 88-95.

Поваринцев А.И., Саловаров В.О., Свиридова Е.А. 2016. Результаты исследования орнитофауны государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» (июль-сентябрь 2014 года) // *Байкал. зоол. журн.* 2 (19): 87-93.

Попов В.В. 2014а. Интересные встречи птиц в Прибайкалье: полевой сезон 2013 года // *Байкал. зоол. журн.* 1 (14): 91-94.

Попов В.В. 2014б. Интересные встречи птиц на острове Конном и в его окрестностях в 2014 г. (р. Ангара, Иркутск // *Байкал. зоол. журн.* 2 (15): 71-73.

Попов В.В. 2015. Заметки по орнитофауне окрестностей г. Тулун (Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн.* 2 (17): 66-69.

Попов В.В. 2016. Интересные встречи птиц в Иркутской области в полевой сезон 2015 г. // *Байкал. зоол. журн.* 1 (18): 105-107.

Попов В.В., Поваринцев А.И. 2015. Заметки по орнитофауне долины р. Малой Белой (Черемховский район, Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн.* 2 (17): 70-72.

Попов В.В., Серышев А.А. 2014. К орнитофауне долины р. Киренга (Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн.* 2 (15): 74-80.

Попов В.В., Серышев А.А. 2016. Заметки по орнитофауне Братского района (Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн.* 2 (19): 94-96.

Пыжьянов С.В., Тупицын И.И., Попов В.В. 2010. К изучению птиц окрестностей дельты реки Голоустной // *Байкал. зоол. журн.* 1(4): 65-70.

Реймерс Н.Ф. 1966. *Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири*. М.: 1-418.

Сонина М.В., Дурнев Ю.А., Медведев Д.Г. 2001. Новые и малоизученные виды авифауны Тункинского национального парка и проблема критериев в современных фаунистических исследованиях // *ООПТ и сохранение биоразнообразия Байкальского региона: Материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию образования заповедника «Байкало-Ленский»*. Иркутск: 82-88.

Ткаченко М.И. 1924. Распространение некоторых видов птиц по рекам: Нижней Тунгуске, Алдану и Мае // *Очерки по землеведению Восточной Сибири*. Иркутск: 127-137. (Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО. Т. 47).

Ткаченко М.И. 1937. Птицы реки Нижней Тунгуски // *Изв. Иркут. науч музея* **2**: 152-162.

Тугаринов А.Я., Бутурлин С.А. 1911. *Материалы по птицам Енисейской губернии*. Красноярск: 1-228.

Тупицын И.И. 2009. К изучению авифауны северных районов Иркутской области // *Байкал. зоол. журн*. 1: 81-86.

Фефелов И.В. 1998. К орнитофауне запада Иркутской области // *Рус. орнитол. журн*. **7** (38): 15-19.

Фефелов И.В., Хидекель В.В. 1999. Находки некоторых редких и малоизученных птиц на Зиминско-Куйтунском степном участке (Восточная Сибирь) // *Рус. орнитол. журн*. **8** (76): 11-14.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1912**: 1754-1757*

Групповое нападение сорок *Pica pica* на краснощёкого суслика *Spermophilus erythrogenys*

Н.Н.Березовиков, А.С.Фельдман

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки. Проспект Аль-Фараби, д. 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail
Александр Сергеевич Фельдман. КГУ средняя общеобразовательная школа № 28, ул. Б.Момышулы, д. 57, Семей, Восточно-Казахстанская область, 071400, Казахстан. E-mail: papafe@mail.ru

Поступила в редакцию 25 марта 2020

В кормовом поведении сорок *Pica pica* нередки случаи групповых охот, поражающие чёткой организованностью особей внутри группы при нападениях на других животных (Березовиков 2005; Романовская, Березовиков 2014). Свидетелями ещё одного подобного случая нам довелось быть в Семипалатинском Прииртышье.

На левобережье Иртыша в окрестностях села Приречное, в 15 км восточнее города Семей (Семипалатинск), среди полынной глинистой степи, на которой уже сошёл снег, 23 марта 2020 был замечен взрослый краснощёкий суслик *Spermophilus erythrogenys*, выбравшийся из норы и отдыхавший на солнце около неё. Вскоре поблизости появилась группа из четырёх сорок, некоторое время наблюдавших за неподвижно лежавшим зверьком и затем перелетевшая к норе (рис. 1). Две из них уселись перед ним, две другие – сзади, отрезав ему путь к отступлению. Суслик вскочил, занял оборонительную позу, распушив хвост (рис. 2). Дальнейшая наступательные действия сорок проходили по известной схеме: передние птицы, осторожно приближаясь, отвлекали внимание зверька выпадами и клевками в его сторону, злили его, вынуждая на ответную реакцию, а сидевшие сзади выжидали благоприятный момент, чтобы нанести ему удар по голове или глазам. Суслик,

крутясь на месте и увёртываясь от клевков, иногда вставая в бойцовскую позу «столбиком», сумел некоторое время держать сорок на безопасной для себя дистанции, но когда к нападающим спереди подключилась третья птица и последовали более решительные атаки, он сумел ретироваться, спрятавшись в нору. Потерпевшие неудачу сороки молча взлетели и покинули место охоты (рис. 3, 4).

Рис. 1. Группа сорок *Pica pica*, наблюдающая за сусликом у норы. Окрестности села Приречное. 23 марта 2020. Фото А.С.Фельдмана.

Рис. 2. Сороки *Pica pica*, окружившие краснощёкого суслика *Spermophilus erythrogenys* около норы, приготовились к нападению. 23 марта 2020. Фото А.С.Фельдмана.

Рис. 3. Сороки *Pica pica*, атакующие краснощёкого суслика *Spermophilus erythrogenys*. 23 марта 2020. Фото А.С.Фельдмана.

Рис. 4. Сороки *Pica pica*, улетающие после неудачной охоты. 23 марта 2020. Фото А.С.Фельдмана.

Литература

Березовиков Н.Н. 2005. Случаи проявления хищничества у сороки *Pica pica* на Алтае // *Рус. орнитол. журн.* **14** (293): 627-628.

Романовская И.Р., Березовиков Н.Н. 2014. Коллективная попытка сорок *Pica pica* отнять добычу у канюка *Buteo buteo* // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1059): 3189-3192.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1912**: 1757-1758*

Зимовка сапсана *Falco peregrinus* в городе Атырау

С.С.Халменов

Серик Сапарбекович Халменов. Атырауское областное общество охотников и рыболовов, ул. Балгимбаева, д. 38, Атырау, 060011, Казахстан

Поступила в редакцию 25 марта 2020

В недавно опубликованной статье «Возвращение сокола-сапсана» приводится интересная информация о том, что в казахстанских городах в последнем десятилетии наблюдается формирование новых зимовок сапсана *Falco peregrinus* (Березовиков 2019).

Сапсан *Falco peregrinus* на подоконнике 16-этажного здания. Город Атырау. 11 ноября 2018. Фото С.С.Халменова.

В городе Атырау (до 1991 года – Гурьев) я был свидетелем первой зимовки одного сапсана среди многоэтажных домов нового микрорай-

она «Алмагуль» в 2017/18 году. На следующую зиму появление сапсана в городе я заметил 11 ноября 2018. При этом молодой сокол устроился на отдых на подоконнике моей квартиры на 16 этаже в упомянутом выше микрорайоне (см. рисунок). В дальнейшем в течение месяца я ещё несколько раз в дневное время видел его отдыхающим на моём окне. Последняя встреча сапсана произошла 24 декабря 2018.

Литература

Березовиков Н.Н. 2019. Возвращение сокола-сапсана // *Зелёный мир* **17**: 11-16.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1912**: 1758-1761*

Скальный конёк *Anthus petrosus* на Москве-реке в музее-заповеднике Коломенское (Москва)

А.М.Наумов

Александр Михайлович Наумов. Москва, Россия. E-mail: machaon74@mail.ru

Поступила в редакцию 25 марта 2020

В один из обычных пасмурных осенних дней, 19 ноября 2019, в поисках самца морской чернети *Aythya marila* я обследовал акваторию Москвы-реки в Коломенском. Примерно на середине маршрута мой путь лежал сквозь полосу густого тумана. Вызванные сбросами тёплой воды испарения ограничивали видимость не далее середины реки. Справа от меня на разнотравных лугах тумана не было, а на вершине холма среди темных безлистных деревьев, как всегда, белел купол храма Усекновения главы Иоанна Предтечи. Именно здесь, на крупных камнях, отделяющих пешеходную зону набережной от воды, я заметил странную птичку. По размеру и поведению она почему-то напомнила мне варакушек, наблюдать которых мне довелось немало весной этого же года на Черноморском побережье Кавказа. Причём одна из птиц, абсолютно без яркого рисунка, наблюдалась в сходных условиях на каменистой лужайке у морского берега. Естественно, у птицы из Коломенского все яркие цвета, присущие самцам варакушки, тоже отсутствовали. Подобно большинству воробьиных птиц, которых можно встретить у реки, эта особь всё время активно перемещалась. То перелетая, то просто перебираясь с камня на камень, она замирала лишь на редкие секунды, используя их, чтобы осмотреться и проверить дистанцию между собой и наблюдателем с фотоаппаратом. Так продолжалось до тех пор, пока на её пути из тумана не показались силуэты

рыбаков. В очередной раз взлетев, птица не улетела совсем, а сделав вираж над водой, полетела назад на каменную гряду, куда-то туда, где я впервые недавно заметил её. Решив, что сделанных кадров достаточно (рис. 1 и 2), я не стал больше преследовать свою необычную знакомую.

Рис. 1. Скальный конёк *Anthus petrosus*. Берег реки Москвы в Коломенском. Москва. 19 ноября 2019. Фото автора.

Рис. 2. Скальный конёк *Anthus petrosus*. Берег реки Москвы в Коломенском. Москва. 19 ноября 2019. Фото автора.

Возвращаясь домой, я перебирал в памяти известные мне описания подобных птиц, но никак не мог определиться, с кем же мне пришлось столкнуться. Неопределённости добавляло ещё и то, что подобных птиц именно на прибрежных валунах в Коломенском я ранее не видел. Просмотренный дома определитель птиц Москвы и Подмосковья, а также другие справочники картины не прояснили. Ничего не оставалось, как выложить мою находку для определения в интернет. К моему удивлению, не прошло и пары минут, как пришёл первый ответ. Первым отреагировал Илья Иванович Уколов, известный многим орнитолог и администратор базы данных «Онлайн дневники наблюдений птиц» (http://ru-birds.ru/): «Это скальный конёк *Anthus petrosus* или горный конёк *Anthus spinoletta»*, – написал Илья. К обсуждению находки вскоре подключились и многие другие орнитологи, фотоохотники и бёрдводчеры; большинство склонялось к тому, что это скальный конёк. Одновременно я отослал наиболее удачные фотографии конька в Зоологический музей Московского университета. Вскоре то, что это *Anthus petrosus*, подтвердил и старший научный сотрудник сектора орнитологии этого музея кандидат биологических наук Евгений Александрович Коблик.

На сайте ebirds.ru ареал этого вида описан так: «Распространение *Anthus petrosus* связано со скалистыми морскими побережьями Европы. Он населяет берега Скандинавии, атлантическое побережье Франции, Британские, Гебридские, Фарерские, Датские острова, а также Аланд и Готланд. Зимует по всему атлантическому побережью Европы и Марокко. На большей части Скандинавии (кроме западного побережья Норвегии) это перелётная птица. Прочие популяции более или менее оседлы. В России скальный конёк гнездится на острове Харлов и на близлежащих мелких островках, а также, по-видимому, на северном побережье Кольского полуострова. Спорадично распространённый, малочисленный перелётный вид. В период миграций отмечался на побережье Белого моря. Более или менее регулярно встречается на Балтике».

В заключение нельзя не отметить, что вышеописанная находка скального конка оказалась первой в Москве и Московской области.