ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал

2020
XXIX

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1981
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XXIX

Экспресс-выпуск • Express-issue

2020 № 1981

СОДЕРЖАНИЕ

4601-4613 Борис Евгеньевич Бегичев (1883-1928?) – семипалатинский топограф, краевед и орнитолог-любитель. Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ

4614-4622 Египетская цапля *Bubulcus ibis* – новый гнездящийся вид Ставропольского края. М.П.ИЛЬЮХ, А.С.ШЕВЦОВ

4622-4624 Новые встречи пёстрого дрозда *Zoothera varia* в Костанайской и Северо-Казахстанской областях в 2020 году. А.Ю.ТИМОШЕНКО, И.А.ЗУБАНЬ

4624-4625 Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* в деревне Заполье (Волосовский район Ленинградской области). И.В.СТАСЮК

4626-4660 Птицы островов северо-западной части залива Петра Великого. В.И.ЛАБЗЮК, Ю.Н.НАЗАРОВ, В.А.НЕЧАЕВ

4660-4661 К фауне птиц Владивостока. Ю.Н.НАЗАРОВ

Редактор и издатель А.В.Бардин

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2020
Дата опубликования: 20 сентября 2020

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXVIII
Express-issue

2020 № 1981

CONTENTS

4601-4613 Boris Evgenievich Begichev (1883-1928?) – Semipalatinsk topographer, local historian and amateur ornithologist. N.N.BEREZOVIKOV

4614-4622 The cattle egret *Bubulcus ibis* – a new breeding species of the Stavropol Krai. M.P.ILYUKH, A.S.SHEVTSOV

4622-4624 New records of the scaly thrush *Zoothera varia* in Kostanay and North Kazakhstan Oblasts in 2020. A.Yu.TIMOSHENKO, I.A.ZUBAN

4624-4625 The record of the great egret *Casmerodius albus* in Zapolye (Volosovo Raion, Leningrad Oblast). I.V.STASYUK

4626-4660 The birds of the islands in the north-western part of the Peter the Great Gulf. V.I.LABZYUK, Yu.N.NAZAROV, V.A.NECHAEV

4660-4661 To the bird fauna of Vladivostok. Yu.N.NAZAROV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St.-Petersburg University
St.-Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2020

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1981**: 4601-4613*

Борис Евгеньевич Бегичев (1883-1928?) – семипалатинский топограф, краевед и орнитолог-любитель

Н.Н.Березовиков

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 14 сентября 2020

Среди краеведов Семипалатинска в первой трети XX века было немало замечательных личностей, связанных с деятельностью Семипалатинского краеведческого музея и Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. Среди них большой известностью пользовался топограф Б.Е.Бегичев, увлекавшийся фотографией, охотой и содержанием певчих птиц.

Борис Евгеньевич Бегичев. Барнаул. 1910 год.

Борис Евгеньевич Бегичев происходил из дворян Московской губернии. Родился он в 1883 году в Приморской области в семье военного. Его отец Евгений Иванович Бегичев, 1857 года рождения, после окончания в 1877 году Виленского пехотного юнкерского училища был

направлен на Дальний Восток. В 1897 году в звании капитана он служил в 8-м Восточно-Сибирском стрелковом батальоне 2-й Сибирской стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в местечке Барабаш. В сентябре 1904 года в звании подполковника он продолжал службу в составе 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка в Хабаровске. Участвовал в русско-японской войне, был ранен в боях под Ляояном.

Александровское военное училище в Москве,
ныне здание Генерального штаба ВС РФ.

В семье Б.Е.Бегичева было три сына: Вячеслав, Владимир и Борис. По семейной традиции Борису была предопределена судьба военного. В 1901 году он окончил 1-й Сибирский кадетский корпус в Омске, затем два года учился в Александровском военном училище в Москве, готовившем для армии пехотных офицеров. Юнкерами этого элитного училища становились дворянские дети, окончившие военные гимназии. Его выпускникам, произведённым в офицеры, вручались личные поздравительные телеграммы от императора.

В 1903 году Борис Бегичев был выпущен в звании подпоручика и определён в 12-й Сибирский резервный батальон в Барнауле. Во время русско-японской войны он находился в действующей армии в составе 12-го пехотного сибирского полка, в котором 2 февраля 2004 года был назначен адъютантом 2-го батальона. Он принимал участие в боевых действиях, из которых самым крупным и кровопролитным было сражение 10-11 июля 1904 года у станции Дашичао на железной дороге Харбин – Порт-Артур, где барнаульцы из 12-го пехотного полка приняли на себя удар японской дивизии и вошли в историю своей необычайной стойкостью и отвагой. На второй день сражения они предприняли четыре штыковых контратаки и в отчаянных рукопашных схватках отстояли свои позиции, сорвав наступление японцев.



Весь наличный составъ офицеровъ Барнаульскаго полка во время движенія нашихъ войскъ отъ Мукдена. Посреди группы командиръ Барнаульскаго полка Серг. Вед. Добротинъ, получившій орденъ св. Георгія 4-й ст. за эту кампанію.
Съ фот. Дудкевича.

Офицеры 12-го пехотного барнаульского полка, с которыми Б.Е.Бегичев служил в 1904-1906 годах в Маньчжурии. Этот снимок из газеты он хранил в семейном архиве.

Б.Е.Бегичев за участие в этих боях был награждён медалью Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». В составе своего полка 3 апреля 1906 года он вернулся домой и был расквартирован в Барнауле. Приказом от 30 ноября 1906 он был уволен в запас и устроился на работу землемером в Барнальском уезде. С 18 апреля 1908 подпоручик Бегичев был вновь призван в армию и до 13 января 1910 года служил младшим офицером 1-го батальона 12-го Сибирского барнаульского резервного полка. На этом военная карьера Бегичева завершилась.

Уволившись в запас, он устроился на работу учителем в церковно-приходской школе в деревне Дёмино Бийского уезда Алтайской губернии (ныне Солонешенский район Алтайского края), расположенной в в долине реки Куевады у подножия Ануйского хребта. В это время он был уже женат на Александре Георгиевне Бегичевой (в девичестве Быковой), 1887 года рождения, уроженке Барнаула. В 1906 году она окончила гимназию и до 1915 года работала учительницей в 8-м начальном училище города Барнаула.

Александра Георгиевна и Борис Евгеньевич Бегичевы.
Барнаул. 1911 год.

Борис Бегичев был неординарным человеком и с юношеских лет интересовался естествознанием. Он увлекался фотографией, охотой, ловлей и содержанием птиц, аквариумистикой, собиранием различных коллекций. На одной из фотографий в 1910 году он запечатлён в своей барнальской комнате у аквариума и птичьей клетки на фоне полки с коллекциями, среди которых можно рассмотреть фигурку буддийского божества, два черепа человека, чучела птиц, зверушек, летучих мышей, крокодильчика, морской звезды, а также птичьи гнезда, коллекционные коробки и пробирки.

Период его учительствования счастливым образом ознаменовался событием, уже тогда сделавший Б.Е.Бегичева известным человеком. Дело в том, что 6 сентября 1911 года в 15 часов 30 минут на поле у села Дёмино упал метеорит весом около 12 кг. Заслугой учителя Бегичева было составленное им описание этого явления: «В послеполуденные часы, при облачном небе, в окрестностях Дёмино, Куяганской волости, Бийского уезда, Алтайской губернии крестьянами было замечено несколько ярко светящихся тел, одно из которых упало на копну хлеба и,

пробивши снопы, углубилось, примерно, на один аршин в почву. Полёт наблюдался в направлении с юго-запада на северо-восток (со стороны с. Топольное) и сопровождался сильным гулом, похожим на артиллерийскую стрельбу. Камень был тотчас же выкопан крестьянами, которые свидетельствуют, что он к этому времени ещё не успел остыть; к нему «пригорела» солома и сама яма с краёв как бы «обгорела». Размеры его были до 5 вершков в поперечнике, и весил он около 30 фунтов (12 кг), форму он имел неправильно-округлую и был покрыт ямками и углублениями, напоминающими следы пальцев и ладони на мятой глине, с поверхности он был тёмно-бурого цвета, в средине же серовато-белого, сложение имел мелкозернистое с блестящими золотистыми крупинками. Крестьяне разбили метеорит на куски, которые разошлись по окрестностям». Один из самых крупных осколков Борис Евгеньевич взял в свою коллекцию, два отправил алтайскому губернатору и ещё один подарил геологу М.А.Усову, с которым у него была переписка по этому поводу. Летом 1916 года академик Владимир Иванович Вернадский, побывавший в Барнауле во время поездки на Алтай и заинтересовавшийся этой находкой, пытался разыскать Бегичева, но он к этому времени уже жил с семьёй в Семипалатинске и все имеющиеся материалы увёз с собой. Один из осколков этого метеорита весом около 2 граммов, переданный М.А.Усовым, В.И.Вернадский доставил в Метеоритную коллекцию Российской Академии наук, где он хранится сейчас под названием «Дёминского», а фамилия его открывателя Б.Е.Бегичева значится на доске почёта этой коллекции.

Б.Е.Бегичев у аквариума и птичьих клеток в своей квартире в Барнауле. 1910 год.

В первой половине 1915 года Б.Е.Бегичев получил назначение на работу топографом в Семипалатинское переселенческое управление. В августе 1915 года он уже работал в землеустроительной экспедиции в Теренкульской волости Павлодарского уезда, а на следующий год в

Усть-Каменогорском и Зайсанском уездах. Одним из мест, где Борис Евгеньевич проводил землеустройство и оставил о себе память, является долина реки Чар у посёлка Георгиевка, ныне Калбатау.

Борис Евгеньевич Бегичев. Барнаул. 16 ноября 1914.

Б.Е.Бегичев на рыбалке. Протока на Полковничьем острове. Семипалатинск. 1916 год.

Будучи увлечённым фотографом, во время своих поездок по Семипалатинской области он много снимал, в том числе примечательные места и этнографические этюды из жизни казахских аулов. Часть этих фотографий, к счастью, сохранилась до нашего времени в архиве Барнаульского краеведческого музея. Среди них имеется несколько сним-

ков, запечатлевших его во время ловли птиц на Полковничьем острове в пойме Иртыша у Семипалатинска. Сохранился среди них снимок лесного сыча *Aegolius funereus*, которого он содержал в клетке. Его интерес к птицам был не случаен и, конечно же, связан с дружбой с семипалатинским орнитологом Виктором Алексеевичем Селевиным. Об этом свидетельствует также упоминание в одной из статей Селевина (1924): «Факт массового здесь появления дубоносов *Coccothraustes coccothraustes* в январе и феврале 1919 г. отмечен в местной прессе моим другом Б.И.Бегичевым».

Топограф Переселенческого управления во время съёмок местности.
Усть-Каменогорский уезд. 1916 год. Фото Б.Е.Бегичева.



Полевой лагерь топографов на берегу реки Чар у Георгиевки. 1916 год. Фото Б.Е.Бегичева.

Почти 10 лет Б.Е.Бегичев занимался собиранием остеологической коллекции, в том числе черепов птиц. Собирать их он начал в 1907 году во время работы землемером, а затем продолжил во время поездок

в Семипалатинской области в 1915-1916 годах. Эти сборы он подарил Семипалатинскому окружному краеведческому музею. Среди них было 18 экземпляров 16 видов птиц:

Тетерев *Lyrurus tetrix*. 18 июня 1911. Село Карыш Барнаульского уезда.

Перепел *Coturnix coturnix*. 14 августа 1915. Аул Сагандык Теренкульской волости Павлодарского уезда.

Стерх *Grus leucogeranus*. 14 августа 1915. Озеро Карасу Теренкульской волости Павлодарского уезда.

4-5. Дупель **Gallinago media**. 1911. Барнаул.

6. Большой кроншнеп *Numenius arquata*. 11 июня 1916. Аул Муздыкуль Уруковской волости Павлодарского уезда.

7. Речная крачка *Sterna hirundo*. 16 августа 1911. Село Карыш Барнаульского уезда.

8. Ушастая сова *Asio otus*. 14 июля 1907. Барнаул.

9-10). Желна *Dryocopus martius*. 12 мая 1917, 26 июня 1911. Барнаул.

11. Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. 16 июня 1912. Барнаул.

12. Скворец *Sturnus vulgaris*. 12 мая 1907. Барнаул.

13. Сорока *Pica pica*. 18 июля 1910. Барнаул.

14. Галка *Corvus monedula*. 21 августа 1910. Барнаул.

15. Восточная чёрная ворона *Corvus corone orientalis*. 3 июля 1910.Барнаул.

16. Домовый воробей *Passer domesticus*. 29 августа 1911. Барнаул.

16. Черноголовый щегол *Carduelis carduelis*. 28 декабря 1915. Семипалатинск.

17. Чечётка *Acanthis flammea*. 21 декабря 1912. Барнаул.

Портрет казаха-пастуха. Семипалатинская область. 1915 год. Фото Б.Е.Бегичева.

Известно, что в годы жизни в Семипалатинске Б.Е.Бегичев освоил также таксидермию. В коллекции Семипалатинского музея хранились две тушки птиц, изготовленные им, в том числе взрослого самца чёрного аиста *Ciconia nigra*, добытого 20 апреля 1918 года в окрестностях Семипалатинска и молодого самца фламинго *Phoenicopterus roseus*, пойманного 15 октября 1917 года жителями станицы Долонская (Селевин 1929).

Казахская свадьба. Семипалатинская область. 1915 год. Фото Б.Е.Бегичева.

Казахи на базаре. Семипалатинск. 1916 год. Фото Б.Е.Бегичева.

Борис Евгеньевич Бегичев

Ловля в западню на манную птицу.1916 год. Фото Б.Е.Бегичева.

Лесной сыч *Aegolius funereus*, содержавшийся в клетке у Б.Е.Бегичева. Семипалатинск, 1915-1916 годы.

В начале двадцатых годов Б.Е.Бегичев активно включился в деятельность Семипалатинского отдела Русского географического общества, где нашёл немало единомышленников и стал одним из его деятельных членов. В это время он проявил интерес к изучению состояния охотничьей фауны в связи со становлением охотничьего хозяйства в Семипалатинской губернии, организацией и деятельностью Семипалатинского кооперативно-промысловых союза охотников. Он стал одним из авторов журнала «Охотник Алтая», который начал издаваться в 1923 году в Усть-Каменогорске. В помощь охотникам он издаёт сводную таблицу о периодических явлениях в жизни промысловых животных Семипалатинской губернии, дополнив её местными названиями (Бегичев 1923), пишет о проблеме катастрофического уменьшения дичи в охотничьих угодьях Семипалатинской губернии (Бегичев 1924). Большой интерес представляет его статья о необходимости организации исследовательской работы при уездных и губернских отделах охоты

по сбору информации с помощью охотников о состоянии численности охотничьих животных (Б.Б. 1923). Примечательно, что когда в 1924 году Сибирское представительство Всероссийского союза охотников и Сиброст задумали издавать настольную книгу-справочник «Пушная Сибирь» («Охотничий промысел Сибири»), в состав авторского и редакционного совета от Семипалатинской губернии были включены Бегичев Б.Е., Герасимов Б.Г., Козинцев К.Н., Лазарев Б.М., Паршин К.А., Пермитин Е.Н., Селевин В.А., Смирнов А.М. Организационное бюро этого издания находилось в Ново-Николаевске. К сожалению, издать эту книгу тогда так и не удалось.



Рукописный список русско-казахских названий животных
Бухтарминского уезда, составленный Б.Е.Бегичевым. 1925 год.

В архиве Б.Е.Бегичева сохранился подготовленный в 1925 году русско- казахский словарь некоторых животных Бухтарминского уезда Семипалатинской губернии, при этом казахские названия даны как на кириллице, так и на арабском языке: чёрный аист – карабай, бородач – тогусай, беркут – буркыт, варнавка (красная утка) – саралаказ,

журавль – трна, глухарь – кара-улар, гусь – каз, дрофа – бок-даудак, дергач (коростель) – таргак, голубь – кок-кебтерь, горлица – кок-кебтерь, дятел – таклдаук, желна – кара-таклдаук, ворона – карга, ворон – кузгун, грач – кара-карга, галка – узак, жаворонок – боз торгай, воробей – торгай.


РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК
Непременный Секретарь
„21“ января 1924 г.
№61.
Ленинград

Удостоверение

Предъявитель сего Борис Евгеньевич БЕГИЧЕВ командирован Российскою Академиею Наук в Бийский уезд Алтайской губернии для сбора сведений о падении метеорита у села Демина, а также для сбора осколков этого метеорита у населения и доставления их в Петроград, в Геологический и Минералогический Музей Российской Академии Наук.

Срок командировки по 24 мая 1924 года.

Российская Академия Наук просит все правительственные, общественные и ученые учреждения, а также должностных и частных лиц не отказать Б.Е.Бегичеву в просвещенном содействии как в пути следования, так и при исполнении возложенного на него Академиею научного поручения.

Непременный Секретарь, Академик Сергей Ольденбург

Управляющий Делами Конференции

Заведующий Делами Отделения Т.Чернышева

Командировочное удостоверение, выданное Б.Е.Бегичеву Российской Академией наук. 1924 год.

О событиях в жизни Б.Е.Бегичева между 1918-1921 годами сведений нет, но есть все основания предполагать, что это был очень сложный и трагичный период в его судьбе. В декабре 1921 года, когда в Семипалатинск прибыла Первая метеоритная экспедиция Л.А.Кулика, её участники не застали Бориса Евгеньевича в городе, а его жена передала учёным сохранившийся обломок дёминского метеорита, записку с подробностями его падения и переписку с геологом М.А.Усовым. В 1922 году Бегичев вернулся в Семипалатинск и работал доверенным артельного маслодельного завода, а в одной из публикаций в 1924 году местом своей работы указал урочище Айдарча Семипалатинского уезда, возможно, по месту расположения завода. Известно также, что Геологический и Минералогический музей Российской Академии наук командировал его в период с 21 января по 24 июня 1924 года в село Дёмино Бийского уезда Алтайской губернии для поисков осколков метео-

рита и доставки их в Петроград. Сохранилось выданное ему удостоверение, подписанное академиком С.Ф.Ольденбергом, в ту пору секретаря Академии наук. В 1926 году Б.Е.Бегичев был переведён по работе в Рубцовское земельное управление, в 1927 году – в Минусинск. В 1928 году он уехал в Среднюю Азию и о его судьбе с тех пор ничего не было известно, возможно, умер в дороге.

Как сложилась дальнейшая жизнь родных и близких Б.Е.Бегичева известно немного. Его жена вместе с двумя дочерями в 1929 году вернулась из Семипалатинска в Барнаул, окончила вечернее отделение педагогического института и работала в городских школах. Обе дочери впоследствии получили педагогическое образование и до конца жизни преподавали в школах Барнаула. Трагично сложилась судьба его брата Владимира Евгеньевича Бегичева (1881-1944). Он также окончил Сибирский кадетский корпус (1900), Александровское военное училище (1902) и в звании подпоручика определён в 21-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, участвовал в русско-японской войне, отмечен наградами. В 1906 году он вышел в запас в чине поручика и обосновался с семьёй в Омске, где работал на Омской железной дороге и в других учреждениях, дослужившись до чина коллежского асессора. С 1914 по 1917 года он находился на фронтах Первой мировой войны, командовал ротой 44-го Сибирского стрелкового полка, был контужен в боях под Сольдау в Восточной Пруссии. В 1918-1919 годах служил в железнодорожных войсках белой армии, в 1920 году эмигрировал в Маньчжурию, проживал в Харбине, занимался педагогической деятельностью, заведовал Мукденским реальным училищем и преподавал в 1-м Русском высшем начальном училище в Харбине, где скончался 1 октября 1944 в возрасте 63 лет. Его семья – жена и четверо детей – остались в СССР. О судьбе другого брата – Вячеслава Евгеньевича Бегичева, жившего в Омске, сведений не сохранилось.

Выражаю искреннюю признательность А.Н.Куряшкину и А.С.Фельдману (Семей) за помощь в поиске материалов о судьбе Б.Е.Бегичева.

Литература

Бегичев Б. 1923. Промысловые животные Семипалатинской губернии (некоторые данные о различных периодах их жизни) // *Охотник Алтая* 9/10: 14.

Бегичев Б. 1924а. К уменьшению дичи // *Охотник Алтая* 8: 23.

Б.Б. [Бегичев Б.] 1923. Исследовательская работа при отделах охоты // *Охотник Алтая* 9/10: 23-24.

Селевин В.А. (1924) 2020. Из дневника наблюдений над жизнью семипалатинской природы в 1922 году // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1879): 356-368.

Селевин В.А. 1929. *Орнитологическая коллекция Семипалатинского музея*. Семипалатинск: 1-45.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1981**: 4614-4622*

Египетская цапля *Bubulcus ibis* – новый гнездящийся вид Ставропольского края

М.П.Ильюх, А.С.Шевцов

Михаил Павлович Ильюх. Северо-Кавказский федеральный университет, ул. Пушкина, д. 1, Ставрополь, 355017, Россия. E-mail: ilyukh@mail.ru
Александр Станиславович Шевцов. ООО «Ставролен», Будённовск, Ставропольский край, Россия. E-mail: 9097608181@mail.ru

Поступила в редакцию 14 сентября 2020

Египетская цапля *Bubulcus ibis* – одна из самых многочисленных цапель мировой фауны. Однако в России она находится на северном пределе своего распространения и является редким видом, внесённым в Красную книгу Российской Федерации (Литвинова 2001). Эта цапля гнездится на юге европейской части страны в дельте Волги, низовьях Терека и Кубани в количестве нескольких десятков пар (Пекло 1982; Бондарев, Гаврилов 1991; Казаков и др. 2004; Мнацеканов и др. 2004, 2013; Мнацеканов, Короткий 2006; Гожко и др. 2008; Джамирзоев 2011; Мнацеканов, Найданов 2013; Динкевич 2017; Гожко, Лохман 2018; Белик, Гугуева 2020).

В Ставропольском крае египетская цапля стала отмечаться с 2004 года в восточных засушливых районах: у Чограйского водохранилища, на озере Лысый Лиман, в низовьях рек Калаус и Кума (Маловичко, Гаврилов 2012). Причём эти цапли нередко встречались в гнездовой период, что позволило предположить их гнездование здесь. Однако до настоящего времени гнездовые находки египетской цапли на Ставрополье не отмечались. В связи с этим появление здесь данного вида на гнездовании представляет определённый интерес.

Впервые гнездование египетской цапли на территории Ставропольского края нами отмечено весной 2020 года. Около 15 пар данного вида загнездились совместно с малой белой цаплей *Egretta garzetta* (около 15 пар) и кваквой *Nycticorax nycticorax* (около 20 пар) в крупном жилом грачевнике (3 тыс. пар грачей *Corvus frugilegus)*, располагающемся в лоховнике из лоха узколистного *Elaeagnus angustifolia* в засушливой степной зоне восточной части Ставрополья (рис. 1, 2). Этот лоховник сформировался естественным путём в результате самосева и распространения семян по мелиоративным канавам. Данная гнездовая колония цапель располагается в 5 км юго-западнее села Величаевское Левокумского района Ставропольского края, в 5.5 км от русла реки Кумы и всего в 300 м от довольно оживлённой асфальтированной трассы местного значения «Урожайное – Величаевское» (примерные координаты: 44°55.0′ с.ш., 45°02.8′ в.д.). Прилегающие участки полупу-

стынной злаково-полынной ксерофитной степи с редкими кустами тамарикса используются в основном как пастбища овец и коров (поблизости имеются несколько кошар). Недалеко от колонии находятся мелководные разливы реки Кумы, где египетские цапли часто кормятся среди зарослей тростника и тамарикса совместно с другими цаплями. В самой колонии под гнёздами нередко выпасается крупный и мелкий рогатый скот.



Рис. 1. Расположение гнездовой колонии египетской цапли *Bubulcus ibis* в Ставропольском крае.

Довольно плотная смешанная колония цапель трёх видов размещалась в центральной части грачевника на площади около 1 га на невысоких деревьях лоха узколистного (до 6-8 м высотой). В третьей декаде апреля цапли уже держались у своих гнёзд, в гнёздах кваквы были свежие кладки, а в гнёздах грача – полные кладки. 3 мая 2020 в некоторых гнёздах египетской цапли уже находились полные свежие кладки. При этом в соседних гнёздах грача находились насиженные кладки и недавно вылупившиеся птенцы.

Гнёзда египетской цапли размещались в основном в среднем ярусе крон ниже построек грача и кваквы. Высота расположения гнёзд египетской цапли колебалась в пределах 4-6 м над землёй (рис. 3). На одном дереве насчитывалось до 10-12 гнёзд цапель разных видов и грачей, однако при этом несколько жилых построек египетской цапли на

одном дереве встречались крайне редко. Ближайшие гнёзда данного вида находились в 1.5-5 м одно от другого. Чаще всего наиболее близко к гнёздам египетской цапли располагались постройки малой белой цапли (рис. 4).



Рис. 2. Общий вид гнездовой колонии египетской цапли *Bubulcus ibis*, малой белой цапли *Egretta garzetta* и кваквы *Nycticorax nycticorax* в грачевнике у села Величаевское. Левокумский район, Ставропольский край. 23 апреля 2020. Фото с квадрокоптера.

Рис. 3. Гнездовая колония египетской цапли *Bubulcus ibis*, малой белой цапли *Egretta garzetta* и кваквы *Nycticorax nycticorax* в грачевнике у села Величаевское. Левокумский район, Ставропольский край. 3 мая 2020. Фото М.П.Ильюха.

Рис. 4. Гнёзда египетской цапли *Bubulcus ibis* (отмечены красным), малой белой цапли *Egretta garzetta* и кваквы *Nycticorax nycticorax* в грачевнике у села Величаевское. Левокумский район, Ставропольский край. 3 мая 2020. Фото с квадрокоптера.

Гнездовые постройки египетской цапли, подобно гнёздам кваквы и малой белой цапли, размещаются в развилке трёх и более ветвей, преимущественно боковых, на удалении от главного ствола. Они имеют характерную для цапель форму перевёрнутого конуса с радиально рас-

ходящимися от вершины веточками. Само гнездо при этом весьма рыхлое и кладка часто бывает заметна сбоку и снизу.

Откладка яиц у египетской цапли весьма растянута: яйца отмечались в гнёздах с конца апреля до конца второй декады июня (рис. 5). В полной кладке (n = 8) 3-5 яиц, в среднем 3.62±0.26 яйца на гнездо.

Рис. 5. Гнёзда с кладками египетской цапли *Bubulcus ibis* в грачевнике у села Величаевское. Снимок сверху – 22 мая 2020, рядом с гнездом малой белой цапли *Egretta garzetta*; нижние снимки – 16 июня 2020. Фото с квадрокоптера.

Сроки гнездования египетской цапли в данной колонии совпадают с таковыми малой белой цапли и на 1-2 недели отстают от кваквы. Характеристика размеров и формы яиц египетской цапли из данной колонии представлена в таблице. Наиболее вариабельным параметром

является объём яиц, а наименее изменчивым – их ширина. В целом эти яйца по размерам оказались несколько меньше яиц из других сопредельных популяций египетской цапли (Джамирзоев 2011).

Характеристика яиц египетской цапли
Bubulcus ibis в Ставропольском крае

Показатели	n	Lim	Среднее ± *S.E.*	*S.D.*	*CV*, %
Длина, мм	23	41.3-48.1	44.82±0.36	1.74	3.89
Ширина, мм	23	32.4-34.8	33.41±0.14	0.67	1.99
Объём, $см^3$	23	23.1-29.2	25.54±0.32	1.54	6.02
Индекс формы, %	23	70.4-81.7	74.65±0.65	3.14	4.20

Рис. 6. Яйца египетской цапли *Bubulcus ibis* (верхний ряд) в сравнении с яйцами малой белой цапли *Egretta garzetta* (средний ряд) и кваквы *Nycticorax nycticorax* (нижний ряд). Левокумский район, Ставропольский край. 3 мая 2020. Фото М.П.Ильюха.

Яйца египетской цапли, в сравнении с яйцами малой белой цапли, оказались примерно одинаковыми по длине, несколько больше по ширине и, соответственно, чуть более округлыми. Кроме того, яйца египетской цапли отличаются от яиц малой белой цапли и, тем более,

кваквы хорошо выраженной каплевидной (яйцевидной) формой с заметно различающимися острым и тупым полюсами и более насыщенной голубой окраской скорлупы (рис. 6).

В середине июня в некоторых гнёздах египетской цапли уже находились крупные 2-3-недельные птенцы (рис. 7), хотя в других гнёздах в это время ещё продолжается насиживание яиц.

Рис. 7. Птенцы в гнезде египетской цапли *Bubulcus ibis*. Окрестности села Величаевское. Левокумский район, Ставропольский край. 16 июня 2020. Фото с квадрокоптера.

Как показали наши наблюдения, при использовании квадрокоптера грачи у гнёзд вели себя более беспокойно и покидали свои гнёзда при приближении беспилотника на 15-20 м, а цапли оставляли гнёзда только когда дрон приближался к ним всего на 2-3 м. При этом цапли далеко не улетали, а присаживались на соседние ветви. Отмечено, что некоторые малые белые цапли при приближении квадрокоптера даже демонстрировали угрожающие позы на гнезде, принимая, видимо, летящий аппарат за птицу. За несколько минут полёта беспилотника над колонией птиц нам удавалось сделать весьма информативные фотографии колонии и гнёзд с содержимым, по которым в дальнейшем можно было объективно анализировать ситуацию.

Скорее всего, данная смешанная гнездовая колония цапель появилась не в 2020 году, а существовала и в предыдущие годы. Лишь фотографии с квадрокоптера в 2020 году позволили случайно обнаружить в ней египетскую цаплю, которая издалека по размерам и окраске очень похожа на малую белую цаплю. Отметим, что лимитирующие факторы, в том числе и антропогенные, негативно воздействующие на гнездовую колонию цапель, здесь практически отсутствуют. Несмотря на близкое расположение колонии к населённому пункту, кошаре и автомобиль-

ной дороге, цапли и грачи здесь весьма успешно выводили и выкармливали своих птенцов.

Таким образом, в настоящее время египетская цапля расширяет область гнездования на Северном Кавказе, постепенно заселяя подходящие засушливые территории Ставропольского края, куда проникает, очевидно, из соседнего Дагестана (Джамирзоев и др. 2000). Распространение этой южной цапли на юге России, вероятно, ограничивается климатическими условиями и отсутствием достаточного количества легкодоступной пищи (прямокрылых, личинок водных насекомых и лягушек) в период кормления птенцов в мае-июне (Джамирзоев 2011). Однако происходящие современные глобальные изменения климата в сторону потепления, очевидно, оказались благоприятными для египетской цапли и позволили ей постепенно расширять ареал. С учётом того обстоятельства, что данная колония обнаружена практически случайно, нельзя однозначно утверждать, что она единственная, и на данный момент в Ставропольском крае вполне вероятно гнездование до 100 пар египетской цапли с дальнейшим ростом популяции. В перспективе этот вид вполне может загнездиться в известных крупных многолетних смешанных колониях мелких цапель на деревьях близ водоёмов в сухих степях с развитым пастбищным скотоводством, например, в Иргаклинской лесной даче в Степновском районе Ставропольского края (Хохлов и др. 1997).

Литература

Белик В.П., Гугуева Е.В. 2020. Миграции египетской цапли *Bubulcus ibis* вдоль Черноморского побережья Кавказа // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1971): 4132-4137.

Бондарев Д.Г., Гаврилов Н.Н. (1991) 2008. Гнездование египетской цапли *Bubulcus ibis* в дельте Волги // *Рус. орнитол. журн.* **17** (401): 266-267.

Гожко А.А., Бакута Д.Н., Хохлов А.Н. 2008. Ноябрьская встреча египетской цапли на Кубани // *Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кавказе*. Ставрополь: 47.

Гожко А.А., Лохман Ю.В. 2018. Египетская цапля *Bubulcus ibis* в Краснодарском крае // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1688): 5375-5377.

Джамирзоев Г.С. 2011. Египетская цапля *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) // *Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные*. М.: 265-276.

Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Ильюх М.П. 2000. *Редкие и исчезающие птицы Дагестана и их охрана*. Ставрополь: 1-146.

Динкевич М.А. 2017. Египетская цапля *Bubulcus ibis* – новый вид Ростовской области // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1446): 2027-2028.

Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П., Хохлов А.Н., Тильба П.А., Пишванов Ю.В., Прилуцкая Л.И., Комаров Ю.Е., Поливанов В.М., Емтыль М.Х., Бичерев А.П., Олейников Н.С., Заболотный Н.Л., Кукиш А.И., Мягкова Ю.Я., Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И., Витович О.А., Динкевич М.А. 2004. *Птицы Северного Кавказа 1: Гагарообразные, Поганкообразные, Трубконосые, Веслоногие, Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные*. Ростов-на-Дону: 1-398.

Литвинова Н.А. 2001. Египетская цапля *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) // *Красная книга Российской Федерации. Животные*. М.: 373-375.

Маловичко Л.В., Гаврилов А.И. (2012) 2017. Египетская цапля *Bubulcus ibis* – новый вид орнитофауны Ставропольского края // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1543): 5420-5422.
Мнацеканов Р.А., Динкевич М.А., Тильба П.А., Короткий Т.В. 2004. Новые сведения о регистрации египетской цапли в Краснодарском крае // *Стрепет* **2**, 1: 134-137.
Мнацеканов Р.А., Короткий Т.В. 2006. Египетская цапля – новый гнездящийся вид Западного Предкавказья // *Орнитология* **33**: 186-187.
Мнацеканов Р.А., Найданов И.С. 2013. Современное состояние египетской цапли *Bubulcus ibis* в Краснодарском крае // *Рус. орнитол. журн.* **22** (952): 3467-3471.
Мнацеканов Р.А., Найданов И.С., Динкевич М.А., Короткий Т.В. 2013. Распространение египетской цапли в Краснодарском крае // *Стрепет* **11**, 2: 112-115.
Пекло А.М. (1982) 2017. Египетская цапля *Bubulcus ibis* в Восточном Приазовье // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1513): 4380-4381.
Хохлов А.Н., Ильюх М.П., Климашкин О.В., Емельянов С.А., Маловичко Л.В., Акопова Г.В., Дашевский Е., Хохлов Н. 1997. К орнитофауне Иргаклинской лесной дачи и её окрестностей // *Кавказ. орнитол. вестн.* **9**: 156-166.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1981**: 4622-4624*

Новые встречи пёстрого дрозда *Zoothera varia* в Костанайской и Северо-Казахстанской областях в 2020 году

А.Ю.Тимошенко, И.А.Зубань

Алексей Юрьевич Тимошенко. Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК), ул. Бейбитшилик, д. 18, Нур-Султан, 010000 Казахстан, E-mail: naur_timoshenko@mail.ru
Иван Александрович Зубань, Кафедра биологии, Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева, ул. Пушкина, д. 87, Петропавловск, 150000, Казахстан.
E-mail: zuban_ia@mail.ru

Поступила в редакцию 18 сентября 2020

В Казахстане пёстрый, или земляной дрозд *Zoothera varia* гнездится в горных лесах Северного Тянь-Шаня и, возможно, Джунгарского Алатау, на пролёте встречался в центральных частях страны (Гаврилов 1999). В 2020 году впервые отмечен на гнездовье на Западном Алтае (Болботов 2020).

Для территории Костанайской области известен один случай, когда 3 сентября 1938 в Наурзумском заповеднике был добыт пёстрый дрозд (Рябов 1950; Брагин, Брагина 2002). В списке видов птиц, составленном В.Ф.Рябовым, этот вид значится как редкий пролётный, однако вплоть до 2020 года (более чем 80 лет) пёстрый дрозд не регистрировался. Вторая встреча состоялась на 300 км южнее первой локации, 3 июля 2020 одиночный пёстрый дрозд отмечен на обрывистом берегу реки Улы-Жыланшык (юг Костанайской области). При приближении

наблюдателя птица взлетела, пролетев 50 м уселась на землю и стала передвигаться в сторону песчаного бархана, через 20 м вновь взлетела и скрылась в северо-восточном направлении, удалось сделать несколько фотоснимков, где отчётливо видны полевые признаки (рис. 1). Ближайшим местом гнездования пёстрого дрозда от места встречи будут горы Южного Урала, что в 600-700 км севернее. Слётки зарегистрированы в окрестностях Миасса (Челябинская область) на хребте Малый Урал (Захаров 1989). Таким образом, встречу пёстрого дрозда на юге Костанайской области можно отнести к поздней миграции с мест зимовки.

Рис. 1. Пёстрый дрозд *Zoothera varia* около реки Улы-Жыланшык. Костанайская область. 3 июля 2020. Фото А.Ю.Тимошенко.

Рис. 2. Молодой пёстрый дрозд *Zoothera varia* в домашних условиях. Петропавловск. 7 сентября 2020. Фото Г.Баранниковой.

Для Северо-Казахстанской области пёстрый дрозд ранее не указывался. Первая встреча отмечена 7 сентября 2020. Не летающая птица обнаружена на тротуаре в центре города Петропавловска. У неё была сломана правая лапа. Попытка натуралиста-любителя Г.Баранниковой вылечить дрозда не увенчалась успехом, через несколько дней содержания в домашних условиях он погиб. Судя по фотографиям, дрозд был молодым. Остаётся загадкой, из каких мест он мигрировал через область. Данный факт позволяет с уверенностью включить пёстрого дрозда в список птиц Северо-Казахстанской области.

Литература

Болботов Г.А. 2020. Пёстрый дрозд *Zoothera varia* – новый гнездящийся вид Западного Алтая // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1972): 4223-4226.

Брагин Е.А., Брагина Т.М. 2002. *Фауна Наурзумского заповедника. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (аннотированные списки видов).* Костанай: 1-60.

Гаврилов Э.И. 1999. *Фауна и распространение птиц Казахстана*. Алматы: 1-198.

Захаров В.Д. 1989. К распространению пёстрого дрозда на Южном Урале // *Распространение и фауна птиц Урала: Материалы к регион. конф*. Оренбург: 15.

Рябов В.Ф. 1950. Материалы к познанию степной орнитофауны // *Учён. зап. Сталинград. пед. ин-та* **2**: 35-45.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1981**: 4624-4625*

Встреча большой белой цапли *Casmerodius albus* в деревне Заполье (Волосовский район Ленинградской области)

И.В.Стасюк

Иван Вадимович Стасюк. Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН). Дворцовая набережная, д. 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия. E-mail: norroendrengr@mail.ru

Поступила в редакцию 18 сентября 2020

17 сентября 2020 в 11 ч 30 мин я наблюдал одиночную белую цаплю *Casmerodius albus* в деревне Заполье (Волосовский район Ленинградской области) на небольшом карстовом озерке, расположенном в центре деревни (59°22'40" с.ш., 29°29'48" в.д., см. рисунок). Птица кормилась, медленно перемещаясь по мелководью. Это третье наблюдение *C. albus* в бассейне реки Лемовжи и второе – в окрестностях памятника природы «Музей-усадьба Н.К.Рериха в Изваре» (Стасюк 2020). В прежние годы большая белая цапля в этой части Ижорской возвышенности не отмечалась (Бардин и др. 2019).

Большая белая цапля *Casmerodius albus* на карстовом озерке в деревне Заполье. Волосовский район Ленинградской области. 17 сентября 2020. Фото автора.

Литература

Бардин А.В., Дьяконова Т.П., Стасюк И.В. 2019. Птицы Извары и её окрестностей // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1800): 3411-3485.

Стасюк И.В. 2020. Встречи большой белой цапли *Casmerodius albus* на реке Лемовже в Ленинградской области летом 2020 года // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1975): 4332-4333.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1981**: 4626-4660*

Птицы островов северо-западной части залива Петра Великого

В.И.Лабзюк, Ю.Н.Назаров, В.А.Нечаев

*Второе издание. Первая публикация в 1971**

Орнитофауна островов, расположенных в заливе Петра Великого, на протяжении многих лет оставалась в стороне от интересов орнитологов, работавших в Южном Приморье. Это определялось рядом причин, в частности, преимущественным вниманием исследователей к материковой фауне. О птицах и прежде всего о морских колониальных видах островов можно было судить лишь по старым данным, сведённым в работе Л.М.Шульпиииа (1936). Эти сведения, которые и во время исследований Шульпина были весьма не полными, не могут, естественно, удовлетворять современным требованиям фаунистики. Мы поставили перед собой задачу дать по возможности полный фаунистический список птиц и выяснить современное состояние орнитофауны этого района.

Первым орнитологом, посетившим некоторые острова залива Петра Великого в мае 1914 года, был А.И.Черский (1916). Однако фактические результаты его поездки были довольно скромными. Можно предполагать, что ещё до Черского здесь побывали некоторые коллекционеры, собиравшие птиц в южной части края. Так, В.Л.Бианки (1913), ссылаясь на Berlepsch и Godman, сообщает о 3 экземплярах малой качурки, добытых в конце XIX века братьями Ф. и Г. Дорриез в Амурском заливе, к западу от Владивостока. В 1924 году М.А.Фирсовым (1928) была обнаружена гнездовая колония этого вида на одном из островов Верховского.

Ещё в 1906 году М.А.Фирсов обследовал птичий базар на острове Русский, но ничего не опубликовал, а ряд сведений передал Л.М.Шульпину. Последний, приводя данные о гнездовании некоторых чистиковых птиц на островах в заливе Петра Великого (Шульпин 1936), ссылается главным образом на М.А.Фирсова. А.А.Емельяновым (1937) был описан птичий базар на острове Карамзина. По существу, этими сведениями и ограничивалась оригинальная информация о птицах островов. К.А.Воробьёв (1954) на островах не работал, и те скудные сведения о птицах этого района, которые содержатся в его сводке, заимствованы почти целиком у Л.М.Шульпина (1936).

---

* Лабзюк В.И., Назаров Ю.Н., Нечаев В.А. 1971. Птицы островов северо-западной части залива Петра Великого // *Орнитологические исследования на юге Дальнего Востока*. Владивосток: 52-78.

В недавнее время появилась заметка Б.Г.Масленникова (1965), содержащая новые сведения о колонии малой качурки на острове Верховского. С 1967 года орнитологами Н.М.Литвиненко и Ю.В.Шибаевым на острове Карамзина начаты популяционные исследования колониальных птиц. Здесь в июле 1967 года они установили гнездование пегого, или пестролицего буревестника.

Наши исследования проводились с 1963 по 1968 год. В.И.Лабзюк работал в июне 1963, в мае-июне и сентябре-октябре 1964, в мае-июне 1967 и 1968 на островах Римского-Корсакова. Исследования Ю.Н.Назарова проводились в конце сентября – начале октября 1964, в апреле-мае 1965, в апреле, мае и сентябре 1966, в мае-июне 1967 и в мае 1968 на островах Большой Пелис и Матвеева из группы островов Римского-Корсакова. Кроме того, им были совершены кратковременные экскурсии на острова Верховского, Карамзина и Антипенко. В.А.Нечаев работал в конце июня и сентябре 1965, в конце апреля, мае и августе 1966 и в мае-июне 1968 на островах Попова, Рейнеке, Рикорда, Желтухина, Карамзина, Пахтусова, Циволько, Клыкова, Верховского, Стенина и Большой Пелис, а в конце ноября 1968 – на острове Попова.

Во время проведения полевых работ большую помощь нам оказали Г.Ш.Лафер и А.Г.Юдаков, которым мы выражаем нашу горячую благодарность. Мы признательны В.К.Абрамову за интересные сведения о зимней фауне птиц в водах островов Рейнеке, Рикорда и Римского-Корсакова за период с 14 февраля по 2 марта 1967.

Некоторые материалы исследований опубликованы (Нечаев, Юдаков 1967, 1968; Нечаев 1969; Лафер, Назаров 1967; Лабзюк, Назаров 1967).

В северо-западной части залива Петра Великого находится более 30 островов. Большинство из них протянулось неровной цепью от полуострова Муравьева-Амурского на юго-запад вдоль побережья материка. Наиболее крупные острова (с севера па юг) – Русский (не был обследован), Попова, Рейнеке, Рикорда и Большой Пелис. Их размеры – 5-15 км в длину, площадь от 1 до 3-4 км^2. Остальные острова значительно меньше, а некоторые из них представляют собой кекуры – скалистые останцы площадью всего в несколько сотен квадратных метров.

Для крупных островов характерен холмистый рельеф с максимальными высотами до 150-200 м. Береговая линия умеренно изрезанная. Преобладающий тип берегов – скалы и каменистые осыпи. Низкие берега заняты лугами и травяными болотами.

Естественная растительность островов сильно нарушена человеком. Крупные острова частично покрыты широколиственными лесами с преобладанием монгольского дуба На островах, где производится выпас скота и оленей, леса приобрели парковый характер, на других островах образуют труднопроходимые чащи. Безлесные площади заняты

зарослями кустарников, полыни и лугами. Некоторые мелкие острова полностью лишены древесно-кустарниковой растительности.

В процессе полевых работ была собрана коллекция, содержащая около 800 экз. птиц. Большая часть сборов находится в Зоологическом музее Дальневосточного университета, меньшая – в Биолого-почвенном институте Дальневосточного филиала СО АН СССР.

Номенклатура и порядок семейств птиц даны по А.И.Иванову и Б.К.Штегману (1964) с некоторыми изменениями, приведёнными в статье А.А.Назаренко (1971)*. Для птиц, которые нами не добывались, а также для монотипических видов подвиды не указаны.

Краснозобая гагара *Gavia stellata stellata* (Pontoppidan, 1763). В отдельные годы довольно обычна на весеннем пролёте. В 1967 и 1968 годах у берегов острова Большой Пелис небольшие группы и одиночные птицы отмечены во второй половине мая – июне.

Чернозобая гагара *Gavia arctica viridigularis* Dwight, 1918. В небольшом числе отмечена на пролёте в конце мая – июне 1968 года. Линяющая птица добыта из пары 17 июня 1968 у острова Русский.

Чомга *Podiceps cristatus cristatus* (Linnaeus, 1758). Встречена только однажды: 27 апреля 1966 у острова Большой Пелис.

Серощёкая поганка *Podiceps grisegena holbollii* Reinhardt, 1854. Многочисленный пролётный вид. Весной первые птицы отмечались 16 апреля 1966. Большая часть поганок, видимо, разбивается на пары ещё на местах зимовок. В конце апреля наблюдались брачные игры. На пролёте птицы держатся разреженными стаями из 60-70 особей. Наибольшая численность поганок – в первой половине мая. Пролёт заканчивается в конце второй декады мая, но одиночки встречаются ещё и в конце июня. Осенний пролёт начинается в начале августа и продолжается до конца октября. Разреженные стаи из 20-40 и более птиц чаще встречаются в сентябре. По наблюдениям В.К.Абрамова, одиночные серощёкие поганки встречены во второй половине февраля 1967 года в проливе между островами Рейнеке и Рикорда.

Красношейная поганка *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758). Одиночные птицы наблюдались у островов Карамзина и Рикорда 25 апреля 1966.

Малая поганка *Tachybaptus ruficollis poggei* (Reichenow, 1902). Наблюдалась лишь однажды, 10 июня 1964, на озере острова Большой Пелис, где из пары был добыт самец (Лабзюк, Назаров 1967). Характер пребывания не ясен.

Пестролицый буревестник *Calonectris leucomelas* (Temminck, 1836). Гнездование этого вида на острове Карамзина достоверно уста-

* В настоящем издании названия птиц приведены в основном по сводке Ю.Н.Глущенко, В.А.Нечаева и Я.А.Редькина «Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор» (2016).

новлено в 1967 году Н.М.Литвиненко и Ю.В.Шибаевым (Литвиненко и др. 1972). Нами птицы наблюдались в следующих мостах. Одиночная птица 23 сентября 1965 у острова Стенина в стае чернохвостых чаек. Погибшая особь найдена 10 сентября 1966 на литорали острова Большой Пелис. Далее, также погибшая особь обнаружена 17 мая 1966 на вершине острова Карамзина, Там же 10 августа 1967 нами найдены гнёзда с сильно насиженными яйцами или пуховыми птенцами. Часть птиц 24 мая 1968 находилась парами в норах, где яиц ещё не было. Пестролицый буревестник известен местным рыбакам и сборщикам яиц, которые, кстати, и обратили наше внимание на «каких-то чаек с пёстрой головой и крючковатым клювом». Численность этого вида на острове Карамзина составляет не менее 20 пар.

Малая качурка *Oceanodroma monorhis* (Swinhoe, 1867). Многочисленный гнездящийся вид на островах Верховского (около 22.5 тыс. особей) и малочисленный на острове Карамзина (30-50 пар). Птицы селятся колониями, устраивая гнёзда главным образом в норах, выкопанных в мягкой почве, но на островах Верховского гнездятся также среди камней в осыпях, в брошенных норах тупиков-носорогов и стáриков и даже открыто – на карнизах и в нишах скал. Прилёт в начале – середине мая, отлёт в конце сентября – начале октября. Птицы, добытые 19 мая 1966 и 4 июня 1967, ещё не были готовы к размножению.

Размеры нор (n = 10): 5-10×11-16 см. Гнездовые камеры выстилаются травой. Откладка яиц начинается в середине июня и продолжается до конца августа. Яйца матовые, чисто белые. Размеры яиц (n = 8): 3.6-3.9×2.4-2.5 см. Вес свежих яиц 7.6-8.0 г. Первые птенцы появляются в конце июля и находятся в гнёздах до конца сентября. Окраска пуховых птенцов малой качурки ещё не описана в отечественной литературе. По нашим данным, верх пуховиков темно-бурый, местами чёрный, низ пепельно-серый. 28 августа 1966 в гнёздах качурок найдены разновозрастные птенцы, встречались и свежие яйца. Крупные пуховые птенцы были покрыты преимущественно пеньками перьев, увенчанными пухом. Б.Г.Масленников (1965) 26 сентября 1961 в гнёздах обнаружил птенцов размером со взрослых птиц, но ещё не способных к полёту.

Японский баклан *Phalacrocorax capillatus* (Temminck et Schlegel, 1849).). Гнездится на островах Русский, Карамзина (около 100 пар), Моисеева, Матвеева, Стенина, Большой Пелис (40-50 пар на каждом) и некоторых других. Колонии бакланов на островах Попова, Рейнеке, Рикорда и Верховского в результате разорения гнёзд и отстрела птиц прекратили своё существование. В 1967 году численность бакланов резко сократилась: на каждом из перечисленных островов гнездилось менее 10 пар. В 1968 году количество гнездящихся птиц вновь увеличилось, но всё же не достигло уровня 1966 года.

На местах гнездовий японские бакланы появляются в начале-середине апреля. Гнёзда устраивают на карнизах скал в 2-30 м от уреза воды. На острове Карамзина 17 мая 1966 птицы строили гнёзда из зостеры и водорослей. Часть птиц приступает к постройке гнёзд даже в первых числах июня. Откладка яиц – со второй половины мая. На острове Карамзина 18 августа 1966 в 52 из 80 осмотренных гнёзд находилось по 2-4 птенца размером со взрослую птицу. Часть молодых уже держалась на воде вблизи острова.

Берингов баклан *Phalacrocorax pelagicus pelagicus* Pallas, 1811. Гнездится на островах Карамзина (10-15 пар), Большой Пелис (3-4 пары), Вера и Русский. На последнем он встречается чаще, чем японский баклан. Беринговы бакланы населяют те же скалы, что и японские бакланы, но сроки гнездования у них различны. Беринговы бакланы 17 мая 1966 уже закончили откладку 3-4 яиц и приступили к их насиживанию. В 1967 году трепанголовы собирали яйца бакланов на острове Вера во второй половине апреля. Гнёзда этого вида напоминают кочку с углублением на вершине. На острове Карамзина к 18 августа 1966 молодые птицы уже покинули гнёзда и держались самостоятельно на воде вблизи островов. По наблюдениям В.К.Абрамова, зимой берингов баклан был довольно обычным во второй половине февраля 1967 года у берегов всех островов.

Серая цапля *Ardea cinerea jouyi* A.H.Clark, 1907. Весной отмечена в апреле – начале мая, осенью – в сентябре. Над островом Большой Пелис цапли чаще пролетают со стороны острова Аскольд. В течение всего лета встречаются бродячие особи. Во второй половине февраля 1967 года В.К.Абрамов встречал на островах одиночных птиц.

Зелёная кваква *Butorides striatus amurensis* (Schrenck, 1860). Гнездо этого вида, разорённое воронами, найдено в начале июня 1964 года на острове Большой Пелис. Здесь же кваква держалась и в июне 1967-1968 годов. На пролёте немногочисленна во второй половине мая.

Белокрылая цапля *Ardeola bacchus* (Bonaparte, 1855). Самка (второгодок) добыта на острове Большой Пелис 30 мая 1967. Это единственный экземпляр, встреченный на островах.

Египетская цапля *Bubulcus ibis coromandus* (Boddaert, 1783). Наблюдалась только на острове Большой Пелис: 13 мая 1964 здесь добыт взрослый самец (длина семенников 17 мм); взрослая самка добыта 8 мая 1965; одиночная птица пролетала низко над островом на северо-восток 13 мая 1965; самка-второгодок добыта 29 мая 1968.

Большая белая цапля *Casmerodius albus albus* (Linnaeus, 1758). Встречается в небольшом количестве на весеннем пролёте с конца апреля до конца июня.

Средняя белая цапля *Casmerodius intermedius intermedius* (Wagler, 1829). Два взрослых самца добыты на острове Большой Пелис 21

мая и 31 июня 1964. Шесть птиц наблюдались здесь же 13-20 и 29 мая 1964; две птицы отмечены 8 и 23-24 мая 1967. Взрослая самка добыта 22 мая 1968. На острове Попова мёртвая птица найдена 27 мая 1968.

Желтоклювая цапля *Egretta eulophotes* (Swinhoe, 1860). Регулярно, но в небольшом числе пролетает через острова в мае-июне (Лабюк, Назаров 1967). Одна желтоклювая цапля отмечена 20 июня 1967.

Обыкновенная кваква *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758). Регулярно отмечалась на острове Большой Пелис. Самец и самка (второгодки) добыты 8 мая 1965 и 16 мая 1966. Мёртвая птица (второгодок) найдена 5 мая 1967. Второгодок встречен 15 мая, а взрослая птица 12 и 15 июня 1967.

Японская выпь *Gorsachius goisagi* (Temminck, 1836). Одиночная выпь наблюдалась на острове Большой Пелис 2 июня 1967. Не добыта.

Китайский волчок *Ixobrychus sinensis* (J.F.Gmelin, 1789). Взрослый самец добыт на острове Большой Пелис 29 мая 1967. Второй взрослый самец, мёртвый, найден здесь же 10 июня 1968.

Амурский волчок *Ixobrychus eurhythmus* (Swinhoe, 1873). Одна пара гнездится на острове Большой Пелис. В 1964 году найдено гнездо. В 1967 году пара птиц держалась до 7 июня, но после гибели самки самец покинул остров. Во время пролёта этот вид малочислен.

Большая выпь *Botaurus stellaris stellaris* (Linnaeus, 1758). В небольшом количестве пролетает через острова в мае и сентябре.

Хохлатая пеганка *Tadorna cristata* (Kuroda, 1917). Три птицы, принадлежавшие, по-видимому, этому виду, наблюдались у берегов острова Матвеева 16 мая 1964, но не добыты (Лабзюк, Назаров 1967).

Кряква *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758. Одиночки и небольшие стайки отмечались изредка в апреле-мае. Самец в неполном брачном наряде добыт 3 июня 1968 на острове Большой Пелис.

Чёрная кряква *Anas zonorhyncha* Swinhoe, 1866. По-видимому, гнездится на островах большой Пелис и Стенина. Ежегодно и в течение всего лета пара птиц держалась на озере острова Большой Пелис. Будучи потревоженными, кряквы всегда улетали на остров Стенина, но через некоторое время возвращались. На пролёте чёрная кряква довольно обычна, но в отличие от предыдущего вида, редко встречается непосредственно на море.

Чирок-свистунок *Anas crecca* Linnaeus, 1758. Во время пролёта встречается значительно чаще, чем другие речные утки, но держится одиночками или небольшими стайками. Весной отмечался в конце апреля – мае, осенью – в конце сентября – октябре.

Касатка *Anas falcata* Georgi, 1775. Одиночки регулярно встречаются на островах в мае.

Свиязь *Anas penelope* Linnaeus, 1758. В отдельные годы довольно обычна на пролёте в мае.

Шилохвость *Anas acuta* Linnaeus, 1758. Весной немногочисленна в апреле. Осенью наблюдалась только во второй половине октября.

Чирок-трескунок *Anas querquedula* Linnaeus, 1758. Пролётный вид. Одиночки и небольшие стайки отмечены в мае и сентябре.

Мандаринка *Aix galericulata* (Linnaeus, 1758). Малочисленна во время пролёта, в конце апреля и начале мая. Одиночная самка добыта 30 мая 1968.

Морская чернеть *Aythya marila* (Linnaeus, 1761). Немногочисленна на пролёте. Первые птицы отмечены 2 мая, максимальная численность – во второй декаде мая. Одиночки встречены в июне.

Горбоносый турпан *Melanitta deglandi stejnegeri* (Ridgway, 1887). На пролёте многочислен в апреле-мае. Птицы держатся стаями от 5 до 100 и более особей. Конец пролёта в последних числах мая – начале июня. Одиночки и небольшие стайки отмечены в середине июня. В отдельные годы массовый пролёт наблюдается в конце мая. В конце ноября 1968 года стаи численностью до 100 птиц отмечены у берегов островов Попова и Рейнеке. Зимой, по второй половине февраля 1967 года, этот вид встречен В.К.Абрамовым в проливе между островами Рейнеке и Рикорда.

Американская синьга *Melanitta americana* (Swainson, 1832). В водах залива Петра Великого обычная пролётная и зимующая птица (Шульпин 1936). По данным В.К.Абрамова (устн. сообщ.), во второй половине февраля 1967 года стаи американской синьги наблюдались в проливе между островами Рейнеке и Рикорда.

Каменушка *Histrionicus histrionicus pacificus* W.S.Brooks, 1915. Многочисленный пролётный и зимующий вид. По данным В.Тачановского (1893), на юге Приморья она появляется в конце мая. Нами на островах Римского-Корсакова 12 апреля 1966 наблюдались стаи из 4-15 птиц. Обычно каменушка не образует крупных стай, но однажды, 16 мая 1966, отмечалась стая численностью около 60 особей. В первых числах мая часть птиц разбивается па пары. Отлёт заканчивается 16-19 мая, но отдельные пары встречаются и в июне. Осенью первые птицы появляются в конце сентября. В это время они интенсивно линяют и большая часть их не способна летать. Во второй половине февраля 1967 года стаи каменушек встречены В.К.Абрамовым в проливе между островами Рейнеке и Рикорда.

Гоголь *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758). Обычная пролётная птица. Весной последние гоголи отмечены 18-20 апреля.

Морянка *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758). В отдельные годы довольно обычна па пролёте. Стаи из 40-50 и более птиц встречаются в первой декаде мая. К 9-12 мая основная масса морянок откочёвывает и в заливе остаются лишь одиночки. Осенью первые птицы появляются в сентябре, массовый прилёт происходит в ноябре. Зимой у берегов

Приморья (Шунтов 1965) и в заливе Петра Великого (Шульпин 1936; В.К.Абрамов, устн. сообщ.) морянка — самый многочисленный вид из гусеобразных.

Луток *Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758). Малочисленный пролётный вид. Одиночный самец встречен 21 апреля 1965.

Длинноносый крохаль *Mergus serrator* Linnaeus, 1758. Многочислен на пролёте. Первые птицы отмечены 13 апреля 1966, последние – в первых числах июня. Осенью первые птицы появляются в середине сентября; массовый пролёт – в середине октября.

Большой крохаль *Mergus merganser merganser* Linnaeus, 1758. Пролётная птица, по численности уступающая предыдущему виду. Пары и небольшие стайки отмечены с 20 апреля по 14 мая. Осенью первые особи появляются в конце сентября.

Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus orientalis* Taczanowski, 1891. Весной одиночные птицы отмечались в первой половине мая и, по-видимому, холостые – в июне. Осенью хохлатый осоед обычен на пролёте в первой и второй декадах сентября.

Беркут *Aquila chrysaetos* subsp.? Редкая зимующая птица. Одиночная особь отмечена 28 ноября 1968 на острове Попова.

Ястребиный сарыч *Butastur indicus* (J.F.Gmelin, 1788). Одна пара гнездится на острове Попова. 28 мая 1968 свежее гнездо, построенное на яблоне из сухих веток на высоте 10 м, найдено в заболоченном ольховнике; яиц ещё не было. На пролёте отмечена только одна птица: 20 мая 1966 на острове Большой Пелис.

Полевой лунь *Circus cyaneus cyaneus* (Linnaeus, 1766). Встречен только дважды: 23 апреля на острове Рикорда и 9 мая 1966 на острове Большой Пелис.

Пегий лунь *Circus melanoleucos* (Pennant, 1769). Обычен на пролёте. Весной чаще встречается в первой половине мая. В годы высокой численности грызунов птицы задерживаются на островах на несколько дней. Две птицы наблюдались в конце августа 1967 года на острове Рейнеке (А.А.Назаренко, устн. сообщ.).

Восточный лунь *Circus spilonotus spilonotus* Kaup, 1847. Отмечен лишь дважды: 11-13 мая 1966 и 12 мая 1968 на острове Большой Пелис.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla albicilla* (Linnaeus, 1758). Обычный пролётный и зимующий вид. Пара птиц отмечена на острове Большой Пелис 27 сентября 1966. Во второй половине февраля 1967 года этот вид был обычен, а местами многочислен на некоторых островах залива (В.К.Абрамов, устн. сообщ.).

Белоплечий орлан *Haliaeetus pelagicus* (Pallas, 1811). Прошлогоднее гнездо этого вида, построенное из прутьев полыни, было найдено 17 мая 1966 на вершине скалы острова Карамзина. В течение дня на острове несколько раз наблюдался орлан. По-видимому, где-то по-

близости находилось новое гнездо. Зимой на островах эбелоплечий орлан – довольно обычная птица (В.К.Абрамов, устн. сообщ.).

Чёрный коршун *Milvus migrans lineatus* (J.E.Gray, 1831). Обычный пролётный вид. Одиночки отмечены во второй половине сентября.

Канюк *Buteo buteo japonicus* Temminck et Schlegel, 1844. Обычный пролётный вид. Весной последние птицы отмечены 27 апреля 1966 и 11 мая 1967. Осенью встречен в сентябре-октябре. Часть птиц, по-видимому, зимует на островах в годы высокой численности грызунов.

Мохноногий канюк *Buteo lagopus menzbieri* Dementiev, 1951. Зимующая птица. Весной последние птицы наблюдались на острове Большой Пелис 15 апреля 1966. Осенью появляется в конце октября.

Тетеревятник *Accipiter gentilis* subsp.? Обычен во время пролёта. Весной последние птицы отмечены 17 мая 1966. Осенью первые ястребы появляются в первых числах сентября. Основной пролёт проходит в сентябре-октябре.

Китайский перепелятник *Accipiter soloensis* (Horsfield, 1822). Самка (второгодок) встречена на острове Большой Пелис. 28 мая 1967. На следующий день она была добыта. Здесь же с 31 мая по 4 июня 1967 держалась взрослая птица, которую добыть не удалось. Там же 22 мая 1968 добыта взрослая самка. Одна птица наблюдалась 22, 23 и 29 мая на острове Большой Пелис и одна – 28 мая на острове Попова. У добытых самок фолликулы достигали размеров 3 и 4 мм.

Перепелятник *Accipiter nisus nissosimilis* (Tickell, 1833). Обычный пролётный вид. Весной последние птицы отмечены в конце апреля. Осенью первые ястребы появляются в первых числах сентября. Пролёт заканчивается в конце октября.

Малый перепелятник *Accipiter gularis gularis* (Temminck et Schlegel, 1844). На весеннем пролёте в отдельные годы обычен в мае. Осенью этот вид – самый многочисленный из всех хищных птиц. Первые особи появляются в конце августа – начале сентября. Пролёт заканчивается в октябре.

Скопа *Pandion haliaetus haliaetus* (Linnaeus, 1758). Малочисленна на пролёте. Осенью отмечена в конце сентября.

Пустельга *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758. Гнездится на острове Большой Пелис, и, по-видимому, на некоторых других островах. Одиночные птицы наблюдались 12 июня 1968 на островах Попова и Рикорда. На пролёте пустельга обычна в сентябре. Зимой одиночные птицы отмечены 28 ноября 1968. на острове Попова и 23 января 1964 на острове Скребцова.

Сапсан *Falco peregrinus* subsp.? В 1969 году пара сапсанов гнездилась на острове Карамзина (Н.М.Литвиненко, устн. сообщ.). Весной пролётные сапсаны отмечены в конце апреля – первой половине мая, осенью – во второй половине сентября и в октябре.

Дербник *Falco columbarius* subsp.? Малочисленный пролётный вид. Три птицы отмечены в конце апреля – начале мая 1966 года на островах Рикорда и Большой Пелис.

Амурский кобчик *Falco amurensis* Radde, 1863. Встречен лишь однажды: 7 мая 1965 на острове Большой Пелис.

Чеглок *Falco subbuteo subbuteo* Linnaeus, 1758. Одна пара, по-видимому, гнездится на острове Большой Пелис. На пролёте обычен в мае и в сентябре-октябре.

Немой перепел *Coturnix japonica* Temminck et Schlegel, 1849. Гнездится на Большом Пелисе (2 пары), но не каждый год. На остальных островах обычен на пролёте в мае и в сентябре – начале октября.

Фазан *Phasianus colchicus pallasi* Rothshild, 1903. Гнездится на острове Попова (1-2 пары) и, по сообщению местных жителей, на острове Русский. В 1930-е годы гнездился на острове Рейнеке.

Пятнистая трёхпёрстка *Turnix tanki blanfordii* Blyth, 1863. Гнездится на лугах островов Большой Пелис (2 пары) и Де-Ливрона (1 пара). На пролёте отмечена на других островах, но всегда в малом числе.

Погоныш-крошка *Porzana pusilla pusilla* (Pallas, 1776). Гнездится на острове Большой Пелис (2-3 нары), где появляется 11-13 мая. Во время пролёта этот вид довольно малочислен.

Большой погоныш *Porzana paykullii* (Ljungh, 1813). Гнездится на островах Попова (5-6 пар) и Большой Пелис (2 пары). На последнем острове отмечался не каждый год. Весной 1968 года первые птицы появились 27 мая.

Красноногий погоныш *Porzana fusca erythrothorax* (Temminck et Schlegel, 1849). В 1967 году он был обычен на острове Большой Пелис с 27 мая по 12 июня. Птицы придерживались сухих безлесных участков и опушек у мелколесья. Нами добыто 4 экземпляра этого вида. Остатки одной птицы найдены 1 июня 1967 на острове Карамзина. Одна птица отмечена на острове Большой Пелис 25 мая, две – 29 мая и две – 6 июня 1968.

Белокрылый погоныш *Coturnicops exquisitus* (Swinhoe, 1873). Отмечен лишь однажды: погибшая птица найдена на острове Большой Пелис 25 апреля 1966 М.Г.Казыхановой.

Восточный пастушок *Rallus aquaticus indicus* Blyth, 1849. Одна пара гнездилась на острове Большой Пелис в 1964 году. Одиночная птица отмечена здесь же 22 мая 1968.

Рогатая камышница *Gallicrex cinerea* (J.F.Gmelin, 1789). Самец (второгодок) добыт на острове Большой Пелис 7 июня 1967. Семенники его достигали размеров 11×19 мм.

Камышница *Gallinula chloropus chloropus* (Linnaeus, 1758). Гнездится на острове Большой Пелис (1 пара), но не ежегодно. Во время пролёта довольно обычна во второй половине мая.

Бурокрылая ржанка *Pluvialis fulva* (J.F.Gmelin, 1789). Малочисленный пролётный вид. Отмечена дважды во время пролёта: на острове Большой Пелис 6 мая и на острове Рикорда 13 августа 1966.

Малый зуёк *Charadrius dubius curonicus* J.F.Gmelin, 1789. Гнездится на островах Попова (1-6 пар, берег пролива Старка), Рейнеке, Рикорда (по 2 паре) и Большой Пелис (1 пара); на последнем – не каждый год. На пролёте малочислен.

Монгольский зуёк *Charadrius mongolus* subsp.? Немногочислен на пролёте. Отмечен в июне, августе и сентябре.

Морской зуёк *Charadrius alexandrinus nihonensis* Deignan, 1941. Гнездится по 1-2 пары на каждом из островов Римского-Корсакова, но на островах Большой Пелис и Матвеева – не каждый год. На пролёте редок.

Чибис *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758). Отмечен 21 мая 1967 на острове Большой Пелис. Здесь же найдены остатки двух птиц. Весной в Южном Приморье чибис появляется в марте и, по-видимому, в это же время встречается на островах.

Серый чибис *Microsarcops cinerea* (Blyth, 1842). Залётные особи встречены на острове Большой Пелис: одна – 7 мая 1965 (Лабзюк, Назаров 1967) и две – 19 мая 1966. Добыты два самца, семенники которых достигали размеров 3×5 мм.

Черныш *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758. Одиночные птицы отмечены на пролёте в конце апреля – мае и в конце августа – сентябре.

Фифи *Tringa glareola* Linnaeus, 1758. Пролётный вид. Весной одиночные птицы отмечены в первой половине мая. Осенью этот вид обычен в августе – первой половине сентября. В первых числах сентября фифи держатся разрозненными стаями из 25-30 особей.

Большой улит *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767). Одиночки отмечены на островах в мае и в сентябре.

Травник *Tringa totanus ussuriensis* Buturlin, 1934. Одиночная птица добыта 14 мая 1968 на острове Большой Пелис.

Щёголь *Tringa erythropus* (Pallas, 1764). Отмечен только дважды на пролёте: в мае 1967 и в сентябре 1966 на острове Большой Пелис.

Сибирский пепельный улит *Heteroscelus brevipes* (Vieillot, 1816). Одиночки и небольшие стайки отмечены на пролёте в мае и в августе-сентябре.

Перевозчик *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758). Гнездится на островах Попова (3-4 пары), Рейнеке (2-3 пары), Рикорда (3-4 пары), Большой Пелис (4-5 пар, но не каждый год), Матвеева и Де-Ливрона (по 2-3 пары). Во время пролёта обычен на всех островах.

Мородунка *Xenus cinereus* (Güldenstadt, 1775). Одна птица встречена на острове Большой Пелис 17 мая 1968 и две – на острове Рикорда 13 августа 1966.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758). Небольшие стайки птиц встречены на море вблизи островов Стенина и Большой Пелис во второй половине сентября 1965 года.

Камнешарка *Arenaria interpres oahuensis* (Bloxham, 1826). Одиночки отмечались на пролёте в мае и в августе-сентябре.

Песочник-красношейка *Calidris ruficollis* (Pallas, 1776). Изредка встречается на пролёте в мае, но в августе – первой половине сентября одиночки и небольшие стайки обычны на всех островах.

Длиннопалый песочник *Calidris subminuta* (Middendorff, 1853). Одиночные птицы отмечены на пролёте в мае и в конце августа – начале сентября.

Краснозобик *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763). Одиночная птица добыта 13 мая 1968 на острове Большой Пелис.

Чернозобик *Calidris alpina sakhalina* (Vieillot, 1816). Бродячие и пролётные одиночки и небольшие стайки чернозобиков отмечены в июне, августе и начале сентября.

Песчанка *Calidris alba* (Pallas, 1764). Наблюдалась в небольшом количестве во второй половине августа и в начале сентября.

Большой песочник *Calidris tenuirostris* (Horsfield, 1821). Отмечен лишь однажды на пролёте: 19 августа 1966 на острове Рикорда.

Бекас *Gallinago gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758). Не представляет редкости на пролёте. Весной первые птицы отмечены 19 апреля 1966. Максимальная численность приходится на первую декаду мая. Осенью многочислен в последних числах августа и в первой половине сентября. Последние птицы отмечены в первой половине октября.

Лесной дупель *Gallinago megala* Swinhoe, 1861. Как и бекас, обычен на пролёте. Весной наблюдался с 21 апреля по 15-18 мая. Наибольшая численность вида приходится на первую декаду мая. Осенью встречен н сентябре – начале октября.

Японский бекас *Gallinago hardwickii* (J.E.Gray, 1831). Может быть, гнездится на острове Большой, Пелис. Впервые самец этого вида был добыт на острове 17 мая 1964 (Лабзюк, Назаров 1967). В 1967 году с момента прилёта – с 25 мая – пара бекасов постоянно встречалась на сухом безлесном склоне острова, а в первых числах июня переместилась в низину. Самец начал токовать вечером 6 июня. Таковой полёт птица совершает на высоте 100-150 м, медленно летая неправильными кругами. Взмахнув крыльями несколько раз, бекас секунд 10 парит, почти стоит на одном месте, подняв крылья кверху и расправив хвост. Во время взмахивания крыльями птица издаёт низкий глухой, но далеко слышный, крик *«ке-кейи, ке-кейи»*. Частота выкриков постепенно увеличивается, достигай максимума через 3-7 мин. Затем, полусложив крылья и расправив хвост, бекас пикирует под углом к земле, пролетая при этом 15-20 м и издавая негромкий звук, напоминающий

шум реактивного самолёта. Выйдя из пике и набрав исходную высоту, птица повторяет всё сначала. Иногда довольно продолжительное время бекас во время полёта выкрикивает только однотипное *«ке, ке, ке...»*. Днём самец нередко токовал на земле среди невысокой травы, а однажды – сидя на коньке крыши дома. В это время бекас издавал те же крики, что и в полёте, и подпускал к себе на 10-15 м, совершенно не реагируя па приближение человека. В солнечные дни самец токовал реже. В первые четыре дня в брачном полёте участвовала и самка, но в отличие от самца, она не издавала никаких звуков и летала недолго. Наиболее интенсивно токование проходило днём и ночью 11 и 12 июня, лишь ненадолго прерываясь несколько раз. Самец был добыт 14 июня во время токования на земле. Его семенники достигали размеров 6× 20 мм, а их состояние указывало на начало спада активности. В 1968 году здесь же пара японских бекасов встречена 13 мая, одна 15 мая и 6 птиц – 22 мая. У самки, добытой 22 мая, фолликулы достигали 4 мм в диаметре.

Азиатский бекас *Gallinago stenura* (Bonaparte, 1830). Самый многочисленный пролётный вид из бекасов. Весной основной пролёт происходит в первой половине мая, а осенью – в конце августа – сентябре. В это время нередко встречаются группы из 10-15 и более птиц, однако чаще бекасы держатся поодиночке.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758. Гнездится на острове Большой Пелис (1-2 пары) и, по-видимому, на островах Попова и Рикорда. На пролёте вальдшнеп обычен в апреле – первой половине мая и в сентябре.

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* (Linnaeus, 1766). Весной стаи из 6-40 птиц пролегают в северо-восточном направлении. Последние птицы отмечались 16 мая. На осеннем пролёте встречен лишь однажды – 14 августа 1966 на острове Рикорда.

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus variegatus* (Scopoli, 1786). В небольшом числе отмечался и добывался на острове Большой Пелис в мае 1967 и 1968 годов.

Большой веретенник *Limosa limosa melanuroides* Gould, 1846. Одиночная птица добыта 13 мая 1968 на острове Большой Пелис.

Чернохвостая чайка *Larus crassirostris* Vieillot, 1818. Гнездится на островах Карамзина (около 10 тыс. пар в 1967 году и около 7 тыс. в 1968 году) и Стенина (несколько десятков пар). В мае н июне 1964 года чернохвостые чайки пытались гнездиться на острове Большой Пелис, но их гнёзда были разорены одичавшими кошками. К.Л.Воробьёв (1954) указывает на гнездование этого вида на острове Фуругельма. Прилетают чайки ка места гнездования в середине апреля. Откладка яиц начинается в середине мая и растягивается (на острове Карамзина) до середины июня. Подобное явление связано с частым посещением

острова жителями острова Попова и массовым сбором яиц чаек. Гнёзда чернохвостых чаек строятся из стеблей полыни и листьев злаков. Размеры гнёзд (n = 10), см: диаметр гнезда 22.5-25, диаметр лотка 14-18, глубина лотка 4.5-6.5. Размеры яиц (n = 30) 6.1-6.9×4.3-4.6 см, вес – 60-71.5 г. Подъём на крыло молодых птиц в конце июля – начале августа, но на острове Карамзина нелётные птенцы встречаются даже в середине августа. На зимовки чайки отлетают в ноябре.

Сизая чайка *Larus canus* subsp.? Зимует у берегов островов. Стаи численностью до 20 птиц наблюдались 28-30 ноября 1968 вблизи островов Русский, Попова и Рейнеке.

Тихоокеанская чайка *Larus schistisagus* Stejneger, 1884. Н.М.Литвиненко (устн. сообщ.) нашла два гнезда с полными кладками на острове Карамзина в 1968 году, а годом раньше наблюдала выкармливание одного птенца. По сообщению трепанголовов, на острове Фуругельма вместе с чернохвостыми чайками гнездятся крупные чайки с белым хвостом, которые, по-видимому, относятся к этому виду. На острове Большой Пелис молодая птица отмечена 11 мая 1968 и 18 мая 1966, а взрослая и молодая – 7 сентября 1966. Зимой тихоокеанские чайки обычны у берегов всех островов.

Озёрная чайка *Larus ridibundus* Linnaeus, 1766. Несколько птиц отмечено у рыбокомбината на острове Попова на пролёте 19 апреля 1966. Стая из 8 озёрных чаек наблюдалась 30 ноября 1968 вблизи острова Русский.

Речная крачка *Sterna hirundo longipennis* Nordmann, 1835. Гнездится на островах Циволько (около 10 пар), Малом (около 20), Лаврова (около 50 пар), Стенина, кекурах, расположенных между островами Матвеева и Большой Пелис (около 20 пар), на кекуре западнее острова Матвеева (1 пара), на безымянном островке у острова Антипенко и, по-видимому, на некоторых других. На местах гнездовий крачки появляются 2-5 мая. Гнёзда, построенные из травинок и водорослей, устраивают на вершинах кекуров и скал среди редкого травостоя. На острове Циволько 12 июня 1968 в гнёздах были сильно насиженные яйца. В июне речные крачки, отыскивавшие пищу, отмечались у побережий островов Карамзина, Попова и Рейнеке.

Малая крачка *Sterna albifrons sinensis* J.F.Gmelin, 1789. Отмечена только однажды: 8 и 9 июня 1967 четыре птицы кормились вблизи острова Большой Пелис. Ближайшие места достоверного гнездования: озеро на острове Путятина и озеро Дорицени в Хасанском районе.

Тихоокеанский чистик *Cepphus columba columba* Pallas, 1811. Пара птиц отмечена вблизи острова Карамзина 25 апреля 1966.

Очковый чистик *Cepphus carbo* Pallas, 1811. Гнездится на островах Русский, Клыкова (до 20 пар), Верховского (до 30 пар), Карамзина (около 100 пар), Циволько (около 20 пар), Желтухина (около 20 пар),

Козлова, Большой Пелис (около 350 пар), Стенина, Матвеева (около 700 пар) и на некоторых других. На местах гнездовий появляется в начале апреля, Откладка яиц начинается в первой декаде мая. Гнёзда чистики устраивают под камнями осыпей, часто на глубине более 1 м; кроме того, в трещинах и нишах скал на высоте 40-50 м и более от воды. Полная кладка часто содержит два яйца, но двух птенцов в одном гнезде мы не находили. На острове Матвеева 11 июня 1967 в гнёздах найдены сильно насиженные яйца и пуховые птенцы. Там же 18 июня попадались уже крупные птенцы (около 2/3 от веса взрослой птицы) с пеньками перьев на крыльях и хвосте. В это время взрослые чистики начинают носить птенцам небольших полурылов, бычков, маслюков и других рыб. Нам постоянно приходилось наблюдать птиц, летящих с кормом от острова Матвеева к южной оконечности Большого Пелиса, в то время как чистики, гнездящиеся на острове Матвеева, обычно кормятся у берегов острова Большой Пелис. В середине августа молодые отмечались уже на воде. К концу августа птицы откочёвывают и в заливе Петра Великого остаются лишь отдельные особи. В октябре в заливе появляются очковые чистики, прикочевавшие из северных районов.

Толстоклювая кайра *Uria lomvia arra* (Pallas, 1811). Довольно обычна в заливе, но характер её пребывания здесь не ясен. Небольшие стаи из 4-7 особей и одиночки отмечены у берегов островов Римского-Корсакова и Карамзина в апреле – начале июня.

Тонкоклювая кайра *Uria aalge inornata* Salomonsen, 1932. Гнездится на острове Карамзина (около 200 пар) и, по сообщению местных жителей, на островах Фуругельма и Вера. Л.М.Шульпин (1936) приводил этот вид для острова Русский. На острове Карамзина кайры гнездятся главным образом на отвесных утёсах в южной и средней частях острова. 17 мая 1966 птицы уже насиживали яйца. 16 сентября 1966 у острова Большой Пелис добыты взрослые кайры в зимнем пере, но с не полностью отросшими маховыми.

Пёстрый пыжик *Brachyramphus perdix* (Pallas, 1811). Две птицы, почти полностью перелинявшие из зимнего наряда, добыты близ острова Большой Пелис 6 мая 1965 и 28 мая 1968.

Ста́рик *Synthliboramphus antiquus* (J.F.Gmelin, 1789). Гнездится на островах Верховского (30-40 пар), Карамзина (около 100 пар), Клыкова, Стенина и других. Вблизи гнездовий появляется в начале-середине апреля. Откладка яиц в первой декаде мая. В кладке обычно два яйца. Гнёзда располагаются на дне трещин и пустот, под камнями в осыпях и, реже, в норах па глубине до 1 м. Яйца, взятые 24 мая 1968, были сильно насиженными. Молодые птицы покидают гнёзда в конце июля – начале августа.

Конюга-крошка *Aethia pusilla* (Pallas, 1811). Довольно обычна в заливе Петра Великого на зимовках и пролёте. Одиночки и стайки из

3-5 конюг-крошек наблюдались в апреле-мае у берегов островов Римского-Корсакова и Рикорда.

Тупик-носорог *Cerorhinca monocerata* (Pallas, 1811). Гнездится на островах Верховского (до 30 пар), Карамзина (около 50 пар), Клыкова (до 20 пар) и, возможно, на некоторых других. На островах появляются в апреле. Гнёзда устраивают в норах длиною до 1 м, а также среди камней в осыпях и изредка в нишах. Откладка яиц – в третьей декаде апреля – середине мая. Яйца насиживают самка и самец. На острове Карамзина 1 июня 1967 в гнёздах были уже сильно насиженные яйца, а в одном – пуховичок. Массовое вылупление птенцов приходится на первую половину июня. В это время в утренние часы нам регулярно приходилось наблюдать тупиков, пролетавших за кормом на юг мимо острова Большой Пелис. В начале августа основная масса молодых уже держится на воде. К середине августа тупики-носороги покидают места гнездовий.

Топорок *Lunda cirrhata* (Pallas, 1769). В начале XX столетия в незначительном количестве гнездился на островах Фуругельма, Матвеева, Дурново (Черский 1916), Русский и Рейнеке (Шульпин 1936). Нам за пять лет ни разу не удалось наблюдать этот вид.

Скальный голубь *Columba rupestris rupestris* Pallas, 1811. Отмечен трижды: на острове Большой Пелис – одна птица в мае и три – в июне, на острове Рикорда – около 10 птиц в августе.

Большая горлица *Streptopelia orientalis orientalis* (Latham, 1790). Гнездится на островах Попова (около 10 пар), Клыкова (2-3 пары), Большой Пелис, Стенина и Матвеева (по 1 паре на каждом) и, по-видимому, на некоторых других. Весной прилетает в начале апреля – первой половине мая. Осенью массовый пролёт протекает во второй половине сентября – первой половине октября.

Ширококрылая кукушка *Hierococcyx fugax hyperythrus* (Gould, 1856). В отдельные годы довольно обычна на пролёте во второй и третьей декадах мая. На острове Большой Пелис во второй половине мая 1968 года можно было слышать одновременно 2-3 самцов ширококрылой кукушки.

Индийская кукушка *Cuculus micropterus micropterus* Gould, 1838. Несколько самцов, один из которых добыт, отмечены по крику на острове Большой Пелис 13-14 мая 1968.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus telephonus* Heine, 1863. Отмечалась в течение всего июня 1964 года на острове Матвеева, где, может быть, гнездилась. На других островах этот вид обычен на пролёте в мае и сентябре.

Глухая кукушка *Cuculus saturatus horsfieldi* Moore, 1857. Гнездится на островах Попова, Рикорда, Большой Пелис. Стенина и Матвеева (по 1-2). На пролёте многочисленна в мае и сентябре.

Малая кукушка *Cuculus poliocephalus poliocephalus* Latham, 1790. Гнездится на острове Большой Пелис (1 «пара»), но не каждый год, и, по-видимому, на острове Попова. На пролёте в небольшом числе встречалась в третьей декаде мая – начале июня.

Ошейниковая совка *Otus bakkamoena ussuriensis* (Buturlin, 1910). В гнездовое время отмечена по крику лишь однажды: 1 июля 1965 на острове Попова. На пролёте две птицы отмечены 15 апреля 1966 на острове Большой Пелис.

Восточная совка *Otus sunia stictonotus* (Sharpe, 1875). Обычна на пролёте. Весной встречалась в течение всего мая и в первых числах июня, осенью – во второй и третьей декадах сентября.

Филин *Bubo bubo ussuriensis* Polyakov, 1915. Наблюдался в течение всех летних сезонов на островах Большой Пелис, Матвеева и Стенина. На каком из островов он гнездится, установить не удалось, так как птицы в сумерках обычно перелетали с одного острова на другой. Нередко (на Большом Пелисе) случалось наблюдать филинов, которые охотились за дальневосточными полёвками даже днём и на совершенно безлесных участках. На острове Матвеева на одной из скал найдена «столовая», где обнаружены остатки очковых чистиков, бакланов, длинноносых крохалей, каменушек, зимняков, мелких ястребов и ворон.

Иглоногая сова *Ninox scutulata ussuriensis* Buturlin, 1910. Обычна на пролёте во второй и третьей декадах мая. Осенью отмечена одна птица 1 сентября 1966 на острове Большой Пелис.

Ушастая сова *Asio otus otus* (Linnaeus, 1758). Малочисленна на пролёте в апреле-мае. Осенью обычна в конце сентября – октябре.

Болотная сова *Asio flammeus flammeus* (Pontoppidan, 1763). Нередка на весеннем пролёте с 20 апреля но 15 мая. Наибольшая численность наблюдалась в первой декаде мая 1966 года.

Большой козодой *Caprimulgus indicus jotaka* Temminck et Schlegel, 1847. В гнездовое время отмечен по крику лишь однажды: 1 июля 1965 на острове Попова. На пролёте обычен во второй половине мая и в сентябре.

Голубой зимородок *Alcedo atthis bengalensis* J.F.Gmelin, 1788. Одиночки отмечались в мае и с середины августа до октября.

Ошейниковый зимородок *Halcyon pileata* (Boddaert, 1783). Залётные самец и самка добыты на острове Большой Пелис 8 и 12 мая 1966.

Широкорот *Eurystomus orientalis calonyx* Sharpe, 1890. Одиночки и группы из 2-4 и более птиц обычно наблюдаются на пролёте во второй половине мая – первой половине июня и в августе-сентябре. Осенью последние широкороты встречены 22 сентября.

Удод *Upupa epops saturata* Lönnberg, 1909. Гнездится на островах Попова, Рейнеке и Рикорда (по 1 паре на каждом). На остальных островах встречен на пролёте в апреле и в сентябре.

Белопоясный стриж *Apus pacificus pacificus* (Latham, 1801). Самая многочисленная гнездящаяся птица всех островов и кекуров. Прилетает 1-8 мая, отлетает в первой половине сентября. Гнездится в трещинах скал. Гнёзда строит из листьев зостеры, стеблей трав и перьев (главным образом чаек), склеенных выделениями слюнных желёз в плотную чашку. На одиночном кекуре вблизи острова Попова 27 июня 1965 обнаружено 6 гнёзд с 2-3 яйцами в каждом насиженностью 2-3 дня. Выкармливание птенцов продолжается до конца августа.

Иглохвостый стриж *Hirundapus caudacutus caudacutus* (Latham, 1801). Осенью пролетает над островами в конце сентября в юго-юго-западном направлении. Около 20 птиц встречено 22 сентября, 6 и 1 птица соответственно – 23 и 25 сентября 1966.

Седой дятел *Picus canus jessoensis* Stejneger, 1886. Одна-две пары гнездятся на острове Попова. Несколько пролётных птиц отмечено на острове Рикорда 26 и 27 сентября 1965. Зимой наблюдался 29 ноября 1968 острове Попова.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major japonicus* (Seebohm, 1883). В небольшом числе встречается во внегнездовое время. Одиночки и пары отмечены в конце апреля – мае и в сентябре-ноябре на островах Большой Пелис, Рикорда и Попова.

Белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos sinicus* Buturlin, 1907. Гнездится на островах Попова, Рикорда и Большой Пелис (1-2 пары на каждом). С последнего острова птицы нередко летают кормиться на острова Матвеева и Стенина. На острове Попова гнездо с птенцами найдено 11 июня 1968, а на острове Рикорда 12 июня 1968 наблюдался выводок. Во время кочёвок и зимовки этот вид встречается на всех облесённых островах.

Малый пёстрый дятел *Dendrocopos minor amurensis* (Buturlin, 1909). Редкий кочующий вид. Самка отмечена 21 апреля 1965 на острове Рикорда и две птицы 12 и 20 сентября 1965 на острове Большой Пелис.

Рыжебрюхий дятел *Dendrocopos hyperythrus subrufinus* (Cabanis et Heine, 1863). На острове Большой Пелис добыты два самца и самка 18 и 20 мая 1966 и 31 мая 1968. Семенники самцов достигали 8×11 мм, а фолликулы самки – 3 мм.

Малый острокрылый дятел *Dendrocopos kizuki permutatus* (Meise, 1934). Достоверно гнездится только на островах Попова и Рикорда (по 2-3 пары). Во время кочёвок изредка появляется на других островах.

Вертишейка *Jynx torquilla chinensis* Hesse, 1911. Одиночные птицы отмечены на пролёте с 30 апреля по 20 мая и в середине сентября.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis* subsp.? Гнездится на островах Попова (около 50 пар), Рейнеке (около 50 пар), Рикорда (40-50 пар) и Большой Пелис (3-9 пар). Постройка гнёзд и откладка яиц в конце

апреля – начале мая. Первые слётки появляются в конце мая. На острове Попова 27 нюня 1965 найдено гнездо с повторной кладкой из 3 слабо насиженных яиц. На пролёте обычен на всех островах.

Малый жаворонок *Calandrella brachydactyla dukhunensis* (Sykes, 1832). Ежегодно и в небольшом числе появляется на островах весной и осенью. Одиночки и стайки из 2-10 птиц наблюдались в разные годы с 27 апреля по 15 мая и в сентябре на острове Большой Пелис.

Береговая ласточка *Riparia riparia* subsp.? Несколько птиц отмечены на острове Большой Пелис в мае 1967 и 1968 годов.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica gutturalis* Scopoli, 1786. Гнездится на острове Попова (5-10 пар) и Большой Пелис (2-3 пары). Прилетает в конце апреля. Гнёзда устраивает под крышами домов и на скалах. На других островах бывает на пролёте в мае и сентябре.

Рыжепоясничная ласточка *Cecropis daurica japonica* (Temminck et Schlegel, 1845. Гнездится в населённых пунктах на островах Попова и Рейнеке (около 10 пар на каждом) и на скалах острова Большой Пелис (1-2 пары). Прилёт на места гнездовий в конце апреля.

Воронок *Delichon urbica* subsp.? Гнездится на скалах почти всех крупных островов, до 10 пар на каждом.

Китайская иволга *Oriolus chinensis diffusus* Sharpe, 1877. Гнездится на островах Попова (1-2 пары), Рейнеке, Большой Пелис, Стенина, Матвеева и Де-Ливрона (по 1 паре на каждом). Прилёт в середине-конце мая, отлёт в сентябре. Во время пролёта довольно малочисленна. Гнездо с 2 свежими яйцами найдено 11 июня 1968 на острове Попова.

Сойка *Garrulus glandarius brandtii* Eversmann, 1842. Две пары соек гнездились в 1968 году на острове Попова. Одиночки и стаи из 10-20 птиц отмечены па пролёте с 20 апреля по 20 мая и во второй половине сентября на всех островах. Зимой, 28-30 ноября 1968, на острове Попова держались одиночные особи.

Голубая сорока *Cyanopica cyanus pallescens* Stcgmann, 1931. На острове Попова стая из 4 птиц и одиночки отмечены 28-30 ноября 1968. Рулевые и маховые перья голубой сороки найдены весной 1965 года на острове Большой Пелис.

Сорока *Pica pica jankowskii* Stegmann, 1928. Гнездится на островах Попова (около 10-12 пар), Рейнеке (1 пара) и Желтухина. В гнёздах, найденных 19 и 25 апреля 1966, было соответственно 5 и 3 совершенно свежих яйца. Вылет молодых в конце июня. На острове Попова сороки питаются в основном отходами рыболовного промысла и отбросами у звероферм. Во внегнездовое время одиночные птицы посещают и другие острова.

Восточная чёрная ворона *Corvus (corone) orientalis* Eversmann, 1841. Одна пара в отдельные годы гнездится на острове Большой Пе-

лис. На других островах ворона встречается на кочёвках. Вблизи рыбокомбината острова Попова птицы держатся в течение всего холодного времени года.

Большеклювая ворона *Corvus macrorhynchos mandshuricus* Buturlin, 1913. Гнездится на островах Попова (около 5 пар), Рикорда (6-7 пар), Рейнеке (3-4 пары), Римского-Корсакова (по 1-2 пары на каждом), Верховского, Карамзина, Клыкова, Циволько, Желтухина (по 1 паре на каждом). Гнезда строит на деревьях, а на безлесных островах на скалах. На острове Рикорда 23 апреля 1966 в одном гнезде было 4 яйца, в другом – 1, три гнезда ещё пустовали. Гнездо, найденное на острове Попова 25 апреля 1966, содержало 4 свежих яйца. Птенцы вылупляются во второй половине мая. В начале-середине июля на острове Попова стаи из молодых и старых птиц появляются близ рыбокомбината и звероферм. В питании этого вида преобладают отходы рыболовного промысла, погибшие морские животные, яйца и птенцы морских птиц, дальневосточные полёвки, а в осеннее время – плоды вишни Максимовича, жимолости, винограда, боярышника, мелкоплодника, ариземы, шиповника, бархата и других растений.

Восточная синица *Parus minor wladiwostokensis* Kleinschmidt, 1913. Гнездится на всех облесённых островах. Численность: до 30 пар на островах Попова и Рикорда, 8-10 пар на островах Стенина и Большой Пелис, 2-3 пары на островах Матвеева, Клыкова и Желтухина. На острове Рикорда 21 апреля 1966 птицы уже разбились на пары. Откладка яиц в начале-середине мая. В конце июня на острове Попова наблюдались выводки хорошо летающих молодых птиц. Зимой на острове Попова отмечены одиночные птицы.

Московка *Periparus ater amurensis* Buturlin, 1907. Многочисленна в периоды пролёта в мае и во второй половине сентября. В это время московки встречаются в самых разнообразных местах, вплоть до безлесных участков. На острове Большой Пелис 18 мая 1966 мы наблюдали большое количество московок, непрерывным потоком двигавшихся в юго-западном направлении, то есть в открытое море. Весной на острове Попова последние московки встречены 22 мая 1968.

Болотная гаичка *Poecile palustris brevirostris* (Taczanowski, 1872). Гнездится на островах Попова, Рикорда (до 20 пар), Клыкова, Желтухина, Наумова, Большой Пелис и Стенина (по 1-3 пары на каждом). В конце июня 1965 года на острове Попова наблюдались выводки. В начале августа гаички начинают кочевать по островам. Зимой, 28-30 ноября 1968, на острове Попова этот вид наблюдался чаще, чем другие синицы.

Поползень *Sitta europaea amurensis* Swinhoe, 1871. Гнездится на островах Попова и Рикорда (до 20 пар) и, по-видимому, Стенина (1 пара). Появляется на местах гнездовья в начале марта. На острове Ри-

корда 20-23 апреля 1966 поползни уже разбились на пары. Выводки наблюдались на острове Попова в конце июня.

Косматый поползень *Sitta villosa corea* Ogilvie-Grant, 1906. Регулярно встречается во время весеннего пролёта. Три самца и самка наблюдались на острове Большой Пелис 8-14 мая 1965 (Лафер, Назаров 1957), самец – 16 мая 1966 и самец – 15-16 мая 1967. Добыты два самца и самка.

Обыкновенная пищуха *Certhia familiaris orientalis* Domaniewski, 1922. Редкий пролётный и зимующий вид. Одна пищуха отмечена 20 апреля 1966 на острове Рикорда и две – 29 ноября 1968 на острове Попова.

Бурая сутора *Paradoxornis webbianus mantschuricus* (Taczanowski, 1885). Зимой, 28 ноября 1968, на острове Попова наблюдалась стайка из 4 птиц, Там же были отмечены две птицы 26 апреля 1968.

Ополовник *Aegithalos caudatus caudatus* (Linnaeus, 1758). Редкая зимующая птица. Стайка из 5 птиц была встречена 29 ноября 1968 на острове Попова.

Серый личинкоед *Pericrocotus divaricatus divaricatus* (Raffles, 1822). Гнездится на островах Попова (2-3 пары), Большой Пелис, Стенина и Де-Ливрона (по 1-2 пары), но не каждый год. На пролёте обычен в первой половине мая. На острове Большой Пелис личинкоеды чаще встречаются в зарослях полыни и кустарников, чем в лесу. Осенний пролёт – в конце сентября.

Рыжеухий бюльбюль *Microscelis amaurotis amaurotis* (Temminck, 1830). Одиночная птица наблюдалась на острове Большой Пелис 14 мая 1964 (Лабзюк, Назаров 1967).

Крапивник *Troglodytes troglodytes peninsulae* (A.H.Ckark, 1907). Редок на пролёте. Одиночки отмечались 24 апреля 1969 на острове Попова.

Рыжая райская мухоловка *Terpsiphone paradisi incei* Gould, 1852. Наблюдалась во время пролёта на острове Большой Пелис: самец добыт 20 сентября 1965, два самца и самка отмечены 2 и 12 сентября 1966.

Чёрная райская мухоловка *Terpsiphone atrocaudata atrocaudata* (Eyton, 1839). Самец добыт 29 мая 1964 на острове Большой Пелис. На острове Стенина 16 и 17 июня 1964 держался другой одиночный самец (Лабзюк, Назаров 1967).

Пестрогрудая мухоловка *Muscicapa griseisticta* (Swinhoe, 1861). Весной первые птицы отмечены 5-12 мая. Интенсивная миграция идёт во второй половине мая. Осенью многочисленна в первой половине сентября, а одиночки встречаются и в первых числах октября.

Мухоловка-касатка *Muscicapa sibirica sibirica* J.F.Gmelin, 1789. Как и предыдущий вид, не представляет редкости во время пролёта. Весной она обычна во второй половине мая. Осенью наибольшая чис-

ленность её приходится на середину сентября. Пролёт закапчивается в первых числах октября.

Ширококлювая мухоловка *Muscicapa dauurica dauurica* Pallas, 1811. Гнездится на островах Попова (2-3 пары) и Большой Полис (2 пары). На пролёте первые птицы отмечены 8 мая, а через неделю эта мухоловка была уже многочисленной. Осеннее движение происходит с середины августа до первых чисел октября. Максимум пролёта наблюдается в первой половине сентября.

Синяя мухоловка *Cyanoptila cyanomelana* (Temminck, 1829). Обычна в период пролёта. Первые птицы появляются в начале мая. Массовый пролёт проходит в середине мая. Осенью синяя мухоловка отмечалась с середины августа до первых чисел октября. Максимум пролёта – в первой половине сентября.

Восточная малая мухоловка *Ficedula albicilla* (Pallas, 1811). Несколько малых мухоловок отмечено на пролёте в середине мая 1968 года на острове Большой Пелис.

Мухоловка-мугимаки *Ficedula mugimaki* (Temminck, 1836). Первые пролётные птицы появляются в начале мая, в массе же летят в середине мая. Осенью первые птицы отмечены 23 сентября, а наиболее интенсивное движение – в первой половине октября.

Японская мухоловка *Ficedula narcissina* (Temminck, 1836). В период миграции несколько самцов отмечены на островах Большой Пелис и Матвеева 13-18 мая 1964; из них три добыты (Лабзюк, Назаров 1967), и по одному самцу – 15 и 27 мая 1967. Здесь же эта мухоловка была обычна с 8 по 29 мая 1968 (2 самца и 1 самка добыты). Эти находки, а также известная встреча японской мухоловки Л.М.Шульпиным (1927) в окрестностях Сучана позволяют предполагать пролёт этой птицы через окраины материка на Сахалин.

Желтоспинная мухоловка *Ficedula zanthopygia* (Hay, 1845). Гнездится на всех крупных облесённых островах. Численность – до 20-30 пар на каждом острове. Прилетает в конце апреля – первых числах мая. Откладка яиц в конце мая. На острове Попова 28 июня 1965 наблюдались слётки.

Толстоклювый черногорлый чекан *Saxicola stejnegeri* (Parrot, 1908). Обычен в конце апреля – первой половине мая и во второй половине сентября.

Пустынная каменка *Oenanthe deserti atrogularis* (Blyth, 1847). Два самца встречены 1 и 5 июня 1968 на острове Большой Пелис. Один из них добыт.

Синий каменный дрозд *Monticola solitarius philippensis* (P.L.S. Muller, 1776).). Гнездится на островах Попова (7-8 пар), Рейнеке и Рикорда (до 10 пар), Большой Пелис (11-13 пар), Стенина, Матвеева и Де-Ливрона (по 1-3 пары) и некоторых других. Первые птицы появля-

ются 18-22 апреля. Гнёзда устраивают в расщелинах отвесных береговых скал. В гнезде, найденном на острове Большой Пелис 2 июня 1967, находилось 3 яйца. Через несколько дней птицы бросили это гнездо (в нём было уже 4 яйца) и начали строить новое в нескольких десятках метрах от первого. 26-27 июня на острове Попова и 30 июня 1965 на острове Рейнеке наблюдались взрослые птицы, носившие корм в гнёзда, и выводки хорошо летающих молодых. Осенний пролёт синих каменных дроздов наблюдается в начале сентября, одиночки отмечены 24 сентября 1965 на острове Большой Пелис.

Белогорлый дрозд *Petrophila gularis* (Swinhoe, 1863). Обычный пролётный вид, отмечавшийся в мае, сентябре и первой половине октября.

Сибирская горихвостка *Phoenicurus auroreus auroreus* (Pallas, 1776). Многочисленный пролётный вид. Весной пролёт заканчивается в первых числах мая, но отдельные птицы встречаются на островах до конца месяца. Осенью горихвостки летят в последних числах сентября и в октябре.

Варакушка *Luscinia svecica svecica* (Linnaeus, 1758). Осенью 1964 года наблюдалась на острове Большой Пелис с 28 сентября по 3 октября. Всего отмечено около 20 птиц, державшихся поодиночке на безлесных участках (одна самка добыта). Два самца и самка встречены здесь же 20-22 мая 1968.

Соловей-красношейка *Luscinia calliope calliope* (Pallas, 1776). Малочисленный пролётный вид, отмечаемый в середине мая и в конце сентября – первой половине октября.

Соловей-свистун *Luscinia sibilans* (Swinhoe, 1863). Обычен на пролёте в середине мая и в сентябре. Весной первые птицы появляются 6-9 мая. В отдельные годы многочислен.

Синий соловей *Luscinia cyane bochaiensis* (Schulpin, 1928). Гнездится на островах Большой Пелис, Стенина, Матвеева и Де-Ливрона (по 1-2 пары на каждом), но не каждый год. Прилетает в начале мая. Осенью первые пролётные птицы появляются в начале сентября.

Синехвостка *Tarsiger cyanurus ussuriensis* Stegmann, 1929. Многочисленный пролётный вид. Весной основной пролёт наблюдается во второй половине апреля. Последние птицы отмечены в середине мая. Осенью первые синехвостки появляются в середине сентября, основной пролёт – в первой половине октября.

Пёстрый дрозд *Zoothera varia toratugumi* (Momiyama, 1940). Пролётный вид. Первые птицы отмечены 20 апреля. Обычен на пролёте в первой половине мая. Осенний пролёт начинается в первых числах сентября и наиболее интенсивен в середине месяца. В первой половине октября встречаются только одиночные особи.

Сибирский дрозд *Zoothera sibirica* (Pallas, 1776). На островах от-

мечено два подвида. *Z. s. sibirica* (Pallas, 1776) – обычен на пролёте. Весной появляется в первой декаде мая. Основной пролёт в первой половине мая. Осенний пролёт начинается в первых числах сентября. В середине сентября птицы довольно многочисленны на островах, где держатся даже на открытых участках. *Z. s. davisoni* (Hume, 1877) – самец добыт на острове Большой Пелис 10 мая 1968.

Дрозд Науманна *Turdus naumanni* Temminck, 1820. Многочислен на пролёте в апреле. Чаще птицы держатся стаями из 10-20 птиц, предпочитая открытые участки островов. В первой половине мая летят лишь одиночные особи. Осенью первые птицы появляются в октябре.

Бурый дрозд *Turdus eunomus* Temminck, 1831. Многочисленная пролётная птица с несколько иными сроками пролёта, чем у предыдущего вида. Наиболее интенсивен пролёт в первой декаде мая. Птицы держатся стаями, преимущественно на открытых местах. Последние птицы наблюдались 16-24 мая. Осенью первые стаи дроздов появляются 20-22 сентября.

Белобрюхий дрозд *Turdus cardis* Temminck, 1831. Два самца наблюдались на острове Большой Пелис 4 и 7-8 мая 1966 (оба добыты) и один – 13 мая 1968.

Сизый дрозд *Turdus hortulorum* Sclater, 1863. Гнездится на островах Попова, Рикорда, Стенина и Большой Пелис (2-5 пар на каждом), придерживаясь русел лесных ключей и оврагов. На пролёте обычен во второй половине апреля – начале мая и в конце сентября – октябре.

Бледный дрозд *Turdus pallidus* J.F.Gmelin, 1789. Периодически гнездится на островах Большой Пелис, Стенина, Матвеева и Де-Ливрона (1-2 пары на каждом). Населяет сомкнутые леса с густым подлеском. На весеннем пролёте обычен во второй половине апреля. В первых числах мая отмечались последние птицы. Осенью пролётные дрозды встречаются в конце сентября – начале октября.

Оливковый дрозд *Turdus obscurus* J.F.Gmelin, 1789. Первые пролётные птицы отмечены 7 мая. Стаи из 5-20 и более особей обычно держатся в лесах. Наибольшая численность наблюдается в середине мая. Последние птицы покидают острова в конце мая – начале июня.

Пеночка-таловка *Phylloscopus borealis xanthodryas* (Swinhoe, 1863). Весной появляется в первой половине мая и обычна до конца этого месяца. Осенью первые птицы отмечены в конце августа. Основной пролёт таловки происходит в течение всего сентября.

Бледноногая пеночка *Phylloscopus tenellipes* Swinhoe, 1860. Довольно обычна на пролёте в мае и сентябре.

Светлоголовая пеночка *Phylloscopus coronatus* (Temminck et Schlegel, 1847). Гнездится на островах Попова и Рикорда (10-15 пар), Клыкова, Матвеева и Де-Ливрона (по 2-3 пары), Большой Пелис (10-28 пар) и Стенина (4-6 пар). Прилетает в конце апреля – начале мая.

Пролётные птицы встречаются до середины мая. Выводки молодых птиц отмечены в конце июня. На осеннем пролёте обычна до середины сентября.

Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus* Swinhoe, 1861. В небольшом числе отмечалась на пролёте. во второй половине мая и в середине августа.

Пеночка-зарничка *Phylloscopus inornatus inornatus* (Blylh, 1842). Первые птицы появляются па пролёте в начале мая. В середине мая птиц очень много. В небольшом числе встречаются и в начале июня. Осенью многочисленна в середине сентября.

Корольковая пеночка *Phylloscopus proregulus* (Pallas, 1811). Самая многочисленная из пеночек на пролёте. Первая птица отмечена 16 апреля 1966. Основной пролёт в конце апреля – первой половине мая. Осенью первые пеночки встречены 19 сентября 1966. Массовое движение – в конце сентября – начале октября.

Бурая пеночка *Phylloscopus fuscatus fuscatus* (Blyth, 1842). Немногочисленна на пролёте. Отмечалась в мае и сентябре.

Толстоклювая пеночка *Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863). Несколько птиц отмечено в середине мая 1967 и 1968 годов.

Восточная дроздовидная камышевка *Acrocephalus orientalis* (Temminck et Schlegel, 1847). Гнездится на островах Попова (около 10 пар), Рейнеке (3-4 пары), Рикорда (10-15 пар), Большой Пелис (5-14 пар) и Стенина (2-3 пары). Прилетает в середине мая. Селится в травянисто-кустарниковых зарослях. В гнезде, найденном на Большом Пелисе 21 июня 1967, было 4 свежих яйца. Осенний пролёт в сентябре. Последние птицы отмечены на Большом Пелисе 22 сентября 1965.

Чернобровая камышевка *Acrocephalus bistrigiceps* (Swinhoe, 1860). Гнездится на островах Большой Пелис (5-6 пар) и Стенина (2-3 пары) в зарослях кустарников и полыни на обезлесенных склонах. На пролёте во второй половине мая и в сентябре встречается и на других островах.

Толстоклювая камышевка *Phragamaticola aedon rufescens* Stegmann, 1929. В отдельные годы обычна на пролёте по второй половине мая.

Таёжный сверчок *Locustella fasciolata* (G.R.Gray, 1860). На пролёте в отдельные годы многочислен со второй половины мая до середины июня. Осенью отмечена только одна птица 17 сентября 1964.

Охотский сверчок *Locustella ochotensis ochotensis* (Middendorff, 1853). Одна птица добыта на острове Большой Пелис 20 сентября 1966. А.И.Черский добыл двух птиц 16 мая 1914 на острове Козлова (Воробьёв 1954).

Певчий сверчок *Locustella certhiola certhiola* (Pallas, 1811). Обычен на пролёте. Весной первые птицы отмечены 2 мая. Основная часть особей пролетает до середины мая, но отдельные птицы летят ещё и в

начале июня. Осенью певчий сверчок встречается с середины августа до конца сентября.

Пятнистый сверчок *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840). В отдельные годы обычен на пролёте во второй половине мая и в сентябре.

Короткокрылая камышевка *Horeites canturians borealis* (C.W. Campbell, 1892). Гнездится на островах Попова и Большой Пелис (5-6 пар), Рейнеке, Рикорда, Стенина и Де-Ливрона (2-3 пары на каждом). На острове Большой Пелис гнездится нерегулярно. Прилетает в конце апреля – начале мая. Осенний пролёт в конце сентября – начале октября.

Короткохвостка *Urosphena squameiceps* (Swinhoe, 1863). Весной первые птицы появляются на пролёте в середине апреля. Наибольшая численность пролётных птиц приходится на конец апреля – начало мая. Осенью наблюдается в течение всего сентября.

Желтоголовый королёк *Regulus regulus japonensis* Blakiston, 1862. Весной одиночные птицы отмечены 20-21 апреля 1966. Осенью первые корольки появляются в последних числах сентября. Основной пролёт в середине октября.

Альпийская завирушка *Prunella collaris erythropygia* (Swinhoe, 1870). Пролётный и, возможно, зимующий вид. Стаи из 5-10 птиц обычны здесь ещё в конце апреля. Последние птицы отмечены в начале мая. Осенью первые завирушки прилетают во второй половине сентября и в октябре этот вид довольно обычен.

Сибирская завирушка *Prunella montanella badia* Portenko, 1929. Обычна на пролёте, но не образует стай, встречаясь небольшими группами или одиночно. Весной первая птица отмечена 22 апреля (остров Рикорда), последняя – в середине мая. Осенний пролёт в октябре.

Камчатская трясогузка *Motacilla lugens* Gloger, 1829. Обычная пролётная и гнездящаяся птица всех островов. Прилетает в начале-середине апреля. На острове Большой Пелис 21 июня 1967 отмечен выводок из 4 молодых с полностью отросшими рулевыми и маховыми перьями. Осенний отлёт происходит в октябре.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. На островах встречается два пролётных подвида. *M. a. ocularis* Swinhoe 1860 весной обычна в первой половине мая. Осенью первые птицы появляются в середине сентября. *M. a. leucopsis* Gould 1838 – редка. Пара птиц этого подвида держалась несколько дней на озере острова Большой Пелис в мае 1968 года.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea robusta* (C.L.Brehm, 1857). Встречается только на пролёте. Весной первые птицы отмечены в конце второй декады апреля. Основной пролёт приходится на первую декаду мая. Осенью этот вид обычен в сентябре-октябре.

Жёлтая трясогузка *Budytes flavus*. На островах встречается три подвида. *B. f. macronyx* Streseman 1920 гнездится на островах Боль-

шой Пелис и Стенина (по 1-3 пары), но не каждый год. Прилетает во второй половине апреля, отлетает в сентябре. *B. f. similimus* (Hartert, 1905) – обычная пролётная птица: весной – со второй половины апреля до конца мая, осенью – в конце сентября – начале октября. Стаи этих птиц обычно держатся вместе с краснозобыми коньками и жаворонками на болотистых участках островов. *B. f. plexus* Thayer el Bangs 1914 – немногочисленна на пролёте в те же сроки, что и предыдущий подвид.

Зеленоголовая трясогузка *Budytes taivana* Swinhoe, 1864. Одиночки и стаи из 25-35 птиц обычны в середине мая. В 1967 году последняя птица отмечена 23 мая.

Древесная трясогузка *Dendronanthus indicus* (J.F.Gmelin, 1789). Гнездится на островах Большой Пелис, Стенина и Де-Ливрона (по 1-2 паре), но не каждый год. На пролёте обычна в мае и сентябре.

Степной конёк *Anthus richardi sinensis* (Bonaparte, 1850). Гнездится на островах Попова, Рейнеке, Рикорда (по 5-6 пар) и Большой Пелис (2 пары). Прилетает в середине апреля. Осенью степной конёк покидает острова в конце сентября.

Пятнистый конёк *Anthus hodgsoni yunnanensis* Uchida et Kuroda, 1916. Обычный пролётный вид. Первые птицы отмечены 23 апреля. В начале мая наиболее многочислен. Осенью 1966 года первые птицы были замечены 2 сентября. Пролёт продолжается в течение всего сентября и в первой половине октября.

Краснозобый конёк *Anthus cervinus cervinus* (Pallas, 1811). Обычен на пролёте, весной отмечался в конце апреля – начале мая. Последние птицы наблюдались 10 мая в 1965 и 27 мая в 1967 году. Осенний пролёт начинается с середины сентября.

Сибирский конёк *Anthus gustavi*. На островах встречается два подвида, оба – пролётные. *A. g. gustavi* Swinhoe 1863 был довольно обычен в 1968 году в мае на острове Большой Пелис (3 птицы добыты 11 и 22 мая). *A. g. menzbieri* Schulpin 1928 летит в эти же сроки, по малочислен (один самец добыт 11 мая).

Гольцовый конёк *Anthus rubescens japonicus* (Temminck et Schlegel, 1847). В небольшом числе отмечался на пролёте в первой половине мая и в октябре.

Обыкновенный свиристель *Bombycilla garrulus garrulus* (Linnaeus, 1758). Нерегулярно пролётный и, по-видимому, зимующий вид. Наблюдался в апреле – начале мая 1966 (стайками из 3-10 птиц) на островах Большой Пелис, Рикорда и Желтухина.

Японский свиристель *Bombycilla japonica* (Siebold, 1826). Одна птица добыта на острове Большой Пелис 13 мая 1965.

Японский сорокопут *Lanius bucephalus* Temminck et Schlegel, 1845. В 1966 году несколько птиц отмечено во время пролёта на острове Большой Пелис в первой половине мая.

Сибирский жулан *Lanius cristatus*. Представлен на островах тремя подвидами. *L. c. confusus* Stegmann 1929 гнездится на островах Попова (2-3 пары), Рикорда (5-6 пар), Большой Пелис (1-8 пар), Стенина, Матвеева и Де-Ливрона (по 1-2 пары на каждом). Первые птицы появляются в середине апреля. Основной пролёт в течение всего мая. Осенний пролёт в конце сентября – первой половине октября. *L. c. superciliosus* Latham 1802 был обычен на острове Большой Пелис с 11 мая по 1 июня 1967 (добыты 4 самца) и с 13 по 27 мая 1968 (добыты 6 самцов и 1 самка). *L. c. lucionensis* Linnaeus 1766 добыт на острове Большой Пелис в мае 1966 года. Там же 8 птиц этого подвида отмечены 13-17 мая 1968 (3 самца добыты). Следует отметить, что в мае 1968 года наблюдался исключительно массовый пролёт жуланов, в основном *L. c. confusus*.

Тигровый сорокопут *Lanius tigrinus* Drapiez, 1828. Гнездится на острове Большой Пелис (1 пара). Места гнездования менялись по годам: в 1964 году сорокопуты придерживались мелколесья южной части острова, а в 1967 году гнездились в парковом лесу северной части. На пролёте в небольшом числе встречается в апреле-мае и в сентябре.

Серый скворец *Sturnus cineraceus* Temminck, 1835. Гнездится на островах Попова, Рейнеке, Большой Пелис (по 10-40 пар), Стенина и Де-Ливрона (по 5-6 пар). Во второй половине апреля птицы, уже разбившись па пары, подыскивают дупла для гнёзд, но на местах кормёжек держатся стаями. На острове Рикорда 20 мая 1966 найдено 3 дупла с гнёздами, из которых в двух было по 4 яйца, а в третьем – 6. Лоток выстилается травинками и перьями. На острове Большой Пелис птицы, кроме дупел, гнездятся в трещинах скал и в печных трубах разрушенных домов. В 1967 году вылупление птенцов началось 20-23 мая. Вылет молодых приходится на первую декаду июня. К началу августа скворцы покидают острова, лишь одиночки иногда встречаются до конца месяца.

Малый скворец *Sturnia sturnina* (Pallas, 1776). Многочислен в отдельные годы на пролёте в мае, а осенью – с конца августа до октября.

Краснощёкий скворец *Sturnia philippensis* (J.R.Forster, 1781). На пролёте был довольно обычен на острове Большой Пелис с 11 по 29 мая в 1967 году. Птицы держались одиночно и стаями до 30 особей вместе с малыми скворцами. Самец и самка отмечены 29 мая 1968 на острове Попова. Ближайшее место гнездования – остров Аскольдв заливе Петра Великого (Нечаев, Юдаков 1967).

Буробокая белоглазка *Zosterops erythropleurus* Swinhoe, 1863. Одна из самых обычных пролётных птиц. Весной первые отмечены 11-18 мая. Основной пролёт во второй половине мая. Осенью появляется во второй половине августа. Держится стаями из 10-30 особей в течение всего сентября. Последние птицы отмечены 24 октября 1964.

Красноухая овсянка *Emberiza cioides weigoldi* Jacobi, 1923. Гнездится на островах Попова, Рейнеке, Рикорда, Большой Пелис (до 15 пар), Стенина, Матвеева, Де-Ливрона (по 3-5 пар на каждом). Прилетает в начале-середине апреля. Осенью летит в октябре. В 1968 году этот вид не гнездился на островах Большой Пелис и Матвеева. Зимой стайки из 3-4 птиц отмечены 29 ноября 1968 на острове Попова и 21 января 1962 на острове Скребцова.

Ошейниковая овсянка *Emberiza fucata transitiva* (Portenko, 1960). Гнездится на островах Попова, Рейнеке и Рикорда (около 20 пар), Большой Пелис (4- 5 пар). Прилетает во второй половине апреля. На острове Попова в конце июня взрослые птицы выкармливали птенцов. Осенью отлетает в октябре.

Желтогорлая овсянка *Emberiza elegans ticehursti* Sushkin, 1926. Гнездится на острове Большой Пелис (1 пара), в лесу северной части. На пролёте многочисленна в апреле. Последние пролётные птицы отмечены в первой декаде мая. Осенний пролёт начинается в последних числах сентября.

Желтобровая овсянка *Emberiza chrysophrys* Pallas, 1776. На пролёте довольно обычна в отдельные годы в мае. Чаще держится стайками из 2-5 птиц в лесу.

Таёжная овсянка *Emberiza tristrami* Swinhoe, 1870. Одна пара гнездилась только на острове Матвеева в густом мелколесье. Весной на острове Большой Пелис первые птицы отмечены 4 мая 1966. Основной пролёт – в первой половине мая. Осенью первые птицы отмечены на острове Большой Пелис 18 сентября 1966.

Овсянка-ремез *Emberiza rustica latifascia* Portenko, 1930. Многочисленна в апреле. Последние птицы наблюдались 14 мая 1966 и 24 мая 1967. Осенью первые особи появляются в начале октября.

Овсянка-крошка *Emberiza pusilla* Pallas, 1776. Первые птицы отмечены на острове Рикорда 23 апреля 1966. Основной пролёт приходится на первую половину мая. Стаи на 2-5 особей держатся только на открытых местах. Последняя птица наблюдалась 19 мая. Осенью 1966 года первые птицы появились 23 сентября.

Седоголовая овсянка *Emberiza spodocephala spodocephala* Pallas, 1776. Гнездится на островах Попова и Рикорда (до 20 пар), Рейнеке (5-6 пар), Клыкова (2-3 пары) и Римского-Корсакова (более 50 пар). Прилетает в конце апреля. В конце июня седоголовые овсянки ещё выкармливают птенцов. Осенний пролёт в сентябре-октябре.

Дубровник *Emberiza aureola ornata* Schulpin, 1928. Гнездится на островах Большой Пелис и Стенина (по 1 паре), но не каждый год. Весной основной пролёт наблюдается в середине мая. В это время встречаются стаи из 100 и более особей. Последние пролётные птицы отмечены в начале июня. Осенью отлетает в конце сентября.

Рыжая овсянка *Emberiza rutila* Pallas, 1776. Первые птицы отмечены на пролёте в конце первой декады мая. В середине мая встречаются стаи из 100 и более особей. Последние птицы покидают острова в последних числах мая. Осенью летят в августе и в небольшом количестве в сентябре. Последняя встреча – 29 сентября 1966.

Камышовая овсянка *Emberiza schoeniclus nortoniensis* Gm. Отмечена только дважды на острове Большой Пелис: 17 мая и 21 сентября 1966.

Полярная овсянка *Emberiza pallasi polaris* Middendorff, 1853. Четыре пролётные полярные овсянки наблюдались на острове Большой Пелис 29 апреля 1966.

Рыжешейная овсянка *Emberiza yessoensis continentalis* (Witherby, 1913). Встречается в небольшом числе на пролёте во второй половине мая. Зимой отмечена на острове Скребцова: 18 февраля 1962 добыт самец (Нечаев 1966).

Пуночка *Plectrophenax nivalis* subsp.? Редкая зимующая птица: 3 особи наблюдались 18 февраля 1962 на острове Скребцова.

Полевой воробей *Passer montanus dybowskii* Domaniewski, 1915. Гнездится в населённых пунктах островов Попова и Рейнеке и в заброшенных строениях на островах Рикорда и Большой Пелис. На последнем в 1967 и 1968 годах воробьи уже не гнездились.

Юрок *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758. Весной летит в апреле-мае. Последние птицы отмечены 17 мая 1965 и 25 мая 1967. Осенью первые юрки появляются в конце сентября.

Сибирский горный вьюрок *Leucosticte arctoa brunneonucha* (J.F. Brandt, 1842). Зимой, с ноября по март, наблюдается вдоль всего побережья залива Петра Великого, на острове Скребцова и, по-видимому, на других островах (Нечаев 1964). Весной последние птицы встречены 16 апреля 1966 на острове Большой Пелис.

Чечётка *Acanthis flammea flammea* (Linnaeus, 1758). В отдельные годы обычна на пролёте в апреле – начале мая. В 1965 году последняя птица наблюдалась на острове Большой Пелис 15 мая. Зимой, 28-30 ноября 1968, стая численностью около 20 птиц наблюдалась на острове Попова.

Чиж *Spinus spinus* (Linnaeus, 1758). Обычный пролётный вид. Стаи из 10-50 и более птиц встречаются в апреле – первой половине мая. Последняя стая отмечена 15 мая 1965, а в 1968 году – в первых числах июня. Осенью первые стаи появляются в конце сентября.

Китайская зеленушка *Chloris sinica ussuriensis* E.Hartert, 1903. Отмечена на пролёте и зимовке. Небольшие стайки наблюдались на острове Большой Пелис во второй половине мая, а на острове Попова – 9 декабря 1966 и 13 марта 1957.

Клёст-еловик *Loxia curvirostra japonica* Ridgway, 1885. Весьма не-

регулярно встречается на кочёвках. Над островом Большой Пелис одна птица пролетела в северном направлении 16 июня и 7 птиц – в юго-западном направлении 17 июня 1967.

Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus grebnitskii* Stejneger, 1885. Немногочисленный, но регулярно пролётный вид. Весной одиночки и стайки отмечены 10-24 мая. Осенью наблюдалась стайка из 4 птиц 21 сентября 1965 на острове Большой Пелис.

Сибирская чечевица *Carpodacus roseus* (Pallas, 1776). Редкая зимующая птица. Одиночки отмечены 28-30 ноября 1968 на острове Попова.

Урагус *Uragus sibiricus ussuriensis* Buturlin, 1915. Гнездится на островах Попова (около 10 пар), Желтухина (2-3 пары), Клыкова и Наумова (по 1-2 пары), Рейнеке и Рикорда (5-6 пар), Большой Пелис (6-18 пар), Стенина, Матвеева и Де-Ливрона. После зимних кочёвок птицы появились на острове Большой Пелис в начале апреля. На острове Рейнеке 27 мая 1968 в зарослях полыни найдено гнездо с 4 свежими яйцами. Зимующие птицы наблюдались 28-30 ноября 1968 на острове Попова.

Дальневосточный снегирь *Pyrrhula griseiventris rosacea* Seebohm, 1882. Нерегулярно бывает на пролёте. Отмечен на острове Большой Пелис в небольшом количестве в апреле – первой половине мая 1965 года и во второй половине мая 1968 года, а на острове Рикорда 23 апреля 1966.

Серый снегирь *Pyrrhula cineracea* Cabanis, 1872. Одиночки и небольшие стайки пролётных птиц наблюдались на острове Большой Пелис до 13 мая в 1965 и до 21 мая в 1968 году.

Малый черноголовый дубонос *Eophona migratoria migratoria* E. Hartert, 1903. Гнездится на островах Попова, Рейнеке, Рикорда, Большой Пелис, Стенина и Де-Ливрона (по 1-2 пары на каждом). Прилетает в первой половине мая. В отдельные годы крупные стаи (по 150 и более) пролётных птиц встречались во второй половине мая. На острове Попова в конце июня взрослые птицы кормили птенцов в гнёздах. Осенью основная часть малых черноголовых дубоносов отлетает в начале сентября. Одиночки отмечены на острове Большой Пелис 21 сентября 1965.

Большой черноголовый дубонос *Eophona personata magnirostris* E.Hartert, 1896. В небольшом числе отмечался на пролёте в мае на острове Большой Пелис.

Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccotrallstes schulpini* H. Johansen, 1944. Обычен на пролёте. Весной одиночки и стаи из 20-40 птиц наблюдались в течение всего мая. Осенью 1966 года первые обыкновенные дубоносы появились 3 сентября; основной пролёт происходит в сентябре-октябре.

★ ★ ★

Наземная орнитофауна островов залива Петра Великого резко обеднена в сравнении с прилежащими частями материка, что объясняется многими причинами. Прежде всего необходимо отметить крайне неблагоприятные погодные (метеорологические) условия весны и первой половины лета: низкие температуры, холодные и сырые ветры, ежедневные туманы. Это приводит к слабой активности и низкой численности насекомых и других наземных беспозвоночных (недостаток пищевых ресурсов) в этот период. Важной причиной является дефицит территории, а в некоторых случаях – отсутствие пригодного биотопа или влияние деятельности человека.

По числу видов наземная фауна птиц резко преобладает над прибрежно-морской, но по величине популяций она не идёт с ней ни в какое сравнение. Даже наиболее «многочисленные» наземные виды насчитывают лишь немногие десятки пар на самых крупных островах. Неблагоприятные климатические условия и связанная с этим низкая численность наземных птиц являются причиной того, что целый ряд видов гнездится на островах не каждый год. Эти виды просто не имеют постоянных островных популяций. Наиболее благоприятны условия островов для прибрежно-морских колониальных птиц. На это указывает сотенное и даже тысячное население отдельных видов – чернохвостой чайки, очкового чистика, малой качурки.

Относительно велика доля залётных видов в фауне островов. В этом сказывается особое положение островов в полосе контакта суши и моря и их малая площадь, резко увеличивающая вероятность встречи даже с единичными особями. Однако можно допустить и известный «кумулятивный эффект» для сухопутных видов, оказавшихся в открытом море. Наибольшее число залётов приходится на весеннее время.

На островах залива Петра Великого очень ярко протекает пролёт, главным образом сухопутных птиц. Весной чётко выражены два пролётных направления. Первое – на северо-северо-восток, вдоль островной гряды к полуострову Муравьёва-Амурского и далее внутрь материка. Второе – на восток, к острову Аскольд и далее вдоль побережья к мысу Поворотный.

Весной пролётные птицы не задерживаются на островах. Чаще всего они летят вдоль гряды, не останавливаясь. Однако в непогоду здесь скапливается громадное количество мигрантов. Именно в непогоду, во второй половине апреля – начале мая (максимум пролёта насекомоядных) отмечаются случаи гибели птиц: пеночек, синехвосток, овсянок и некоторых других. Вероятная причина – недостаток пищи, о котором говорилось выше. Ограниченность объектов питания приводит и к другому любопытному явлению. Часто приходилось наблюдать, как многие строго лесные виды: личинкоед, синяя мухоловка, синехвостка и

др., – держатся в совершенно чуждой для них экологической обстановке: на лугах и болотах, в зарослях кустарников и полыни. Только здесь, у самой поверхности почвы, в защищённых от ветра и лучше прогреваемых местах не прекращается деятельность беспозвоночных. Леса же, насквозь продуваемые холодными ветрами, почти безжизненны. На весеннем пролёте многие виды немногочисленны, некоторые встречаются единично или же вообще наблюдаются не каждую весну.

Осеннее движение птиц также имеет два направления. Одно – на юго-юго-запад, через острова вдоль или внутрь материка. Так летят кукушки, широкорот, часть хищников и большинство воробьиных птиц. Другое – почти строго на юг в открытое море. Этим направлением следует большинство уток и часть куликов.

Продолжительная, очень тёплая, сухая и солнечная осень и обилие пищи приводят к тому, что на островах скапливается масса пролётных птиц. Пролёт становится растянутым и имеет чётко выраженный волнообразный характер, совершенно не связанный с изменениями погоды. Большинство видов осенью многочисленны. Ослабевшие или погибшие наземные птицы не наблюдались. Исключение составляют лишь морские птицы, частота гибели которых весной и осенью почти одинакова. Основная причина их гибели – загрязнение перьев. Чаще всего от этого страдают конюги-крошки, старики, очковые чистики, кайры и некоторые другие птицы.

В настоящее время своеобразная и, пожалуй, единственная в Советском Союзе орнитофауна островов залива Петра Великого нуждается в самой строгой и неотложной охране. Это касается в первую очередь морских колониальных птиц, численность которых с каждым годом сокращается. Сейчас эти птицы уже перестали гнездиться на островах Попова, Рейнеке и Рикорда, а на островах Русский и Римского-Корсакова сохранились лишь немногочисленные гнездовые скопления. На других островах небольшие колонии морских птиц находятся на грани исчезновения.

Беспощадным образом всё в более возрастающих масштабах разоряется браконьерами птичий базар на острове Карамзина, где гнездятся японский и берингов бакланы, тонкоклювая кайра, тупик-носорог, старик, очковый чистик, чернохвостая чайка и малая качурка. Здесь находится единственная в Советском Союзе колония пестролицего буревестника. На этом острове жители островов Попова и Рейнеке ежегодно собирают яйца и даже птенцов чернохвостой чайки, тупика-носорога, пестролицего буревестника и других птиц.

24 мая 1968, посетив остров Карамзина, мы обнаружили, что «базар» почти нацело уничтожен. На острове были найдены лишь редко расположенные гнёзда с одним, реже с двумя яйцами: основная площадь «базара» пустовала. Также были разрыты норы тупиков-носоро-

гов и пестролицых буревестников. Рыбакам и трепапголовам хорошо известен птичий базар на острове Карамзина и он регулярно разграбляется. Разоряются и другие «базары». На острове Верховского в норе был найден мёртвый, сильно покалеченный тупик-носорог, а на берегу обнаружены разбитые яйца этого вида.

Систематический сбор яиц чаек на острове Карамзина приводит к тому, что остров не полностью заселяется птицами, откладка яиц затягивается до середины июня, вылет птенцов задерживается, свободные участки зарастают травой, мешающей птенцам передвигаться по острову. К тому же взрослые и частично молодые птицы нередко отстреливаются браконьерами в водах островов. Все это ведёт к резкому сокращению численности чаек на «базаре». Подвергаются разорению птичьи базары и на островах Римского-Корсакова.

В настоящее время острова залива Петра Великого становятся местом массового отдыха трудящихся Владивостока. Можно ожидать, что это ещё более усугубит бедственное положение оставшихся птичьих базаров. Здесь необходимы срочные меры разъяснительного и административного порядков. Во время пролёта и зимовок птиц на островах процветает браконьерство, несмотря на существующий и всем известный запрет на производство охоты в этом районе, который относится к пригородной зоне Владивостока.

В целях сохранения птичьих базаров, да и всей островной фауны и флоры необходимо в самое ближайшее время острова Верховского, Карамзина и Римского-Корсакова объявить памятниками природы.

Литература

Бианки В.Л. 1913. Colymbiformes и Procellariiformes // *Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Академии наук*. Птицы **1**. СПб.: 1-979.

Воробьёв К.А. 1954. *Птицы Уссурийского края*. М.: 1-360.

Глущенко Ю.Н., Нечаев В.А., Редькин Я.А. 2016. *Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор*. М.: 1-523.

Емельянов А.А. 1937. Птичий базар на острове Карамзина // *Вест. Дальневост. фил. АН СССР* **26**: 143.

Иванов А.И., Штегман Б.К. 1964. *Краткий определитель птиц СССР*. М.,Л.: 1-528.

Лабзюк В.И., Назаров Ю.Н. (1967) 2017. О редких и новых птицах южного Приморья // *Рус. орнитол. журн*. **26** (1478): 3152-3155.

Лафер Г.Ш., Назаров Ю.Н. 1967. Косматый поползень *(Sitta villosa* Verr.) – новый вид авифауны СССР // *Зоол. журн*. **46**, 4: 629-630.

Литвиненко Н.М., Шибаев Ю.В., Назаров Ю.Н. (1972) 2020. Пестролицый буревестник *Calonectris leucomelas* – новый гнездящийся вид в фауне СССР // *Рус. орнитол. журн*. **29** (1947): 3169-3171.

Масленников Б.Г. 1965. Новые данные о малой вилохвостой качурке // *Зап. Приморск. фил. Геогр. общ-ва СССР* **24**: 157-158.

Назаренко А.А. 1971. Краткий обзор птиц заповедника «Кедровая Падь» // *Орнитологические исследования на юге Дальнего Востока*. Владивосток: 12-51.

Нечаев В.А. 1964. О зимовках курильского горного вьюрка в Южном Приморье // *Сообщ. Дальневост. фил. СО АН СССР*. Сер. биол. **23**: 137-139.
Нечаев В.А. (1966) 2007. Некоторые наблюдения за птицами в Южном Приморье // *Рус. орнитол. журн*. **16** (358): 652-654.
Нечаев В.А., Юдаков А.Г. (1967) 2017. О гнездовании краснощёкого скворца *Sturnia philippensis* на юге Приморья // *Рус. орнитол. журн*. **26** (1449): 2139-2140.
Нечаев В.А, Юдаков А.Г. 1968. О гнездовании морских птиц на островах залива Петра Великого (Южное Приморье) // *Изв. Сиб. отд. АН СССР*. Сер. биол.-мед. наук **15**, 3: 93-97.
Фирсов М.А. (1928) 2010. Китайская качурка *Oceanodroma monorhis* в окрестностях Владивостока // *Рус. орнитол. журн*. **19** (612): 2062-2063.
Черский А.И. 1916. Экспедиция по берегам и островам залива Петра Великого // *Отчёт Общества изучения Амурского края за 1914 г*. Владивосток: 8-11.
Шульпин Л.М. 1927. Новые данные по распространению птиц в Южно-Уссурийском крае и описание новых форм // *Ежегодн. Зоол. музея Акад. наук* **28**, 3: 398-406.
Шульпин Л.М. 1936. *Промысловые, охотничьи и хищные птицы Приморья*. Владивосток: 1-436.
Шунтов В.П. 1965. Сезонные аспекты в распределении морских птиц в открытых водах Японского моря // *Зоол. журн*. **44**, 3: 411-122.
Netschajew W.A. 1969. Zur Biologie von Swinhoes Wellenläufer im Saliw Petra Welikogo // *Falke* **16**, 1: 12-16.
Taczanowski L. 1893. Faune ornithologique de la Sibérie Orientale // *Mém. Acad. Sci. St.-Pétersb*. Sér. 7. **39**: 1-1278.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1981**: 4660-4661*

К фауне птиц Владивостока

Ю.Н.Назаров

Второе издание. Первая публикация в 1965[*]

По наблюдениям 1959-1964 годов во Владивостоке встречается не менее 42 видов птиц. Из них в городе гнездится только 8 видов: белопоясный стриж *Apus pacificus*, рыжепоясничная ласточка *Hirundo daurica*, горная трясогузка *Motacilla cinerea*, белая трясогузка *Motacilla alba*, восточная синица *Parus minor*, сибирский жулан *Lanius cristatus*, полевой воробей *Passer montanus* и китайская зеленушка *Chloris sinica*.

Кормовые условия в городе значительно менее благоприятны для птиц, поэтому здесь обитают главным образом виды, полностью или частично живущие за счёт человека (полевой воробей, белая и горная трясогузки, китайская зеленушка), или же кормящиеся за пределами

[*] Назаров Ю.Н. 1965. К фауне птиц Владивостока // *Тез. докл. и сообщ. на секции общественных наук 8-й Дальневост. конф. молодых специалистов*. Владивосток: 109-110.

города (белопоясный стриж и рыжепоясничная ласточка). Обеспеченность кормом влияет и на количественную сторону гнездящихся птиц. Наиболее многочисленны полевой воробей и белопоясный стриж, наименее – сибирский жулан т восточная синица. Этой же причиной отчасти определяются и сроки прилёта – в городе птицы появляются несколько позже, чем в естественных ландшафтах.

Основная масса видов (19) птиц, встречающихся во Владивостоке. представлена пролётными и кочующими: перевозчик *Actitis hypoleucos*, малый зуёк *Charadrius dubius*, пустельга *Falco tinnunculus*, орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*, обыкновенный сарыч *Buteo buteo*, восточная совка *Otus sunia*, седой дятел *Picus canus*, степной конёк *Anthus richardi*, сойка *Garrulus glandarius*, пищуха *Certhia familiaris*, серый личинкоед *Pericrocotus divaricatus*, ополовник *Aegithalos caudatus*, буробокая белоглазка *Zosterops erythropleurus*, светлоголовая пеночка *Phylloscopus coronatus*, желтоголовый королёк *Regulus regulus*, сизый дрозд *Turdus hortulorum*, седоголовая овсянка *Emberiza spodocephala*, обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes*, малый черноголовый дубонос *Eophona migratoria*. Численность многих птиц этой группы очень низкая и появляются они в городе только во время массового пролёта (май и сентябрь). Как правило, птицы мало задерживаются в городе. Лишь как исключение бывают случаи, когда отдельные особи держатся в палисадниках и скверах несколько дней (светлоголовая пеночка, седоголовая овсянка).

Зимой, хотя общая масса птиц во Владивостоке низка, количество видов много выше, чем в гнездовый период. В 1959-1964 годах в зимний период, кроме полевого воробья, восточной синицы и китайской зеленушки, было зарегистрировано 13 видов зимующих птиц: ошейниковая совка *Otus bakkamoena*, болотная сова *Asio flammeus*, длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*, белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos*, малый острокрылый дятел *Dendrocopos kizuki*, восточная чёрная ворона *Corvus corone orientalis*, большеклювая ворона *Corvus macrorhynchos*, сорока *Pica pica*, серый сорокопут *Lanius excubitor*, обыкновенный свиристель *Bombycilla garrulus*, болотная гаичка *Parus palustris*, московка *Parus ater*, поползень *Sitta europaea*, чечётка *Acanthis flammea*, сибирский горный вьюрок *Leucosticte arctoa*.

Качественный и количественный состав птиц довольно мало изменяется по годам. Наибольшей численности достигают синицы, поползень и сибирский горный вьюрок. Многие же виды встречаются крайне редко.