ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал

2022
XXXI

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
2217
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXXI
Экспресс-выпуск • Express-issue

2022 № 2217

СОДЕРЖАНИЕ

3547-3552 Первые случаи размножения лутка *Mergellus albellus* на водоёмах национального парка «Себежский». С. А. ФЕТИСОВ

3552-3553 Случай гнездования шилохвости *Anas acuta* в Калбинском нагорье. Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ, А. С. ФЕЛЬДМАН

3554-3559 Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus* – новый пролётный вид в орнитофауне Западного Алтая. Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ

3559-3561 Особенности распределения куликов по антропогенным элементам ландшафта дельты Волги. Д. В. БОНДАРЕВ, С. Д. БОНДАРЕВ

3561 Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria* в дельте Волги. В. В. ВИНОГРАДОВ

3562-3563 О встрече большой стаи дальневосточного кроншнепа *Numenius madagascariensis* на юге Приморья. О. Н. ВАСИК

3564-3565 Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* в Приморье. М. А. ОМЕЛЬКО

3566-3578 Некоторые обобщения наблюдений и новые материалы по птицам заповедника «Кедровая падь». Ю. Б. ШИБНЕВ

3578-3579 Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* на реке Бикин. Б. К. ШИБНЕВ

3579-3580 Азиатский бекасовидный веретенник *Limnodromus semipalmatus* в Бурятии. А. П. ШКАТУЛОВА

3580-3581 Послегнездовые и осенние миграции веслоногих и голенастых птиц в низовьях дельты Волги. Д. В. БОНДАРЕВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Санкт-Петербургский университет

© Русский орнитологический журнал, 2022
Дата опубликования: 21 августа 2022

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXXI
Express-issue

2022 № 2217

CONTENTS

3547-3552 The first cases of breeding of the smew *Mergellus albellus* on lakes of the Sebezh National Park. S. A. FETISOV

3552-3553 Nesting case of the northern pintail *Anas acuta* in the Kalba Uplands. N. N. BEREZOVIKOV, A. S. FELDMAN

3554-3559 The crested honey buzzard *Pernis ptilorhynchus* – a new migratory species in the avifauna of Western Altai. N. N. BEREZOVIKOV

3559-3561 Features of the distribution of waders by anthropogenic elements of the landscape of the Volga delta. D. V. BONDAREV, S. D. BONDAREV

3561 The golden plover *Pluvialis apricaria* in the Volga delta. V. V. VINOGRADOV

3562-3563 Encountering a large flock of the Far Eastern curlew *Numenius madagascariensis* in the south of Primorye. O. N. VASIK

3564-3565 The Far Eastern curlew *Numenius madagascariensis* in Primorye. M. A. OMELKO

3566-3578 Some generalizations of observations and new materials on the birds of the Kedrovaya Pad Reserve. Yu. B. SHIBNEV

3578-3579 The Far Eastern curlew *Numenius madagascariensis* on Bikin river. B. K. SHIBNEV

3579-3580 The Asian dowitcher *Limnodromus semipalmatus* in Buryatia. A. P. SHKATULOVA

3580-3581 Post-breeding and autumn migrations of pelicans, cormorants, and herons in the lower reaches of the Volga delta. D. V. BONDAREV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University

© The Russian Journal of Ornithology, 2022

ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск ***2217****: 3547-3552*

Первые случаи размножения лутка *Mergellus albellus* на водоёмах национального парка «Себежский»

С.А.Фетисов

Сергей Анатольевич Фетисов. Национальный парк «Себежский»,
ул. 7 Ноября, д. 22, Себеж, Псковская область, 182250, Россия. E-mail: Seb_park@mail.ru

Поступила в редакцию 12 августа 2022

В недавно опубликованной обзорной статье о лутке *Mergellus albellus* в Псковской области (Фетисов 2022) были приведены сведения о том, что в южной части области – в Псковском Поозерье – лутка до 2014 года считали лишь транзитно пролётным видом. Однако за последующие после этого 7 лет удалось документально доказать с помощью фотографий 2 случая зимовок этого вида в Опочецком и Себежском районах (Фетисов, Яковлева 2014; Фетисов 2019), а также один случай размножения лутка на озере Лива в Себежском районе (Пукинская 2021). Таким образом, лутка в Псковской области теперь нужно считать пролётным, случайно гнездящимся и случайно зимующим видом (Фетисов 2022).

Рис. 1. Пара лутков *Mergellus albellus* на безымянном озере в 1 км к востоку от деревни Селявы. Национальный парк «Себежский». 12 мая 2018. Фото автора

Что касается размножения лутка в Псковской области, то до 2021 года этот вопрос никем даже не поднимался из-за отсутствия фактов, хотя в Себежском Поозерье регулярные наблюдения за этим видом проводятся с 1982 года, а с 1996 они ежегодно организуются на территории национального парка «Себежский» (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2013; и др.). К тому же с начала 2010-х годов в Парке постоянно пополняется

количество пригодных для размножения лутка искусственных гнездовий, так называемых «гоголятниц». Возможно, это способствовало тому, что в последнее десятилетие луток стал чаще появляться на водоёмах Парка в весенний период и не исключено, что отдельные особи и даже пары (рис. 1) могли оставаться на этой территории на лето. По крайней мере в 2018 году сразу 2 пары задержались в Парке по крайней мере до 12 мая*. Кроме того, на озере Озерявы отмечена встреча с одиночным лутком уже 16 августа 2009 (Фетисов 2021), тогда как осенняя миграция у этого вида в Псковской области проходит позднее, поэтому вполне вероятно, что он провёл лето где-то неподалёку.

Весной 2022 года в национальном парке «Себежский» удалось наблюдать сразу 4 пары лутков: одну – на озере Припеши и три – на озере Осыно, но все встречи с ними происходили не позднее апреля (Фетисов 2022). В связи с этим ничто не предвещало начало размножения лутков в Парке в текущем году. Тем не менее в конце июля – начале августа на озере Анисимовское (Анисимово) и на рыборазводном пруду возле деревни Чёрново (рис. 2) я обнаружил два выводка лутков (рис. 2).



Рис. 2. Места встреч выводков лутков *Mergellus albellus* в национальном парке «Себежский» в 2022 году. 1 – пруд возле деревни Чёрново; 2 – озеро Анисимовское

Первый выводок лутков встречен 29 июля 2022 во время проведения комплексных флористических и фаунистических исследований, затрагивающих большинство «значимых» водоёмов, подлежащих регулярному мониторингу. Обследуя на вёсельной лодке проточное озеро Аниси-

* По наблюдениям А.Вайткявичуса (1968) в Литве лутки начинают спариваться иногда уже в апреле.

мовское (50 га, очень сильно заиленное, глубина не более 2.5 м), Г.Ю.Конечная и С.А.Фетисов вспугнули самку лутка близ северного берега, где прибрежная часть озера между мысом и ручьями сильно заболочена и заросла густой и высокой водной растительностью, в том числе тростником *Phragmites australis* и рогозом широколистным *Typha latifolia*, а плёс – белой кувшинкой *Nymphaea alba* (рис. 3).

Рис. 3. Картосхема и вид на гнездовой участок лутков на озере Анисимовское. Места расположения: ■ – выводка лутков, ● – отлетевшей самки, ▲ – гоголятницы. Вверху слева – самка лутка. Внизу – вид на озеро. 29 июля 2022. Фото автора.

Вспугнутая нами самка сделала над местом взлёта у восточного основания мыса два круга, а потом отлетела на 200-250 м по направлению к ручьям и села на воду, где отдыхали несколько крякв *Anas platyrhynchos* и 6 самок хохлатой чернети *Aythya fuligula* и держалась пара лебедей-кликунов *Cygnus cygnus* (рис. 3). Осталось неизвестным число птенцов в выводке, так как они сразу после взлёта самки забились в непролазные заросли водной растительности. Судя по голосам, птенцы были ещё небольшие (возможно, даже пуховички), Из было не менее 3-4. В

100-120 м от места обнаружения выводка на берегу виднелась гоголятница. При попытке сфотографировать самку и приближении к группе отдыхавших рядом с ней птиц все они разлетелись в разные стороны, причём в отдалённые места озера. В отличие от них, самка лутка сначала затаилась и оставалась на своём прежнем месте, а потом взлетела, вернулась к тому месту, где она оставила выводок и, подобно птенцам, забилась в заросли.

Второй выводок лутков удалось отметить 8 августа 2022 на рыборазводном пруду (рис. 4) возле деревни Чёрново, где держались самка с 4 птенцами. Воду в этом пруду ежегодно спускают на зиму и снова наполняют пруд в апреле. Плёс пруда сильно зарос рдестами *Potamogeton* spp., а по мелководным местам – обширными куртинами тростника. В 2021 году на северо-восточном, наиболее глухом берегу пруда было вывешено 2 гоголятницы. За весь период наблюдений лутки впервые зарегистрированы на этом пруду в 2022 году.

Рис. 4. Рыбоводный пруд возле деревни Чёрново. 23 июня 2022. Фото А.Ю.Яковлева

Рыборазводный пруд у деревни Чёрново давно обследуется с берега и с вёсельной лодки по нескольку раз в году. В 2022 году орнитологические наблюдения на нём проводились не менее четырёх раз в апреле-июне. Удивительно, что выводок лутков удалось заметить только в начале августа. Самка лутка, как и на озере Анисимовское, при приближении человека по северному берегу заблаговременно взлетела и переместилась почти к противоположному берегу пруда; никаких приёмов отвода от птенцов она не демонстрировала. Птенцы же, судя по звукам, сначала побежали по воде к берегу и спрятались в тростниковых заро-

лях, а потом перемещались в них, оставаясь невидимыми для наблюдателя, находящегося на берегу. Вёсельную лодку птенцы к себе также близко не подпускали, уходя от неё скрытно вдоль прибрежных тростниковых зарослей. Только с плёса пруда, издали, их можно было иногда увидеть в тот момент, когда они появлялись на краю тростников для кормёжки и отдыха (рис. 5). По внешнему виду и размерам птенцы мало чем отличались от самки, но на крыло их поднять ни с берега ни с воды не удалось.

Рис. 5. Выводок лутка *Mergellus albellus* на рыбоводном пруду возле деревни Чёрново. Вверху слева – северный берег пруда. 23 июня 2022. Фото А.Ю.Яковлева; Вверху справа и внизу – выводок лутка в прибрежной полосе пруда. 8 августа 2022. Фото автора

Литература

Вайткявичус А. 1968. Видимые миграции водоплавающих и других водяных птиц в Литве // *Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц* **5**: 44-67.

Пукинская Л.Ю. 2021. Заметка о встрече выводков лебедя-кликуна *Cygnus cygnus* и лутка *Mergellus albellus* в Себежском районе Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **30** (2131): 5109-5112. EDN: ZNHIMG

Фетисов С.А. 2013. *Птицы Псковского Поозерья*. Т. 1. История изучения орнитофауны. Гагары, поганки, веслоногие. Себеж: 1-285. (Тр. нац. парка «Себежский». Вып. 3).

Фетисов С.А. 2019. Результаты инвентаризации и мониторинга орнитофауны национального парка «Себежский» (по состоянию на 2019 год) // *Рус. орнитол. журн.* **28** (1776): 2459-2492. EDN: XXPZMB

Фетисов С.А. 2021. Неворобьиные птицы национального парка «Себежский»: аннотированный список видов (по состоянию на июль 2021 года) // *Рус. орнитол. журн.* **30** (2090): 3147-3189. EDN: EISWRY

Фетисов С.А. 2022. Птицы Псковской области: луток *Mergellus albellus* // *Рус. орнитол. журн.* **31** (2203): 2889-2905. EDN: XCAXQQ

Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2002. *Птицы Себежского Поозерья и национального парка «Себежский»*. СПб. 1: 1-152.

Фетисов С.А., Яковлева М.С. 2014. О случаях зимовки лутка *Mergellus albellus* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* **23** (990): 1200-1205. EDN: RZKNIB

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2217**: 3552-3553*

Случай гнездования шилохвости *Anas acuta* в Калбинском нагорье

Н.Н.Березовиков, А.С.Фельдман

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, д. 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru
Александр Сергеевич Фельдман. Средняя общеобразовательная школа № 28, ул. Б.Момышулы, д. 57, г. Семей, Восточно-Казахстанская область, 071400, Казахстан. E-mail: papafe@mail.ru

Поступила в редакцию 17 августа 2022

На озёрах Калбинского нагорья редкое гнездование шилохвости *Anas acuta* было известно в 1950-1960-х годах, но в последующие десятилетия она встречалась здесь только в период весенних и осенних миграций, а также во время линьки (Егоров и др. 2000; Березовиков и др. 2013). Исчезновение шилохвости на гнездовании совпало с началом депрессии численности вида в южной части её ареала в 1970-1980-х годах, когда она практически перестала гнездиться на водоёмах бассейна Верхнего Иртыша.

После длительного периода отсутствия случаев регистрации размножения этого вида в Калбе 1 июля 2022 в среднем течении реки Кызылсу между сёлами Шалабай и Черниговка (49°39′58″ с.ш., 81°28′14″ в.д.) на придорожных разливах, поросших осокой, рогозом и мелким тростником, был встречен выводок из 5 оперённых, но ещё не летающих молодых шилохвостей (рис. 1, 2). Первоначально они были ошибочно приняты за молодняк красноголового нырка *Aythya ferina* (Березовиков, Фельдман 2022), поэтому в этой публикации исправляем эту досадную ошибку.

Рис. 1. Выводок шилохвости *Anas acuta*. Между сёлами Шалабай и Черниговка. Западная часть Калбы. 1 июля 2022. Фото А.С.Фельдмана

Рис. 2. Молодая шилохвость *Anas acuta*. Калба. 1 июля 2022. Фото А.С.Фельдмана.

Литература

Березовиков Н.Н., Смелянский И.Э., Барашкова А.Н., Томиленко А.А. 2013. Орнитологические наблюдения в Калбинском нагорье в 2006 году // *Рус. орнитол. журн.* **22** (869): 1011-1027. EDN: PXRKFJ

Березовиков Н.Н., Фельдман А.С. 2022. Находка выводка красноголового нырка *Aythya ferina* в Калбинском нагорье // *Рус. орнитол. журн.* **31** (2210): 3231-3233. EDN: ZBVVLT

Егоров В.А., Самусев И.Ф., Березовиков Н.Н. 2000. Водоплавающие птицы Калбинского нагорья (Восточный Казахстан) // *Selevinia:* 117-124.

ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск ***2217****: 3554-3559*

Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus* – новый пролётный вид в орнитофауне Западного Алтая

Н.Н.Березовиков

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, д. 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 17 августа 2022

Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus* в XX столетии считался исключительно редкой пролётной птицей в восточных, юго-восточных и южных районах Казахстана (Сушкин 1938; Шнитников 1949; Корелов 1962; Gavrilov, Gavrilov 2005). Во втором томе сводки «Птицы Казахстана» упоминается лишь о 9 коллекционных экземплярах этого осоеда, добытых в Казахстане со времён Н.А.Северцова (Корелов 1962). Редкость тушек в коллекциях объяснялась трудностью коллектирования осоедов, чаще всего наблюдаемых парящими на большой высоте. Существовали также определённые сложности с визуальным определением *P. ptilorhynchus* из-за вариаций в окраске оперения, к тому же нередко летящего в одно время с похожим на него обыкновенным осоедом *P. apivorus*.

В настоящее время благодаря активным любительским фотосъёмкам хищных птиц выяснилось, что хохлатые осоеды регулярно встречаются во время весенних и осенних миграций вдоль Западного и Северного Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, Тарбагатая и Алтая. Достаточно отметить, что на сайте «Птицы Казахстана» (Birds kz) в 2006-2022 годах было зафиксировано 103 встречи хохлатых осоедов, документированные 248 фотографиями, отснятыми в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

Рис. 1. Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus*. Черная Уба. Западный Алтай. 19 августа 2014. Фото А.Исабекова



Рис. 2. Река Чёрная Уба. Западно-Алтайский заповедник. 5 октября 2015. Фото А.Гавриловой

В казахстанской части Алтая в XX веке была известна всего лишь одна встреча хохлатого осоеда в Бухтарминской долине на северном склоне хребта Сарымсакты в Южном Алтае, где 26 сентября 1926 в коллекцию был добыт молодой самец (Сушкин 1938). В последнем десятилетии благодаря фотосъёмкам всех встречающихся хищных птиц удалось выявить ещё два случая появления *P. ptilorhynchus* на этом же хребте. Так, 27 августа 2018 одного осоеда, парящего над вершиной хребта, удалось сфотографировать в верховьях реки Таутекели (2740 м н.у.м.), правого притока Сарымсакты (Воробьёв 2018). Другой хохлатый осоед был снят 5 июня 2019 на хребте Сарымсакты летающим у верхней границы кедрового леса на высоте 2300 м (Воробьёв, Березовиков 2022).

Рис. 3 (слева). Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus*. Река Палевская Разливанка у северного подножия Ивановского хребта. 4 сентября 2019. Фото А.Клименко.
Рис. 4 (справа). Риддерская долина и северный склон Ивановского хребта. Август 2013 года. Фото Ю.Яновского

На Западном Алтае, включая территорию Западно-Алтайского заповедника, достоверных регистраций хохлатого осоеда не было известно

(Сушкин 1938; Корелов 1962; Щербаков 1986; Щербаков, Березовиков 2005). Первая встреча парящего над лесом хохлатого осоеда, документированная фотографией А.Исабекова (www.birds.kz), произошла 19 августа 2014 в долине Чёрной Убы в горно-таёжной части Западного Алтая (рис. 1, 2).

Рис. 5. Река Белая Уба у села Поперечное. Западный Алтай.
10 сентября 2018. Фото Н.Петрова

Рис. 6. Ущелье реки Громотухи. Ивановский хребет. 1.07.2016. Фото В.Гармаша

Рис. 7. Пойма Иртыша в Усть-Каменогорске. 12 июня 2017. Фото Е.Домашева

Рис. 8. Пойма Ульбы в центре Усть-Каменогорска. 29 сентября 2013. Фото В.Зенкова

Рис. 9. Ульбинская долина у села Топиха. 1 июня 2016. Фото М.Черепанова

Рис. 10 (слева). Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus*. Усть-Каменогорск. 8 мая 2018. Фото В.Колесникова.
Рис. 11 (справа). Хохлатый осоед. Усть-Каменогорск. 11 мая 2018. Фото В.Колесникова

Рис. 12 (слева). Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus*. Усть-Каменогорск. 18 мая 2019. Фото К.Андрусенко.
Рис. 13 (справа). Хохлатый осоед. Усть-Каменогорск. 21 сентября 2015. Фото В.Колесникова.

Рис. 14. Хохлатый осоед *Pernis ptilorhynchus*. Усть-Каменогорск.
29 сентября 2015. Фото В.Колесникова.

В последующие годы в Риддерской долине встречено ещё два хохлатых осоеда у северного подножия Ивановского хребта, из них один 4 сентября 2019 на речке Палевская Разливанка, левом притоке Белой Убы (А.Клименко, www.birds.kz) (рис. 3), другой – 3 октября 2020 в ущелье реки Громотухи, притоке Ульбы (А.Клименко, М.Мерц, www.birds.kz) (рис. 4-6). Ряд наблюдений мигрирующих хохлатых осоедов, подтверждённых фотографиями, сделан в Усть-Каменогорске, включая пойму Иртыша и его притока Ульбы (рис. 7-9). Весенние наблюдения приходятся на 8 и 11 мая 2018, 18 мая 2019 (В.Колесников, К.Андрусенко, www.birds.kz) (рис. 10-12). Осенью хохлатых осоедов встречали здесь 3 сентября 2015 (Н.Ким, www.birds.kz), 29 сентября 2015 и 21 сентября 2020 (В.Колесников, www.birds.kz) (рис. 13, 14).

Таким образом, только в последнем десятилетии благодаря «охоте с фотоаппаратом» местных любителей птиц на Западном Алтае было зарегистрировано 9 достоверных встреч с хохлатыми осоедами, из них 3 весной и 6 осенью. Эти наблюдения свидетельствуют, что эти хищные птицы во время миграций летят через Западный Алтай по долинам рек Ульба, Белая и Чёрная Уба. Приведённые данные дополняют фаунистический список птиц Западного Алтая и Западно-Алтайского заповедника ещё одним пролётным видом.

Литература

Воробьёв В.М. 2018. Птицы высокогорья хребта Сарымсакты (Южный Алтай) // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1679): 4961-4997. EDN: MAKJYT

Воробьёв В.М., Березовиков Н.Н. 2022. Птицы биосферного резервата Катон-Карагай // *Тр. Катон-Карагайского национального парка*. Усть-Каменогорск, **2**: 317-471.

Корелов М.Н. 1962. Отряд хищные птицы – Falconiformes // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **2**: 488-707.

Сушкин П.П. 1938. *Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо-Западной Монголии*. М.; Л.:, **1**: 1-320.

Шнитников В.Н. 1949. *Птицы Семиречья*. М.; Л.: 1-665.

Щербаков Б.В. 1986. *Птицы Западного Алтая*. Автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: 1-22.

Щербаков Б.В., Березовиков Н.Н. 2005. Птицы Западно-Алтайского заповедника // *Рус. орнитол. журн.* **14** (290): 507-536. EDN: IBMXAP

Gavrilov E.I., Gavrilov A.E. 2005. The Birds of Kazakhstan // *Tethis ornithological research* **2**: 1-226.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2217**: 3559-3561*

Особенности распределения куликов по антропогенным элементам ландшафта дельты Волги

Д.В.Бондарев, С.Д.Бондарев

*Второе издание. Первая публикация в 1980**

В результате хозяйственной деятельности человека в верхней и средней зонах дельты Волги образовались полезащитные лесные полосы, оросительные каналы, значительные площади рисовых полей (чеков) и рыбоводных прудов. Нижнюю зону и авандельту пересекли рыбоходные каналы, создав ряд вытянутых по направлению к Каспийскому морю низких приканаловых островков. Все перечисленные антропогенные

* Бондарев Д.В., Бондарев С.Д. 1980. Особенности распределения куликов по антропогенным элементам ландшафта дельты Волги // *Новое в изучении биологии и распространении куликов: Материалы 2-го совещ. по фауне и экологии куликов*. М.: 51-53.

элементы ландшафта повлияли на распределение куликов, особенно во время летне-осенних миграций.

Наблюдения проводились в центральной и восточной частях дельты Волги в районах сёл Началово, Ассадулаево, Тузуклей, Грушево, Володаровка и на Тишковском канале с мая по ноябрь 1975-1977 годов, а также в июле-августе 1978 года.

Для каждого отдельного элемента ландшафта характерны определённые виды куликов, встречающихся во время летних кочёвок и осенних миграций. Количество птиц и частота встреч соответствуют порядку перечисления.

В лесных насаждениях со второй половины сентября до середины ноября (в зависимости от погодных условий) обычны вальдшнепы *Scolopax rusticola*.

Оросительные каналы и канавы, пересекающие поля и заросшие по берегам травянистой растительностью, привлекают таких куликов, как травник *Tringa totanus*, перевозчик *Actitis hypoleucos*, бекас *Gallinago gallinago*, черныш *Tringa ochropus*, реже фифи *Tringa glareola*. Значительных стай куликов в этих стациях не встречалось, обычны одиночки или стайки из 2-3 птиц.

Рисовые поля, занимающие в центральной части дельты значительные площади, большую часть лета залиты водой. Здесь в массе встречается турухтан *Philomachus pugnax*, чибис *Vanellus vanellus*, ходулочник *Himantopus himantopus*, реже и не образуя больших стай – бекас, щёголь *Tringa erythropus*, перевозчик, черныш, поручейник *Tringa stagnatilis*. Так, 2 августа 1975 на обсыхающих рисовых чеках в районе села Тузуклей нами было учтено до 12 тыс. турухтанов, причём в отдельных стаях было 2.3-3 тыс. особей. У чибиса обычны стаи в 15-25 особей, у ходулочника – 5-12 особей. Щёголь, поручейник, черныш встречены поодиночке.

Рыбоводные пруды, окаймлённые по берегам довольно крутыми валами и имеющие обширную водную поверхность, в сентябре значительно мелеют. Среди прудов образуется множество илистых низких островков, привлекающих стаи бекасов, турухтанов, веретенников, ходулочников. По берегам единичными экземплярами обычны фифи, перевозчик, черныш. В более позднее время (октябрь) встречены стайки круглоносых плавунчиков *Phalaropus lobatus*.

Приканаловые островки (бровки) служат местом отдыха и кормёжки многим видам куликов с июля по октябрь. На открытых песчаных островках гнездится кулик-сорока *Haematopus ostralegus* (обычно в колониях чайковых). Поросшие надводной растительностью островки привлекают турухтанов, больших веретенников *Limosa limosa*, бекасов, причём турухтаны и веретенники иногда образуют тысячные скопления (сентябрь), стаи бекасов достигают 30 особей. Подобные же стаи образуют

различные песочники, песчанка *Calidris alba*, круглоносый плавунчик. Отдельными особями и небольшими стайками из 5-7 птиц отмечены камнешарка *Arenaria interpres*, большой улит *Tringa nebularia*, фифи.

Отличительной особенностью распределения куликов в 1978 году было скопление их на временных водоёмах (лужах, полоях, мочажинах), образовавшихся в результате необычно высокого меженного уровня воды. По данным Астраханской гидрометобсерватории, подобный уровень воды наблюдался в 1928 году (120 см выше обычного в середине августа). Речные отмели и многие приканаловые островки оказались затопленными, и основной путь пролёта куликов в августе 1978 года сместился к северу на 60-70 км.

ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск ***2217****: 3561*

Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria* в дельте Волги

В.В.Виноградов

*Второе издание. Первая публикация в 1979**

Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria* на зимовке в Кызыл-Агачском заповеднике отмечалась орнитологами почти ежегодно (Греков 1965), но на пролёте в дельте Волги её никогда не встречали и в списках птиц названного региона она не значится (Воробьёв 1936; Луговой 1963).

27 октября 1969 в урочище Макарчата (Дамчикский участок Астраханского заповедника) низко пролетели на юго-запад две птицы. Одна из них была добыта. Это был молодой самец золотистой ржанки в зимнем наряде.

Литература

Воробьёв К.А. 1936. Материалы к орнитологической фауне дельты Волги и прилежащих степей // *Тр. Астраханского заповедника* **1**: 3-52.

Греков В.С. 1965. Материалы по веслоногим, куликам и пастушкам Кызыл-Агачского госзаповедника // *Тр. заповедников Азербайджана* **1**: 80-113.

Луговой А.Е. 1963. Птицы дельты реки Волги // *Тр. Астраханского заповедника* **8**: 9-185.

* Виноградов В.В. 1979. Золотистая ржанка *(Pluvialis apricaria* L.) в дельте Волги // *Природная среда и птицы побережий Каспийского моря и прилежащих низменностей*. Баку: 244

ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск ***2217****: 3562-3563*

О встрече большой стаи дальневосточного кроншнепа *Numenius madagascariensis* на юге Приморья

О.Н.Васик

Ольга Николаевна Васик. Дальневосточное отделение РАН. Ул. Светланская, д. 50, Владивосток, 690091, Россия. E-mail: vasikvasik@yandex.ru

Поступила в редакцию 20 августа 2022

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* внесён в Красную книгу России (2021) и Красный список МСОП как находящийся в состоянии, близком к угрозе исчезновения.

В Приморском крае дальневосточный кроншнеп гнездится локально в западном секторе от низовий рек Бикин, Большая Уссурка и Уссури к югу до Приханкайской низменности. На юге Приморья регулярно встречается в период сезонных миграций (Глущенко и др. 2016). На весеннем пролёте в вершинной части Амурского залива (устья рек Шмидтовка и Раздольная) в апреле обычны одиночки, группы из нескольких десятков особей. В.А.Нечаев (2006) указывает, что самые крупные стаи включали до 120 особей. В литературе есть указание, что самая крупная группа из пролётных кроншнепов 9 апреля 1964 насчитывала около 500 особей (Омелько 1976).

В связи с этим представляет интерес встреченное 19 апреля 2022 в устье реки Шмидтовки скопление дальневосточных кроншнепов, которые кормилась в мелководной части Амурского залива (рис. 1). Когда птицы поднялись, всю стаю удалась снять на фотокамеру, при подсчёте на снимке в поднявшейся стае оказалось 313 особей (рис. 2).

Автор выражает благодарность О.А.Бурковскому за помощь в подготовке сообщения.

Рис. 1. Дальневосточные кроншнепы *Numenius madagascariensis*. Амурский залив. 19 апреля 2022. Фото О.Н.Васик

Рис. 3. Дальневосточных кроншнепы *Numenius madagascariensis*.
Амурский залив. 19 апреля 2022. Фото О.Н.Васик

Литература

Глущенко Ю.Н., Нечаев В.А., Редькин Я.А. 2016. *Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор*. М.: 1-523.

Красная книга Российской Федерации: Животные. 2021. 2-е изд. М.: 1-1128.

Нечаев В.А. (2006) 2016. Весенние миграции птиц в долине реки Раздольной (Южное Приморье) // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1271): 1269-1276. EDN: VOXGRD

Омелько М.А. (1976) 2022. Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* // *Рус. орнитол. журн.* **31** (2217): 3564-3565.

ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск ***2217****: 3564-3565*

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* в Приморье

М.А.Омелько

*Второе издание. Первая публикация в 1976**

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* принадлежит к обыкновенным птицам Уссурийского края. На весеннем пролёте эти кроншнепы появляются довольно редко. По нашим многолетним наблюдениям (1949-1971), на полуострове Де-Фриза (Амурский залив) начало их пролёта было отмечено в разные числа первой декады апреля. Отдельные встречи передовых особей – 30 марта 1963 и 30 марта 1970 и 1971 на полуострове Де-Фриза, 30 марта 1945 у озера Ханка (станция Лебехе – ныне Тиховодное).

В начале своего пролёта дальневосточные кроншнепы летят одиночками, по 2-3 особи и небольшими стайками из 9-20 птиц. В устье реки Шмидтовки после встречи передовой стайки (11 апреля 1962) на следующий день (12 апреля) наблюдался массовый пролёт птиц. Было отмечено несколько стай численностью от 40 до 150 особей. Две стаи из 50-100 особей наблюдались 27 апреля. Затем с перерывами в разных числах мая попадались небольшие стаи из 10-15 птиц, а 28 мая отмечена, стая из 50 особей.

Пролёт кроншнепов в 1964 году был примерно таким же, как и в 1962 году. Так, 9 апреля три больших стаи, собравшиеся вместе около устья Шмидтовки, образовали общий табун численностью около 500 птиц. С перерывами, не каждый день, птицы летели в течение всего апреля и мая. В этом сезоне большие стаи были отмечены в следующие сроки: одна стая из 35 птиц – 27 апреля, три из 9, 16 и 150 особей – 28 апреля, из 83 птицы – 4 мая. В дальнейшем кроншнепы попадались не каждый день небольшими стайками до 27 мая. Сравнивая пролёт кроншнепов рассмотренных сезонов с периодами 1970-1971 годов, видно резкое уменьшение численности птиц. В 1970 году при каждодневном учёте птиц на стационаре кроншнепы были отмечены в следующие сроки: 28 марта – 2 одиночные птицы, 8 апреля – стая из 7 птиц, 16 апреля – стая из 8 птиц, 13 апреля – стая из 3 птиц, 27 апреля – стая из 50 птиц, 17 мая – одиночка и стая из 5 особей, 20 мая – одиночка, 24 мая – стая из 11 птиц, 27 мая – стая из 15 экземпляров, 29 мая – стая из 3 птиц.

Общая картина пролёта и встреч дальневосточных кроншнепов в 1971 году была такова: 30 марта – одиночка, 4 апреля – стаи из 4 и 8

* Омелько М.А. 1976. Дальневосточный кроншнеп // *Тр. Окского заповедника* **13**: 159-161.

птиц, 5 апреля – стая из 12 особей, 7 апреля – стая из 40 птиц, 8 мая – 2 птицы, 11 мая – стая из 9 особей, 12 мая – стая из 40 птиц, 18 мая – стая из 6 особей, 22 мая – 2 птицы, 2 июня – одиночка.

Весенний пролёт дальневосточных кроншнепов на полуострове Де-Фриза начинается в конце марта и заканчивается в первых числах июня. В это время пищей кроншнепов являются береговые крабы, в обилии встречающиеся на мелководье залива.

На осеннем пролёте дальневосточные кроншнепы ещё более малочисленны. Передовые птицы начинают лететь к югу в июле (22 июля 1965, 29 июля 1966). Пролёт кроншнепов в 1971 году, как и в другие годы, протекал слабо. За весь период они были отмечены всего несколько раз: 8 августа – одиночка, 5 сентября – одиночка, 11 сентября – 2 молодые птицы, 12 сентября – одиночка.

Таковы сравнительные данные о пролёте дальневосточных кроншнепов в разные годы.

Несмотря на ограничение сроков охоты, в последние годы численность дальневосточных кроншнепов на полуострове Де-Фриза в местах их ежегодных остановок резко снизилась. Причина этого заключается в следующем.

Во-первых, непомерно большая армия охотников, блокирующих приустьевые участки рек, не даёт возможности птицам оседать в своих исконных угодьях, служивших им для отдыха и кормления в течение многих тысячелетий.

Во-вторых, в последние годы участились случаи посещения рыбаками-любителями приустьевых участков, где они организуют ночёвки и жгут костры, что создаёт препятствия для отдыха перелётных птиц.

В-третьих, на побережье частными лицами ставятся сети для ловли рыбы и процветает охота с моторных лодок, производится отлов креветок в прибрежной полосе. Лодки бороздят морские пространства и в ночное время, сгоняя птиц с их пристанищ, что ещё более усугубляет создавшееся ненормальное положение.

Всё это и является главной причиной уменьшения численности на полуострове Де-Фриза не только дальневосточных кроншнепов, но и аистов, журавлей и других птиц. Необходимы срочные мероприятия, которые запрещали бы пребывание охотников и рыбаков в местах ежегодных скоплений птиц на морском побережье и в приустьевых участках рек. Строгая охрана и запрет охоты вблизи населённых пунктов могли бы снизить истребление редких видов птиц.

ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск ***2217****: 3566-3578*

Некоторые обобщения наблюдений и новые материалы по птицам заповедника «Кедровая падь»

Ю.Б.Шибнев

*Второе издание. Первая публикация в 1992**

Все предыдущие работы по орнитологии, касающиеся заповедника «Кедровая падь» (Назаренко 1971; Панов 1973; Глущенко, Шибнев 1984), проведены не только на его территории, но и на обширных сопредельных территориях. Число видов птиц заповедника и окрестностей только в последней упомянутой работе составляет 333, из которых 117 гнездятся. В настоящей работе приведён список гнездящихся, пролётных, зимующих и залётных видов птиц, отмеченных автором за последние 20 лет только в пределах официальных границ заповедника (см. приложение), то есть исключая сопредельные крупные реки, акватории Амурского залива, приграничное плато и т.п., которые в ряде предыдущих работ рассматривались как «заповедник Кедровая падь».

Поскольку ландшафт заповедника представляет собой сравнительно однообразную облесённую гористую местность с небольшими ключами и речками и незначительными луговыми пространствами, то число видов птиц, встречающихся здесь, не так велико (Васильев и др. 1984).

В статье приводятся отдельные выводы по учётам гнездящихся, пролётных и зимующих птиц, а также материалы по изучению зависимости плотности гнездования птиц от кормовых и климатических условий, пребывания пролётных видов на территории заповедника, состава и численности зимующих птиц в зависимости от кормовой базы, то есть от обилия или отсутствия кормов, характерных для той или иной группы птиц, и некоторые новые биологические и фаунистические наблюдения.

Материалы фенологических наблюдений по птицам заповедника и о методах учёта птиц уже опубликованы (Шибнев 1984, 1987).

Численность и плотность птиц как на гнездовании, так и в период пролётов и на зимовках меняется из года в год по ряду причин, основные из которых следующие.

1. При оседании птиц на гнездование в заповеднике – это прежде всего состояние вида в целом (увеличение или сокращение численности), на что, собственно, также влияют общие результаты зимовки в южных районах и условия на пролётных путях, а для оседлых и незначительно

* Шибнев Ю.Б. 1992. Некоторые обобщения наблюдений и новые материалы по птицам заповедника «Кедровая падь» // *Современное состояние флоры и фауны заповедника «Кедровая падь»*. Владивосток: 145-163.

кочующих видов – кормовые и климатические условия в зимний период и на местах гнездования. Здесь нужно отметить, что отдельные виды каким-то образом «предчувствуют» то, что данный гнездовой сезон будет неблагоприятным (холодным, дождливым) и несмотря на обильный пролёт весной, на гнездование остаются в очень незначительном числе, в то время как в другие, более сухие и тёплые весенне-летние сезоны они оседают на гнездование с большей плотностью. Загнездившиеся же птицы из-за продолжительных дождей и холодов бросают гнёзда с кладками, а при улучшении погодных условий вновь приступают к размножению. И так бывает до 3-4 раз за сезон, но в результате к концу лета некоторые птицы так и не выводят потомства. Жилые гнёзда при затяжной дождливой погоде бросают не только мелкие воробьиные птицы. Например, свежие и насиженные кладки бросают иглоногие совы *Ninox scutulata*, что отмечалось неоднократно, но при этом ко второй кладке они как правило не приступают. Наиболее часто при неблагоприятных условиях бросают гнёзда овсянки и камышевки.

Одна из основных причин, влияющая на численность на гнездовании – кормовые условия. Так, многолетние наблюдения показали, что на гнездящихся насекомоядных птицах неблагоприятно сказываются предыдущие морозные и малоснежные зимы, после которых заметно снижается численность насекомых и других беспозвоночных и обычно бывает холодное дождливое лето. По-видимому, в такие зимы плохо перезимовывают многие беспозвоночные – часть их вымерзает, другие же становятся более доступными для птиц и других животных. На некоторые виды оказывают сильное влияние осенние и весенние палы (здесь имеется ввиду не прямая гибель гнёзд, а лишь последствия палов). Особенно заметно это сказывается на сибирском жулане *Lanius cristatus*, несмотря на то, что он приступает к гнездованию после подъёма высокотравья. После палов на выгоревших пространствах гнездится в 3-4 раза меньше жуланов, а некоторых камышевок – в 1.5-2 раза меньше. На изменение видового состава и плотности птиц на гнездовании влияет также изменение стаций – зарастание опушек и лугов кустарником и мелколесьем, но это происходит медленно, в течение 5-10 и более лет, пожары же влияют резко – в один сезон.

О влиянии массового размножения мышевидных грызунов на плотность гнездования ошейниковой совки *Otus bakkamoena*, длиннохвостой неясыти *Strix uralensis* и даже орнитофага тетеревятника *Accipiter gentilis* в 1978 году уже сообщалось (Шибнев 1983, 1989; Глушенко, Шибнев 1984). Однако после 1978 года по настоящее время более не было такого массового размножения мышевидных грызунов и как результат – ошейниковые совки совсем не отмечались на гнездовании, тетеревятники – далеко не ежегодно, а длиннохвостые неясыти не гнездились с такой большой плотностью. Данные наблюдения показывает, что многие виды

птиц в период миграций и кочёвок плотно оседают на гнездование в оптимально благоприятных в кормовом отношении местах.

Некоторое виды по невыясненным причинам находятся многие годы в состоянии депрессии или гнездятся активно. Так, согласно Е.Н.Панову (1973), в 1960-х годах в заповеднике на гнездовании были обычны тигровый *Lanius tigrinus* и особенно японский *L. bucephalus* сорокопуты. Только в Гаккелевском ключе гнездилось до 7 пар японских сорокопутов. В 1970-е годы их гнездование регистрировалось нами лишь дважды по одной паре, а в 1980-е годы эти сорокопуты вовсе не гнездились. За это же двадцатилетие тигровый сорокопут отмечался на гнездовании только один раз.

Значительные колебания численности на гнездовании регистрируются у короткокрылой камышевки *Horeites canturians*. Если при хорошем состоянии вида в нижней части реки Кедровой обычно остаётся до 5 самцов и 12-16 самок, то в 1988 году этих камышевок не было совсем, исчезли из этого района и малые кукушки *Cuculus poliocephalus*, паразитирующие на этом виде. Значительно варьирует численность и у некоторых дятлов. Если в первое пятилетие 1970-х годов большой пёстрый дятел *Dendrocopos major* был большой редкостью или вовсе не отмечался в заповеднике, то за последние 15 лет он стал здесь довольно обычным. В то же время за последние 3 года резко упала численность малого пёстрого дятла *Dendrocopos minor*. Так, если ранее на 1 км маршрута учитывалось до 3-4 гнездящихся пар, то к настоящему времени – не более 1 пары. Также за последние 3 года почти в 1.5 раза снизилась численность на гнездовании и зимовках карликового, или малого острокрылого дятла *Yungipicus kizuki* и вовсе перестал отмечаться большой острокрылый дятел *Yungipicus canicapillus*. За последнее десятилетие заметно упала численность гнездящихся уссурийских совок *Otus sunia*, но почти в 2 раза возросла численность иглоногих сов.

2. На осеннем пролёте время пребывания птиц в заповеднике полностью зависит от кормовых условий данного сезона, а видовой состав – от изменения миграционных путей тех или иных видов, на что заметно влияют кормовые условия в более северных районах. Например, в отдельные годы ни чечётки *Acanthis flammea*, ни чижи *Spinus spinus* не отмечаются ни зимой, ни осенью, в то время как в другие годы они обычны в оба сезона. На это не влияет и обилие корма – птицы либо зимуют севернее, либо пролетают другим путём. Но если в заповеднике в обилии их пища – серёжки берёз и ольхи – и путь чечёток и чижей проходит в том числе и через заповедник, то в значительном числе они остаются здесь и на зимовку.

Если насекомоядные птицы как правило укладываются в обычные сроки пролёта, то виды, в рацион которых входят в значительной степени и плоды лесных растений, в зависимости от наличия корма могут

надолго задержаться и даже зимовать. Так, если обильно плодоносит бархат амурский *Phellodendron amurense*, жимолость Маака *Lonicera maackii*, жостер даурский *Rhamnus dahurica* и яблоня маньчжурская *Malus mandshurica*, то дрозды Науманна *Turdus naumanni*, пролетающие через заповедник, остаются здесь надолго, а иногда и на зимовку. В 1970-х годах отмечались зимующие стаи до 20 и более птиц, однако в последнее десятилетие отмечались только одиночные зимующие особи. Дрозды предпочитают плоды яблони и бархата. К весне, когда плоды уже съедены, дрозды кормятся беспозвоночными на незамерзающих перекатах рек и ключей. При обильном плодоношении указанных растений в долине реки Кедровой, зимует до 10-15 голубых сорок *Cyanopica cyanus*. При хорошем плодоношении сирени амурской *Syringa amurensis* с осени больше оседает в заповеднике сибирских чечевиц *Carpodacus roseus*, а при обильном плодоношении омелы окрашенной *Viscum coloratum* с осени на зимовку остаются стаи обыкновенных *Bombycilla garrulus* и амурских *B. japonica* свиристелей. Если в заповеднике хороший урожай на жёлуди дуба монгольского *Quercus mongolica*, а в более северных районах он не плодоносит, то кочующие к югу сойки *Garrulus glandarius* концентрируются в дубняках заповедника. Так, в годы слабого плодоношения дуба на 6 км маршрута у южных склонов сопок вдоль дубняков регистрировалось не более 2-3 соек, а при обильном – до 8-12. При обилии желудей фазаны *Phasianus colchicus* встречаются в смешанных лесах по склонам сопок вдали от лугов, что совсем не характерно для этих птиц.

Особое влияние на многих птиц оказывает обильный урожай корейского кедра *Pinus koraiensis* и пихты цельнолистной *Abies holophylla*, и особенно благоприятно для птиц то, что в отдельные года шишки на этих деревьях не опадают до весны, и тогда на зимовку остаются большие черноголовые дубоносы *Eophona personata*, много обыкновенных дубоносов *Coccothraustes coccothraustes*, щуры *Pinicola enucleator*. В кедрово-широколиственных лесах концентрируются дятлы, поползни *Sitta europaea*, болотные гаички *Poecile palustris*, в массе остаются зимовать московки *Periparus ater* и восточные синицы *Parus minor*, в то время как в другие годы последние два вида редки на зимовке (см. таблицу). Зима 1988/89 года изобиловала оставшимися шишками на кедрах и пихтах, а ольхи и берёзы железные *Betula schmidtii* были усыпаны серёжками, и в результата «плодоношения» последних на зимовку осталось много чечёток и чижей. Данные взяты из 3 январских учётов, причём из каждого учёта взято наибольшее количество встреченных птиц. Для примера приведён такой же учёт, но в неурожайный сезон 1987/88 года.

3. Ни зимовку птиц в заповеднике влияют те же факторы, что и осенью – это обилие или недостаток кормов и миграционные пути разных видов осенью. В предыдущем разделе о зимовке многих видов уже было

сказано, здесь будут приведены данные о зимовке лишь некоторых видов птиц.

Зимний учёт птиц на 6-километровом маршрута то долине реки Кедровой при обильном плодоношении кедра корейского, пихты цельнолистной и ольхи волосистой (1988/89 год) и в неурожайный сезон (1987/88 год)

Вид	Зимы	
	1967/88	1988/89
Buteo (buteo) japonicus	1	3
Aquila chrysaetos	1	1
Haliaeetus albicilla	1	1
Haliaeetus pelagicus	1	–
Aegypius monachus	–	1
Tetrastes bonasia	2	1
Strix uralensis	–	1
Picus canus	–	2
Dryocopus martius	–	1
Dendrocopos major	–	2
Dendrocopos leucotos	2	4
Dendrocopos minor	1	–
Yungipicus canicapillus	1	–
Yungipicus kizuki	4	4
Lanius borealis sibiricus	–	1
Garrulus glandarius	3	2
Cyanopica cyanus	–	2
Corvus macrorhynchos	8	6
Bombycilla garrulus	–	6
Bombycilla japonica	11	–
Troglodytes troglodytes	2	1
Turdus naumanni	1	1
Aegithalos caudatus	8	10
Poecile palustris	12	48
Periparus ater	–	36
Parus minor	1	30
Sitta europaea	20	24
Certhia familiaris	2	4
Spinus spinus	–	30
Acanthis flammea	–	16
Carpodacus roseus	2	2
Pinicola enucleator	–	2
Pyrrhula sp.	1	3
Eophona personata	–	4
Coccothraustes coccothraustes	–	20

Одними из немногих видов, поддерживающих постоянную численность в заповеднике, являются большеклювая ворона *Corvus macrorhynchos* и белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos*. Оба вида зимой держатся на своих гнездовых участках. Особенно это характерно для ворон. Плотность на гнездовании у большеклювых ворон из года в год одна и та же. Так как не 6-киломотровом маршрута по долине реки Кедровой их насчитывается не более 6-7 пар. Как правило, большее время дня зимой они проводят на гнездовых участках. Время от времени они взлетают высоко над вершинами сопок и высматривают, не появилась ли где па-

даль. Стоит одной вороне обнаружить, в частности, остатки трапезы леопарда *Panthera pardus* и полететь с криком к ней, как с окрестных участков туда же направляются другие пары. Таким образом, у кормного места собираются почти все вороны заповедника, наибольшее отмеченное их число – до 60-65 птиц. В противоположность большеклювым воронам, чёрные вороны *Corvus corone orientalis* днём кормятся на окультуренных участках, а на ночь летят на хребты заповедника, где их скапливается до 200 особой. Большинство из них – это мигрирующие с севера птицы, среди которых незначительное число составляют и большеклювые вороны. Гнездятся чёрные вороны в перелесках по окраинам заповедника.

Длиннохвостая неясыть – обычный гнездящийся и зимующий вид заповедника (Шибнев 1989). При обилии мышевидных грызунов и низком снежном покрове эти птицы хорошо переживают зиму, но при высоком снежном покрове и когда после оттепели снег покрывается коркой наста и тем более при депрессии мышевидных грызунов часть неясытей гибнет от голода, однако некоторые заранее делают запасы из крупной добычи. Мы наблюдали три таких случая. Причём прячет неясыть недоеденные остатки в полудуплах пней и под вывороты корней упавших деревьев, где добычу не заносит снегом. Во всех трёх случаях добычей были вороны: 2 большеклювые и 1 чёрная. Первое наблюдение сделано в конце 1970-х годов у вершины сопки вблизи ночёвки ворон. Проходившие мимо выворотня самке леопарда и её детёныши вытащили из-под него ворону и съели, оставив кучу перьев, однако полной уверенности, что это был запас длиннохвостой неясыти, не было. 1 января 1989 я наблюдал, как неясыть вытащила из пня обезглавленную и уже подсохшую ворону и днём пыталась её съесть. Третий раз – 24 декабря 1990 – также днём была выпугнуть неясыть из-под выворотня, где была обнаружена ещё незамёрзшая ворона, которая тоже была с отъеденной головой. Все эти зимы были многоснежными с депрессией мышевидных грызунов.

Материал по зимовкам орланов уже публиковался (Шибнев 1931). В среднем орланы отмечаются в заповеднике с середины октября до середины марта. В распадки ключей и рек заповедника они прилетают обычно на отдых и ночёвку, либо в редких случаях пользуются остатками трапезы леопарда или падалью, но как правило кормятся на морском побережье или на соседних о заповедником крупных реках. При этом численность орланов, в частности, отдыхающих в долине реки Кедровой, постепенно или резко возрастает к середине февраля и достигает пика во второй его половине. Многолетние наблюдения позволяют сделать вывод, что в этот период на акватории Амурского заливе скапливается наибольшее их число за зимний период в результате того, что с севера ешё продолжают прикочёвывать белоплечие *Haliaeetus pelagucis* и бе-

лохвостые *H. albicilla* орланы в результате замерзания морских и речных вод и в то же время зимующие южней орланы начинают кочёвки к северу на места гнездовий. В заповеднике орланы отдыхают, как правило, все на небольшом участке у реки и на склоне сопки на деревьях, садятся на лёд реки и иногда купаются на мелководьях. От морского побережья оно находится в 6 км. На отдыхе обычно более 15-20 орланов не регистрируется, но в течение дня это число постоянно меняется – одни птицы улетают в море, другие прилетают на отдых. Например, в 1989 году нарастание числа орланов в долине реки Кедровой шло так: 10 февраля было отмечено 8 белоплечих и 2 белохвостых орлана, 15 февраля – 7 белоплечих и 7 белохвостых орденов, 16 февраля – соответственно 4 и 17, причём 3 белоплечих орлана летали-токовали в воздухе, 18 февраля в 12 ч наблюдалось 2 белоплечих и 3 белохвостых орлана, а в 16 ч – соответственно 3 и 6 птиц.

4. На весенний перелёт птиц особое влияние оказывают преимущественно погодные условия, в результате чего птицы тех или иных видов летят либо раньше, либо позднее. Внезапное похолодание может задержать птиц на неделю и более.

Новые наблюдения редких видов птиц в заповеднике «Кедровая падь»

Белокрылая цапля *Ardeola bacchus*. Наблюдалась на реке Кедровой недалеко (0.5 км) от усадьбы заповедника 4-6 июня 1983.

Японская кваква *Gorsachius goisagi*. Отмечена 3 мая 1988 в 300 м выше усадьбы по реке Кедровой.

Хохлатый орёл *Nisaetus nipalensis*. Впервые в заповеднике зарегистрирован 10 июня 1988. Его атаковала группа большеклювых ворон на склоне сопки в нижней части реки Кедровой. Зимой 1988/89 года одна птица неоднократно регистрировалась в средней части реки Кедровой. Летом 1989 года хохлатый орёл дважды отмечался в районе ключей Сухой и 2-й Золотой, где на склоне сопки в средней части огромной пихты 12 июня было обнаружено большое гнездо, явно принадлежащее этому виду, а под ним тушка белки *Sciurus vulgaris* с отъеденной головой. По-видимому, орёл прервал трапезу перед приближением человека и кричал недалеко в лесу. Гнездо оказалось недоступным для осмотра, несколько перекошенным и, видимо, было брошено орлами. Следующую зиму и весну одна птица держалась в верховьях реки Кедровой, где долгое враля питалась остатками добычи леопарда – пятнистым оленем *Cervus nippon*. Данные наблюдения не оставляют сомнений в гнездовании хохлатого орла в заповеднике.

Хохлатый орёл ведёт очень скрытый образ жизни. Вспугнутый орёл ни разу не взлетал выше леса и не кружился в воздухе, он всегда улетал низом под кронами деревьев и отлетев на безопасное расстояние вновь

садился на дерево. В полёте в лесу он напоминает тетеревятника, длинный хвост даёт возможность ему хорошо лавировать между деревьев. Иногда в улёт он напоминает молодого орлана-белохвоста, но последний, будучи потревоженным, всегда взлетает высоко над лесом и начинает парить в воздухе. Пролетающий над головой наблюдателя хохлатый орёл очень сильно напоминает хохлатого осоеда и в природе наблюдатели, вероятно, принимают его за последний вид.

Чеглок *Falco subbuteo*. Редкий для заповедника вид. Первое гнездование его в заповеднике отмечено в 1986 году. Гнездо найдено 1 июля в полосе ольхи японской *Alnus japonica* внизу южного склона Сухореченского хребта. Чеглок загнездился в старом гнезде чёрной вороны на ольхе на высоте около 8 м. На момент обнаружения в нём находились 3 насиженных яйца. Вылупившиеся позднее птенцы погибли от какой-то болезни. Ранее, в середине июня, пара чеглоков держалась у гнезда сороки *Pica pica*на реке Кедровой выше железнодорожного моста, но затем исчезла.

Зелёный голубь *Treron sieboldii*. Отмечен поющим у устья ключа 1-й Золотой 29 июня 1989. Это вторая встреча вида в заповеднике.

Ошейниковый зимородок *Halcyon pileata* Наблюдался на реке Кедровой 11-12 мая 1983 у центральной усадьбы заповедника. Он то садился на высокие деревья в средней их части, то летал низко над водой и время от времени бросался в воду и выхватывал из потока мелкую пеструшку.

Японский сорокопут *Lanius bucephalus*. Последнее гнездование и встреча данного вида в заповеднике были в 1979 году.

Тигровый сорокопут *Lanius tigrinus*. Единственная встреча одиночного тигрового сорокопута за последние 20 лет зарегистрирована в заповеднике 6 июня 1985.

Короткопалый бюльбюль *Hypsipetes amaurotis*. Пара бюльбюлей наблюдалась возле усадьбы заповедника 7 ноября 1984. Они держались в стае дроздов Науманна и свиристелей и вначале кормились плодами жимолости Маака, затем улетели в сторону от стаи, сели на вершину дерева над рекой и временами, слетая с дерева, ловили на лету насекомых.

В приложении дан список видов птиц заповедника, составленный на основании двадцатилетиях наблюдений (1971-1990). Всего в формальных границах заповедника зарегистрировано 182 вида, из которых 95 гнездятся и для 2 видов предполагается гнездование, 75 – исключительно пролётные птицы, 66 видов отмечены зимующими и 9 видов – залётные. Кроме того, надо отметить залетающих в долину реки Кедровой заблудившись в непогоду лебедей-кликунов *Cygnus cygnus* и пролетающих иногда над заповедником японских *Grus japonensis* и даурских *G. vipio*, журавлей (Шибнев 1988) и отмеченных впервые для заповедника 24 сентября 1990 в 1 ч ночи чёрных журавлей *Grus monacha*. Про-

летают над заповедником стаи гусей и ночью некоторые утки и кулики, но точно определить их невозможно.

Статус «редкий», «обычный» и «многочисленный» для разных видов разный. Многочисленный – когда вид образует на гнездовании, пролёте или зимовке наибольшую численность, которую он может представлять, обычный – образующий примерно среднюю численность, а редкий – ниже средней.

Приложение. Виды птиц заповедника «Кедровая падь»

Гн – гнездящийся, Пр – пролётный, Зим – зимующий, Залёт –залётный (цифрами указано число залётов за 20 лет); статус: р – редкий, о – обычный, м – многочисленный.

Вид	Гн	Пр	Зим	Залёт	Статус
Зелёная кваква *Butorides striata amurensis*	+	+			о
Японская кваква *Gorsachius goisagi*				3	р
Белокрылая цапля *Ardeola bacchus*				1	р
Серая цапля *Ardea cinerea jouyi*	+	+			р
Чёрный аист *Ciconia nigra*		+			р
Кряква *Anas platyrhynchos platyrhynchos*	+	+			р
Чирок-свистунок *Anas crecca crecca*		+			р
Мандаринка *Aix galericulata*	+	+			о
Скопа *Pandion haliaetus haliaetus*		+			р
Хохлатый осоед *Pernis ptilorhyncus orientalis*	+	+			р
Чёрный коршун *Milvus migrans lineatus*		+			р
Полевой лунь *Circus cyaneus cyaneus*		+			р
Пегий лунь *Circus melanoleucos*	+	+	+		р
Тетеревятник *Accipiter gentilis schvedowi*	+	+	+		р
Перепелятник *Accipiter nisus nissosimilis*		+	+		р
Китайский перепелятник Accipiter soloensis	+	+			р
Малый перепелятник *Accipiter gularis gularis*	+	+			Р
Зимняк *Buteo lagopus menzbieri*		+			о
Восточный канюк *Buteo buteo japonicus*	+	+			о
Ястребиный сарыч *Butastur indicus*	+	+			р
Хохлатый орёл *Nisaetus nipalensis orientalis*	?		+		р
Большой подорлик *Aquila clanga*		+			р
Беркут *Aquila chrysaetos kamtschatica*		+	+		о
Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*		+	+		о
Белоплечий орлан *Haliaeetus pelagicus*		+	+		о
Чёрный гриф *Aegypius monachus*		+	+		о
Сапсан *Falco peregrinus japonensis*		+			р
Чеглок *Falco subbuteo subbuteo*	+	+			р
Амурский кобчик *Falco amurensis*		+			р
Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus perpallidus*		+			р
Рябчик *Tetrastes bonasia amurensis*	+		+		о
Немой перепел *Coturnix japonica*	+	+			о
Фазан *Phasianus colchicus pallasi*	+		+		о
Пятнистая трёхперстка *Turnix tanki blanfordii*	+	+			р
Большой *погонышPorzana paykullii*	+	+			о
Малый зуёк *Charadrius dubius curonicus*	+	+			р
Чибис *Vanellus vanellus*		+			о
Черныш *Tringa ochropus*		+			о
Перевозчик *Actitis hypoleucos*	+	+			р
Бекас *Gallinago gallinago gallinago*		+			о

Вид	Гн	Пр	Зим	Залёт	Статус
Японский бекас *Gallinago hardwickii*	+	+			р
Лесной дупель *Gallinago megala*		+			о
Азиатский бекас *Gallinago stenura*		+			о
Горный дупель *Gallinago solitaria*			+		о
Вальдшнеп *Scolopax rusticola*	+	+			о
Чернохвостая чайка *Larus crassirostris*		+			о
Скальный голубь *Columba rupestris rupestris*	+	+	+		р
Большая горлица *Streptopelia orientalis orientalis*	+	+			о
Зелёный голубь *Treron sieboldii sieboldii*				2	р
Ширококрылая кукушка *Hierococcyx fugax hyperythrus*	+	+			о
Индийская кукушка *Cuculus micropterus micropterus*		+			р
Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus canorus*	+	+			о
Глухая кукушка *Cuculus saturatus horsfieldi*	+	+			м
Малая кукушка *Cuculus poliocephalus poliocephalus*	+	+			о
Ушастая сова *Asio otus otus*		+	+		р
Болотная сова *Asio flammeus flammeus*		+			р
Уссурийская совка *Otus sunia stictonotus*	+	+			р
Ошейниковая совка *Otus bakkamoena ussuriensis*	+	+	+		р
Иглоногая сова *Ninox scutulata ussuriensis*	+	+			о
Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis nikolskii*	+	+	+		о
Большой козодой *Caprimulgus indicus jotaka*		+			р
Иглохвостый стриж *Hirundapus caudacutus caudacutus*		+			р
Белопоясный стриж *Apus pacificus pacificus*		+			о
Восточный широкорот *Eurystomus orientalis calonyx*	+	+			р
Ошейниковый зимородок *Halcyon pileata*				2	р
Обыкновенный зимородок *Alcedo atthis bengalensis*	+	+			о
Удод *Upupa epops saturata*	+	+			р
Вертишейка *Jynx torquilla chinensis*	+	+			о
Седой дятел *Picus canus jessoensis*	+				о
Желна *Dryocopus martius martius*	?		+		р
Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*	+		+		о
Белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos sinicus*	+		+		о
Рыжебрюхий дятел *Dendrocopos hyperythrus subrufinus*				1	р
Малый пёстрый дятел *Dendrocopos minor amurensis*	+	+	+		о
Большой острокрылый дятел *Yungipicus canicapillus doerriesi*	+		+		р
Малый острокрылый дятел *Yungipicus kizuki permutatus*	+	+	+		м
Деревенская ласточка *Hirundo rustica gutturalis*		+			о
Рыжепоясничная ласточка *Cercopis daurica japonica*	+	+			о
Полевой жаворонок *Alauda arvensis intermedia*	+	+			о
Степной конёк *Anthus richardi ussuriensis*		+			р
Зелёный конёк *Anthus hodgsoni yunnanensis*		+			о
Краснозобый конёк *Anthus cervinus cervinus*		+			р
Горная трясогузка *Motacilla cinerea robusta*	+	+			о
Белая трясогузка *Motacilla alba leucopsis*	+	+			о
Камчатская трясогузка *Motacilla lugens*		+			о
Древесная трясогузка *Dendronanthus indicus*		+			р
Японский сорокопут *Lanius bucephalus bucephalus*	+	+			р
Тигровый сорокопут *Lanius tigrinus*		+			р
Сибирский жулан *Lanius cristatus*	+	+			о
Северный сорокопут *Lanius borealis sibiricus*		+	+		р

Вид	Гн	Пр	Зим	Залёт	Статус
Китайская иволга *Oriolus chinensis diffusus*	+	+			о
Малый скворец *Sturnia sturnina*	+	+			р
Серый скворец *Sturnus cineraceus*	+	+			о
Сойка *Garrulus glandarius brandtii*	+	+	+		о
Голубая сорока *Cyanopica cyanus pallescens*	+	+	+		о
Сорока *Pica pica jankowskii*	+	+	+		р
Кедровка *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*				2	р
Большеклювая ворона *Corvus macrorhynchos mandshuricus*	+	+	+		м
Восточная чёрная ворона *Corvus corone orientalis*	+	+	+		о
Ворон *Corvus corax kamtschaticus*		+	+		р
Свиристель *Bombycilla garrulus garrulus*		+	+		о
Амурский свиристель *Bombycilla japonica*		+	+		о
Серый личинкоед *Pericrocotus divaricatus divaricatus*	+	+			р
Короткопалый бюльбюль *Hypsipetes amaurotis*				1	р
Бурая оляпка *Cinclus pallasii pallasii*	+		+		о
Крапивник *Troglodytes troglodytes peninsulae*	+	+			о
Сибирская завирушка *Prunella montanella badia*	+				р
Короткохвостка *Urosphena squameiceps ussurianus*	+	+			о
Короткокрылая камышевка *Horeites canturians borealis*	+	+			о
Таёжный сверчок *Locustella fasciolata*		+			р
Певчий сверчок *Locustella certhiola*	+	+			о
Пятнистый сверчок *Locustella lanceolata*		+			р
Чернобровая камышевка *Acrocephalus bistrigiceps bistrigiceps*	+	+			м
Восточная дроздовидная камышевка *Acrocephalus orientalis*	+	+			о
Толстоклювая камышевка *Phragmaticola aedon rufescens*	+	+			м
Таловка *Phylloscopus borealis*		+			о
Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus*	+				о
Бледноногая пеночка *Phylloscopus tenellipes*	+				о
Светлоголовая пеночка *Phylloscopus coronatus*	+	+			м
Зарничка *Phylloscopus inornatus inornatus*		+			о
Корольковая пеночка *Phylloscopus proregulus*	+	+			о
Бурая пеночка *Phylloscopus fuscatus fuscatus*		+			р
Толстоклювая пеночка *Phylloscopus schwarzi*	+	+			о
Желтоголовый королёк *Regulus regulus japonensis*		+	+		р
Желтоспинная мухоловка *Ficedula zanthopygia*	+	+			о
Таёжная мухоловка *Ficedula mugimaki*		+			р
Восточная малая мухоловка *Ficedula albicilla*		+			р
Синяя мухоловка *Cyanoptila cyanomelana intermedia*	+	+			о
Сибирская мухоловка *Muscicapa sibirica*		+			о
Пестрогрудая мухоловка *Muscicapa griseisticta*		+			р
Ширококлювая мухоловка *Muscicapa dauurica*		+			р
Черноголовый чекан *Saxicola torquata stejnegeri*	+	+			о
Синий каменный дрозд *Monticola solitarius philippensis*		+			р
Белогорлый дрозд *Petrophila gularis*	+	+			р
Сибирская горихвостка *Phoenicurus auroreus*	+	+			о
Синий соловей *Luscinia cyane bochaiensis*	+	+			м
Соловей-свистун *Luscinia sibilans*		+			о
Синехвостка *Tarsiger cyanurus cyanurus*		+			о
Бледный дрозд *Turdus pallidus*	+	+			о
Оливковый дрозд *Turdus obscurus*		+			о

Окончание приложения

Вид	Гн	Пр	Зим	Залёт	Статус
Сизый дрозд *Turdus hortulorum*	+	+			м
Дрозд Науманна *Turdus naumanni*		+	+		м
Бурый дрозд *Turdus eunomus*		+			о
Сибирский дрозд *Zoothera sibirica*		+			р
Пёстрый дрозд *Zoothera varia*	+	+			о
Синяя птица *Myophonus caeruleus*				1	р
Бурая сутора *Suthora webbiana*	+	+	+		о
Ополовник *Aegithalos caudatus*	+	+	+		о
Болотная гаичка *Poecile palustris*	+	+	+		м
Пухляк *Poecile montanus*		+	+		о
Московка *Periparus ater amurensis*	+	+	+		о
Восточная синица *Parus minor wladiwostokensis*	+	+	+		о
Обыкновенный поползень *Sitta europaea amurensis*	+	+	+		м
Обыкновенная пищуха *Certhia familiaris orientalis*	+	+	+		о
Буробокая белоглазка *Zosterops erythropleurus*	+	+			о
Полевой воробей *Passer montanus*	+	+	+		о
Юрок *Fringilla montifringilla*		+	+		о
Китайская зеленушка *Chloris sinica ussuriensis*	+	+	+		р
Чиж *Spinus spinus*		+	+		о
Обыкновенная чечётка *Acanthis flammea flammea*		+	+		о
Сибирский горный вьюрок *Leucosticte arctoa brunneonucha*		+			р
Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus erythrinus*	+	+			о
Сибирская чечевица *Carpodacus roseus*		+	+		о
Урагус *Uragus sibiricus ussuriensis*	+	+	+		о
Щур *Pinicola enucleator ksmtschatkensis*		+	+		р
Клёст-еловик *Loxia curvirostra*				1	р
Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula cassini*		+	+		о
Уссурийский снегирь *Pyrrhula griseiventris rosacea*		+	+		о
Серый снегирь *Pyrrhula cineracea*		+	+		р
Малый черноголовый дубонос *Eophona migratoria migratoria*	+	+			о
Большой черноголовый дубонос *Eophona personata magnirostris*	+	+	+		о
Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes schulpini*	+	+	+		о
Белошапочная овсянка *Emberiza leucocephalos leucocephalos*		+			р
Красноухая овсянка *Emberiza cioides weigoldi*	+	+	+		о
Ошейниковая овсянка *Emberiza fucata*	+	+			о
Желтогорлая овсянка *Cristemberiza elegans elegans*	+	+			м
Таёжная овсянка *Ocyris tristrami*	+	+			о
Овсянка-ремез *Ocyris rusticus*		+			о
Седоголовая овсянка *Ocyris spodocephalus*	+	+			м
Маскированная овсянка *Ocyris (spodocephalus) personatus*		+			р
Дубровник *Ocyris aureolus ornatus*	+	+			о
Рыжая овсянка *Ocyris rutilus*		+			р

Литература

Глущенко Ю.Н., Шибнев Ю.Б. 1984. К орнитофауне заповедника «Кедровая падь» и сопредельных территорий // *Фаунистика и биология птиц юга Дальнего Востока*. Владивосток: 44-48.

Васильев Н.Г., Харкевич С.С., Шибнев Ю.Б. 1984. *Заповедник «Кедровая падь»*. М: 134-157.

Назаренко А.А. 1971. Краткий обзор птиц заповедника «Кедровая падь» // *Орнитологические исследования на юге Дальнего Востока*. Владивосток: 12-51.

Панов Е.Н. 1973. *Птицы Южного Приморья (фауна, биология и поведение)*. Новосибирск: 1-376.

Степанян Л.С. 1990. *Конспект орнитологической фауны СССР*. М.: 1-728.

Шибнев Ю.Б. 1983. Биология ошейниковой совки в Приморье // *Бюл. МОИП*. Отд. биол. **88**, 4: 32-39.

Шибнев Ю.Б. 1981. Зимовка крупных хищных птиц в Приморье // *Редкие птицы Дальнего Востока*. Владивосток: 100-107.

Шибнев Ю.Б. (1989) 2018. О биологии длиннохвостой неясыти *Strix uralensis* в Приморье // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1593): 1645-1657. EDN: VYYXRJ

Шибнев Ю.Б. 1987. О методах и результатах учёта птиц для «Летописи природы» в заповеднике «Кедровая падь» // *Организация и методика учёта промысловых и редких видов млекопитающих и птиц Дальнего Востока*. Владивосток: 60-64.

Шибнев Ю.Б. (1988) 2018. Пролёт японского *Grus japonensis* и даурского *Grus vipio* журавлей в районе заповедника «Кедровая падь» // *Рус. орнитол. журн.* **27** (1673): 4755-4756. EDN: XZRSWD

Шибнев Ю.Б. 1984. Фенологические наблюдения за птицами в заповеднике «Кедровая падь» // *Фенологические явления в Приморье*. Владивосток: 86-92.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2217**: 3578-3579*

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* на реке Бикин

Б.К.Шибнев

*Второе издание. Первая публикация в 1976**

В нижнем течении Бикина дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis* был довольно обычен. Гнездится по обширным сфагновым марям и вылетает кормиться на поля, лежащие близ посёлков. В 1950-1960-е годы в районе Нижнего Перевала мне приходилось видеть их кормящимися в полях в числе до 10-12 особей. Сейчас кроншнепы встречаются значительно реже. 10 июня 1957 сильный град погубил значительное количество этих птиц. Только в районе полей Верхнего Перевала было найдено 6 трупов дальневосточных кроншнепов. Причиной гибели этого кроншнепа также являются поздневесенние палы и в какой-то части енотовидные собаки *Nyctereutes procyonoides*, уничтожающие яйца и птенцов. Весенний пролёт кроншнепов обычно наблюдается во второй и третьей декаде апреля. Осенний отлёт нами не отмечался.

* Шибнев Б.К. 1976. Краткие сообщение о дальневосточном кроншнепе // *Тр. Окского заповедника* **13**: 163.

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis*.
Сихотэ-Алинь, река Бикин. 28 апреля 2014. Фото Д.Кочеткова

ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск ***2217****: 3579-3580*

Азиатский бекасовидный веретенник *Limnodromus semipalmatus* в Бурятии

А.П.Шкатулова

*Второе издание. Первая публикация в 1976**

На территории Бурятии в 1974 году азиатский бекасовидный веретенник *Limnodromus semipalmatus* наблюдался как во время пролёта, так и на гнездовании.

На пролёте в окрестностях Улан-Удэ данный вид отмечался нами только три дня – с 22 по 24 мая. За три утренних наблюдения (с 6 ч 30 мин до 11 ч 00 мин) пролетело всего 37 птиц. Среднее количество особей в одной группе было 7.7 (3-18 птиц). На отдых останавливались в пойме Тулунжи на кочкарном топком труднодоступном её участке (300-

* Шкатулова А.П. 1976. Краткие сообщения об азиатском бекасовидном веретеннике // *Тр. Окского заповедника* **13**: 169-169.

500 м²). Подпускали к себе на 25-50 м. Во время отдыха держались вместе с другими куликами (турухтан *Philomachus pugnax*, травник *Tringa totanus*, мородунка *Xenus cinereus*, поручейник *Tringa stagnatilis*, фифи *Tringa glareola)*, но обособленной группкой. Последняя осенняя встреча 6 сентября.

Гнёзда *L. semipalmatus* я обнаружила 19 июня в устье реки Тулдун на северном побережье озера Большое Еравное. Тулдун впадает в озеро тремя рукавами, между которыми из воды выступают участки суши, поросшие густой травой, рогозом, камышом, осоками и вейниками. Здесь на площади 350×300 м найдено 5 гнёзд, которые находились на расстоянии от 35 до 61 м одно от другого. Гнёзда устроены в центре куртин злаков, стебли которых хорошо их маскировали.

Рядом с гнёздами бекасовидного веретенника в 1-25 м гнездились малая чайка *Larus minutus* (19 гнёзд), белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus* (84 гнезда), речная крачка *Sterna hirundo* (101 гнездо), рогатая поганка *Podiceps auritus* (6 гнёзд), хохлатая чернеть *Aythya fuligula* (7 гнёзд), серая утка *Anas strepera* (1 гнездо), чирок-свистунок *Anas crecca* (2 гнезда), поручейник и малый зуёк *Charadrius dubius* (по 1 гнезду).

Размеры гнёзд *L. semipalmatus* (n = 2), мм: 142-161×129-135, глубина 30-47. В каждом гнезде было по 2 яйца. Размеры яиц (n = 4), мм: 47.1-49.4×31.3-32.9, в среднем 48.4×31.5, вес – 25.9-27.5, в среднем 26.4 г.

5-9 июля 1974 началось вылупление птенцов.

На обследованной территории с 8 июня по 10 июля 1974 всё время держалось 16 азиатских бекасовидных веретенников. 11 июля наблюдения были прерваны. 6 сентября здесь отмечено 25 птиц.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2217**: 3580-3581*

Послегнездовые и осенние миграции веслоногих и голенастых птиц в низовьях дельты Волги

Д.В.Бондарев

*Второе издание. Первая публикация в 1974**

Голенастые и веслоногие – фоновые группы птиц дельты реки Волги. Осенью к гнездящимся здесь особям присоединяются птицы, летующие и гнездящиеся в дельте Урала, у северных и северо-восточных берегов Каспия. Характер миграций каждого вида имеет свои особенности.

* Бондарев Д.В. 1974. Послегнездовые и осенние миграции веслоногих и голенастых птиц в низовьях дельты Волги // *Материалы 6-й Всесоюз. орнитол. конф.* М., **2**: 159-160.

Первые небольшие стайки кудрявых пеликанов *Pelecanus crispus* из 7-8 птиц появляются в восточной части дельты в последних числах июня – начале июля. Число стаек и птиц в них постепенно растёт и к концу июля они объединяются в 1-2 скопления, насчитывающих до 3-3.5 тыс. особей. В августе стаями по 30-50 особей они начинают откочёвывать к юго-западу. Небольшие стаи и одиночные кудрявые пеликаны остаются в култуках до ноября.

Большие бакланы *Phalacrocorax carbo* в первый месяц после вылета молодых (июль) регулярно совершают кормовые перелёты на взморье, возвращаясь на ночёвку к местам гнездования. Осеннее стаение происходит в сентябре; птицы сосредоточиваются в заповеднике и в охраняемых участках Севкаспрыбвода. В это время бакланы находятся у устьев протоков, собираясь в стаи по 3 тыс. особей и более. Кольцеванием установлено, что отдельные стаи держатся постоянно в течение всей осени в одних и тех же местах, ночуя в одном строго определённом ерике на деревьях. В октябре происходит значительное увеличение числа бакланов за счёт птиц, подлетающих из восточных районов Северного Каспия. Основная масса сосредоточивается в западной части дельты Волги на Дамчикском участке Астраханского заповедника; в отдельные годы число птиц в октябре доходило здесь до 40-45 тысяч. Совершая регулярные кормовые перелёты один раз в сутки, бакланы находятся в данном районе до заморозков, наступающих обычно в последних числах ноября, после чего в течение 1-2 сут основная масса бакланов покидает дельту.

Серые цапли *Ardea cinerea* в послегнездовой период широко рассредоточиваются по дельте Волги, особенно молодые птицы. В августе серые цапли перекочёвывают в авандельту, где сосредоточиваются на прибрежных отмелях островов. В октябре-ноябре небольшие скопления в 20-30 птиц держатся у устьев протоков до отлёта.

Характер осенних миграций больших белых цапель *Casmerodius albus* аналогичен, с той разницей, что в октябре-ноябре цапли этого вида наблюдаются стаями в 1500-2000 особей. Пролёт, проходящий в ноябре, выражен более ярко.

Малые белые *Egretta garzetta* и жёлтые *Ardeola ralloides* цапли покидают дельту Волги в сентябре. Малые белые цапли перед отлётом сосредоточиваются стайками по 15-20 птиц в зарослях ивы в култуках, а жёлтые цапли держится в авандельте в 20-30 км от береговой кромки. Пролёт проходит интенсивно. 9 сентября 1972 за 4 ч наблюдений отмечено до 250 жёлтых цапель летевших на юго-запад стаями по 15-20 птиц в каждой.